



Dictionnaire classique d'histoire naturelle [electronic resource]

Jean Victor Audouin

LU AVEC LIREGRATUITEMENT.COM

Livre libre de droits, lisible gratuitement en ligne et en quinze minutes par jour.

FÉVRIER

\WvVV VWVWVWVWVWVWVW VVWVW v*v\vW\ w w w\
VWV W V** VA vwvsw W V V V\V\AV\\V\V^V\ V W VV>
WV\\ \x y. \>

IOD

10. ins. Nom scientifique du Papillon vulgairement nomme Paon du jour. (b.)

* IODATES. PT. Iode.

IODE. bot. min. chim. Ce corps est un de ceux que , dans l'état actuel des connaissances chimiques, l'on considère comme simples. Il lut de- CQUverJpavan t 1812 par Courtois, salpêtrièT\le Paris, dans les eaux mères des cendres de Fucus. Clément et Désarmes annoncèrent cette découverte à l'Institut dans sa séance du 29 novembre i8i5. Quelques jours après, Gay-Lussnc lut un Mémoire sur celle nouvelle substance pour laquelle il proposa le nom d'Iode dérivé d'un mot grec qui signifie violet , en raison de la plus saillante de ses propriétés, celle de se réduire en vapeur d'une belle couleur violette. Ce célèbre chimiste aperçut de prime abord les rapports que l'Iode offrait avec le Chlore par la manière dont il se comportait avec l'Oxigène et l'Hydrogène, et dès-lors la théorie dans laquelle le Chlore était considéré comme corps simple, fut pleinement confirmée.

D'autres chimistes , et en particulier

11. Iodine, s'occupèrent à cette époque de l'Iode ; ils obtinrent des résultats semblables à ceux de Gay-Lussac ,

TOMF. IX.

IOD

et en peu de temps ils épuisèrent, pour ainsi dire , toutes les connaissances qu'il était possible d'acquérir sur la combinaison de ce corps avec les autres.

L'Iode est solide à la température ordinaire; il se présente sous la forme de paillettes micacées, d'un gris noirâtre , ou de lames rhomboïdales , lisses-brillantes , et d'octaèdre allongé.

Sa densité est de 4,348. Il se liquéfie à 107 degrés, et entre en ébullition de 175 à 180, en produisant la belle vapeur violette dont nous avons parlé ci-dessus, d'après le calcul , a une densité de 8,6g5. En contact avec la peau, l'Iode y produit une tache brune qui devient jaunâtre et se dissipe assez promptement à l'air. Son odeur est analogue à celle du Chlore étendu d'eau , et sa saveur est très-âcre, même caustique; aussi est-il considéré comme un poison violent.

Avec les autres corps simples, l'Iode forme plusieurs combinaisons :

ainsi l'Acide iodique est le produit de son union avec 1 Oxygène dans certaines circonstances favorables , c'est-à-dire au moment où celui-ci cesse de faire partie de quelques composés.

L'Acide hydriodique s'obtient en exposant à une chaleur rouge l'Iode et l'Hydrogène. L'Acide chloriodique

2 IUD

est le résultat de son union avec le Chlore. Les autres combinaisons de l'Iode avec les corps simples ne jouissent pas de propriétés acides ; on les nomme simplement des Iodures , et leur composition , ainsi que leurs propriétés , sont analogues à celles des sulfures , des chlorures, etc. Le Bore et le Carbone n'ont pas encore pu être combinés avec l'Iode , tandis qu'on a obtenu avec facilité des Iodures d'Azote , de Soufre , de Potassium ^ de Sodium , de Zinc , de Fer, d'Etain , d'Antimoine , de Cuivre , de Mercure, d'Argent, etc. Pendant la combinaison de l'Iode avec le Potassium ou avec d'autres Métaux, il se dégage de la chaleur et quelquefois de la lumière. L'eau n'a qu'une action trèsfaible sur l'Iode; elle n'en dissout qu'un 0,007 de son poids , et la solution est jaune. Celle-ci se décolore par l'ébullition , et ne contient plus que des Acides hydriodique et iodique résultans de la décomposition d'une petite quantité d'eau.

Une des propriétés chimiques les plus remarquables de l'Iode , c'est celle de former un composé bleu lors-

qu'on le met en contact avec l'amidon. Jusqu'à ces derniers temps, on s'était accordé à considérer ce composé comme un Iodure d'amidon , c'est-à-dire comme une combinaison intime de l'Iode avec l'amidon qui était alors regardé comme une substance simple dans sa composition organique. Mais il en est tout autrement, selon les expériences de Raspail , expériences dont il a lu le précis devant la Société Philomatique , le 6 août 1825. Ce jeune et savant observateur s'est assuré par des recherches microscopiques et chimiques, que la couleur bleue que prend l'amidon par l'action de l'Iode , n'est due qu'à la superposition de cette dernière sur la surface des granules de fécule dont il a décrit les formes diverses. Ces granules , qu'il compare à des perles de

Nacre plus ou moins grosses et plus ou moins irrégulières, après avoir été enduits, pour ainsi dire, d'un vernis d'Iode, peuvent

IOD

être décolorés par le sous-carbouale de Potasse, sans perdre leurs formes ou leur transparence. Ces faits tendent à prouver que l'amidon se compose d'un tégument susceptible d'être coloré par l'Iode et d'une matière gommoïde située à l'intérieur.

Ainsi que le Chlore , l'Iode décolore les teintures végétales. Cette décoloration paraît due à une décomposition de l'eau qui tient en solution les matières organiques; l'Oxigène de celle-ci s'unit au Carbone et à l'Hydrogène des substances colorantes , tandis que son Hydrogène se porte sur l'Iode.

On retire l'Iode des eaux mères des cendres de Fucus et d'autres Algues marines. Il y existe à l'état de combinaison saline, c'est-à-dire que ces eaux contiennent des hydriodates de Potasse et de Soude. On les introduit dans une cornue lubulée à laquelle sont adaptés une allonge et un récipient. L'allusion intermittente d'un excès d'Acide sulfurique concentré détermine la décomposition de l'hydriolate. Il se forme du sulfate de Soude ou de Potasse , et de l'Acide sulfureux, parce que l'excès d'Acide sulfurique a cédé une portion de son Oxigène à l'Hydrogène de l'Acide hydriodique. L'Iode est donc mis en liberté , et par l'ébullition il passe dans le récipient en même temps que les autres produits gazeux. On le lave et on le rectifie en le distillant de nouveau avec une solution étendue de Potasse. Il est alors sous forme de lames brillantes qui ressemblent au Carbure de fer, et que l'on dessèche entre des feuilles de papier Joseph.

Ce n'est pas seulement des Plantes de la famille des Algues qu'on pourrait extraire l'Iode. Plusieurs autres corps marins, et particulièrement les Epounges, en contiennent une certaine quantité. On l'a retrouvé dans quelques sources d'eau minérale, et, tout récemment, le savant professeur Vauquelin a lu, à l'Académie des Sciences, une note sur une mine d'Argent des environs de

Mexico qui en contenait à peu près dix— lin i l pour eue. L'Iode y existe à l'état d'Iodure (Anu. de Phys. et de Chim., i8a4, p. 99).

Nous avons parlé plus haut de Pirtij; Oï lli ne copie la de *cô'uvèr' < e de 1 Iode a eue pour la chimie, en ce qu'elle a jeté un grand jour sur un point de doctrine sujet à controverse. Par les nombreuses combinaisons que ce corps est susceptible de contracter avec les autres substances, on est parvenu à produire une foule de composés intéressants pour les chimistes, mais dont les usages techniques sont encore très-bornés. Cependant on a employé avec succès l'Iode ou plutôt ses sels (Iodures de Potasse et de Soude) dans le traitement du goitre. Le docteur Coindet de Genève a le premier l'a fait connaître son efficacité dans ce cas, et en a obtenu des succès très-nombreux; . Malheureusement, quelques médecins ignorans en chimie l'ont administré sans employer les précautions convenables, et il en est résulté de très-graves accidens. L'usage de ce médicament a conséquemment perdu de son crédit aux yeux du vulgaire, qui s'enthousiasme toujours pour les nouveautés, et qui les proscriit avec autant de facilité si par hasard des hommes inexpérimentés en abusent. Il est constant, néanmoins, que l'Iode a guéri, en Suisse, une foule d'individus affectés de la difformité du goitre; mais on

doit observer que son emploi irréfléchi peut avoir des suites très-dangereuses. C'est par l'Iode contenu dans les Eponges carbonisées que l'emploi de celles-ci a produit la guérison d'un nombre trèsconsidérable de goitreux, avantqu'on eût soupçonné le principe actif de ec médicament. L'Iode , foi niant un composé bleu avec l'Amidon , est uu réactif excellent pour reconnaître la présence de celte substance dans les Végétaux. (o..N.)

IOLITHE. min. (Werncr.) V. Dicn BOITE.

ION. bot i'ïian. La Violette chez

les anciens, d'où les nom- d'Iode, d'Iolitlie, etc. (b.)

* 1oNE. Joue, cnusr. Genre de l'ordre des Auiphipodes , famille des Ilétéropodes de Latreille (Fam. Nat. du Règn. Anim.}, avant pour caractères essentiels : quatorze pieds , tous sans ongles , en ijrme de lanières arrondies à leur extrémité, et simplement propres à la natation ; branchies trèsramiliées ; queue terminée par deux longs appendices presque semblables aux pieds; des antenues distinctes.

Ce genre, établi par Latreille qui le plaçait (llègn. Anim. T. m) dans l'ordre des Isopodes , a été formé aussi par Leach sous le nom deCcclino. Diisniareit (article Malacostracés du Dictionnaire des Sciences Naturelles) le réunit aux Pranizcs dont il dillère cependant par des caractères assez tranchés, tirés surtout du nombre et de la forme des pales ; il s'éloigne des Apscudes par la foime et l'usage de celles-ci. La seule espèce de ce genre est :

L'Io.vE tiioiiacio_ue, Io/ie thoracicus , Onisctis thoracicus , Monlagu (Traits. L'uni. Suc. T. îx, iv, 3), figurée dans l'Encyclopédie Méthodique (Crusl. et Ins., tab. 556 ,

fig. 28). (G.)

IONESIK. Ionesia. bot. pu an. Genre de la famille des Légumineuses , cl de l'Heplandrie Monogyuie, L. , établi par PiOxburgh {Asiat. Research., 4 , p. 555) et ainsi caractérisé : calice a deux folioles ; corolle iufundibulifonnedont le tube est charnu et fermé; le limbe quadrilobé; appendice annuliforme , inséré sur l'entrée du tube de la corolle el supportant sept étarnines ; légume pédicellé en forme de sabre, et contenant quatre à huit graines. Ce genre a des rapports avec le Palovea et le Bauhinia; il ne reu ferme qu'une seule espèce nommée par Roxburgh Ionesia pinna-ta. C'est X Asjogain de Rhéede (Hort. Malab.,b , p. 117, tab. 59), Arbre des Indes-Orientales , d'une grandeur médiocre, dont les feuilles sont alternes , pétiolées, imparipin-

nées , et les fleurs , d'un jaune orangé , sont disposées en cimes, terminales et axillaires. (g..n.)

* IONIA. bot. m AN. Nom que l'Yvette {Teitcrium Chamcepytis , h.) portait chez les anciens. (G..N.)

* IONIDES. dot. phan. (Ruell.) Syn. de Câprier. (b.)

10NIDION. lonidium. dot. tiian.

Genre établi par Ventenat pour quelques espèces de Violettes exotiques, et qui a été adopté depuis par tous les botanistes. Ce genre , qui appartient à la famille des Violacées , avait été créé auparavant sous le nom de Pombalia , par Vandelli; néanmoins, l'usage a consacré le nom de Ventenat, bien qu'il soit postérieur à celui du botaniste portugais. Dans son Mémoire sur la famille des Violacées , et dans le premier volume du Prodrornus Systematis du professeur De Candolle, le botaniste De Gingins a voulu réta-

blir le genre *Pombalia* de Vandelli , comme distinct de *Vloni-*
cliurn. Mais Aug. de Saint-Hilaire (Plant, usuell. des Brasi-
liens, n° xi) a réfuté victorieusement cette opinion , en prouvant que les
caractères assignés au *Pombalia* se retrouvaient évidemment
dans plusieurs espèces faisant partie du genre *lonidium*. Le
même auteur a fait une observation semblable pour le genre *Hy-*
banthus de Jacquin, qui doit être réuni à *V lonidium*. Voici les ca-
ractères qu'il assigne au genre *lonidium* : calice profondément
quinquépartite , dont les divisions ne sont ni prolongées au-des-
sous de leur base , ni entièrement séparées. Pétales au nombre de
cinq , périgynes ou plus rarement hypogynes, très-inégaux, l'infé-
rieur plus grand, onguiculé, saus éperon , à ongle ordinairement
plus large et concave à la base, rétréci au sommet. Elamines au
nombre de cinq , insérées comme les pétales et alternes avec eux
; filets libres ou soudés, le plus souvent courts, quelquefois nuls;
anthères aplaties, membraneuses au sommet , attachées par la

base , immobiles , tournées vers le pistil, biloculaires et s'ou-
vrant longitudinalement; les connectifs ou les filamens des an-
thères inférieures le plus souvent munis d'un appendice plus ou
moins sensible. Style couibé, épaissi au sommet, persistant. Stig-
mate un peu latéral. Ovaire libre , sessile , oligosperme ou poly-
sperme ; ovules attachés à trois placentas pariétaux. Capsule en-
tourée du calice, uniloculaire , s'ouvrant en trois valves étalées
portant les semences sur le milieu de leur face. Semences petites ,
horizontales, ovoïdes, globuleuses , creusées au sommet d'une
chalaze orbiculaire et ridée, quelquefois relevées d'un côté d'une
ligne proéminente (raphé) ; ombilicun peu latéral, rarement toul-
à-fait terminal; tégument propre double, l'extérieur crustacé ,
l'intérieur membraneux , adhérent à l'endosperme qui est char-

nu. Embryon axile , droit, ayant presque la même longueur que l'endosperme; cotylédons planes; radicule tournée vers l'ombilic.

Les espèces de ce genre sont en général de petits Arbustes rameux , à feuilles alternes entières, accompagnées de deux stipules à leur base.

Les fleurs sont pédonculées et placées à l'aisselle des feuilles supérieures. L'une des espèces les plus intéressantes de ce genre est *Tlonidium Ipecacuanha* de Ventenat ou *Pombalia Ipecacuanha* de Vandelli. Dans l'ouvrage que nous avons cité précédemment , Aug. de Saint-Hilaire a prouvé que le *Viola Itoubou* d'Aublct n'est qu'une simple variété du *Pombalia* de Vandelli. Ainsi , celle espèce croit à Cayenne et sur la côte du Brésil , depuis le fleuve des Amazones jusqu'au cap Frio ; mais on ne l'a pas retrouvée au midi de ce cap. Elle se plaît en général dans les lieux bas et sablonneux. C'est une Plante extrêmement variable , dont la tige rameuse est tantôt étalée , tantôt ascendante, longue de six à vingt-quatre pouces , couverte de poils quelquefois très-longes et très-rapprochés. Ses feuilles sont alternes, ovales, lan-

céolées, dentées en scie et amincies en pointe à leurs deux extrémités et chargées de poils épars. Les divisions du calice sont semi-pinnatifides. La racine de cette Plante, qui est grosse à peu près comme une plume à écrire, un peu tortueuse , grisâtre et striée en dehors , blanche en dedans , est connue au Brésil sous les noms de *Poaya*, de *Poaya da Praia* et de *Poaya branca*. Elle sert à remplacer, dans quelques ' parties du Brésil , le véritable *Ipécacuanha* fourni par le *Cephoelis Ipécacuanha* ; on la désigne sous le nom d'*Ipccacuanha blanc*.

Aug. Saint-Hilaire a encore décrit (Plant, usuelles des Brasi-
liens, n° ix), sous le nom A' Ionidium Poaya, une autre espèce
nouvelle, voisine de la précédente, qui a été trouvée à l'ouest du
Rio-San-Francesco, dans la province de Minas-Gerars, et dont
la racine est également employée par les habitants comme un
puissant cinétique, (a., r.)

♦IONOPSIDE. Jonopsis. bot.

tian. Genre de la famille des Orchidées et de la Gynandrie
Monandrie, L., établi par Kunth (in Humb.

et Bonpl. Nov. Gen., I, p. 348), et qui peut être caractérisé
ainsi : le calice est à six divisions disposées sur deux rangs; les
trois divisions extérieures sont ovales, lancéolées, aiguës, égales
entre elles; les deux inférieures forment, en se réunissant à leur
base, une sorte de petit sac obtus. Les deux divisions internes et
supérieures sont obliques, ovales, un peu obtuses. Le labelle est
onguiculé à sa base qui forme une gouttière; il est beaucoup plus
grand que les autres parties de la fleur, inférieur et obcordé-
forme. Le gynostème est court, stigmatifère à sa face antérieure,
terminé supérieurement par une anthère operculiforme à deux
loges :

chaque loge contient une masse pollinique, ellipsoïde; ces
masses viennent s'attacher l'une et l'autre à la partie supérieure
d'une petite lame qui se termine inférieurement par un rétinacle
allongé formant une sorte de

IPE S

bec disposé en angle droit à l'extrémité de la petite lame.

Ce genre se compose de plusieurs espèces originaires d'Amérique, et qui toutes sont parasites. La première connue est celle que Kunth a décrite sous le nom *A' Ionopsis pttichella*, /oc. cit., tab. 85. Elle croît dans le royaume de la Nouvelle-Grenade, entre Carthagène et Buga.

Nous en possédons une espèce nouvelle à laquelle on peut donner le nom *A' Ionopsis distichophylla*, à cause de la disposition de ses feuilles, qui sont plus larges que dans l'espèce précédente; elle s'en distingue encore par sa hampe deux fois plus élevée et rameuse, par ses fleurs plus petites et son labelle cilié. Elle a été découverte à la Martinique par Richard père, qui l'y a trouvée parasite sur le Café.

Plusieurs autres Orchidées, mieux étudiées, devront encore rentrer dans ce genre; tel est par exemple le *Dendrobiuin utricularioides* de Swartz.

fi.it)

Le nom à? *Ionopsis* a été appliqué à une section du genre *Cochlæaria*, par De Candolle [Syst. Regn. Veg. A'c/. , T. II, p. 371] qui, en raison de l'existence du genre établi par Kunth, a changé depuis sa terminaison en celle *A' Ioniopsidiurn*. (G..N.)

* *IONOPSIDIUM*. bot. phan. (De Candolle, Prodr. Regn. P'eg. nat.

T. I, p. 174.) V. *Cociliæakia* et *Io-Norside*. (g..n.)

* *IONDS* et *IOPS*. rois. Les deux Poissons désignés sous ces noms pâlies anciens ne peuvent être reconnus, (b.)

* IOTA. ins. Espèce de Noctuelle dont la chenille se nourrit d'Armoises et de Santolincs. (u.)

IPÉCACUANHA. bot. tian. On désigne sous ce nom un grand nombre de Racines appartenant à des Végétaux de genres et de familles différentes, mais qui toutes jouissent de la propriété de déterminer le vomissement. C'est MarcgraafTet Pison qui ,

G IPE

les premiers, parlèrent dp l'Ipécacuanha dans leurilistoire Naturelle et Médicale du Brésil , publiée vers le milieu du dix-septième siècle. Ils donnèrent une description et une figure de la Plante qui , au Brésil , l'ournitlaracine connue sous ce nom.

Mais celte figure et la description qui l'accompagne sont, tellement vagues et imparfaites , q'jc nul botaniste ne put rapporter la Plante mentionnée par ces auteurs à aucun des genres alors connus. Dès-loi s chacun, s'appuyant sur quelque supposition plus ou moins fondée, attribua la racine d'Ipécacuanha du commerce à quelque genre connu. C'est ainsi que Bai, dans son Histoire générale des Plantes , crut l'Ipécacuanha fourni par une espèce du genre Paris, delà famille des Asparaginées. Morison , Plucknet , Linné lui-même , dans la première édition de sa Matière Médicale , pensaient qu'elle était produite par une espèce de Chèvrefeuille ; plus tard celui-ci l'attribua à une espèce de Violette. En un mot , les opinions les plus opposées furent émises sur l'origine et la nature du Végétal auquel on devait-llpécacuanha. De cette obscurité naquit un autre inconvénient qui n'a pas peu contribué à augmenter la confusion déjà si grande à cet égard : ' c'est que n'ayant aucune donnée certaine sur la Plante qui fournissait le véritable Ipécacuanba , on appliqua ce nom à

toutes les Racines exotiques douées d'une propriété émétique plus ou moins marquée , et bientôt chaque pays eut en quelque sorte une espèce particulière d'Ipécacuanha.

La cupidité dut. profiter de cette ignorance pour accréditer les incertitudes qui couvraient ce médicament. Comme la véritable espèce d'Ipécacuanha , celle dont Marcgraaff et Pison avaient les premiers donné la description , était assez rare, les marchands américains y mêlèrent bientôt plusieurs autres racines plus communes et souvent presque inconnues , qui d'un côté accrurent la confusion , et d'un autre côté contri-

IPE

huèrent à diminuer la réputation de la racine du Brésil, dont les vertus se trouvaient ainsi masquées et en quelque sorte dénaturées par cette sophistication. Dès-lors l'Ipécacuanha du commerce ne fut plus qu'un mélange hétérogène de racines différentes entre elles, non-seulement par les Plantes dont on les retirait , mais encore par le lieu d'où elles provenaient.

Cependant l'opinion que la racine d'Ipécacuanha était celle d'une Violette , prévalut pendant fort longtemps ; mais on n'était pas d'accord sur l'espèce à laquelle il fallait l'attribuer. Ainsi quelques auteurs pensaient que c'était le *Viola Ipecacuanha* de Linné fils, ou *Pombalia Ipecacuanha* de Vandelli; d'autres, le *Viola diandra* , L. ; quelquesuns le *Viola patviflora* , L. ; ceulà le *Viola Itoubou* d'Aublet. Tel était l'état d'incertitude qui régnait sur ce médicament, quand le célèbre Mullis , directeur de l'expédition botanique de Santa-Eé de Bogota, dans le royaume de la Nouvelle-Grenade , fit parvenir à Linné , en 1764, la description et la figure du Végétal qui , au Pérou , produisait la racine d'Ipé-

cacuanha. Ces rcuseignemens ne. furent publiés qu'en 1781 par Linné fils , qui, dans son supplément, décrivit la Plante de Mutis sous le nom de *Psychotria ernetica* , que lui avait donné le botaniste espagnol. Il crut, mais à tort, que cette espèce était la même qucellc décrite long-temps avant par iUarcgraali et Pison , en sorte que depuis cette époque ou pensa généralement que c'était la même Plante qui , au Pérou et au Brésil, fournissait l'Ipécacuanha.

Cependant don Avellar Brotero , professeur de botanique à l'université de Coimbr, en Portugal, fit connaître en 1800 , dans les Actes de la Société Linnéenne de Londres, la Plante qui, au Brésil , produit l'Ipécacuanha. Cette Plante, quoiqu'apr par tenant à la famille des tlabiacées, commele *Psychotria* du Pérou, en est

IPE

génériquement différente ; il la nomma *Callicocca Jpecacuanha*. Ces travaux jetaient un grand jour sur l'histoire de ce médicament. Néanmoins , on tomba dans une nouvelle erreur en croyant que toutes les racines que le commerce nous fournissait sous le nom d'Ipécacuanha étaient celles du *Psychotria* ou du *Callicocca*. Ce fut pour détruiie cette opinion erronée que De Candolle publia, en ïiioa , un Mémoire dans lequel il démontra nue , loin d'être uniquement produites par les deux seuls Végétaux décrits par Mutis.ct Brotero , les divers Ipécacunnhas provenaient d'un très-grand nombre de Plantes , de genres et de familles quelquefois fort éloignés.

Plusieurs observations publiées depuis cette époque, et en paticulier les faits nouveaux insiés dans les Plantes usuelles des

Brasilicns , que rédige Aug. Saint- ililaire, ont confirmé celte as-
sertion de De Car.dolle. Nous croyons donc utile d'énumérer ici
rapidement les diverses Plantes dont les racines ont reçu le nom
d'Ipécacuanha.

Famille des Rubiacces. C'est à cette famille, déjà si intéres-
sante par le grand nombre de médicamens importaues qu'elle
fournit, qu'il faut d'abord rapporter les deux espèces réellement
officinales, savoir : celles que nous désignons sous les noms
d'Ipécacuanha annelé et d'Ipécacuanha strié. Outre ces deux es-
pèces principales , cette famille nous offre encore plusieurs
autres racines, employées sous le nom d'Ipécacuanha dans di-
verses contrées de l'Amérique méridionale. Ainsi , au rapport
d'Auguste Saint -Hilaire , ou emploie dans diverses parties du
Brésil , les racines du Spermacoce Poaya et du Spermacoce ferru-
ginea ; celles du Richard sonia roseael du R ictan/so/iia scabra.
Cette dernière a même beaucoup de rapports avec I Ipécacuanha
aunelé; mais les anneaux qu'elle offre sont beaucoup plus larges
que ceux de celte espèce , cl sa saveur est moins acre. Selon

Dandrada , on ferait également usage des racines du Psycho-
tria herbacea.

Famille des Violariêes. Les Ipécacua.nb.as) fournis par les
Plantes de celle famille , ont , en général , une couleur blanchâtre
, et sont beaucoup moins énergiques. L'espèce princi-

Çale est Y Ionidium Ipecacuanha de cnlenat ou Pombalia de-
Vandelli , à laquelle il faut réunir le V iola Itoubou d'A.ublct qui
n'en est pas spécifiquement différent. Celte Plante croît à
Cayenne. On la trouve également par intervalles sur le littoral du
Brésil , depuis le fleuve des Amazones jusqu'au cap Frio ; maison

ne la retrouve pas au midi de ce cap. Ces racines , employées fréquemment à Cayenne et au Brésil, sont d'un blanc pâle, cylindriques, allongées, quelquefois rameuses , grosses comme une plume à écrire , un peu tortueuses , offrant quelquefois des étranglemens et des intersections plus ou moins marquées. L'axe ligneux est en général plus épais que la couche corticale , et plus jaune; la cassure est assez nette, peu résineuse; son odeur est manifestement héibacée et nauséuse; sa saveur est comme amylocée, d'ajord faible , mais bientôt un peu amère , et surtout d'une arrêté remarquable.

Auguste Saint- Hilaire a fait connaître une espèce nouvelle qu'il nomme *lonidium* Poaya , et que les habitans des provinces intérieures du Brésil emploient pour. remplacer l'*Ipécacuanha* annelé. Ou peut en dire autant du *f-iola paivijlora* de Linné fils, qui appartient au genre *lonidium*. On la désigne aussi au Pérou sous le nom d'*Ipécacuanha* blanc.

Celte propriété émétique des *Violariées* exotiques se retrouve également dans les racines de nos *Violettes* indigènes, mais avec moins d'énergie.

Famille des *slpocynées*. Les genres de cette famille sont généralement remarquables par le suc blanc et laiteux qu'elles renferment, et qui leur donne des qualités Acres et plus ou moins irritantes; aussi plusieurs fournissent-elles des racines que l'on dé-

8 IPE

signe , dans les pays où elles croissent, sous le nom d'*Ipécacuanha*.

Tels sont : 1° le *Cynanchum vomitofitum* de Lamarck ou le *Cyn. Ipecacuanha* de Willdenow, tftfi croît à Ceylan et à Java , et qu'on cultive îi l'Ile-de-France; 2° le *Cynanchum Mauritianum* de Comnerson , aux îles de France et de Bourbon ; 3° le *Cynanchum loevigatum* de Relz , au Bengale ; 4° le *Cynanchum tomentosum* de Lamarck, dont les racines sont employées sous le nom d'*Ipécacuanha* dans les hôpitaux de Ceylan; 5° aux Indes-Orientales , on emploie aussi les racines du *Feriploca emetica* de Retz; 6* enfin , aux Antilles, les racines de *Ylsclepias Curassavica* , L., appelé *Ipécacuanha* blanc ou bâtard, et de plusieurs autres espèces du même genre, sont employées comme éméliques et désignées sous le notn de faux *Ipécacuanha* brun.

Famille des Euphorbiacées. De même que les Apocynées , les Plantes de cette famille contiennent un suc laiteux d'une extrême âcreté, et la racine de plusieurs Euphorbes est employée comme émétique; telle est celle de *Euphorbia Ipécacuanha* dans l'Amérique septentrionale, de *Euphorbia Tirucalli* de Linné, aux grandes Indes , etc.

Il nous serait facile de citer encore ici un grand nombre d'autres Végétaux dont les racines ont été employées comme succédanées de l'*Ipécacuanha* ; mais un pareil développement nous entraînerait trop loin du but que nous nous proposons dans cet article qui ne doit avoir pour objet que les deux *Ipécacuanhas* du commerce , l'annelé et le strié.

Dans le commerce, on distingue généralement deux espèces principales d'*Ipécacuanha*. L'une , beaucoup plus commune que l'autre et en quelque sorte la seule que l'on emploie en grand en Europe , vient du Brésil. Elle offre les caractères suivants : racines

ordinairement de la grosseur d'une plume à écrire , allongées , irrégulièrement contournées et coudées, simples ou rameuses, (oi-

IPE

mées de petits anneaux saillans , inégaux , très-rapprochés les uns des autres, ayant environ une ligne de hauteur, séparés par des enfoncemens circulaires moins larges, formées de deux parties , savoir : un axe ligneux plus ou moins grêle , et une couche corticale beaucoup plus épaisse. Ces racines sont lourdes , compactes , cassantes ; leur cassure est brunâtre, manifestement résineuse dans sa partie corticale; leur saveur est herbacée, un peu acre et amère ; leur odeur fœtale , mais nauséabonde.

La seconde espèce vient généralement du Pérou. On ne la rencontre que rarement dans le commerce. Voici quels sont ses caractères distinctifs : racines cylindracées, le plus souvent simples, rarement rameuses, de la grosseur d'une plume à écrire , peu contournées, non rugueuses, offrant de distance en distance des espèces d'étranglemens ou d'intersections circulaires , profondes, éloignées les unes des autres ; épiderme d'un brun foncé, formant des stries longitudinales plus ou moins marquées; cassure brune, noirâtre, faiblement résineuse ; couche corticale moins friable , moins cassante que dans l'espèce précédente; odeur presque nulle; saveur fade, nullement amère, offrant à peine une légère âcreté , après une application long-temps prolongée.

Telles sont les deux espèces d'Ipécacuanha du commerce. On avait donné à la première, qui est la racine du *Callicocca Ipécacuanha* de Brotero , le nom d'Ipécacuanha gris, et à la seconde, que l'on retire du *Psychotria emetica* de Mutis, celui d'Ipécacuanha brun ou noir. Mais nous avons fait voir , soit dans le Bul-

letin de la Société de la Faculté de Médecine de Paris , soit dans notre Dissertation sur l'Ipécacuanha du commerce, que le caractère tiré de la coloration extérieure ne saurait être employé avec avantage pour distinguer ces deux espèces, et qu'il était même la cause de nouvelles confusions Nous avons au contraire pro-

IPE

posé de tirer les caractères distinctifs de ces deux espèces , de leur organisation qui est fort différente dans chacune d'elles , et qui n'offre aucune variation. Ainsi nous avons donné à la racine du Callicocca , qui est irrégulièrement contournée et formée de petits anneaux saillans et superposés , le nom A' Ipécacuanha annelé, èt celui d'Ipécacuanha strié aux racines du Fsychoi ia , qui n'offrent nullement ces anneaux , mais de simples élranglemens écartés les uns des autres, avec des stries longitudinales. Quant à la couleur des racines, elle n'est plus devenue qu'un simple caractère pour former des variétés dans ces deux espèces. Ainsi on distingue dans le commerce, deux espèces d'Ipécacuanha, Y annelé et le strié.

Cet Ipécacuanha annelé, comme nous l'avons dit précédemment , est fourni parle Callicocca Ipecacuan/ia de Hrotero. Mais nous ferons remarquer que le genre Callicocca , établi par Scireber, est le même que le Cephœlis établi long-temps avant par Swartz. Le genre de Schreber ne doit donc pas être adopté , et c'est pour cette raison que dans les deux travaux cités précédemment, nous avons nommé Cephœlis Ipécacuanha l'Arbuste qui produit l'ipécacuanha annelé. (f. pour sa description et celle du Pijc/iotria emetica, les mots CÉ-

l' H V 1 . 1 1 1 1; et PsYCILOTIUE.)

Li'Ipécact/a/i/ià annelé présentet trois variétés principales de couleur , savoir : 1° Ipécacuanha annelé Brun :

c'est la plus commune et la plus abondante; c'est elle aussi qui paraît jouir des propriétés les plus énergiques. Son épiderme est d'un brun plus ou moins foncé, quelquefois même presque noir ; c'est dans cet état qu'on la désignait autrefois sous le nom *île Fsy-chotria emetica* , quand on croyait pouvoir distinguer ces deux espèces uniquement par la couleur. Mais son organisation prouve évidemment qu'elle n'est que la racine *dii Cephoëlis* ; 2° Ipécacuanha annelé c-ius : épiderme d'un gris blan-

IPE 9

châtre , anneaux moins rapprochés , moins saillans. Cette variété n'est pas très-commune. Elle se trouve parfois mélangée avec la précédente; 5° Ipécacuanha annelé rouge. Elle est presque aussi commune dans le commerce que l'ipécacuanha annelé brun.

Son épiderme est d'un brun rougeâtre , couleur de rouille.

Quant aux Ipécacuanhas blancs , ils sont fort variables , et l'on a donné ce nom aux racines d'un grand nombre de Plantes ; telles sont : *Ylonidium Ipécacuanha* , *V Ionidium parvijlorutn* ^ le *Cynanchum vomitoiurn* , et une foule d'autres. Mais ces es-

fièces ne sont jamais répandues dans le commerce. Aussi est-il moins important de distinguer ces diverses racines les unes des autres.

Les Ipécacuanhas ont été, dans ces derniers temps, l'objet de travaux très-impotans de la part des chimistes. C'est à Pelletier que l'on doit une connaissance exacte des divers principes consti-

tuans de ces racines. Il y a trouvé : 1° une matière grasse, huileuse , ti ès-odorante , d'une couleur brune, qui paraît communiquera cette racine son odeur et sa saveur nauséabondes; 2° une substance particulière, simple de sa nature, dans laquelle réside la propriété émétique es Ipécacuanhas , et à laquelle il a donné le nom à'Ernétine; 3° de la Cire Végétale ; 4e de la Gomme en assez grande quantité; 5° presque la moitié du poids total d'Amidon ; 6° du Ligneux ; 70 enfin, quelques traces d'Acide gallique.

L'Emétine ou le principe actif se trouve également dans l'ipécacuanha annelé et dans l'ipécacuanha strié.

Pelletier l'a trouvée dans les racines du *Cynanchum vomitorium* qu'il a analysées sous le nom de *Viola emetica*, et nous en avons nous-même constaté l'existence dans les racines de *V Ionidium Ipecacuan/iaou Poaya branca* du Brésil. Mais ce principe, n'existe pas en égale quantité dans ces quatre espèces d'Ipécacuanha.

Ainsi dans les racines du *Cephoelis* ou Ipécacauha annelé, on trouve dç.

jo IPE

14 à 16 pour cent d'Emétine; dans celles du *Psychutiia* ou Ipéacuaiha strie, on en trouve environ 8 pour cent; dans le *Cynanchuin vomitorium* , 5 pour cent ; et environ 3 pour cent dans les racines à'IonL/ium Ipecacuanha. Il résulte de-là nécessairement que l'Ipéacauha annelé mérite la préférence sur tous les autres puisqu'il renferme beaucoup plus du principe aelif.

,•• Disons quelques mots des propriétés médicales de l'Ipéacuanha. Nous avons déjà dit que Marcgraaff et Pison lurent les

premiers qui, vers le milieu du dix-septième siècle , firent connaître en Europe l'Ipécaeuanha , et signalèrent ses propriétés médicales principalement dans la diarrhée.

Malgré les éloges qu'ils prodiguèrent à cette nouvelle substance , son introduction fut lente et rencontra beaucoup d'obstacles. En 1672, un médecin, nommé Legras , qui avait fait trois fois le voyage d'Amérique, en l'apporta une certaine quantité d'Ipécacaulia , qu'il déposa chez un pharmacien alors fort en vogue. Mais cçlui-ci l'ayant administré à des doses trop fortes, nuisit à son débit , plutôt qu'il ne servit à en répandre l'usage. L'ignorance du marchand et le peu de succès qu'il retira de l'administration du nouveau médicament, tournèrent en quelque sorte contre la substance elle-même , et les incrédules saisirent ce nouveau prétexte de douter de son efficacité.

Environ quatorze ans après ces essais infructueux, vers l'année 1686 , un négociant français, nommé Grenier, revenant d'Espagne, rapporta à Paris près de cen^ quarante livres d'Ipécauanha. Pour favoriser la vente de celte substance , et en retirer plus d'avantages , il s'adjoignit Adrien Helvétius, médecin renommé de la ville de B.eims , qui se chargea d'en Eurveiller avec soin l'administration.

Les premiers essais d'Helvétius ayant eu des succès , il obtint de Louis XIV la permission de les continuer à l'Hôtel-Dieu de Paris, où , par de nombreuses expériences , il constata l'ef-

IPE

ficacité de la racine du Brésil , surtout dans le traitement de la diarrhée.

Ce remède avait été tenu, secret jusqu'à ce moment. Le roi, voulant répandre dans la société les avantages qu'il offrait dans le traitement de plusieurs maladies, en fit l'acquisition, moyennant une somme d'argent considérable. Nous ne rapporterons pas ici les détails de la querelle qui s'éleva alors entre le marchand et le médecin, le premier voulant partager la récompense magnifique dont Louis XIV avait couronné les succès des tentatives d'Helvétius. Le Parlement et le Châtelet décidèrent qu'elle appartenait entièrement à celui dont l'habileté et les connaissances avaient pu mettre si avantageusement en usage une substance jusqu'alors dépréciée, et la venger en quelque sorte de l'oubli dont on avait voulu la couvrir dès son origine. Ce fut depuis cette époque que l'usage de l'Ipécacuanha fut introduit en France. Bientôt après il se répandit en Allemagne, en Angleterre, et dans les autres contrées de l'Europe.

L'Ipécacuanha est un médicament extrêmement précieux et dont l'emploi est en quelque sorte journalier.

Son action cinétique est une de celles pour lesquelles on l'emploie le plus fréquemment. L'on peut donner ce médicament comme émétique, dans deux intentions différentes : 1^o comme simplement évacuant ; 2^o comme évacuant et dérivatif. Ainsi, par exemple, dans l'embarras gastrique, il agit simplement comme évacuant, en débarrassant l'estomac des matières bilieuses et muqueuses qui y sont amassées. Mais dans d'autres circonstances, son action ne se borne pas à l'estomac. Ainsi l'on voit souvent des ophtalmies, des angines, des pneumonies et des pleurésies très-intenses céder comme par enchantement à l'administration d'un vomitif. La dose à laquelle on administre la

poudre d'Ipécacuanha comme émétique varie suivant l'âge, le sexe et le tempérament. Chez les enfans très-

IPH

jeunes , un seul grain suffit souvent pour produire d'abondans vomissemens ; chez les jeunes sujets de huit à dix ans , la dose est de cinq à huit grains ; pour les jeunes gens et les femmes on porte cette dose à quinze et dix-huit grains ; enfin , on en donne vingt , vingt-cinq ou même trente grains aux sujets vigoureux et adultes.

Nous avons déjà dit précédemment que c'était à cause de l'action tonique qu'il exerce sur le canal intestinal , dans le cas de diarrhée chronique , que ce médicament avait d'abord été recommandé aux médecins européens par. Marcgraaf et Pison. Depuis que son usage a été introduit dans la thérapeutique , il a constamment justifié sa réputation dans le traitement de cette maladie. Mais on doit bien se garder de l'employer dans la dysenterie , quand cette maladie est accompagnée de symptômes d'une irritation aiguë ; car alors il aggraverait l'inflammation de la muqueuse des gros intestins, au lieu d'y porter remède.

On a encore fait usage de ce médicament donné à petites doses souvent répétées dans la fièvre puerpérale, dans les rhumes ou catarrhes pulmonaires chroniques , etc. (A. n.)

IPÉCA- GUACU. ois. (Pison.) r.

Canard musqué.

IPËCU. ois. (Marcgraaf.) V. Pic

NOIU HUPPÉ.

IPECUTIRI. ois. Espèce du genre Canard. F~. ce mot. (b.)

* IPMONE. Iphiuna. bot. phan.

Genre delà famille des Sy nanthérées, Corymbifères de Jus-sieu, et de la Syngénésie égale, L. , établi par H.

Cassini (Bullet.de laSociét. Philom., octobre 1817) qui lui a donné les caractères suivans : involuerc formé d'écaillés imbri-quées ; réceptacle nu, planiuscule; calathide sans rayons,, com-posée de fleurons égaux , nombreux , réguliers et hermaphro-dites; anthères munies d'appendices basilaircs; akènes cylindra-cés, hispides, surmontés d'une aigrette légèrement plumrusc. Les deux Plantes sur les-

IPO 11

quelles ce genre a été constitué diffèrent entre elles par quelques caractères. L'une d'elles (/ . punctata, Cass.) est origi-naire de Galam en Afrique; la seconde (/ . juniperifoia,ll. Cass. , Diel. , ou / . dubia , Cass. , Bullel. Philomat.) croît en Egvple, aux environs du Caire. C'est le Conysa puiigens de Lamarck, le Chry-socuma mucronata de Forskahl , et le Stœhelina spinosa de Vahl.

* IPH1S. Ipliis. cnusT. Genre de l'ordre des Décapodes, famille des Brach\ m es , tribu des Orbiculaires , établi par Leach et que Latreille n'a pas adopté (Fam. Natur. du Règne Anim.); il le réunit (llègue Anim.

de Cuvier) au genre lxa de Leacli (f. ce mol), dont il ne diffère que parce qu'il a, de chaque côté, une grosse et longue épiue transverse.

L'espèce qui servait de type à ce genre , est le *Cancer septemspinosus* (Herbst , *Cancr. T.* 1, tab. 20, fig.

na). y. Ixe et Leucosie. (g.)

* IPHTSE. bept. oph. Daudin a donné ce nom à une Couleuvre qui paraît être le *Serpens siamensis* de Séba , *T/ies.* 11 , tab. 34, fig. 5. (b.)

IPHYON. bot. phan. (Théophraste.)Syn. d'Asphodèle jaune. (b.)

IPO et UPAS. bot. pu an . Poison qui passe pour le plus violent de tous ceux que fournissent les Végétaux. Les voyageurs ont raconté des choses incroyables de sa violence; Leschenault, dans un Mémoire fort étendu sur les Plantes vénéneuses de Java (*Ann. du Mus. T.* xvi, p. 45g), a prouvé que ses cft'ets n'avaient pas besoin d'être exagérés pour être terribles. 11 a reconnu que les deux poisons employés, sous les noms d'Ipo et d'Dpas, par les habitans des archipels de l'Inde dans le but défendre leurs armes plus sûrement meurtrières, provenaient des Arbrcsdécrits' et figurés par lui (/oc. cit., pl. a3 et 22) sous les noms de *Stryc/mus Tieutc* et *Antiaris toxicaria*. (b.)

IPOMLE. *Ipornœa*. bot. phan.

12 IPO

Genre de la famille des Convolvulacées, établi par Linné dans la Pentandrie Monogynie , très-voisin des Liserons (*Conuolfilus*) dont il ne diffère que par des caractères d'une faible importance. Mais comme ce dernier genre est extrêmement nombreux en espèces , il est utile de conserver *Ylpohiœa* , en convenant ue ses caractères distinclifs sont 'une très-faible valeur. Linné , en

établissant ce genre , ne le distinguait des Liserons que par son stigmate capitulé et à trois lobes , et par sa corolle infundibuliforme. Jussieu [Gen.

Plant.) conserve ce genre avec le caractère de Linné; il ajoute que dans les Liserons les loges contiennent une ou deux graines , tandis qu'elles sont polyspermes dans les pontœa.

Kimth (in Humb. et Bonpl. Non.

Gen., 3,p: 110) adopte le genre dont il s'agit ici , mais en le circonscrivant d'une autre manière. Il y place toutes les espèces qui ont la corolle tubuleuse, infundibuliforme , et les étamines saillantes au-dessus du tube de la corolle. Voici comment on peut le caractériser : le calice est monosépale , à cinq divisions profondes, nu et persistant. La corolle est monopétale , régulière , tubuleuse, infundibuliforme, ayant son limbe à cinq divisions plissées. Les étamines, au nombre de cinq , sont saillantes au-dessus du tube de la corolle. L'ovaire est libre , à deux ou trois loges renfermant chacune deux ovules. Le Style est simple, saillant, terminé par deux ou trois stigmates globuleux et rapprochés les uns contre les autres. Le fruit est une capsule ordinairement globuleuse , en partie recouverte par le calice. Elle porte une, deux ou trois loges , avec une ou deux graines dans chacune d'elles.

Ce genre , ainsi caractérisé , se compose encore d'un très-grand nombre d'espèces. Ce sont des Plantes herbacées , annuelles ou vivaces , tantôt dressées et volubiles. Leurs feuilles jointes sont entières , quelquefois lobées ou pinnatifides. Les Heurs sont

IPO

quelquefois très-grandes et de couleur très-éclatante ; elles sont portées sur des pédoncules simples ou rameux qui naissent à l'aisselle des feuilles ou au sommet des ramifications de la tige. Plusieurs espèces de ce genre sont cultivées dans les jardins. Nous mentionnerons les suivantes :

Ipoiviée Quamoci.it , *Iponioea* Quarnoclit , L. , Willd., Sp. i, p. 879.

Cette espèce , que l'on désigne sous le nom vulgaire de Fleur du cardinal, est originaire de l'Inde. On la trouve aussi dans l'Amérique méridionale.

Elle s'est naturalisée aux îles de France et de Mascareigne. Elle est annuelle; sa tige est volubile, et ses feuilles sont pinnatifides et découpées en lobes linéaires et presque sétacées. Les fleurs sont d'un rouge éclatant, portées sur des pédoncules biflores plus longs que les fleurs.

IroiiÉE Bonne-nuit , *Ipomœa* Bonaiwx , L. , Cavan. , Icon. 3 , p. 5a , tab. 300. Cette belle espèce est également annuelle et volubile , mais ses feuilles sont entières , ovales , arrondies , acuminées au sommet , échancrées en forme de cœur à leur base, et glabres. Les fleurs sont rouges , portées sur des pédoncules axillaires et multiflores plus longs que les feuilles. Elle est originaire de l'Amérique méridionale, (a- n-)

* IPOMERIA. bot. PHAN. Le genre ainsi nommé par Nuttall (Gen. of north Amer. Plants) est le même que l'*Ipomopsis*. V. ce mot. (a. r.)

IPOMOPSIS. *Ipomopsis*. bot.

phan. Genre établi par le professeur Richard dans la Flora Bo-reali-Jmericanade Michaux , vol. ier, p. î4i, pour Ylpomœa rubra , L. , et qui fait partie, non de la famille des Convolvulacées , mais bien de celle des Polémoniacées. Il ne se compose que 'd'une seule espèce, Ipomopsis elegans , Michx. , loc. cit. , et planches de ce Dictionnaire; Ipomœa rubra , L . ; Cantua coronopifol ia , Wi lld . , Sp. 1, 879. C'est une Plante vivace, dont la tige sous-fiutes-cente et dressée s'élève à une hauteur d'environ

IPO

deux pieds, et se ramifie beaucoup vers sa partie supérieure. Les feuilles sont alternes, sessiles , très-rapprochées , étalées , pinnatifides , à divisions écartées , étroites et presque linéaires. Les fleurs, qui sont d'un beau rouge, forment une sorte de panicle pyramidale à la partie supérieure de la tige ; elles sont d'abord dressées , puis pendantes. Leur calice est presque cylindrique, à cinq divisions peu profondes, dressées et aiguës; la corolle est monopétale , régulière , iufundibuliforme , ayant son limbe à ciuq divisions obtuses ou un peu acuminées. Les élamines, au nombre île cinq , sont inégales et légèrement saillantes. Leurs anthères sont globuleuses , à deux loges , s'ouvrant par un sillon longitudinal.

L'ovaire est allongé , assis sur un disque h^pogyne , aunulaire; il offre trois logis qui contiennent chacune de six à dix ovules insérés sur deux rangs alternatifs. Le style est simple,» saillant , terminé par un stigmate à trois divisions linéaires recourbées en dessous. Le fruit est une capsule ovoïde , allongée , à trois côtes , terminée supérieurement par une pointe formée par le style. Cette capsule , qui est enveloppée par le calice persistant, offre trois loges contenant chacune de six à dix graines insérées sur

deux rangées à l'angle interne , et portant une pointe à leur sommet.

Les graines sont irrégulièrement cubiques , attachées par le milieu d'une de leurs faces. L'embryon est droit , placé transversalement au bile, au milieu d'un endosperme un peu corué. La radicule est assez longue, conique; les deux cotylédons sont obtus, planes, et nullement chiffonnés.

Ce genre est évidemment distinct des Ipomées , puisqu'il n'appartient pas à la famille des Convolvulacées.

Il diffère du Cantua dont il se rapproche par son calice urcéolé , ses graines qui ne sont pas membraneuses , et par son poi l. (a. n.)

*IPOTARAGUAPIN\ bot. piian.

irs i3

Lcefliug a cité sous ce nom un Arbrisseau de l'Amérique méridionale, dont il n'a décrit que le fruit qui se compose d'une noix à deux loges monospermes, recouvertes par un brou un peu allongé. Les feuilles opposées de cet Arbrisseau , ses épines également opposées et axillaires , ses stipules inlei médianes , et ses fruits pédoncules, axillaires , ont fait supposer que c'était une Rubiacée voisine du genre Cantkium. (g..N.)

IPREAU. bot. phan. Espèce du genre Peuplier, f. ce mot. (b.)

IPS. Ips. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Pentamères , famille des Clavicornes, tribu des Peltoides (Latr., Fam. Nalur.

du Règne Anim.), ayant pour caractères : élytres tronquées ; tarses à articles allongés et grêles ; massue des antennes étroite ; extrémité postérieure de l'abdomen nue. Ce genre a subi un grand nombre de changemens , et il n'en est pas un dont la synonymie soit aussi embrouillée.

Mais nous allons laisser parler Latreille à ce sujet. On désignait anciennement, sous le nom d'*Ips* , dit ce savant , des Insectes qui rongent la corne et le bois. Degéer, en 1775 , appliqua cette dénomination à un genre de Coléoptères , qu'il détacha de celui des Dermestes de Linné , et très-voisin de celui des Scolites de Geoffroy. Fabricius , dans son *Manus Insectorum*, comprit sous le nom générique d'*Ips* , nos *Milidules* à forme oblongue, nos *Dacues*, des *Tritomes* de Geoffroy, ou des *Mycetophages* et d'autres Coléoptères analogues. Les *Ips* de Degéer devinrent pour lui des *Bostriches*.

Olivier les réunit aux Scolites, et son genre *Ips* fut composé de quelques Coléoptères désignés ainsi par Rossi[^] et de quelques Dermestes de Linné ; il le plaça dans la section des Pentamères ; mais plusieurs espèces qu'il y rapporta appartiennent à d'autres sections. Fabricius ensuite (Actes de la Soc. d'Hist. Natur. de Paris y *Enlom. Systemal.*) le divisa en plusieurs genres , mais sans presque rien-

hirs

changer à la coupe qu'il avait ainsi nommée, et à laquelle il conserva la même dénomination. Herbst , dans son ouvrage sur le.-» Coléoptères, éclaircit encore ce sujet par l'établissement de quelques autres genres et par la description de plusieurs espèces inédites. Paykull (Tf. Suec.) forma avec les *Ips* de Fabricius, le

genre Engis (Dacne), et plaça dans la seconde division de celui des Cryptopliages d'Herbst , nos Ips proprement dits, Insectes qu'il avait auparavant confondus avec les Derinestes.

Fabricius enfin, dans un ouvrage postérieur {Syst. Elsett/i.}, adopta le genre Engis, et réunit les Crypophages du précédent, soit aux Mycétophages, soit aux Dermestes. Les Ips , tels qu'ils sont adoptés par Latreille, se distinguent des Dacnés et des Byturs {V. ces mots}, par les élytres qui recouvrent tout l'abdomen dans ceux-ci et qui sont arrondies postérieurement; ils diffèrent des Nitidules et des autres genres voisins , par des caractères de la même valeur. Ce sont, en général , de petits Insectes qui se trouvent sous les écorces des Arbres, sur le bois et même dans nos habitations ou on les voit courir, dans toutes les saisons de l'année , sur les châssis et les vitres de nos fenêtres.

Leurs larves , qui vivent probablement dans le bois, sont inconnues.

L'espèce qui sert de type à ce genre et qui se trouve le plus communément à Paris , est :

L'Ir cellerier, *Ips cellaris* , Oliv .

(Entom., t. 2, n° 18, pl. 1, f. 5, a-b); *Derinestes cellaris* , Scopoli ; le Dermeste du fumier, Geoffroy; *Cryptophagits cellaris*, Payk.; *Cryp.'op/ingus crenatus* , Herbst.; *Derinestes fungorum*, Panz. (Faun. Ins. Gerin., fasc.

3g, fig. 14). H est très-petit , d'un brun fauve, pubescent, pointillé avec deux dents de chaque côté du corselet. (G.)

IPSIDA. bot. ni an. Double emploi d'Ispida dans. le Dictionnaire de Déterville. V. ce mot. (b.)

1PSIDES. Ipsides. iNs.Divisioncta-

RE

blij par Latreille [Gen. Crust. et Ins. T. it , p. 19) dans la famille desClavicornes , et renfermant les genres [ps et Dacné. P. ces mots. (g.)

* IPSDS. bot. piian. Syn. de Liège. ClIÈSE. (b.)

IQUETAYA. rot. piian. V. Scro-

P1IULA1RE.

IRABULO. mari. (Gumilla.) Syn.

de Cabiai. r. ce mot. (b.)

* IRANE. POLYP.? BOT. CRYPT. ?

Ce nom paraît avoir désigné dans l'antiquité les Coialliues et petits Fucus vermifuges dont on appelle communément aujourd'hui le mélange Mousse de Corsa. F '. Helmintiicortuon. (b.)

IR.ASSE. bot. piian. Bosc cite sous ce nom un Palmier peu connu de l'Amérique méridionale qu'il croit appartenir au genre Martinèze. P'. ce mot. (b.)

IR.EON. rot. piian. (P. Browue.) Syn. de Sauuagesia. V. ce mot. Le nom à'Jreon a été donné comme générique par Scopoli , à une Plante qui est le Lobelia paiviflora de Bergius. Ce genre n'a pas été adopté.

IREOS. bot. fuan. L'Iris de Florence chez les anciens. (b.)

I RÉ SI NE. .Iresine. rot. piian.

Genre de la famille des Amaranthacées , et de la Dioécie Peniandric, établi par Linné, adopté par les auteurs modernes , et ainsi caractérisé par Kunth (Nou. Gêner, et àpecics Plant, œqtii-noct., vol. 11 , p. jg8) :

leurs dioïques; calice à cinq divisions profondes et régulières; dans les mâles , cinq étamines dont les filets sont soudés par la base, et les anthères à deux loges; dans les Heurs femelles, un seul style surmonté de deux stigmates; capsule monosperme fendue transversalement.

L'Iresine celosioides est l'espèce sur laquelle Linné a fondé le genre.

C'est une herbe qui croît dans les lieux inondés, pendant l'hiver, de la Virginie et de la Floride. Elle a des

feuilles ponctuées , scabres, les inférieures oblongues, acuminées , les supérieures ovales , lancéolées ; la tige est glabre , cannelée et rameuse ; ses fleurs sont très-petites, disposées en une panicule rameuse et serrée.

On cultive cette Plante dans les jardins de botanique.

Willdenow, Poirer et Kunth ont décrit une dizaine d'autres espèces indigènes pour la plupart de l'Amérique méridionale. (o..N.)

IRIA. BOT. THAX. V. ItUE.

IRIARTEA. bot. fuan. Genre de la famille des Palmiers , et de la Mouœcie Polyandrie , L. , établi par Ruiz et Pavon (/'/■ Veruv. et Clùl.

Piodr., p. i3g,t. 02), et adopté par Maritlls {Palmarurn Gênera, p. 17) qui l'a ainsi caractérisé : fleurs monoïques réunies dans le même spadice ; plusieurs spathes complètes , imbriquées ; fleurs sessiles , sans bractées ; les mâles ont un calice triphyl- Je , une coiolle à trois pétales , douze étamines ou un plus grand nombre, et un pistil rudimenlaire ; les fleurs femelles se composent d'un calice et d'une coiolle comme dans les (leurs mâles , d'un ovaire triloculaire , surmonté de trois stigmates très-petits.

Le fruit est une baie renfermant une seule graine pourvue d'albumen et d'un embryon basilaire. L'I/ïartca deltoïdca a un slipe cylindrique annclé d'où pendent plusieurs racines épigées; ses frondes sont terminales , à pétioles engainans et à pinnules trapézoïdales. Les (leurs sont jaunes, disposées en régimes simplement rajmeux, et placés au-dessous des frondes. Ce genre a été réuni par Kuntli au Ceroxylun de Humboldt et Bonpland ; niais , selon Martius , ces genres offrent entre eux quelques différences, r. CÉROXYLE. (C.N.)

IUIBIN. ois. Genre institué pat- Vieillot pour y placer le Daptius a/er, qu'il a séparé des Caracaras de Cuvier. r~. Faucon, di- vision des Cabacaras. (nn..z.)

IRTBU- ACABIH AY. ois.Syn-. vul-

IRI i5 gairedu Caillai te Aura. J'. Cathar-

TE. (DR..Z

IRIBURU-BICHA. ois. (Azzara.) L'un des noms de pays du roi des Vautours. V. Catharte. (dr..z.)

IRIDAPS. bot. phan. (Commerson.) d'Artocarpe. (u.)

* IRIDÉE. Iridea. bot. crypt.

(Ilydrophyles.) Le genre ainsi désigné par Stackliouse , ne pouvant être conservé selon Lamouroux, nous adopterons ce nom pour un genre nouveau de Fucacées dont nous proposons l'établissement , parce qu'il désigne parfaitement les teintes brillantes dont se parent les Plantes qui le composent. Quand elles sont plongées dans leur élément naturel , elles y répandent les plus belles nuances de l'arc-cu-ciel , ou les reflets chatoyans que lancent le plumage de certains Oiseaux et quelques variétés de charbon de terre. Ses caractères, qui le placent dans notre tribu des Lam mariées (V. ce mot), consistent dans la forme de la fronde simple , atténuée inférieurement en un slips court de la même substance que l'expansion qui est épaisse , d'une consistance cartilagineuse , gélatineuse, formée d'un mucus contenu clans un réseau microscopique , formé de filameni entrecroisés, ressemblant à celui d'une Hydrodictye.

La (ructification) consiste en des tubercules épais dans l'épaisseur des frondes, environnés d'une sorte d'anneau translucide et devenant souvent durs et saillans au point de rendre la fronde rugueuse comme la peau de certains Squales. Toutes les espèces de ce genre brillent, dans la mer, de reflets chatoyans , que plusieurs reprennent même lorsqu'après une longue dessiccation on les remet dans l'eau pour les faire revenir; elles reprennent alors toute

leur flexibilité, mais ne la nient pas à se décomposer en une sorte de gelée ou mucosité qui répand une odeur de violette très-prononcée et fort agréable.

Le *Delesseria* editlis de Lamouroux, dont De Candolle faisait une *Dlve*,

16 nu

et Agardh un *Halymenia*, rentre certainement dans ce genre dont nous connaissons plusieurs autres belles espèces exotiques : *Vlridea corda/a*, N.; *Fucus cordatus* ,Turn. , Ilist. Fuc, t. 1 1 6 ; *Halymenia* , Ag. , Sp., p. 201 , à l'ronde entière subcordée , acuminée, quia été rapportée par Menzies des côtes occidentales de l'Amérique du nord. XJ*Iridœa crispata*, N., â fronde sub-réniforme ou en coin , à bords très-ondulés et frisés , découverte par Lesson , sur les côtes du Chili , à la Conception. ISI*Iridœa papillosa*, jN. , à frondes plus allongées, déclarées, se chargeant de papilles qui , lorsqu'elles viennent à tomber par l'âge avec la fructification , laissent des trous dans la substance du Végétal qui alors demeure càucellé comme le *Larninaria slgarum*. C'est encore Lesson qui a découvert cette espèce aux Malouines. Enfin *Vlridea micans* , N., à fronde ovoïde obronde, obtuse, à peine ondulée, d'abord mince , très-hygrométrique , d'une teinte violette sombre , et la plus chatoyante de toutes; l'âge Tépaissit plus que toute autre , et alors ses fructifications très-mullipliées la rendent âpre ; elle acquiert jusqu'à un pied et demi de long. D'Urville l'a rapportée des Malouines et de la Conception. L' *Halymenia reniformis* , Ag. ; le *Fucus lumalion* , et le *Delesseria palmata* , doivent encore appartenir au genre Iridée. (b.)

IRTDÉES. Irideœ. bot. phajst.

Famille naturelle de Plan:es monocolylédones à étamines épigynes , dont le genre Iris est le type et le plus nombreux en espèces. La famille des Jridées forme un groupe extrêmement naturel et très-facile à distinguer. Toutes les Plantes qui le composent sont remarquables par la grandeur ou l'éclat de leurs fleurs:

aussi une multitude d'entre elles forment-elles l'ornement de nos serres et rie nos jardins ; telles sont les Iris, leslelxies , les Glaïeuls , les Safran s, les icrmndicnnns et beaucoup d'autres.

Les Iridécsson t toutes des Plantes her-

bacées, généralement vivaces , ayant leur racine tubéreuse et charnue , quelquefois cependant fibreuse. Leur tige , qui est assez rarement sous-frutescente à sa base , est cylindrique ou comprimée, portant des feuilles alternes, planes, ensiformes ou cylindrcées, devenant jaunâtres dans l'herbier. Les fleurs sont constamment enveloppées avant leur épanouissement dans une spathe membraneuse, souvent mince, sèche et scarieuse , formée d'une seule , de deux ou de plusieurs pièces. Ces fleurs sont tantôt solitaires, tantôt diversement groupées. Leur calice est généralement tubuleux , adhérent par sa base, avec l'ovaire qui est infère. Sou limbe est à six divisions profondes , dont trois intérieures et trois extérieures , quelquefois inégales et dissemblables.

Les étamiques sont constamment au nombre de trois naissant du sommet du tube; tantôt les filets sont libres et distincts, tantôt ils sont soudés et monadelph.es. Les anthères ont leur l'ace tournée vers le centre de la fleur. Elles sont à deux loges qui s'ouvrent par un sillon longitudinal. L'ovaire est constamment infère , à trois loges, contenant chacune plusieurs ovules attachées sur

deux rangées alternatives , à l'angle rentrant. Le style est simple, terminé par trois stigmates simples , bifides , découpés ou minces , membraneux et pétaloïdes. Le fruit est une capsule à trois loges polyspernies , et à trois valves septifères sur le milieu de leur face interne. Les graines se composent d'un tégument propre et d'un embryon p'arfaitement indivis , placé dans un endosperme charnu ou légèrement corné.

Les genres qui entrent dans la famille des Iridées peuvent être partagés en deux sections bien distinctes , suivant que leurs trois étamines sont libres ou suivant qu'elles sont raonadelphes.

I'e Section. — Etamines libres.

Iris , L. ; Morœa , L. , auquel il faut réunir, selon Jussieu, le Bo-

barda de Linné et le Diplarr/iena do Labillardière ; Ixia , L. ; Tapeinia , Coinmers. ; Cipura, Aublet ; Jratso/ia, Juss. ; G/adio-lus, L. ; Antholyza, L. ; Tfritscenia, Thunb. ; Crocus , L. ; Pardan-thus , Ker. ; Babiana , Gawler ; Sparaxis , Gawler ; Hesperantka , Gawl.; Gcissorhiza , Gawl.; Tritonia, Gawl.; Jnoma- Iheca, Gawl.; Triclionema , Gawl.; Jrislea, Aiton; Diasia, De Cand. ; Moub/etia , De Cand.

* IIe Section. — Etamines monadelp/tes.

Galaxia , Thunb ; Sisyrinchium , L. ; Tigridia, Juss.; Ierraria, L. ; Vieusseuxia , Délai ochc ; Patersonia , llob. Browu.

Plusieurs des genres que nous venons d'dnumérer devront probablement être réunis ensemble , quand ils auront été étudiés avec plus de sévérité.

Quant aux Di/a/ris , Xiphidium et Iridina , placés par Jussieu à la suite des Iridées dans son Gênera, cet illustre botaniste en a l'ait plus récemment une famille nouvelle sous le nom de Dilapidées. P". ce mot au Supplément. (a. r.)

* IRIDINE. Iridina. conçu. Genre proposé par Lamarck pour une des espèces d'Anodontites de Bruguière.

Féussac et Blainville le considèrent, avec juste raison, comme sous-genre des Anodontes. P. ce mot. (d..h.)

* IRIDION. bot. vu an. On a rapporté au Roridula dentata , L. , la Plante nommée par Burinart) {Prodr.

6) Iridium verticillatum. (g..n.)

IRIDIUM. MIN. Le docteur Wollaston a découvert ce Métal à l'état d'alliage avec l'Osmium en des proportions encore inconnues. Il se rencontre en grains blancs métalliques avec ceux du Platine natif, et présente des indices de cristallisation d'après lesquels on croit pouvoir rapporter sa loi nie à celle d'un prisme hexaèdre régulier. Les grains d'Iridium osmiuré ressemblent beaucoup

TOME IX

à ceux du Platine par leur couleur; mais ils sont sensiblement plus durs.

Leur pesanteur spécifique est d'environ 17,15. Ils sont insolubles dans tous les Acides , et donnent , par la calcination dans un tube ouvert , une odeur analogue à celle du Chlore.

On les sépare du Platine brut en traitant le saule platinifère par l'Acide nitro- hydrochlorique Le Platine se dissout et l'osmium d'Iridium reste avec les matières pierreuses. (<;. dkl.)

IRIDORCHIS. bot. piiiAN. Nom donné par Du Petit-Thouars (list.

des Orchidées des îles australes d'Afrique) à un groupe de la section des Epidendres qui correspond au genre *Cymbidium* de Swartz. 11 offre pour caractères essentiels : une seule masse pollinique dans chaque loge de l'anthère; labelle plane, élargi, denté au sommet; leur renversée, il ne se compose que d'une seule espèce (*Cymbidium equitans*), Plante des îles de France , de Mascarin et de Madagascar. Du Petit-Thouars l'a figurée {lue. cit., lab. g 1) sous le nom \1 Equitans. (g..n.)

IRIDROGALVIA. bot. l'ian.

(Poirer, Encyclopéd. , et Steudl.) Pour *Isidrogalvia*. ff . ce mot. (g..n.)

* IRIE Iria. bot. phan. Le professeur Richard a proposé ce nom {in Persoon. *Syn. Plant.* 1 , p. 65) pour un sous-genre dont le *Cyperus /munos~ tac/ius* de Linné est le type. Ses caractères consistent : en un épi simple , composé d'écaillés distiques et imbriquées , dont les supérieures sont serrées les unes contre les autres, et les inférieures se terminent par une arête. Chaque fleur se compose d'une seule étamine, d'un ovaire surmonté de deux stigmates. Le fruit est un akène mutique.

Ce sous-genre se compose de deux espèces; l'une , *Iria Caribaea* , Rich., est le *Cyperus munoslachyos* de Linné qui croît

dans l'Amérique méridionale; l'autre, *Iria indica* , Rich., est le *Cyperus munustachytis* de Rotlbol qui croît dans l'Inde , et se dis-

j8 IRI

tingue de la précédente pnr sa toull'e épaisse, dressée , et ses écailles inférieures aristées. (a. n.)

* IRIO,. bot. piian. Ce mot , employé par Linné comme nom spécifique d'un *Sisymbrium* , a été donné par De Caudolle (Syst. Vcget. Nat.

T. il, p. 463) à la quatrième section qu'il a établie dans ce genre. V. Si-

SYMBLLE. (G..N.)

IRION. bot. pīian. Ce mot, dont on a fait Irio , était celui par lequel les anciens désignaient la Moutarde des champs, et \ us-qu'ail *Folygonum Fagopyrum*. (g.)

* IRIS. zool. t. OEil.

* IRIS. ins. Nom scientifique du beau Papillon d'Europe vulgairement nommé Grand Mars changeant, (b.)

IRIS. Tris. bot. piian. Genre rie la famille des Iridées , de la Triandrie Monogynic, L. Il est fort nombreux en espèces cultivées daus nos jardins, et peut être caractérisé de la manière suivante : son calice est tubuleux et adhérent par sa base avec l'ovaire qui est complètement infère ; le limbe est à six divisions très-profondes, dont trois extérieures plus grandes sontquelquefois dressées et quelquefois réfléchies, ordinairement marquées sur le milieu de leur face interne d'une rangée longitudinale de poils glanduleux; les trois divisions internes , plus petites que les trois

autres, sont dressées quand celles-ci sont réfléchies , ou réfléchies quand les autres sont dressées. Les étamines , au nombre de trois, sont insérées au sommet du tube du calice. Leurs filets sont libres , et leurs anthères allongées à deux loges et extrorses. Chaque étamine est placée en face de chacune des divisions calicinales externes et recouverte par un des stigmates. Le style est ordinairement triangulaire, tantôt libre, tantôt soudé avec le tube du calice qui est épais et charnu.

Il se termine par trois stigmates pétaloïdes allongés , voûtés et recouvrant immédiatement chaque étamine. Ils sont bilobés à leur sommet

avec une petite languette placée à la face inférieure de la fente qui sépare les deux lobes , et marquée d'une rainure glanduleuse formée par la prolongation de la fente dont nous venons de parler. L'ovaire est infère, à trois loges, contenant chacune un assez grand nombre d'ovules attachés à l'angle interne et sur deux rangées longitudinales , mais alternes. Le fruit est une capsule ovoïde allongée , quelquefois un peu triangulaire , acuminée à son sommet , à trois loges , contenant plusieurs graines disposées sur deux ou sur une seule rangée. Cette capsule s'ouvre en trois valves septifères sur le milieu de leur face interne. Les graines qui sont globuleuses ou planes, déprimées et discoïdes, contiennent dans un endosperme blanc et corné un embryon dressé et cylindrique.

On compte quatre-vingt-douze espèces d'Iris décrites dans le troisième volume du *Systema Vegetabilium* de Roemer et Schultes. Ce sont toutes des Plantes vivaces, à racines fibreuses ou plus généralement munies d'une souche ou rhizome horizontal ; tubéreux et charnu , dont la forme varie beaucoup suivant les

diverses espèces. Les feuilles sont généralement eusiformes, comprimées, engainantes à leur partie inférieure, quelquefois linéaires et graminiformes; les plus extérieures avortent quelquefois et forment des espèces de gaines scarieuses. La tige ou hampe est tantôt cylindrique, tantôt comprimée ou anguleuse, simple ou rameuse, portant une ou plusieurs fleurs sessiles ou pédonculées, généralement très-grandes, violettes, jaunes ou blanches, accompagnées de spathes scarieuses qui ne paraissent être que des feuilles avortées. Les espèces de ce genre sont répandues généralement dans les diverses contrées de l'Europe, en Orient et au cap de Bonne-Espérance; très-peu habitent l'Amérique. On en compte environ sept à huit dans l'Amérique septentrionale, et une seule au Brésil.

Un très-grand nombre d'espèces de

RI

ce genre imitent, par l'élégance de leurs fleurs, d'être cultivée* dans les jardins. Nous nous contenterons d'en mentionner ici quelques-unes des plus remarquables. En général on forme deux sections dans les espèces d'Iris.

La première comprend celles dont les divisions calicinales sont ciliées sur le milieu de leur face interne, la seconde celles qui ont ces divisions glabres.

f Divisions calicinales ciliées.

Iris Germanique, *Iris Germanica*, L., Red., Lil., t. 809. Sa racine est une souche ou tige souterraine, horizontale, charnue, tu-

béreuse, plane par sa face inférieure qui donne naissance à des racines fibreuses et charnues, convexe par sa face supérieure offrant des espèces d'anneaux formés successivement par la base persistante des feuilles. Celles-ci partent, ainsi

que la tige, de la partie antérieure et la souche, dont la postérieure se détruit successivement et devient tronquée. Elles sont ensiformes, glauques, hautes d'un pied, larges d'un pouce, aiguës au sommet, s'embrassant et s'engainant les unes dans les autres dans leur base; la tige haute d'environ deux pieds, et un peu comprimée, porte ordinairement dans sa partie inférieure deux à trois feuilles embrassantes et alternes, et à sa partie supérieure elle offre trois à cinq grandes fleurs violettes, pédonculées, embrassées chacune dans quatre spathes scarieuses avant leur épanouissement. Les trois divisions internes du calice sont dressées, obovales, arrondies, rapprochées en globe; les trois externes sont réfléchies, très-obtuses, munies d'une rangée de poils jaunes à leur moitié inférieure et interne. Cette espèce, la plus commune de celles qu'on cultive dans les jardins, croît naturellement dans les lieux secs, sur les vieux murs de l'Allemagne et de la France. Sa racine charnue contient un suc acre et caustique qui irrite fortement l'estomac et le canal alimentaire. C'est un émétique et un drastique assez vio-

IR[rg

lent, dont les médecins anciens ont recommandé l'usage dans les hydropisies. Aujourd'hui ce remède n'est plus mis en usage que par les gens de la campagne, qui emploient encore pour se purger. Cette espèce offre plusieurs variétés; ses fleurs sont quelquefois d'un rouge pourpre sombre, ou jaunâtres; elles forment alors *Vallisneria spiralis* de quelques auteurs.

Iris dk Florence , Iris Ftorentiita , L., Red., Lil., t. aS. Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec la précédente, dont elle diffère surtout par ses fleurs constamment blanches veinées de jaune, sessiles, sur le tube de son calice qui est plus court. Ses fleurs sont odorantes. Elle croît en Italie, en Provence. On la cultive dans les jardins*. Sa racine, quand elle est sèche , a une odeur agréable de violette. Elle est employée aujourd'hui dans la parfumerie , et pour aromatiser diverses préparations pharmaceutiques. On en met également des fragments dans le linge, pour lui donner une odeur agréable. Autrefois on administrait cette racine sèche et réduite en poudre , à la dose de dix à vingt grains, dans les rhumes , les catarrhes pulmonaires chroniques. On l'a également recommandée dans les affections asthmatiques.

On emploie encore la racine d'Iris de Florence, pour faire des poils à cautères; sousséchée, qui n'est pas entièrement dissipée par la dessiccation , la rend très-propre à entretenir dans la plaie une irritation convenable pour l'effet qu'on se propose d'obtenir.

Iris de Suze , Iris Suziana, Vahl , Red., Lil., t. 18. Cette espèce que l'on connaît, dans les jardins, sous les noms d'Iris deuil et d'Iris tigrée , est originaire de Perse, des environs de Constantinople. Ses feuilles sont très-étroites ; sa tige haute d'environ deux pieds, dans les individus cultivés, est simple , sillonnée, et se termine , en général, par une seule fleur. Celle-ci est très-grande , d'un brun foncé , mêlé de brun clair et de blanc avec des veines pourpres. Cette espèce qui est assez délicate doit, peu-

dans l'hiver, être recouverte d'une cloche et de fumier , afin de la préserver du froid.

Tris naine, Iris]>nmila,Yu\\\\,Wcà. , Lit., t. 261. Petite espèce originaire de France, et dont on fait fréquemment des bordures dans les jardins.

Ses tiges sont courtes , d'un à deuxpouces de hauteur seulement, portant à leur sommet une seule fleur violette ou panachée, accompagnée d'une spathe plus courte que sou tube. Les feuilles sont lougues de quatre à cinq pouces , assez larges , ensiformes et glauques.'

Iris de la Chine, jris Chinensis , Cav. ; Iris jimbriata , Vent., Jard.

Gels. , t. 9; lied. , Lil. , 1. 1 5a. Celteespècc est une des plus belles du genre ; ses racines sorit tubéreuses, traçantes et horizontales. .ves feuilles sont distiques , glauques , ensiformes , plus courtes que la lige , laquelle al élevée d'un pied et demi à deux pieds , laineuse dans sa partie supérieure ou elle poite de trois à huit fleurs de grandeur moyenne, d'un bleu pâle, ayant les divisions calicinales jaunâtres dans leur contour. Les divisions extérieures sont plus larges, marquées de taches jaunes. Les stigmates sont bleus et frangés. Cette Iris est assez délicate. On doit la rentrer en orangerie pendant l'hiver.

■f Divisions calicinales non ciliées.

Iris des marais , IrisPseudo-sfcorus, L.,Red., Lil., t. 255. Sa racine ou souche est horizontale et charnue ; sa tige dressée , un peu comprimée , lisse , glabre et glauque , haute d'environ deux pieds, olfranl des nœuds à l'attache de chaque feuille. Cellesc sont ensiformes , allongées, aiguës , entières, amplexicaules. Les fleurs jaunes, grandes, au nombre de quatre à cinq , pé;ioncu!ées à la partie supérieure de la lige. Les trois divisions internes sont

dressées, spatulées et très-petites. La capsule est ovoïde , allongée , à trois loges , contenant chacune un très-grand nombre de graines planes , discoïdes , appliquées les unes sur les autres.

IRR

Cette espèce croît en abondance sur le bord des marais et des ruisseaux aux environs de Paris, où elle fleurit en mai et en juin. On ne la cultive pas dans les jardins. Ses graines torréfiées ont une saveur amère et une odeur aromatique assez prononcée. On a proposé de les substituer à la graine du Café, à une époque où la guerre avait interrompu les communications commerciales.

Iris de Perse, *Iris Persica* , L. (Red., Lil. , t. 189. Cette jolie espèce a sa racine bulbeuse, ou plutôt le bas de sa tige offre un renflement ovoïde, de la base duquel naissent des libres épaisses, et qui est environné de gaincs scarieuscs. Les feuilles sont linéaires , subulées , cauliculées , plus hautes que la tige qui est très-courte et uniflore. La fleur est variée de blanc et de violet. Le tube du calice est extrêmement long. Les trois divisions intérieures sont très-petites et réfléchies. On cultive cette espèce dans les jardins. Elle est originaire de Perse.

Iris Bermuoienne , *Iris Sisyrinchium* , L., Red., Lil., t. 29 et 458. Originaire d'Espagne , de Naples et de Barbarie, cette espèce a une racine bulbeuse, des feuilles cauliculées , arquées et quelquefois contournées, deux fois plus élevées que la lige.

Celle-ci, haute d'environ cinq à six pouces, se termine, en général, par trois fleurs dont le tube est grêle et très-long. Les divi-

sions sont bleues, les extérieures marquées d'une tache jaune, et les intérieures plus courtes et réfléchies. (a. r.)

IRIS. min. V. Pierre d'Iris.

* 1RLIN. ois. Syn. vulgaire de Bergeronnette du printemps. (dr..z.)

IROUCANA. rot. riiAN. (Aublct.) T' . Casearia.

IRRITABILITÉ. 7.001.. et bot. Il est extrêmement difficile , dans l'état actuel de la physiologie , de faire connaître d'une manière précise le sens que l'on doit attacher à ce mot. Les différons auteurs qui l'ont employé

IRR

aux diverses époques de la science sont loin de lui avoir donné la même acception. Ainsi , Glisson , qui le premier l'a introduit dans le langage physiologique , appelle Irritabilité la force particulière dont sont doués nos organes , force qui préside à lous leurs inou-veincns , et sans laquelle leurs fonctions ne pourraient s'exécuter. Cette théorie fut adoptée par J. Gorler, qui fit 1 application des principes émis par Glisson aux inoiivernens qu'exécutent les Végétaux, et chercha ainsi à démon lier que lous les êtres organisés sont doués, seulement à des degrés différons , de cette propriété spéciale que Glisson avait nommée Irritabilité. Ce fut depuis cette époque que l'on cessa de ne voir dans les IMantes que des-mouvemeus mécaniques, et que ces mouvemens furent rapportés à l'action vitale, qui est le caractère distinctil' de la matière organisée,

Mais Haller donna une définition tout-à-fait différente de l'Irritabilité- Suivant Glisson et Gorter , l'Irritabilité existant dans toutes les parties des êtres organisés , cette propriété pouvait agir sans que l'organe manifestât aucun mouvement appréciable : telle est , par exemple, celle qui préside à certaines fonctions, comme l'absorption et la nutrition, etc. Haller, au contraire, restreignit de beaucoup le sens de ce mot. «.l'appelle Irritabilité, dit-il , cette force ou propriété inhérente à certains tissus, et en vertu de laquelle ils se meuvent sous l'influence des agents extérieurs.

Ainsi, une partie sera d'autant plus irritable , qu'elle se raccourcira ou se contractera davantage , quand un corps extérieur viendra à la toucher ou -il agit sur elle. » On voit que l'Irritabilité de Haller , sur laquelle ce grand physiologiste a fait un si grand nombre de belles expériences , est la même chose que ce que plus tard on a généralement appelé contractilité musculaire ou Myolilité. Outre cette action énergétique et vitale , Haller admettait encore dans certains tissus, tels que les aponévroses , les

ISA

tendons, les membranes, une force motrice , une sorte d'élasticité organique , en vertu de laquelle ces organes tendent à se raccourcir, à revenir sur eux-mêmes. Cette force qui se manifeste dans ces tissus , même longtemps après la mort , doit être soigneusement distinguée de l'Irritabilité , propriété essentiellement vitale qui s'éteint peu de temps après que l'Animal a cessé de vivre.

Ce que nous venons de dire suffit pour faire voir que le sens du mot Irritabilité est loin d'être rigoureusement défini , surtout depuis que Haller et ses disciples lui ont donné une signification tellement différente de celle que Glisson lui avait d'abord imposée. Néanmoins nous partageons l'opinion du médecin anglais , réservant les noms de contractilité musculaire ou de myotilité pour les phénomènes que Haller désignait sous le nom d'In itabilité \V. Muscles, Myotilité). Et comme l'Irritabilité de Glisson a été généralement attribuée au système nerveux, nous renvoyons aux mots CÉLIÉURO-SIMNAL , Neufs et Sensibilité, pour examiner à fond cette fonction et discuter les opinions diverses qui ont été émises à son égard.

Quant à l'Irritabilité dans les Végétaux , nous en avons déjà traité en, parlant des mouvemens que les feuilles exécutent. V. Feuilles, (a. n.)

* MSIOLA. îlot. pîian. La Plante désignée sous le nom A' Jrsio-la scatiilens , par Patrick lirown {Jamaïc, 47, t. 4, fig. 1 , a), est rapportée au L'issus smilacina de YVilldenow.

ISABELLE, zool. On a donné ce nom spécifique à un Oiseau du génie Sylvie, à un Squale, à une Libellule du genre A.giion, ainsi qu'à une Coquille du genre des Porcelaines. V.

ces mots. («.)

ISACHNE. Tsachnc. îlot. fijan.

Génie de la famille des Graminées et de la Triândri'e Digynie , établi par Pi. brown (Pnx/r. Fl. Nou-.

Huit. T. i, p. 196) qui le caractérise

a<2 ISA ninsi : fleurs disposées en particules ; lépicène biflore à deux valves égales, membraneuses et obtuses; chaque fleurette est égale, à deux paillettes chartacées ; la fleurette extérieure.est mâle, l'inférieure est femelle , accompagnée de deux paléoles hyP°Synes- Les étamiucs sont au nombre de trois ; l 'ovaire est surmonté de deux styles que terminent deux stigmates plumeux. Le fruit est enveloppé dans les deux valves de la glume qui se sont durcies.

Ce genre se compose d'une seule espèce , *Isachne australis* , Brown , loc. cit. Plante glabre qui croît dans les lieux inondés aux environs de Port-Jnckson , à la Nouvelle-Hollande. Ses feuilles sont planes , avec une ligule formée de poils. Selon R. Brown, Je genre *Isachne* est très-voisin du *Panicum*. L' '*Isachne australis* a même la plus grande ressemblance extérieure avec le *Panicum coloration*.

ISAIRE. BOT. CTiYl'T. Pour Isaria.

P"t ce mot. (b.)

ISANTHE. Isant/ius. bot. tdan.

Genre de la famille des Labiées et de la Didynamie Gymnospermie, L., établi par Richard (in Michx. Flor. bor.

Am. 2, p. 4, tab. 50), et ainsi caractérisé : calice campanule, quinquéfide ; corolle à cinq divisions ovées prè'squ'égales. le tube droit ei étroit ; quatre étamines presque égales ; style terminé par deux stigmates linéaires réfléchis ; quatre noix globuleuses occupant la cavité du tube agrandi du calice. Ce genre ne renferme qu'une seule espèce , *Isanthus coer/ileus^* qui croît dans certaines localités crétacées de la Caroline et de la Virginie. C'est une

Plante herbacée, dont les tiges visqueuses et pubescentes sont garnies de feúdes ovales lancéolées , atténuées aux deux extrémités, et à trois nervures longitudinales. Les fleurs d'un bleu clair sont opposées et portées Sur des pédoncules axillaires. Cette Plante a l'aspect de la Sarriette des jardins, (g. .n.)

ISARD ou YSARD. mam. Même

ISA

chose q ue Chamois. V. Anti-LOI'i:.

ISARIA. bot. civypt. (Jucédinés.) Ce genre , créé par Per^oon , est l'un des plus remarquables de cette famille par son mode de développement ; il est composé de filameus étroitement entrecroisés, formant ainsi une sorte de pédicule, et qui s'écartent vers le sommet de manière à donner à tout le Champignon la forme d'une massue. Ce pédicule se ramifie quelquefois, et les filamens portent vers leurs extrémités des sporules qui paraissent éparées à la surface du capitule. Presque toutes les Planlesdece genre naissent sur les Insectes morlscu surleurs chrysalides ; quelques-unes croissent sur les bois pourris , mais moins fréquemment ; elles sont la plupai tblanches , grises ou jaunâtres , et assez fugaces. Ce genre, comme on peut le voir d'après la description que nous venons d'en donner, appartient à la derniè; e section des Mucédinées à laquelle on peut donner le nom d'Isariées. Ce genre étan't l'un des plus anciennement connus ,est un de ceux qui donnent 1 idée la plus juste de ce groupe; par l'accroissement de leurs fibres , ces Plantes indiquent déjà un certain passage aux Lycoperdacées ; mais les sporules, au lieu d'être

contenues dans le tissu formé par ces fibres entrecroisées , sont éparées à leur surface extérieure. (ad.b.)

* IS AT IDÉE S. Isatideœ. bot.

phan. C'est ainsi que De Candolle {Sjst. Regn. Vogel. T. n , p. 565) a nommé la dixième tribu de la famille des Crucifères , à laquelle il a aussi donné le nom de INolorhizées Nucamen lacées, en raison de la structure de leurs silicules et de leurs graines. Le genre Isatis ou Pastel est considéré comme le type de cette tribu qui forme une association très-naturelle, composée d'Herbes glabres , plus ou moins glauques , à feuilles entières ou dentées, les radicales pétiolées, celles de la lige sagittées à la base. P. Crucifères et Pastel. (g..n.)

ISATIS ou RENARD BLEU. mam.

Espèce du genre Chien. 7^ . ce mot. (b.)

ISC

ISATIS, bot. phan. V. Pastel.

* ISAURE. Jsaitra. foi/ïf. Genre de l'ordre des Aclinaï es , dans la division des Polypiers sarcoïdes , plus ou moins irritables, sans axe central , propose par Savigny qui en a figuré plusieurs espèces (Pl. a, Polypes, un, Zoologie) dans le grand ouvrage sur l'Egypte. Nous ne faisons qu'indiquer ce genre , quoiqu'il mérite d'être adopté, Savigny n'en ayant pas encore donné la description. (lam..x.)

ISAURE. Isaura. bot. pu an. Genre de la famille des Asclépiadées et de la Pentandric Digynie , L. , établi par Commerson , et reproduit .sous le nom de Stepkanotis par Du Petit-Thouars (Nw.

Gêner. Madagasc, p. 11) qui l'a ainsi caractérisé : calice court, à cinq divisions étalées ; corolle tubuleuse, ventrue à la base, dont le limbe est à cinq lobes tordus; cinq étamines comme dans le genre Asclépias j corpuscules à deux cornes ; ovaire double, surmonté d'un style court; deux; follicules horizontaux, acuminés , épais ; semences aigreltées.

Ce genre a été réuni au Ceivpegia par Jussieu et d'autres auteurs. h'Isaura Allicia , Commers. et Poire t (Encyclonéd. Supplément.) , Arbrisseau de 1 île de Madagascar, est la seule espèce de ce genre. Cependant Du Petit-Thouars indique le Ceropogia acuminata de Roxburgh comme congénère de son Stephanotis. (G..N.)

ISCA ou ISKA. bot. pu an. (Paul jEginctte.) Même chose qu'Esca. ^.

ce mot dont Isca est peut-être l'étymologie. (p.)

ISCHEME. Ischœmum. bot. fhan.

Genre de la famille des Graminées , établi par Linné et adopté par la plupart des agrostographes , et qui peut être caractérisé de la manière suivante : ses fleurs sont polygames et monoïques , disposées en épis solitaires ou géminés , ayant leur axe ou rachis articulé , portant deux épillets à chaque articulation, l'un sessile, placé horizontalement, l'autre pédicellé , mâle ou neutre. L'épillet ses-

1SE s 3

sile est billore ; sa lépicène se compose de deux valves un peu coriaces; l'extérieure est un peu plane, l'intérieure est naviculaii e. Chaque fleurette se compose de deux paillettes membraneuses

et incluses ; la fleurette externe est mâle , rarement neutre, l'intérieure est hermaphrodite ; la glumelle se compose de deux paléoles; les étamines sont au nombre de trois; les deux styles sont surmontés de deux stigmates plumeux.

Ce genre , ainsi que le remarque R. Brown {Prodr.Fi.Alov.-Hotl. T.i, p. 404), est très- voisin de *Vsindropogon* et du *Saccharum* ; il en diffère seulement par la fleurette extérieure de l'épillet sessile, qui est bivalve et le plus souvent mâle ; quant au *Rottboella* , il n'en diffère que par un de ses épillets pédicellé ; en conséquence , le *Ruttboella digitata* de la Flore grecque est une espèce du genre *Ischème*. R. Brown pense encore que l'on doit réunir au genre qui nous occupe le-i genres *Sc/iima* de Forskahl et *Col/adua* de Cavanilles.

Palisot de Beauvois , dans son *Agroslographie*, sépare encore le *Coiladoa* comme genre distinct , en convenant néanmoins du peu de valeur des caractères d'après lesquels il a été établi. Le même auteur fait même un genre *Meoschium* des espèces d'*Ischème* qui ont la paillette inférieure de la glume dans la fleur hermaphrodite , bifide à son sommet et portant une arête tordue. *Meoschium*.

Les espèces du genre *Ischèmes* sont toutes exotiques. I\ . Brown, dans son *Prodrome* , en décrit six espèces nouvelles qu'il a observées dans diverses parties de la Nouvelle-Hollande, (a. R.)

ISÉRINE. min. Titane oxydéferrique, Haiiy. Variété de Titanate de Fer trouvée en masses roulées dans un sable granitique , près de la source de la rivière Iser, dans le *Reisengebirge*, et dans le lit de la rivière Don , dans l'*Aberdeenshire* en Ecosse. Elle est composée , suivant Klaproth , de 73 parties d'oxydure de Fer

et de 28 parties d'oxide de Titane. V . Titane oxidé. (g.del.)

ISERTIE. *Isertia*. jîot. l'ïian. Genre de la famille des Rubiacées et de l'Hexandric Mouogynie , L., établi par Schreber, adopté par Lamarck , Vahl, Willdenow, Jussieu et Kunth.

Ce dernier eu a ainsi fixé les caractères : calice supérieur à six dents, persistant; corolle infundibuliforme , dont le tube est long, légèrement courbé , et le limbe à cinq divisions ; six étamines renfermées dans la corolle; un seul style supportant un Stigmate en tête à six lobes; drupe presque globuleuse , à six osselets uniloculaires et polyspermes. L'espèce sur laquelle ce genre a été constitué est le *Guetta*/dacoccinead'Aublet, *Isertia cocci*/iea , Vahl , *Æciog.* 2 , el Lam , *Ill. Gen.*, tab. 269. C'est un Arbre de médiocre grandeur, à feuilles opposées , pétiolées, ovales-oblongues , accompagnées de stipules caduques.' Les fleurs d'un beau rouge sont disposées en une panicule terminale et munie dans chaque division de deux petites bractées. Cet Arbre est indigène des forêts de la Guiane et d'autres contrées de l'Amérique , méridionale.

Une autre espèce a été ajoutée à ce genre par Vahl (*Eclog.* 2, p. 28, tab.

-i5) qui lui a donné le nom à *Isertia parviflora*. Elle a été découverte dans l'île de la Trinité. (c,..N.)

ISI DE. *Isis*. roLYP. Genre de l'ordre des Isidées (f. ce mot) , dont les caractères sont : Polypier dendroïde; arlieuchculations pierreuses, blanches, presque translucides, séparées par des outre-nœuds cornés et discoïdes, quelquefois inégaux; écorce épaisse, friable dans l'état de dessiccation , n'adhérant point à l'axe , et s'en détachant avec facilité; cellules éparses, non

saillantes. Nous dirons fort peu de chose sur ce genre qui sert de type à l'ordre des Isidées ; nous ne pourrions que répéter ce que nous avons dit dans les généralités de ce groupe de Polypiers. Les Isides varient peu dans leur forme, elles sont

toujours cylindriques avec des rameaux épais. Leur couleur n'offre point de grandes différences ; elle est blanchâtre dans le Polypier revêtu de son écorce : celle de l'axe présente deux nuances bien tranchées ; dans les articulations calcaires elle est blanche , semblable au marbre salin ou à l'albâtre par son éclat et par sa demitransparence ; dans les articulations cornées , elle est brune plus ou moins foncée, quelquefois presque noire, d'autres fois jaunâtre. Leur grandeur varie d'un à cinq décimètres. Ces Polypiers, répandus dans toutes les mers, se trouvent sur les côtes d'Islande , ainsi que sous l'équateur ; la majeure partie des auteurs les indiquent comme originaires de l'océan Indien ; cependant les espèces connues sont peu nombreuses. Ils sont employés par les insulaires des îles Moluques et d'Amboine , dans une foule de maladies qui pourraient faire regarder les Isis comme un remède universel, si l'usage qu'en font ces peuples ne prouvait leur ignorance en médecine. (LAM.X.)

ISIDÉES. Isidéœ. polyp. Ordre de la première division des Polypiers flexibles ou non entièrement pierreux , dans la section des Polypiers corticifères composés de deux substances , une extérieure et enveloppante , nommée écorce ou encroûtement ; l'autre appelée axe , placée au centre et soutenant la première. Ce sont des Polypiers dendroïdes , formés d'une écorce analogue à celle des Gorgoniées , et, d'un axe articulé à articulations alternativement corallo-pierreuses , cornées et solides ou spongieuses , presque subéreuses Linné, dans son Hurtiis Cliffordanus , a le

premier établi le genre Isis, auquel il avait réuni le Corail rouge sous le nom à' Isis nolilis. Pallas et quelques autres zoologistes ont suivi l'opinion du naturaliste suédois, et l'on voit encore, dans les cabinets où l'on a conservé l'ancienne nomenclature, les Isidées sous le nom de Coraux articulés pour les dis-

tinguer du vrai Corail qui n'est point articulé. Cette différence n'est pas la seule qui existe entre ces deux groupes et les Polypiers; la substance tant interne qu'externe, le port, la couleur, etc., en offrent d'autres bien caractérisées.

Les Isidées sont composées, comme tous les Psémurifères cortici-fères, de deux parties, une centrale qui porte le nom d'axe, et une enveloppe charnue qu'on appelle écorce, comme dans les Gorgoniées. L'axe est formé d'articulations alternativement pierreuses et cornées, variant dans leur grandeur et leur diamètre: les premières sont blanches, un peu translucides, marquées de sillons plus ou moins profonds et longitudinaux, quelquefois plus grandes, souvent plus petites que les secondes articulations ou les cornées. Ces dernières, toujours opaques, d'une couleur foncée et brunâtre, se séparent des premières avec une grande facilité, à cause de la dilatérence qui existe dans leur composition. Elles semblent destinées à donner aux Isidées les moyens de se prêter aux inconvénients des eaux de la mer, et suppléer par un

* peu de flexibilité à l'usage de la solidité qui leur manque: cette flexibilité disparaît lorsque ces Polypiers sont desséchés, et leur fragilité est telle qu'il est impossible de les fléchir pour les conserver dans un herbier. En général les Isidées sont d'autant plus fra-

giles qu'il y a plus de différence entre les deux substances qui composent l'axe. L'écorce ou l'enveloppe extérieure est d'une

consistance molle et charnue dans le Polypier vivant ; par la dessiccation elle devient crétacée et friable , eu général n'adhérant point à l'axe et s'en séparant avec tant de facilité, que des auteurs ont prétendu que l'écorce des Isidées n'était jamais entière. Il es» très-rare en effet d'en trouver de telle dans les collections ; mais dans la nature il n'en est pas ainsi : la tige et les rameaux de ces Polypiers ai ticulés sont garnis dans toute leur étendue d'une enveloppe charnue, vivifiée parAine

foule de petits Animaux à couleurs brillantes. Cette enveloppe ou écorce est quelquefois très-épaisse, d'autres fois elle est très-mince , elle varie souvent par l'exposition à l'air et par la dessiccation : il n'est pas iuulde de remarquer dans les Isidées une particularité que nous piésentent également les Gorgoniées , c'est que dans les espèces à écorce mince , celle-ci adhère toujours à l'axe ; elle s'en sépare avec d'autant plus de facilité qu'elle est plus épaisse. Ainsi, les Isis et les Plexaui es , les Gorgones et les Mélitées, nous offrent une grande analogie, sous le double rapport de l'épaisseur de l'écorce et de son adbérence avec l'axe.

Il est difficile d'expliquer la manière dont s'opère la croissance des Isidées : chaque articulation doit-elle être considérée comme une famille particulière, isolée des autres, ou bien tous les Polypes communiquentils entre eux comme dans la majeure partie des Polypiers corallignes flexibles? Cuvier ail que a lorsque l'Ar- » bredeslsisgrandit, lesarticulations » cornées de la tige disparaissent, » parce que l'Animal les recouvre de » couches piei reuscs , en sorte qu'il » n'en reste plus qu'aux branches. »

ïNous avons observé généralement le contraire dans les nombreuses Isidées que nous avons examinées , à l'exception toute- lois de Yltis elongata , à laquelle la description de Cuvier semble

appartenir. En effet , les articulations cornées manquent dans les parties inférieures de ce Polypier. Rien n'indique qu'elles aient existé, et l'on n'en voit aucune trace dans les coupes longitudinales ou transversales des tiges.

Ainsi, ou les Polypes changent avec le temps la matière cornée en matière calcaire, ce qui est contraire à ce que l'on observe sur les Isidées en général , ou bien il existe une vie très-active dans les tiges; de toutes les nypolhcses la plus probable eSt que l'écorce et la tige possèdent une vie particulière indépendante de celle qui appartient à chaque Polype ; quo

a6 ISl

cette vie existe essculiellenuml dans la membrane placée entre l'écorce et l'axe, que c'est elle qui renferme les organes destinés à l'accroissement et à la formation de la partie solide interne, et qu'enfin, quoique l'écorce des parties inférieures des Polypiers soit dépourvue de Polypes , la vie n'y existe pas moins et cl'une manière très-énergique. Au moyen de cette hypothèse on explique avec la plus grande facilité , l'accroissement des tiges et rameaux, ainsi que celui de l'empâtement. Si les Polypes étaient

filacés par séries transversales sur les sidées, ou pourrait attribuer à chacune de ces séries la formation d'une articulation pierreuse et d'une cornée; mais. ces Animaux sont épars et placés d'une manière si uniforme , que souvent rien n'indique sur l'écorce les parties correspondantes aux disques cornés ou calcaires. Lorsque l'on examine avec attention ce squelette polypeux, ou ne peut s'empêcher d'être étonné que des Animaux regardés comme très-simples dans leur organisai ion , puissent sécréter des matières aussi nombreuses que celles dont il est com-

posé , ou mieux encore puissent modifier les substances animales de manière à former une écorce épaisse et charnue , et une tige composée de parties alternativement pierreuses et cornées , les premières quelquefois d'une dureté assez grande pour recevoir un beau poli. La transition de l'une à l'autre ne se fait pas graduellement , elle est subite ; il semble même que ces deux corps n'adhèrent entre eux que par leur surface , et qu'ils n'ont aucune communication , car jamais nous n'avons découvert aucun vaisseau, aucun»

ne fibre qui pénétrât dans leur intérieur ; quelquefois cependant les dis-

ques cornés nous ont paru composés de faisceaux de fibres, qui s'arrêtaient à la surface des disques pierreux ; c'est peut-être par eux que se sécrète la matière calcaire ? Au reste , nous ne pensons pas que dans l'état actuel de nos connaissances , il soit possible de donner une explication satisfaisante

IS

de la manière dont croissent les Isidées. Il est facile de bâtir des hypothèses sur un sujet aussi intéressant ; mais tant que l'on ne connaîtra pas parfaitement l'organisation interne et la manière de vivre des Polypes qui construisent les Polypiers , on sera exposé à des erreurs sans nombre. Nous avons divisé le genre Isis des anciens auteurs en trois groupes faciles à distinguer par la nature de l'écorce ou de l'enveloppe charnue, et par la forme de Taxe et de ses articulations. JMous avons conservé le nom d'Isis à celui qui renferme l'espèce la plus anciennement connue, Y Isis

Hippuris de Linné. On ne connaît point les Polypes des Isidées ; les auteurs qui en ont parlé les ont regardés comme les mêmes que ceux du Corail parce qu'ils plaçaient dans le genre Isis cette production brillante de la mer. Ainsi , et quoiqu'aucun naturaliste n'ait publié la description des Animaux des Isidées, nous les regardons comme analogues à ceux des Gorgones i ils peuvent offrir des différences génériques, mais ils se ressemblent par les rapports généraux qui doivent lier entre eux les Polypiers corticifères. Leur écorce est-elle sèche ou molle lorsque les Polypes sont vivans? Quoiqu'animée, elle peut, suivant nous, avoir une apparence de mort; alors la vie sensible n'existe que dans la membrane qui se trouve entre l'axe et l'écorce, et qui se prolonge dans chaque cellule , comme le Cambium et le Liber entre les couches corticales et l'Aubier. Il n'y aurait de Polypes que dans la partie de l'écorce encore molle , les Polypes disparaîtraient à mesure qu'elles se dessèchent , mais la membrane dont nous avons parlé , porte la vie et la nourriture depuis la base jusqu'au sommet, les Polypiers continueront de croître et de grossir. Cette hypothèse nous semble la plus probable et peut s'appliquer à tous les Polypiers corticifères. Défiance prétend avoir trouvé des Isidées fossiles ; n'ayant jamais vu les objets sur lesquels il fonde

rsi

: son opinion , nous croyons devoir i nous borner à l'indiquer. Les Isidées I pourvues de leur écorce ont tant de i ressemblance avec lesGorgones, qu'il i egt facile de confondre les unes avec lies autres; mais privées de cette enveloppe , la différence de l'axe est 1 telle qu'il n'y a pas d'aulrc rapport

3 ue celui de la forme , la composition e cet axe offrant les plus grandes ■ dissemblances.

Ces Polypiers ne se trouvent que i dans la zone équatoriale et dans le voisinage des tropiques, à l'exception de l'Jsis Hippuris que des naturalistes ont indiqué dans presque toutes les mers : en Islande , en Norwège , dans la Méditerranée , dans la mer des Indes , en Amérique , etc.

L'ordre des Isidées se compose des genres Mélilée , Mopdé et Iside. P~.

ces mots. (lam..X.)

ISIDIUM. bot. crypt. {Lichens.) Genre créé par Acbarius [Lichenogr.

Univers., p. 110, tab. il, lig. 7-10), adopté par De Candolle(Flor. Franc.) et par notre collaborateur A. Fée (Essai sur les Cryptogames des écorces, etc., Introduction, p. 80) qui l'a ainsi caractérisé : thallus crusacé , uniforme , muni de podélions (podetia)" ou rameaux solides et courts; apothécions orbiculés , formés d'une lame prolifère, placés au sommet des podélions du thallus, presque enfoncés sur les bords dans celui-ci, proéminents au centre, épais , hémisphériques, planes et sessiles en dessous , intérieurement homogènes. Fée a placé ce genre dans les Sphérophores , parmi les Lichens ramifiés à thallus solide , dont l'apothécion devient hémisphérique! Plusieurs espèces d' Isidium ont été décrites par Hoffman, Schrader et par Acbarius lui-même , sous les noms génériques de Stereocaulon , P'errucaria, Lepra et Lepraria. Elles se trouvent sur les rochers et les vieilles écorces , dans les deux continents. On distingue dans le nombre V Isidium corallinum, Ach., qui croît en Europe sur les pierres et les rochers.

SN

Les rameaux ou podélions de ce Lichen imitent les branches du Corail {*Isis nobilis* , L.), d'où on a formé les noms générique et spécifique. (g..N.)

ISIDROGALVIA. bot. FHAN. Ruiz et Pavon (770/- . Peruu. et Chil. T. m, p. 69) ont établi sous ce nom un genre de l'Hexandrie Monogynie, L., qui est le même que le *Narthecium* de Jussieu ou *Toffieldia* Smilh. L'inspection de la figure de X *Isidrogalvia fuliata* , Ruiz et Pav. [loc. c/7., tab.

30a, fig. 6), suffit pour justifier ce rapprochement. D'ailleurs, les auteurs de ce genre lui assignent comme congénère X *Antlericum calyculatum*, L., qui est le type du genre *Toffieldia*. V. *Toffieldia* et *Narthex*. (g..*.)

* ISIKA. bot. pujan. Adanson nommait ainsi un genre que Moench (*Method. Nov. Plant.*) a adopté, et dans lequel ce dernier faisait entrer les *Lonicera alpigena* et *cœnilea* de Linné. Aucun auteur n'a admis ce genre. V. *Chèvrefeuille*. (g..n.)

* ISINGAK. ois. (Fabricius) Nom

3uc porte le Labbe dans la Faune u Groenland. V. *Stercoraire*.

(DR. .Z

ISIS. FOLYP. V. *IsIDE*.

ISKA. BOT. CRYPT. V. *ISCA*.

ISNARDIE. *Isnardia*. bot. riiAN.

Ce genre , de la tétrandrie Monogynie , L. , rapporté d'abord aux Sali— cariées, a été définitivement placé dans la famille des Onagraceae par Jussieu {Ann. du Mus. d'Hist. Natur.

T. m , p. 475) qui l'a ainsi caractérisé : calice adhérent à l'ovaire, tubulé, et à quatre divisions; corolle nulle; quatre étamines insérées sur le sommet du tube; style simple, terminé par un seul stigmate; capsule quadriloculaire , entourée par le calice, et polysperme. Ces caractères étant absolument conformes à ceux des espèces de *Ludwigia* dépourvues de pétales, Jussieu a proposé de réunir ces Plantes aux *Isnardia*. Cette réunion a été opérée par Poiret, ainsi que par Roemer et Schultes, qui ont décrit six espèces de ce dernier genre,

a8 ISO

savoir : *Isnardia palustris*, L. ; *Isn.*

mollis, Poiret , ou *Ludwigia mollis* , Michx.; *Isn. hirsuta* ou *Ludwigia hirsuta* , Lamk. ; *Isn. hastata*, Ruiz et Pavon; *Isn. microcarpa* , Poiret, ou *Ludwigia microcarpa* , Michx., et *glandulosa* , Pursli; et *Isn. trifolia*, Poiret, ou *Ludwigia trifolia* à Burmann.

Ces Plantes sont de petites Herbes aquatiques qui habitent l'Amérique septentrionale , à l'exception de la première que l'on rencontre aussi en Europe sur le bord des endroits marécageux , et de la dernière qui, selon Buemann , croît dans l'île de Java. (o..N.)

ISOCARDE. *Isocardia*, conch. Ces Coquilles faisaient autrefois partie des Cames ou des Pétoncles des anciens auteurs. Lorsque Linné institua des genres , il le fit avec une grande réserve et il dut souvent réunir dans une même coupe des matériaux assez

hétérogènes. Son genre Bulle en est un exemple; ses Cames pourraient en être un autre. C'est avec ces dernières qu'il confondit les Coquilles qui nous occupent. Bruguière qui le premier parmi nous réforma les genres de Linné, sentit que des Coquilles aussi régulières que les Isocardes ne pouvaient rester dans le même genre que des Coquilles adhérentes, irrégulières et de formes différentes; 11 saisit très-bien leurs rapports en les

ïdaçant parmi les Cardites. Il inarqua eurs affinités avec les genres envi- •ronnans; cependant le genre Cnrdite de Bruguière avait besoin lui-même de réformes ; Lamarck les opéra, et l'une d'elles a été consacrée à l'établissement du genre Isocarde. Carac-térisé d'aboi d sur tes Coquilles seules, il fut admis par presque tous les zoologistes et depuis confirmé par les savantes recherches de Poli dans son grand ouvrage des Testacés de Deux-Siciles oii l'on en trouvera une bonne description et d'excellentes figures.

C'est sous le nom de Glossoderme qu'on le trouvera décrit. Quoique l'on puisse remarquer dans l'ouvrage

ISO

de Klein {Tent. Meth. Ostrac.,ç. 1 38) un genre antérieurement établi sous le nom A' Isocardia, on serait fortement dans l'erreur si l'on croyait qu'il y a des rapports avec celui-ci ou que c'est le même, car Klein y réunit toutes les Coquilles bivalves qui présentaient à l'œil la forme d'un cœur : aussi il ne renferme presque uniquement que des Bucoides, presque toutes les espèces connues du temps de cet auteur, et accidentellement une seule espèce d'Isocarde, Y Isocardia Cor des auteurs; il y auiait donc de la mauvaise foi ou de l'ignorance à dire que Klein est le créateur

du genre Isocarde. Il a rassemblé sous cette dénomination des Coquilles cordiformes de quelques genres qu'elles fussent, et Lamarck a établi le genre Isocarde tel que nous l'entendons aujourd'hui. Quant à la place que les auteurs systématiques ont assignée aux Isocardes, elle a assez varié. Lamarck l'a d'abord mis dans la famille des Cardiacées, avec les Bucardes, les Cardites, etc. Cuvier (Règn. Anim., p. 478) le considère comme un sous-genre du genre *Cardium*, ce qui rompt les rapports établis par les autres auteurs. L'opinion de Férussac est différente de celles que nous venons de rapporter, mais elle se rapproche davantage de celle de Lamarck; en conservant la famille des Cardiacées de ce dernier, il en a éloigné les Cardites, les Cypricardes et les Hyalines, dont il a fait avec les Yénéricardes sa famille des Cardites'. Il n'a conservé dans les Cardiacées que les Bucardes, les Hémiénides et les Isocardes. Blainville, dans son article Mollusque du Dictionnaire des Sciences Naturelles, a conservé à peu près la manière de voir de Cuvier, c'est-à-dire que les Isocardes sont dans la famille des Camacées avec les Cames, les Dicératès, les Ethéïes, les Tiidacnes et les Trigonies. Nous nous sommes plusieurs fois demandé pourquoi ces genres étaient réunis, et nous avons vainement cherché à répondre à cette question par les caractères tellement

ISO

étendus de la famille qu'il serait possible d'y faire entrer la plus grande partie des Conchilères. L'opinion de Lamarck (Familles Naturelles, p. 217) est entièrement la même que celle de Lamarck, seulement il l'unit avec juste raison le genre Vénéricarde à ceux qui composent les Cardiacées.

Voici les caractères qui peuvent servir à faire reconnaître le g«;nrc Isocarde : Animal à corps fort épais : les bords du manteau finement papillaires, séparés dans la partie inférieure moyenne seulement et réunis en arrière par une bande transverse, percée de deux orifices, entourée de papilles radiales; pied petit, comprimé, tranchant; les appendices buccaux ligulés (Blainv.). Coquille équivalve, cordiforme, ventrue, à crochets écartés, divergens, roulés en spirale.

Deux dents cardinales, aplaties, intrantes, dont une se courbe et s'enlance sous le crochet; une dent latérale, allongée, située sous le corselet; ligament extérieur fourchu d'un côté.

Le nombre des espèces connues d'Isocardes est peu considérable; celle qui est la plus répandue est l'Iso-C à uni; globuleuse, Isocardia Cor, Link. (Açim. sans vert. T. vt, p.

3i, n. 3i); C/iama Cor, L., Gmel., p. 3299; Cardita Cor, Brugière, Dict.

Lucycl., n. 1, et pl. 23a, fig. 1, a, b, c, d; l'oli, Test., des Deux-Siciles, T. 11, lab. a3, fig. 1, 2; Chemnitz, Conch. T. vu, pi. 48, lig. 483; Brocchi, Conch. i. posa, subapp. T. 11, p.

519; Scilla, de Corporib. marialis lapidescentibus, tab. 16, fig. a, a; Isoc. fraternel, Say, Mém. sur les Fossiles du Maryland dans le Journal de l'Académie de Philadelphie, T. I, pl. 11, fig. i. Lamarck en mentionne une variété à crochets plus courts et moins divergens.

Cette espèce est très-répandue dans les collections; elle y porte vulgairement le nom de Cœur de Lièvre, de Cœur à volute; on la trouve vivante dans les mers d'Europe et notamment dans

la Méditerranée. Son analogue identique se rencontre dans presque tous

ISO 39

les lieux où il y a des fossiles , en Italie et en Calabre. Ce qui doit surprendre , c'est que l'analogue fossile se retrouve parmi ceux du Maryland en Amérique. La variété est particulière aux environs de Bordeaux, quoiqu'elle se rencontre aussi en Italie.

Les «autres espèces vivantes sont

I ISOCARDE DES GRANDES L\DES , ISO-

Cardia moltkiana , Lamk., loc. cit., n. 3 ; *Cardia moltkiana* , Brug. , *Eccycl.*, pl. 2 53 , fig. 1 , a , b , c , d , qui est extrêmement rare et très-distincte de la précédente , et *Isocardia demissilov-née* , *Isocardia sernisulcata* , Lamk*, loc. cit. , n. 4, espèce non moins rare que la précédente et qui vient des mers de la Nouvelle-Hollande. On ne peut rapporter avec certitude qu'une seule espèce fossile à ce genre, c'est le *Cliaa arietina* de Brocchi , *Isocardia arietina* , Lamk. , Brocchi , *Concli. subapp. T.*

ji, p. 668, pl. 16, lig. 16. Les autres espèces , telles que *Y Isocardia basoc/iia/ia*, Def. (*Dict. des Se. Nat.*), n'étant que des moules intérieurs, ne peuvent s'en rapprocher que par analogie de formes et non sur les caractères de la charnière que l'on ne connaît pas; c'est pour cette raison que les espèces figurées-, par Sowerby dans son *Mineral Conchology* , pl. 255 , ne doivent être admises qu'avec circonspection.

* ISOCARPHE. *Isocarpha*. bot.

PtIAN. Genre de la famille des Synanthérées , Corymbifères de Jussieu , et de la Syngénésic égale , L., établi par R. Brown (Observ. on the Gompasitoe , p. 77) qui l'a ainsi caractérisé : réceptacle conique , garni de paillettes séparées , semblables entre elles, les extérieures constituant l'involucre ; fleurons tubuleux , uniformes , hermaphrodites ; anthères mutiques à la base; stigmates munis d'un appendice allongé, hispidule et aigu ; akènes prismatiques dépourvus d'aigrettes. Les Plantes de ce genre sont herbacées et indigènes de l'Amérique méridionale. Leurs feuilles sont opposées ou alternes , indivises. Les Heurs blanchâtres forment des calathides

30 JSO

ovoides , terminales , ternées ou solitaires.

L'espèce sur laquelle ce genre a été fondé est le *Calea oppositifolia* , L. ; mais les caractères précédens ont été arrangés de manière à y comprendre le *Spilanthes atriplicifolius* , L. , qui diffère du *Cal. oppositifolia* , surtout par ses feuilles alternes, ses calathides solitaires, la texture et la forme des paillettes du réceptacle. R. Brown n'a jamais observé les trois ou quatre

flores barbes qui , selon Swartz , ornent l'aigrette du *Calea oppositifolia* .

Outre les deux espèces que nous venons de citer et qui ont été décrites par H. Cassini (Diction. des Scienc.

Natur. , tab. 24) sous les noms d'*Isocarpha oppositifolia* et *Is. alienifolia*, cet auteur a réuni au genre en question le *Spilanthes leucantha* de Kunth (Nov. Génér. et Spec. Plant, æquinoct. T. IV, p. 210) pour lequel il a proposé le nom d'*Is. Kunthii*. Il en a aussi

rapproché , mais avec doute, le *Pyrethraria dichotoma* de Persoon. (c.w.)

* ISOCERE. *Isocerus*. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Hétéromères, famille des Mélastomes, tribu des Blapsides, établi par Megerle et adopté par Dejean (Cat. des Col., p. 66). Lalreille réunit ce genre à celui des Pédines. V. ce mot. (g.)

ISOCHILE. *Isochilus*. bot.

phan. Et non Isorhile. Genre de la famille des Orchidées et de la Gynandrie Monandrie , L. , établi par R. Brown (Hort. Kew. , éd. 2, vol. 5, p. 209), et ayant pour type *Vepidendrum lineare* de Linné, ou *Cymbidium lineare* de Swartz. Ce genre offre les caractères suivans : les trois divisions externes et les deux divisions internes et supérieures du calice sont égales entre elles et convergentes ; le labelle a la même force ; il est creusé à sa base et dépourvu d'éperon ; le gynostème est dressé , semi-cylindrique , terminé par une anthère operculée , contenant quatre masses polliniques, solides et parallèles.

ISO

Ce genre se compose de trois espèces. Ce sont des Plantes herbacées, vivaces , parasites , toutes originaires de l'Amérique méridionale. Leur tige est simple ou rameuse, non bulbeuse à sa base , portant des feuilles alternes , distiques et linéaires; des fleurs axillaires, solitaires ou terminales et disposées en épis. Ces trois espèces sont : 1° *Isocilus linearis* , Brown, loc. cit., qui se distingue par sa tige simple; ses feuilles distiques , linéaires , émarginées au sommet ; ses fleurs terminales et en épis. 2°. *Isochilus graminifolius* , Kunth in Humb. Nov.

(Jen. , 1, p. 540 , t. 78 ; espèce nouvelle ayant la tige rameuse, les feuilles distiques , linéaires, acuminées ; les fleurs axillaires et solitaires. Elle croît dans les Andes de Popayan.

5Q. *Isochilus prolifer* , Brown , loc.

cit. ; *Cymbidium proliferum* , Willd., Sp. Sa tige est prolifère , portant à l'aisselle des feuilles qui sont distiques , lancéolées, oblongues , des bulbes surmontés de deux feuilles.

Les fleurs sont axillaires. (a. h.)

* ISOCHIRDS. crust. Genre établi par Leach , et dont Desmarest fait mention dans le Dictionnaire des Sciences Naturelles , sans donner ses caractères. (g.)

* ISOCYNIS. bot. phan. Nom donné par Du Petit-Thouars (Hist. des Orchidées des îles australes d'Afr.) à une Plante placée dans le groupe que cet auteur a nommé *Cynosorchis*, et qui correspond au genre *Orchis* de Linné. Cette Plante est *V Orchis fastigiala* , indigène des îles de France, Mascareigne et Madagascar. Du Petit-Thouars l'a figurée {loc. cit., tab. 15}.

* ISODACTYLES, ois. Même chose que *Zigodactyles*. (dr..z.)

*ISODON. MAM. Pendant que Desmarest- faisait connaître en France son genre *Capromys*, Thomas Say publiait à Philadelphie le même genre sous le nom d'*Tsodon*. L'espèce qui a servi de type à ce nouveau genre (*Capromys Furnieri*, Desm.) a reçu

ISO

(lu savant américain le nom *A'Isodon pilorides*. pfi *Capromys*. Il ne faut donc point confondre l'*Isodon* avec l'*Isodon* qui est un Animal à bourse.

ISOÈTES. bot. crypt. {Lycopodiacées?} Ce genre , l'un des plus anciennement connus et des plus curieux de la cryptogamie, est aussi l'un des plus difficiles à ranger dans les familles déjà établies ; peut-être méritait-il , comme Richard le pensait, de former une petite famille à part; mais cependant , pour ne pas multiplier le nombre de ces divisions, on peut le placer à la suite des Lycopodiacées avec lesquelles il a quelques rapports.

U *Isoetes lacustris* , Plante assez commune dans plusieurs parties de l'Europe , croît au fond des lacs qu'elle tapisse d'un gazon d'un beau vert. Sa tige est réduite à'un tubercule très-court et assez gros, couverte de feuilles nombreuses , serrées , divergentes, subulées, demi-circulaires, d'un tissu lâche et celluleux qui les fait paraître cloisonnées. Ces feuilles sont dilatées à leur base qui embrasse en partie la tige , et c'est dans l'intérieur de cette base dilatée que se trouve creusée une ou quelquefois deux loges remplies de semences très -nombreuses. Quelques auteurs, et Sinith en particulier, prétendent que les feuilles du centre renferment dans leur base un organe particulier qu'ils indiquent comme une étamine ; mais ce fait , qui paraît très-douteux , n'a jamais été vérifié avec assez d'exactitude , ni exposé avec assez de détails pour qu'on puisse savoir ce qu'il y a de vrai dans cette assertion. Le professeur Delile a présenté à l'Académie des Sciences, il y a près de deux ans, un Mémoire sur cette Plante , renfermant des détails curieux sur son organisation et sur sa germination; mais ce Mémoire n'étant pas encore publié, les faits qu'il renferme ne nous sont pas connus assez exactement pour les exposer ici. Le genre *Isoetes* ne renferme dans tous les auteurs que deux espè-

ces; l'une , qu'on indique dans toute l'Europe, *Isoetes lacustris*, L., et dont on distingue deux variétés; l'autre, qui croît dans l'Inde, *Isoetes Co/omandeliana*. Il paraît cependant que les deux variétés de l'espèce européenne constituent deux espèces bien distinctes; l'une, qui est le véritable *lacustris* de Linné , croît dans le nord de l'Europe, et jusque dans les Vosges où Mougeot l'a recueillie au lac de Geradmer ; l'autre , qui habite les lacs des environs de Montpellier et quelques autres parties du Midi , a les feuilles beaucoup plus étroites, plus longues et plus redressées. Bory de Saint-Vincent en ajoute une troisième qui se trouverait dans les Landes aquitaines ; ses feuilles sont presque filiformes, et quelquefois confervoïdes. Thore la découvrit aux environs de Saint- Vincent même, près de Dax. (ad. b.)

ISOLÉPIDE. *Isolepis*. bot. puân.

Famille des Cypéracées , Triandrie Mouogynie, L. — B, Brown {Prodr. TL.

Nov.-Holl. T. i, p. 221) a fait un genre particulier., sous ce nom, de toutes les espèces de *Scirpus* de Linné , qui n'ont pas de soies hypogynes autour du fruit. Tels sont les *Sci/pus jluitans* , *setaceus* , *nodosus* , etc. V.

SCIRPE. (A. R.)

* ISO LUS . crust. Genre établi par Leach et mentionné par Desmarest (Dict. des Sciences Natur.) qui ne donne point ses caractères. (o.)

ISONEMA. bot. pñian. Robert Brown {Mem. W'ern. Soc. 1, p. 63) a établi sous ce nom un genre de la famille des Apocynées et

de la Peucedanie Monogynia, L., auquel il a rattaché les caractères suivans : corolle hypocratérisée , dont le limbe est à cinq divisions; cinq étamines ayant leurs filets simples au sommet, les anthères sautées , adhérentes au stigmate par leur milieu; point d'écailles hypogynes ; deux ovaires; style unique, filiforme ; stigmate épais et obtus. L'espèce sur laquelle ce genre a été fondé est un Arbrisseau ,ae_Afrique équinoxiale , qui est velu

3a ISO

et muni de feuilles opposées. Ses fleurs sont disposées en corymbes terminaux. Le tube cylindrique de la corolle est barbu intérieurement.

Rcemer et Schultes ont appelé cette Plante Isonema Smeathmanni , du nom de celui qui l'a apportée d'Afrique.

Postérieurement à l'établissement du genre Isonema de R. Brown , H. Cassini a employé la même dénomination pour un nouveau genre de Symplocarées. En attendant qu'on lui impose un autre nom (ce qui est nécessaire), nous le ferons ici connaître tel que son auteur l'a proposé.

Ce genre appartient à la Syngénésie égale de Linné. H. Cassini (Bulletin de la Société Philomatique , septembre 1817) l'a ainsi caractérisé : involucre hémisphérique, formé de folioles imbriquées, lancéolées , appliquées , membraneuses sur les bords et spinescentes au sommet; réceptacle plane, alvéolé; les cloisons des alvéoles membraneuses et laciniées : calathide sans rayons, composée de fleurons nombreux , presque réguliers et hermaphrodites ; ovaires pentagones, glabres, glanduleux, munis de bourrelets basilaire et apicalaire , et surmontés d'une aigrette longue , blanche et légèrement plumeuse.

L'auteur de ce genre l'a placé dans la tribu des Vernoniées-Ethuliées. Il n'en a décrit qu'une seule espèce sous le nom à! *Isonema avala*. Le *Conyza clrinensis*, L. et Lamk., paraît en être le synonyme. (g..n.)

ISOODON. MAM. V. PÉRAMÈLE.

ISOPHLLIS. polyp.? Rafinesque- Schmaltz (Car. Gen. elSp., tab. 20, fig. 5, a,b.) désigne sous ce nom un genre de productions marines dont il ne décrit et ne figure qu'une espèce.

C'est, dit-il, une substance gélatineuse, transparente, plane, presque arrondie, garnie sur presque toute sa partie supérieure de séminules en partie enchâssées, rondes, situées en liges circulaires et concentriques. 11 a été observé sur les côtes de Sicile.

ISO

Si nous le comparons aux autres productions marines, sans considérer l'opinion de l'auteur, qui le regarde comme une Plante, nous serons forcés^ cause de ses caractères, d'en faire un Zoo-phyte de l'ordre des Polyclinées dans la division des Polypiers sarcoïdes; les rapports que l'*Isophlis* présente avec ces êtres sont si nombreux, qu'il ne forme peut-être qu'une espèce d'un des genres établis par Savigny dans cette famille encore peu connue. Rafinesque donne le nom *A'Isopklis concentrica* à l'espèce qu'il a trouvée. (lam..x.)

* ISOPHYLLTJM. bot. imian. Le genre *Buplevrum*, L., a van t été subd ivisé en trois genres distincts par Hoffmann (P/a//A Umb. Gen. 1, p. 112), cet auteur a donné à l'un d'eux le nom à'I-sophyllum, renouveléde *Cordus* qui l'employait pour une espèce, et il l'a ainsi caractérisé : involucre général et involucelles à plu-

sieurs iolioles inégales , lancéolées; pétales infléchis; akènes oblongs, cylindriques, à cinq côtes. L' Isophyllum n'est en réalité qu'une simple division du genre éminemment naturel Buplevrum ; il se compose des espèces suivantes : B. petroëum, B. caricifoli-
Ufn , B. falcattm , B. juncettm , B. Gerardi et 2?. baldense. (g..n.)

ISOPODES. Isoj)oda. crust.

Cinquième ordre de la classe des Crustacés , ayant pour caractères essentiels: mandibules saus palpes; pieds uniquement propres à la locomotion ; deux paires de mâchoires recouvertes par deux pieds-mâchoires représentant, par leur réunion, une lèvre inférieure ; pieds antérieurs portés par un segment distinct de la tête; branchies situées sous la queue ; corps déprimé'; tronc divisé communément en sept segmens ; quatorze pieds ; un à six segmenS postérieurs, formant une queue.

Latr.eille divisait cet ordre eu deux familles, celles des Phytibranches et des Plérygibranches. Dans le Règne Animal de Cuvier , U l'a divisé en trois sections sous les noms île Cyli-

ISO

loranches, Phylibranches et Plérygibbranches ; enfin dans son nouvel ouvrage (Fam. Natur. du Règne Anim.) lil fait passer les deux premières seciitions , celles des Gytibranches et des rPkytibranches , dans l'ordredes Amphipodes, et ne laisse dans les' Isopodes Hue ceux compris dans sa section des l'Ptérygibranches. Les Isopodes s'éloignent des Amphipodes, parla forme Lamellaire ou vésiculaire des appendices inférieurs du post-abdomen, par leurs mandibules dénue'es de palppes el par l'absence de corps vésicuo.eux à la base des pieds. Ces Crustacés ont le corps ordinairement composé H'une tête portant quatre antennes, lont

les deux latérales, au moins, «ont en forme de soie; ils ont deux i/eux grenus. Leur tronc est formé de ;:ept anneaux , ayant chacun une Wfire de paies ; leur queue , dont le • îombre d'anneaux varie d'un à sept, ■ est garnie , en dessous , de lames ou de feuillets disposés par paires , •i>ur deux rangs, portant ou recouvrant les branchies, et servant aussi it la n'afatfori,' Les organes sexuels masculins d'uïl petit nombre d'espèces où on les a découverts , sont doubles et placés sous les premiers feuillets de la queue , oii ils s'annoncent >Dar des filets ou des crochets. Les emelles portent leiirs œufs sous la mitiirie , soit entre des écailles , soit ilans une poche ou un sac membraîeux qu'elles ouvrent aliu de livrer oasssge aux petits qui ont , en naissant , la forme propre à leur espèce , :t qui né font que changer de peau :n grandissant.

Laireille divise cet ordre en deux grandes sections: la première , celle Mes Aquatiques , se compose des Isoodes qui sont munis de quatre anp'énès très-distinctes, dont les antérieures ont au moins trois à quatre articles : les autres sont dépourvus de ■ :et organe. Les appendices inférieurs Hu post-abdomen sont ordinairement vésiculeux et sans ouvertures particulières pour l'entrée de l'air. Cette pétition comprend les familles des Epicarides, des Cymothoadées , des

TOME IX

ISO 53

Sphéromides , des Aseilotes et des Idotéides. {V. ces mots.) La seconde section , celle des Terrestres , renferme les genres dont les deux antennes intermédiaires sont très-petites , à peine vi-

sibles et de deux articles au plus; elles avaient échappé à l'observation de la plupart des naturalistes. Les premiers feuillets de ceux qui vivent constamment hors de l'eau renferment des pneumobranchies ou des branchies aériennes, faisant l'office de poumons; l'air y pénètre au moyen de petits trous disposés sur une ligne irausverse.

Cette section renferme la famille des Cloportides. V. ce mot. (g.)

ISOPOGON. Jsupogon. bot. phan.

Genre de la famille des Proléacées et de laTétrandrieMbnogy'-nie, L., établi par R. Biowu dans son beau travail sur ce groupe naturel de Végétaux (Trans. Lin. Soc. T. x, p. 71), et qu'il caractérise de la manière suivante : le calice est quadrifide, son tube est-gi êle el persistant; le style est caduc en totalité, surmonté par lin stigmat fusilorme ou cylindrique; il n'v a pas de soies hypogynes autour rte 1 ovaire. Le fruit est une noix sessile, renflée, toute couverte de lo.ngs poils.

Ce genre se compose d'Arbustes roides, ayant les feuilles glabres, planes ou fil 1 i'O1 mes, divisées ou trèsmtières; les fleurs forment dçs capitules teimiuatix ou axillaires; tantôt ces fleurs sont très-serrées, imbriquées, et représentent un cône globuleux; tantôt elles sont simplement f'ascicnlées, réunies sur un réceptacle commun plane, entouré d'un involucre formé d'écaillés caduques et très-serrées. L' Isopogun est très-voisin du l'ftmphifa, dont il diffère par son calice entièrement caduc, par son slj le persistant à sa base, el par son fruit qui n'esl qu'en partie recouvert de poils. R. Brown pense qu'on pourrait le diviser en

deux genres, d'après le mode d'inflorescence que nous venons d'indiquer. Dans sa Flore de la Nouvelle-Hollande, il en décrit

54 ISO

douze espèces, toutes originaires de cette vaste région. A ce genre il rapporte le *Protea anethifolia* de Salisbury (Parad., t. 48), ou *Protea acufera* de Cavanilles, et le *Protea anemonefolia* de Salisbury, ou *Protea tridactylus* de Cavanilles. (a. n.)

ISOPYRE. *Isopyrum** bot. phan. Ce genre de la famille des Renonculacées, section des Helleborées, et de la PolyaridricPolygyue, L., a été caractérisé de la manière suivante par tous les botanistes, et en particulier par De Candolle {Syst. Nat. l^egeet.T.

i, p. 323): calice coloré, pétales, formé de cinq sépales caducs; corolle composée de cinq pétales égaux entre eux, tubuleux, bilabés, plus courts que les sépales, ayant la lèvre extérieure plus longue et bifide; étamines au nombre de quinze à vingt; ovaires au nombre de deux à vingt, surmontés chacun d'un style stigmatifère à son sommet et sur sa face interne. Les fruits sont des capsules sessiles, uniloculaires, polyspermes, comprimées, membraneuses.

Ce genre ne se compose que de deux espèces? *Isopyrum thalictrifolium*, L., D. G., loc. cit., T. i, p. 323, et *Isopyrum fumarioides*, L., D. G., loc. cit., T. i, p. 324. Mais une analyse soignée de ces deux espèces nous a convaincu que les caractères assignés au genre *Isopyrum* ne conviennent qu'à une seule de ces deux espèces, savoir: à *Isopyrum fumarioides*; tandis que l'on peut former un genre nouveau et distinct de *Isopyrum thalictrifolium*. Ce genre, que l'on pourrait appeler *Thalictrifolia*, se distingue de *Isopyrum* par les caractères suivants: ses étamines sont au

nombre de trente à quarante , tandis qu'on en compte seulement de dix à quinze dans l'Isopyre ; ses pétales sont simplement unilabiés, entiers , au lieu d'être bilabiés et bifides; enfin ses pistils et ses capsules ne sont jamais qu'au nombre de deux, tandis qu'on en compte constamment de huit jusqu'à seize dans Y Isopyrum fumarioides. D'après ces différences , il

ISO

nous paraît certain que Ylsopyrum thalicroides forme un genre distinct que nous proposons d'appeler Thalictrella. r. Thalictrelle. (a.r.)

* ISORA. bot. phan. (Plumier.) Syn. d'Hélictères. r. ce mot. Isora n'est pas un nom de la langue mala-î bare comme on l'a dit quelque part, mais américain. (e.)

ISOS. bot. pii.yn. C'est, selon Arlanson , le Groseiller dans Théophraste. (B.)

ISOTRIA. bot. phan. Rafinesque- Smallz (Journ. de Botan. î, p. 220) a publié sous ce nom un genre de la famille des Orchidées, et de la Gygaudrje Digynie , L. auquel il a donné les caractères suivans : périanthe à six divisions , les trois extérieures égales , linéaires; les trois intérieures plus courtes, oblongues, presque égales ; deux anthères; un style; une capsule filiforme. Ces caractères, si incorrects et si incomplets, doivent faire ajourner l'adoption de ce genre dont l'espèce unique, Iso-

tria verticillala , croît dans les Etats- Unis de l'Amérique méridionale.

ISO TYPE. Isotypus. bot. pii.an.

Genre de la famille des Carduacées , tribu des Onoséridéés, établi par notre collaborateur Kunth {iiiHumb.

Nou. Gêner. 4, p. 11), et qui tient le milieu entre les Onoseris et les Stoechclina. Voici ses caractères : fin- I volucre est campanule, turbiné à sa base , formé d écailles lâchement I imbriquées, planes, linéaires, lan- j céolées , subulées à. leur sommet , un peu scarieuses sur les .bords, et d'i- I négalé grandeur , les exterieure- sétant pluà courtes ; le réceptacle est plane , couvert de poils courts et serrés; les fleurons sont au nombre de dix en- I viron , tous tubuleux , hermaphrodi- I tes , ayant leur limbe à cinq divisions I égales, lancéolées et étalées. Le tube, anthérifère est formé de cinq anthères, portant chacune deux appendices subulés à leur base, et à sou sommet il se termine par cinq appen-

ISS

rices très-longs. Les fruits sont des akènes allongés , linéaires , à cinq angles terminés par une aigrette poilue et sessile.

Ce genre ne se compose que d'une seule espèce , *Isolypus onoserolles* , Kunth , loc. cit., p. 12, tab. 307.

C'est une Plante vivace , ayant le port de YOiioseris pu/purata; ses feuilles sont pinnatifides et lyrées, blanchâtreseï argentées à leur faccinférieure ; ses fleurs sont roses, disposées en corymbes et portées sur des pédoncules tout chargés de bractées. Elle a été trouvée dans la province de V enezuela , sur les rives du fleuve Tuy.

Le genre Isotype diffère de YO11oseris par ses fleurons, tous tubuleux et hermaphrodites, et par son réceptacle garni de poils,

et du Stœhelina , par son léceptacle portant des poils et non des paillettes, par son aigrette podue et sa tige herbaeéo. (a. n.)

ISPIDA. ois. (Brisson.) Syn. de Martin-Pêcheur. P. ce mol. (B.)

ISQUIERDA. bot. niAN. Pour Izquierdia. F. ce mot. (b.)

ISSE. Issus, ins. Genre de l'ordre des Hémiptères , section des Homoptères , famille des Cicadaïres , tribu des Fulgoreselles, établi par Fabricius et adopté par Latrille (Fara. Natur.

du Règn. Anim.) qui l'avait réuni au genre Fulgore dans ses ouvrages antérieurs. En effet, ce genre n'en diffère que par des caractères trèssecondaires; leur tête n'est point avancée comme celle des Fulgores ; ils ont les élytres dilatées, arquées à la base et rétrécies ensuite; leur corps est court , et le second segment du corselet n'est guère plus étendu que l'antérieur, et a la forme d'un triangle renversé dont la base est appliquée contre celle du premier segment. Ces Insectes vivent sur divers Végétaux ; leurs habitudes sont à peu près les mêmes que celles des autres Cicadaïres. Les uns sont ailés , les autres sont aptères; parmi les premiers , on distingue :

L'Issu bossu , *Issus coleoptratus* , la

LIE 5f>

Cigale bossue de Geoffroy ; longue d'environ deux lignes et demie; corps cendré verdâtre; front ayant deux impressions noirâtres à son extrémité ; élytres un peu transparentes , chargées de grosses nervures parmi lesquelles l'on observe de petites veines ou lignes noirâtres; près du milieu il y a chacune d'elles, on voit une petite tache ou un point noir. Elle se trouve en France.

Parmi les Isses aplères , nous citerons :

L'ISSE GKYLLOÏDE, ISSUS gljlloules,

Fabr. Il est iaunatie, avec les élytres mélangées de noirâtre. Il se trouve en France et en Espagne où Léon Dufour en a rencontré une variété entièrement roussâtre. (g.)

ISTIOPHORE. Istiop/torus. pois.

(Lacépède.) Sous-genre de Xiphias.

y. ce mot. (b.)

ISURDS. pois. Genre formé par Rafinesque {Ichthyol. Sic, p. 45) aux dépens des Raies, f. ce mot. (b.)

ITEE. Itea. bot. phan. Le nom A'Itea, qui, dans l'antiquité, désignait le Saule, a été appliqué, par Linné, à un genre de Plantes de la famille des Cunoniacées , et de la Penlandrie Digyuie, L. , qui peut être caractérisé de la manière suivante : son calice est monosépale , court, campanule, à cinq divisions étroites et dressées ; la corolle se compose de cinq pétales linéaires , aigus, étalés dans leur moitié supérieure , et insérés au calice à la hauteur de ses divisions; les étamines, au nombre de cinq, sont dressées, introrses , alternant avec les pétales. L'ovaire est libre , pubescent , allongé , profondément marqué sur chacune de ses faces d'un sillon qui semble annoncer qu'il se compose de deux pistils réunis; ce sillon se prolonge sur le style qui se termine par un stigmate capitulé et bilobé. Le fruit est une capsule ovoïde , oblongue, terminée par le style qui est persistant, offrant deux loges qui contiennent chacune un grand nombre de graines attachées à

la cloison. Cette capsule se sépare à sa maturité en deux parties ou valves, par le moyen des deux sillons longitudinaux dont nous venons de parler.

Ce genre ne se compose que d'une seule espèce: *Ilea virginica*, L., Lamour., 111., tab. 147. C'est un Arbrisseau élégant pouvant acquérir une hauteur de quatre à cinq pieds.

Ses feuilles sont alternes, pétiolées, ovales, aiguës, presque glabres. Ses fleurs sont petites, blanches, disposées en grappes terminales. Il croît dans l'Amérique septentrionale, et on le cultive dans les jardins d'ornement.

Ilea coccinea de l'Héritier forme un genre distinct. V. *Cyrilla*.

ITANDENDROS. but. égypt.

Syn. de *Prêle*. /'. ce mol. (b.)

ITICA. BOT. *THAN*. V. *CHIATHETH*.

* *ITOUDOU*. bot. piian. Espèce de Violette de la Guiane, selon Aublet. V". - *Iomdion* et *Ipécacuanha*.

Le nom caraïbe *A'itoubou* a été appliqué par Surian à diverses Fougères. . (B.)

Ititibiulus. ins. Genre de l'ordre des Myriapodes, famille des Chilognathes, établi par Linné et ayant pour caractères : corps cylindrique et très long, se roulant en spirale et composé d'un grand nombre d'anneaux presque tous portant deux paires de pales ; point de saillie en forme d'arête ou de bord tranchant sur le côté des anneaux. Linné et tous les auteurs jusqu'à Latreille réunissaient sous ce nom des Animaux dont les formes différaient essentiellement entre elles ; Latreille en a formé les genres

Glomérus , Polydème et Polyxène, ffu ces mots , et il a conservé le nom d'Iule à ceux qui ont les caractères que nous avons donnés plus haut. Ce genre se dislingue de tous les autres par ses anneaux qui sont parfaitement cylindriques et dépourvus d'arêtes. Il s'éloigne de celui ides Scolopendres par les anneaux qui , dans celui-ci , ne portent qu'une seule paire de pâtes, et par d'autres caractères aussi tran-

IUL

ohés tirés de la bouche et des antennes. Latreille (Règn. Anim. et autres ouvrages) plaçait ces Animaux dans la classe des Insectes , et en faisait le premier ordre , celui des Myriapodes; il a détaché dernièrement (Fam. Nat. du Règn. Anim.) cet ordre de la classe des Insectes et en a l'ail sa classe des Myriapodes. V. ce mol.

La forme générale des Iules est foit allongée, cylindrique, el la substance qui compose le grand nombre d'anneaux de ce corps est dure, un peu calcaire el unie. Ces anneaux varient en nombre , suivant les espèces ; ils sont égaux , à l'exception de deux ou trois de chaque extrémité , et portent chacun en dessous deux-paires de pales contiguësou très-rappiochées à leur naissance. Leur tête est de la largeur du corps . plate en dessous , convexe et arrondie en dessus postérieurement, un peu plus étroite et pres-[^] que carrée ensuite, à parlir des yeux; le bord antérieur est échnncié au milieu. Les yeux sont ovales, plans et formés de petits grains à figure irrégulièrement hexagonale; ils se confondent avec la surface de la tête et ne sont point saillans. Les antennes sont insérées tout près de leur côté interne; elles ne sont guère plus longues que la tête, assez grosses, de sept articles , dont le premier très-court, les quatre suivans presque coniques ou cylin-

driques et amincis insensiblement à leur base; le cinquième un peu plus gros; le sixième également un peu plus gros, conicoovulaire, tronqué, et au bout duquel on aperçoit l'extrémité pointue d'un septième article qui est fort petit. La boubeest composée.: i° de deux-mandibules formées d'une tige écailleuse à l'extrémité de laquelle est un article également écaillé et surmonté d'une pièce où sont implantées transversalement de petites parties cornées, tranchantes, qui sont autant de dents; le dos de chaque mandibule est en outre emboîté extérieurement dans une capsule écailleuse, grande, articulée à sa base, anguleuse, com-

IUL

yme formée de deux plans, dont l'extrémité de chacun est échancrée; a° id'une grande pièce crustacée ou espèce (cc de lèvre inférieure que Savigny considère comme deux paires de mâchoires réunies. Cette pièce est divisée par plusieurs sutures ou lignes imprimées; on voit inférieurement et au milieu une pièce dont les bords : sont anguleux, au-dessus de laquelle : s'élèvent parallèlement deux pièces étroites et en carré long, contiguës à leur bord interne, et dont l'extrémité est oblusément rebordée; de chaque

- côté, à partir de la ligne commune : servant de base, s'élève, dans le sens

- des précédentes, une pièce écailleuse de la même figure que les deux du milieu, mais plus grande, un peu élargie et arrondie sur le côté extérieur, au sommet; elle a, vers l'angle interne, deux petits tubercules que l'on prendrait pour deux palpes. La pièce générale est plate, et ressemble, étant très-mince, à un feuillet membraneux. Les deux premiers anneaux du corps ne

forment pas le cercle ; ils sont ouverts inférieurement , et les deux premières paires de pa tes et même eucoreles secondes semblent être appliquées sous la bouche ; les deux premières paires ont un support membraneux particulier qui remplit les in-leivalles que les anneaux laissent entre eux en dessous. Ces pâtes remplacent les deux paires supérieures de piedsmâchoires des Crustacés. Le premier anneau , qui est très-ouvert et en forme de plaque, est une fois plus long que les autres; c'est une sorte de corselet. Le troisième anneau , quoique formant presque un tour entier, est cependant ouvert el 11 a qu'une seule paire de pâtes, insérées de même que les précédentes ; le quatrième est plus fermé que le troisième , mais n'a encore qu'une paire de pales; ce n'est qu'au cinquième segment qu'on en trouve deux paires; celle disposition continue ainsi sans interruption dans les femelles; mais dans les mâles le septième anneau en est dépourvu, ou n'en a qu'une paire, les organes sexuels entraînant un

changement dans celle partie. Les deux derniers anneaux, dans les deux sexes , sont entièrement dépourvus de pâtes , l'avant-dernier a le milieu de son bord postérieurement avancé eu pointe; il reçoit en partie le segment termina! qui est formé de deux valves arrondies au bord interne, appliquées l'une contre l'autre, ets'ouvraut pour laisser passer les excréments et les œufs. Les pâtes sont très-petites, disposées sur deux séries très-rapprochées l'une de l'autre et dans un sens horizontal à leur base , faisant ensuite le crochet; elles sont composées de six petits articles et d'une pointe conique et cornée.

Savi , professeur de botaniqueà Pise , a fait des observations très -curieuses sur un Iule (7. commuais, Savi) qui diffère sensiblement du 1.

terrestres et du *I. sabulosus* avec lesquels on l'a toujours confondu. Il a environ trois pouces et demi de longueur et semble se rapprocher davantage des *I. /uscus* et *I. /.* Indus qui sont de l'Inde. Les pores latéraux des segments qu'on a regardés comme les stigmates ne sont que des orifices par lesquels s'écoule une liqueur acide et d'une odeur désagréable, qui paraît servir la défense de ces Animaux; les vrais stigmates sont deux petites ouvertures placées sous la pièce sternale de chaque segment, et qui communiquent intérieurement à une double série de poches pneumatiques disposées en forme de chapelet tout le long du corps et d'où partent les branches trachéennes qui vont se répandre sur les organes. Quoique ces Animaux aient un très-grand nombre de pattes, ils n'en sont pas plus agiles; au contraire, ils marchent liés -lentement et semblent glisser comme des Vers de Ici re. Leurs pattes agissent l'une après l'autre, régulièrement et successivement; chaque rangée forme une espèce d'ondulation; ils remuent en même temps leurs antennes, semblant s'en servir pour tâter le terrain et le corps sur lequel ils se promènent. Us roulent leur corps en spirale dans le repos et

38 ICL

placent leur tête au milieu. Les iules sont ovipares, et Latreille s'en est assuré en ouvrant plusieurs femelles qui lui ont toujours présenté des ovaires remplis d'œufs plus ou moins développés. Au sortir de l'œuf, d'après Savi, les Iules ont un corps en forme de rein et parfaitement uni, sans appendices. Dix-huit jours après leur naissance, ils subissent une première mue, et alors seulement ils prennent la forme des adultes; mais ils n'ont encore que vingt-deux segments en tout, et vingt-six paires de pattes et non trois, comme l'a dit Degéer; mais dix-huit paires servent

seules à la locomotion; après la seconde mue, le corps a vingt - trois segmens et trente-six paires de pâtes ; et ces nouvelles parties semblent se développer à la partie postérieure du corps; à la troisième mue l'Animal prend trente segmens et trente- six paires de pâtes ; et ainsi successivement, de manière que chez les adultes le corps est composé de cinquanteneuf segmens dans les mâles et de soixante-trois dans les femelle.'-. Degée n'a jamais aperçu de ves-liges de dépouilles ; mais Savi a été plus heureux, il a vu quels Iules muent à peu près de mois en mois depuis leur naissance, qui arrive en mars , ■ jusqu'en novembre où l'auteur a cessé de les observer; leur dépouille se compose, non-seulement de toute la tête, mais encore de la membrane qui tapisse intérieurement le canal alimentaire et les trachées. Les organes de la bouche sont les seules parties que Savi n'ait pas retrouvées.

Deux ans après leur naissance ils changent encore de peau, et c'est alors seulement que les organes génitaux deviennent appa'rens.

Les Iules vivent à terre, particulièrement dans les lieux sablonneux , les bois , etc.; ils répandent une odeur désagréable; d'autres, plus petits, habitent sous les écorces d'Arbres, dans la Mousse, etc. ; ils se nourrissent de substances- animales , mais mortes ou décomposées , ou de fruits, de racines ou de feuilles , de Plantes

IVA

potagères , etc. ; ils aiment en général les lieux un peu humides et sombres. Degée a yli un Iule ronger une larve de Mouche et la

manger en partie, ce qui poiterait à croire que ces Animaux sont carnassiers. Cependant le sentiment le plus commun est qu'ils se nourrissent, en général, de terreau. Ce genre est peu nombreux en espèces. Les environs de Paris en présentent plusieurs ; l'Amérique et l'Afrique nous en donnent de trèsgrandes. L'espèce la plus commune à Paris , est :

LTuxe terrestre, /. *terrestris* , L. , Fabr. , Geoff. , 01 iv. (Encyclop. Ins. T. vu, p. 415 , n. 10).

L'Iule très-grand , /. *maximus* , L. , Fabr., Oliv. , Latr. Jaune obscur; plus d'un pouce d'épaisseur; cent trente-quatre paires de pâtes.

Il habite l'Amérique méridionale, (g)

* IDLIS. pois. V. Girelle.

IDLUS. ins. V. Iule.

IVA. Iva. bot. PU/VN. Genre de la famille des Synanthéiées, et de la tribu des Xauthiacées , ayant néanmoins aussi quelques rapports avec les Armoises , et que l'on peut caractériser ainsi : involuerc hémisphérique, composé de trois à six folioles unisé-riées , à réceptacle plane , garni de squames lancéolées; fleurons du disque mâles et ayant leur corolle infundibulil'orme et régulière à cinq lobes; fleurons de la circonférence femelles, ayant la corolle courte et urcéolée; les akènes sont dépourvus d'aigrette.

Ce genre se compose de cinq espèces, toutes originaires d'Amérique. Trois ont été observées dans l'Amérique septentrionale , savoir : *Iva frutescens*, L.; *Iva imbricata* et *Iva ciliata*, Michx. Les deux autres croissent dans l'Amérique méridionale, savoir : *Iva anima* , L. ; et *Iva cheiranthifolia* , Kunth.

Les anciens botanistes ont donné le nom d'Iva et d'Ivette à des Plantes fort différentes les unes des autres :

ainsi Ylva moschala de Lobel est le Teucrium Iva de Linné;
Ylva Culinga

IVR

de Barète est le Cotinga Moscliata d'Aublet ; VIVA Pecanga du même n'est qu'une espèce de Smilax, dont la racine est employée comme celle de la Salsepareille. (a.r.J

IVETTE. bot. ni an. V. Iva.

* IVIRA. bot. phan. Le genre établi sous ce nom par Aublet , et adopté par Cavanilles, a été réuni au genre Sterculia de Linné par Swartz. Ainsi Ylva pruriens, Aublet (Guian., tab. 79), ou Ivira crinita , Cav. (Dissert. 5, t. 162), est maintenant le Sterculia Ivira de Swartz (Fl. lat. occid. , a, p. 1160). V.

Sterculie. (g.n.)

IVOIRE, mam. r. Dent, Éléphant et Os.

IVOIRE, muc. Svn. d'Eburne.

V. ce mot

IVRAIE ou YVRAIE. Lolium.

bot. phan. Ce genre, de la famille des Graminées , et de la Triandrie Digynie , L. , se compose de Plantes dont la connaissance remonte aux temps les plus reculés. Il est, en effet, question

d'Ivraie dans la Bible et dans les productions des plus anciens poètes. Le *Lolium* des anciens , et particulièrement celui de Virgile, paraît être la Plante qui a formé le type du genre établi par Linné et qui est ainsi caractérisé : épillets distiques , multilores et parallèles à l'axe de l'épi ; lépicène univalve , mais le plus souvent à deux valves inégales; glumes à deux valves lancéolées , l'extérieure mutique ou aristée audessous du sommet ; ovaire surmonté de deux stigmates plumeux ; caryopse oblongue , convexe d'un côté , aplatie et sillonnée de l'autre. Ce genre se distingue essentiellement du Froment (*Triticum*) par la position de ses épillets qui regardent l'axe par une de leurs faces et non par un de leurs côtés.

On connaît une dizaine d'espèces d'Ivraies , parmi lesquelles nous citerons seulement les deux suivantes qui sont communes en Europe :

IX A 5i)

L'Ivraie enivrante , *Lolium temulentum*, L. , vulgairement nommée Zizanie et Herbe d'Ivrogne , est une Plante annuelle dont le chaume dressé, haut de plus d'un demimètre , est muni de quelques nœuds ainsi que de feuilles engainantes, très-dongues , planes , assez larges , un peu rudes au toucher ; leur gaine , fendue , offre à son orifice une membrane tronquée. Une variété de cette Plante, dont la glume extérieure est mutique, a été élevée au rang d'espèce et nommée *Lolium aiense*. L'Ivraie enivrante est une herbe que les auteurs ont présentée sous les couleurs les plus sinistres , comme un véritable Qéau pour les moissons et pour la santé de l'Homme. Elle pullule, en effet, parmi les blés, lorsque les étés sont très-humides. Ses graines alors sont très-abondantes dans les Fromens et occasionent divers accidents, tels que

des nausées, des vomissemens et l'ivresse aux personnes qui mangent du pain fait avec la farine de ces graines. Nous croyons , toutefois, qu'on a beaucoup exagéré les principaux effets de l'Ivraie , effets qui paraissent dus à un principe susceptible d'être enlevé , ainsi que Parmeutier l'a enseigné , par la dessiccation au four avant que les graines n'aient été réduites en farine.

L'autre Ivraie, indigène d'Europe, est le *Lolium perenne* , L. , Plante excessivement commune sur les bords des chemins et dans les lieux incultes.

Celle Graminée est un fourrage excellent, mais très-peu productif; elle ne convient guère dans les prairies destinées à être fauchées ; elle est , au contraire, fort avantageuse dans les pâturages. On en forme des tapis de verdure dans les jardins paysagers ou elle porte les noms de Ray-Grass et de Gazon anglais. (g.n.)

IXA. Ixa. cnusT. Genre de l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures , tribu des Orbiculaires , établi par Leach et ne différant des Leucosiei que parce que le test produit , de chaque côté , une grosse proémi-

40 IXE

nence cylindrique et mousse qui le rend trois fois plus large que long.

Latreille (Règn. Anim. de Cuv.) avait adopté ce genre, mais il l'a supprimé dans son nouvel ouvrage (Fam.

Natur. du Règ. Anim.) L'espèce qui servait de type à ce genre , est le *Cancer cylindrus* de Herbst. V. Leucosie et Iphis. (g.)

* IXÉRIDE. *Ixeris*. bot. phan. H.

Cassini nomme ainsi un sous-genre qu'il a établi dans le genre *Taraxacum*, de la famille des Synanthérées et de la tribu des Chicoracées ou Lactucées. Voici ses principaux caractères : involucre formé de folioles oblongues lancéolées, disposées sur un seul rang, et à la base desquelles sont cinq petites écailles membraneuses ; réceptacle nu et plane; calathides composées de demi-fleurs hermaphrodites ; akènes oblongs marqués de dix côtes longitudinales excessivement saillantes en forme d'ailes linéaires ; le sommet du fruit prolongé en un col plus court que lui; aigrette blanchie et ptumieuse. Quoique l'auteur de ce sous-genre ne se soit pas décidé à le séparer complètement du *Taraxacum*, il en a fait voir néanmoins les principales différences, lesquelles résident dans le fruit et l'involucre. L'*Ixeris* est en outre pourvu d'une vraie tige, garnie de feuilles et de plusieurs calathides en covymbe, tandis que le *Taraxacum* a une hampe aphyllée et ne portant qu'une seule calathide. Si ces différences n'offraient que peu d'importance, il était inutile ou du moins contraire aux usages reçus de créer un nouveau nom qui fait croire à l'existence d'un véritable genre et isole ainsi une espèce de ses congénères. Nous croyons donc que l'autorité de Cassini, toute puissante qu'elle est en matière de Synanthérées, ne le sera pas assez en cette occasion pour faire adopter le nom *A' Ixeris polycephala* qu'il a donné à l'unique espèce du sous-genre, et que puisqu'elle appartient au genre *Taraxacum* on la nommera *T. polycephalum*.

C'est une Plante herbacée, originaire du Napaul. (&..N.)

1XIE. *Ixia*. bot. phan. Ce genre de la famille des Iridées et de la Triandrie Monogynie, L., offre pour caractères essentiels : un périanthe corolloïde, dont le tube est droit, filiforme, le limbe élaté

à six divisions régulières ou presque égales ; un stigmate trifide. Les fleurs sont le plus souvent solitaires dans une spathe bivalve. Linné n'en décrit qu'un petit nombre d'espèces qui lui semblent essentiellement caractérisées par une corolle en forme de roue. Ce fut par allusion à la roue d'Ixion qu'il nomma le genre *Ixie* ; mais dans toutes les autres espèces la corolle , au lieu d'être rotacée, est pourvue d'un tube long et gièle. Dans une dissertation spéciale intitulée : *Spécimen Botanicum inaugurale* , ele , Leyde , 1766, Daniel de la Roche soumit à un nouvel exameu le genre *Ixia*, et en fit connaître quatorze espèces.

En 1783, Rung de Stockholm publia, sous la présidence de Thun— berg, une disseitalion botanique sur les *Ixia* , dont il porta le nombre à vingt-quatre. Depuis ce temps, les divers auteurs ont donné les descriptions d'une si grande quantité de Plantes de ce genre, que le nombre s'en élève aujourd'hui à plus de cent.

Une masse aussi considérable d'espèces doit offrir beaucoup de variations dans les diverses parties. Quelquesunes de ces variations ont paru assez importantes à certains auteurs pour constituer aux dépens des *Ixia* , plusieurs genres dont la validité n'a pas encore été universellement reconnue. Ainsi Ker [*Anu-o/Eotan.* 1, p. 225) a proposé les genres *Geissorr/iiza*, *Hesperant/ta* et *Sparaxis*; Gawler a établi {in *Ann. of Bolan. et Curt. Bot.*31ag.)\e-, genres *Trilonia*, *Tr/c/ionema*, et adopté le *Lapeyrousia* formé autrefois par l'abbé Pourret (in *A et. Tolos.*, 3, p. 79). Moenck avait également constitué un genre *Beterneada*, nom qui a été donné par Persoon à une section du grand genre

I.via. Le genre *Romulea* de Séhastiani {*Flor. Romana*) est formé sur l'*I. Bulbocodium*. Nous renvoyons à chacun des mots précités pour apprécier la valeur des innovations proposées par ces

auteurs ; nous n'avons en vue, pour le moment, que la connaissance du genre *Ixia* , tel qu'on le conçoit généralement et sans avoir égard aux subtiles différences qu'on a cru observer dans les organes de la fructification de ses diverses espèces.

Néanmoins, il est juste de dire que le genre *Ixia* se lie, par des transitions insensibles, avec d'autres genres voisins, et que les caractères exposés plus haut n'établissent pas une distinction tranchée entre *Ixia* et le *Gladiolus* , le *Tritaria* , le *Galantha*, le *Juncus*, *Yucca*, etc.

Toutes les *Ixies* sont indigènes du cap de Bonne-Espérance, à l'exception de quelques espèces (*Ixia Bulbocodium* , par exemple) qui s'avancent jusqu'au nord de l'Afrique et dans l'Europe méridionale. Elles ont des racines:le plus souvent bulbueuses, tuniquees et réticulées par les impressions qu'ont laissées les feuilles des années précédentes. Leurs feuilles sont engainantes, entières, le plus souvent glabres et plus ou moins courtes que la hampe des fleurs , laquelle est simple ou à plusieurs épis. Les fleurs ne sont jamais pédonculées , car celles qui le semblent sont terminales au sommet des rameaux uniflores de la hampe. La plupart des *Ixies* fleurissent dès les premiers jours du printemps , au cap de Bonne-Espérance leur patrie; peu d'entre elles s'y développent en hiver ou se continuent pendant la saison chaude. Celles qui se plaisent dans les localités basses , arénacées et humides , sont plus précoces ; sur les montagnes, au contraire , elles sont plus tardives.

On ne retire aucune utilité de ces Plantes , mais la beauté de leurs fleurs les fait cultiver avec soin dans les jardins des amateurs. Elles demandent à être garanties du froid, parce que la plupart d'entre elles entrent

en végétation pendant l'hiver. On doit aussi , pour cette raison, les placer près des jours sur les tablettes des serres de l'orangerie , afin qu'elles ne s'étiolent pas ou que la trop grande humidité ne leur soit pas trop préjudiciable. Les arrosements doivent être toujours modérés et proportionnés à la température de la serre. La terre qui leur convient le mieux, est un mélange de bonne terre franche avec du terreau végétal. On les multiplie par les cayeux , dont leurs bulbes sont assez abondamment pourvus et qu'on enlève lorsque les feuilles et les tiges sont mortes. On met les plus forts séparément dans de petits pots jusqu'au mois d'octobre, époque à laquelle on les place dans la serre d'orangerie , ou , ce qui serait mieux , dans un bon châssis que l'on préservait de la gelée. Ne pouvant , dans le grand nombre des Ixies du Cap , faire un choix des espèces les plus remarquables par leur beauté, nous nous bornerons à citer celle qui croît dans les parties chaudes de l'Europe, et qui par conséquent (nérite davantage de fixer notre attention.

L'Ixte Buluocodb , *Ixia Bulbocodium*, L , Redouté, Liliac, 2, lab. 88.

Elle se distingue de toutes ses congénères par sa hampe simple unillore et plus courte que les feuilles, par les deux bractées vertes qui accompagnent sa fleur, et par son stigmate dont chaque division est profondément bifurquée. On en connaît deux variétés , une à grande, et l'autre à petite fleur, que quelques auteurs considèrent comme deux espèces distinctes. Cette Plante, dont le bulbe est d'un goût agréable, croît dans les terrains sablonneux de tout le bas de la Méditerranée. Les botanistes qui

ont herborisé dans le bassin des Landes aquitaniques , l'y ont retrouvée depuis Bordeaux jusqu'à Bayonne.

Bory de Saint-Vincent l'a observée en beaucoup de parties du versant.

Lusitanique d'Espagne, et particulièrement aux environs de la Corogne Galice. (g.n.)

4a IXO

IXODE. Ixodes. ahactin. Genre de l'ordre des Trachéennes, famille des Tiques (Latr. , Fam. Natur. du Règn. Anim.), établi par Latreille qui le rangeait (Règn. Anim.) dans la famille des Holélres, tribu des Acarides, division des Tiques, avec ces caractères : corps aptère sans distinction d'anneaux , et n'ayant qu'une petite plaque écailleuse , occupant son extrémité antérieure; huit pattes simplement ambulatoires; palpes engainant le suçoir et formant avec lui un bec avancé , court, tronqué et un peu dilaté au bout. Ce genre était confondu dans le grand genre Mite ou Acarus de Linné et des anciens auteurs. Latreille a été obligé de subdiviser le genre Acarus en plusieurs autres basés sur l'organisation des parties de la bouche.

Hermann , dans ses Mémoires aptérologiques , avait bien senti la nécessité de diviser le genre Acarus , et il fit, avec ceux que Latreille nomme Ixodes , son genre Cynorhœstes ; d'anciens naturalistes les désignèrent en latin sous le nom de Ricinus que De-géer avait affecté déjà à un genre forme avec des Poux qui vivent sur les Oiseaux.

Le corps des Ixodes est presque orbiculaire ou ovale , très-plat quand l'Insecte est à jeun , mais d'une grosseur démesurée quand

il s'est repu.

Leur bec est obtus en devant ; il consiste en un support formé d'une petite pièce écailleuse, servant de boîte à la base du suçoir et reçue dans une échancrure pratiquée au-devant du corselet ; en une gaine de deux pièces fort courtes , écailleuses , concaves au côté interne, arrondies, et même un peu plus larges à leur extrémité; chacune de ces pièces, vue à la loupe, paraît coupée transversalement, et il est facile de voir que ce sont deux palpes qui se sont allongés et qui ont été transformés en gaine.

Enhn , la bouche présente entre ces deux palpes ou pièces de la gaine, le suçoir qui est composé de trois lames cornées, très-dures , coniques , dont les deux latérales sont plus pe-

tiles, et en recouvrement sur la troisième qui est grande , large , moins colorée, un peu transparente, obtuse au bout, mais remarquable en ce qu'elle porte un grand nombre de dents en scie et très-fortes. C'est au moyen de ces dents que l'Insecte s'attache fortement à la peau des Animaux qu'il suce ; cette lame a un sillon dans son milieu , et ses côtés ainsi que toute sa surface inférieure sont armés de dents. De chaque côté du bec sont placées les pâtes à peu près à égales distances les unes des autres; elles augmentent insensiblement de grandeur à partir des premières ou antérieures. Ces pâtes sont composées de six articles , dont les deux derniers forment un tarse conique qui est terminé par une pelote et garni de deux crochets au bout; cette partie est d'un grand secours à ces Insectes pour se fixer sur les Animaux qui se trouvent à sa portée. Le dessous de l'abdomen présente un petit espace circulaire et écailleux qui paraîtrait indiquer les organes de la généra-, lion.

Les Ixodes ne marchent pas vite, leur démarche est leute et pesante , mais ils ont une grande facilité à s'attacher, avec leurs pales, aux objets qu'ils rencontrent, même au verre le plus poli ; quand ils sont posés sur des Végétaux, ils se tiennent dans une position verticale , accrochés simplement avec deux de leurs pales et tenant les autres étendues.

Un Animal quelconque vient-il à s'arrêter dans leur voisinage, ils s'y accrochent avec les pâtes qui restent libres , et quittent facilement la branche où ils n'étaient fixés que par deux de leurs pâtes. Latrille a observé que les Ixodes d'Europe habitent de prédilection les Genêts , mais on en trouve aussi sur d'autres Plantes. En Amérique, ces Arachnides attaquent l'Homme : elles se trouvent dans les bois en quantités innombrables , et se tiennent sur les Plantes , les buissons, et surtout sur les feuilles sèches dont le sol est couvert. Si l'ou

s'arrête un instant dans ces endroits, et qu'on s'asseye sur des feuilles , on en est bientôt couvert , et elles cherchent aussitôt à fixer leur suçoir dans le corps pour pomper le sang

Les Ixodes sont connues en France sous le nom de Tiques; celle qui tourmente les Chiens de chasse est désignée par les pe^ueurs sous le nom de Loupette ou lique des Chiens.

Une autre nuit beaucoup aux Boeufs et aux Moulons , si on la laisse multiplier; c'est le Reduvius de quelques auteurs. Elles pullulent tellement sur les Boeufs , que Latrille a vu un de ces Animaux longé par elles au point qu'il en succombait presque, tant il était maigre et affaibli. Aussi les bergers doivent-ils visiter avec soin leurs bestiaux , afin de les débarrasser de ces Arachnides ,

s'ils ne veulent pas les voir se multipliera l'infini et nuire à la santé de leurs troupeaux.

Degér a trouvé sous le ventre de l'Ixode Réduve, un autre individu de la même espèce, mais tout noir et beaucoup plus petit, n'ayant que la grandeur d'une graine de Navet; il embrassait le ventre de ces Ixodes avec ses pales et se tenait là renversé, dans un parfait repos .entre les pâtes postérieures et jamais ni plus haut ni plus bas. Sa tête se trouvait placée vis-à-vis l'endroit du ventre où se trouvent les organes de la génération dans les femelles. Cet auteur a vu ce petit individu y enfoncer sa trompe, et il est presumable que c'est le mâle qui était accouplé avec ses femelles. Les Ixodes pondent une

Erodigieuse quantité d'œufs, et Charier prétend qu'ils iortent par la bouche. Les Ixodes ont la vie trèsdure, et elles donnent même dps signes d'existence long-temps après qu[on leur a retranche des parties qui semblent être essentielles à la .vie. Les moyens que l'on peut employer pour détruire ces Arachnides sont à peu près les mêmes que ceux dont on se sert pour détruire les Toux, mais les préparations mercurielles sont les plus efficaces.

Les principales espèces de ce genre sont :

LTxode Ricin, Ixodes Rici/u/s, Latr. ; Acarus Rici/ius, L., Fabr. ; la Tique des Chiens, Geoff. ; Mite Réduve, Degéer (Mém. T. vu, p.

101, pl. 6, fig. î, 2); Hermaun (Mém.

Apt. T. v, lab. 19). D'un rouge de sang foncé, avec la plaque écailleuse plus foncée ; côtés du corps rebordés, un peu poilus ;

palpes engainant' peu le suçoir.

Cette espèce se trouve dans toute l'Europe, dans les bois. Elle s'attache aux Chiens.

L'Ixode réticulé , *Ixodes ricinus*, Latr.; *Acarus Reduvius* , Schranck ; *Acarus reticulatus*, Fabr., Römer, Hermann. C'est cette espèce qui s'attache aux bœufs, aux Moutons et autres Animaux domestiques.

L'Ixode Nigua , *Ixodes Xigua*, *Acarus Higua* , Deg. ; *Acarus Americanus* , L. Long d'environ trois lignes et demie, ovale, aplati, rouge, avec une tache blanche sur le dos, et les jointures des paies blanches.

Cette espèce se trouve dans l'Amérique septentrionale. Kalm dit avoir vu un Cheval dont le dessous du ventre et d'autres parties du corps étaient si couverts de ces Animaux , qu'il en succomba et mourut dans de grandes douleurs, k. pour les autres espèces, Fabricius , Hermann fils et Leach. (g.)

IXODIE. *Ixodia*. bot. pu an. Genre de la famille des Synanthérées , Corymbifères de Jussieu, et de la Syngénésie égale, L., établi par Rob.

brown (in Florul. Ketc., édit. a, vol. 4, p. 517), et qui présente les caractères suivans : involucre campanulé, formé d'écaillés imbriquées appliquées , oblongues , les extérieures arrondies au sommet, et munies sur la face externe d'une bosse charnue, les intérieures surmontées d'un grand appendice étalé pétaloïde et hygrométrique ; réceptacle légèrement conique, garni de paillettes analogues aux écailles intérieures de l'involucre ; calathide sans rayons , composée de

fleurons égaux , nombreux , réguliers et hermaphrodites: akènes dépourvus d'aigrettes , oblongs et hérissés de papilles. Ce genre est placé , dans VHorh Kewensis, entre le Coesidia et le Santolika , qui appartiennent l'un à la tribu des Héhanlhées , et l'autre à celle des Anthémidées de Cassini. Cet auteur pense qu'il en doit être éloigné et Tangé parmi les Iiulées-Gnaphaliées , près des genres Cassinia et Lepisciine.

h'Ixodia achilleoides , R. Brow n , loc. cit. , et Sims, Bot. Mag., vol. 67, n. i534, est l'unique espèce connue.

C'est un Arbuste indigène de la côte australe¹ de la Nouvelle-Hollande , et cultivé maintenant dans plusieurs jardins d'Europe. Il est très-rameux, entièrement glabre , et toutes ses parties vertes sont enduites d'un vernis gluant; ses branches anguleuses sont garnies de feuilles alternes épaisses, sessiles et décurrentes. Les fleurs sont disposées en corymbes au sommet des rameaux ; leurs corolles ont le tube verdâtre , le limbe rougeâtre intérieurement , et jaunâtre supérieurement.

Le nom à'Ixodia avait été donné par Solander à un genre nommé Hydropeltis par Michaux. F. ce mot.

IXORE. Ixora. bot. phan. Genre de la famille des Rubiacées et de la TélrandrieMonogynie, établi par Linné et ainsi caractérisé : calice quadrifide très-petit ; corolle munie d'un tube long et grêle, et d'un limbe à quatre divisions obtuses; anthères presque sessiles , saillantes hors du tube; stigmate épais légèrement bifide ; baie biloculaire renfermant une seule graine dans¹ chaque loge.

Ce genre est tellement voisin du Pa[^]~ vella , que Lamavck les a réunis en un seul , '■ ainsi que le Chomelia de' Jacquin. Jttssieu (Mém. sur la Fam.

des Rubiacées , p- 9) pense qu'on doit également placer dans les *Ixora* , le *Lonicera corymbosa* de Linné , dont l'Héritier avait fait une espèce de *JLoranlhus*. Si l'on n'admet pas la fusion proposée par Lamaick , du

IZQ

Pavetta dans *Y Ixora* , ce dernier gen-< re sera encore composé d'une dizaine d'espèces qui sont des Arbrisseaux indigènes des Indes-Orientales et de l'Amérique équinoxiale. La plupart sont des Plantes d'ornement , remarquables par leurs Heurs nombreuses et ornées des couleurs les plus vives. Parmi ces espèces , il en est i\ne assez intéressante pour mériter d'être mentionnée avec quelques détails.

L'*Ixobe ecaulate*, *Ixora coccinea*, L.; Schetti, Rhéede (Huit. Malab. 2, t. ;13), est un bel Arbrisseau dont la tige atteint un mètre et demi de hauteur; elle se divise en plusieurs rameaux qui dans leur jeunesse sont légèrement comprimés vers le sommet. Ses feuilles sont opposées, à peine pétiolées, ovales; cordilormes, pointues, aiguës etenlières. Les'fleurs, d'un rouge écat late très-éclatant, forment une sorte d'ombelle presque f.essile et terminale. La côte du M.dabar est la patrie de cet Arbuste. L'éiégancede ses fleurs le lait rechercher dans la foule des Végétaux qui ornent cette contrée; les habitants du pays en décorent les temples de leur divinité. C'est le nom de celle-ci (*Ixora*) que Linné a transporté dans la botanique , eu l'appliquant au genre qui nous occupe. L'*Ixore écarlate* est cultivé dans les serres chaudes des jardins d'Europe, ou il exige une grande chaleur , beaucoup d'humidité et de l'ombre. On le multiplie par marcottes et boutures que l'on fait au printemps sur couches et sous châssis, mais qui ne réussissent pas toujours. (g..n.)

IZQUIERDLA. bot. fhan. Ruiz et Pavon (System. F/or. Feruvian:

1 , p. 278) ont donné ce nom à un genre de la Tétrandrie Monogynie , L., auquel ils ont assigné les caractères suivans : fleurs hermaphrodites ou dioïques par avortement ; calice monophylle quadriidenté ; corolle à quatre pétales ; quatre élamines ; ovaire surmonté d'un stigmate ses sile. Le fruit non parvenu à l'état de

JAB

maturité, est uuc drupe trionosperme.

Jj'Izqu/erdia aggregata , unique espèce fie ce genre peu déterminé, est un Arbre haut d'environ dix mètres

JAB 45

et qui croît dans les grandes forêts du Pérou. Ses feuilles sont ovales, acuminées, et ses pédoncules agrégés , uni flores. (g.n.)

JAAJA. bot. phan. Les botanistes voyageurs doivent observer l'Arbre qui couvre, à Siei ra-Léone, de grands espaces du rivage, et qui paraît appartenir au genre R/iizophora. Est-il de la même espèce que celui des Antilles? Ce point a besoin d'être éclairci. u ' (n.)

JAATZADE. bot. phan. Selon Kœmpfei' , c'est le nom dé pays de VArcàia japonica , ihuïib. , aussi nommé Jaats-Ta. fB.)

* JAUËBIRETTE ou JABÉBI- NETÏE. pois. L'espèce de Raie à laquelle on donne ce nom au Brésil , n'est pas encore bien déterminée, mais îje salu ait être la Raie bouclée, comme on l'a cru. (b.)

JABET. aiolxi. Adanson' (Coquillngés du Sénégal, pl. i8, fig. 8) appelle ainsi une petite espèce d'Arche que Linné a désignée sous le nom <X A rca af ta , et que Lamarck n'a pas rapportée parmi les espèces qu'il a décrites. (o..h.)

JABIK.. moll. Linné a rapporté, à son Murex (iyrinus, avec quelque doute, la Coquille ainsi nommée par Adanson. Le Murex Gyrinus, qui est une Rancelle de Lamarck, a été désigné par ce de-ruier auteur sous le nom de Raelle granilère.

De-, cliangemens dans la synon , mie ont été nécessaires, et Lamarck en a rejeté les ligures qui, comme celles d'Adansou, laissent du doute. Le Jabik se trouve dans le même cas que beaucoup de Coquilles, d' Adanson , qu'il est difficile de rapporter aux espèces que nous connaissons. (d..ij.)

JABIRU. Mjc/eria. ois. Espèce du genre Cigogne dont plusieurs auteurs ont fait le type d'un genre particulier qui offrirait cinq ou six espèces. V.

Cigogne. (db..z.)

JABORANDI. bot. phan. (Marcgraaff.) Nom de pays du Piper ailunclim , L. (b.)

JABOROSE Jaborosa. bot. phan.

Genre de la famille des Solanées et de la l'entandrie Monogynie , L. , établi par Lamarck (Encycl. Méth. / qui l'a ainsi caractérisé : calice court à cinq découpures ; corolle tubuleuse, c impa-nulée , le limbe à cinq lobes aigus; cinq étamincs attachées au sommet du lulie, à anthères courtes ; ovaire supérieur; si} le simple; stigmate capité; fruit inconnu. Le nom donné à ce genre est tiré d'un mot arabe qui désigne la Mandragore dont le Jalwro-

sa est voisin et parle port et par les caractères. Les deux espèces qui le constituent sont : *ift le Jaborosa i/t/egri/'u/ia*, Lamk., Encycl.

Méth; et l'ustr. Sem , tab. n4 ; a° et \e-Jaburvsu rujicinata , Lamk., Encycl Elles ont été découvertes aux environs de Buenos-Ayres et de Montevideo par Coininerson. Ces Hantes 'ont pourvues de tiges herbacées, de feuilles toutes radicales et de hampes uillores. (g..N.)

JABOT. Ingluvies- ois. Plusieurs Oiseaux granivores, mais plus spécialement, les Gallinacés , sont munis de deux estomacs , le Jabot et le Gésier. Le premier est composé de deux portions : l'une mince, membraneuse, très-dilatable, ou les ali-

46 JAC

mens sont simplement déposés , et qui est si visible dans les Poules et les Pigeons; l'autre à parois musculeuses , garnies intérieurement d'une membrane muqueuse , et ou commence la digestion, jr. Intestins.

JABOTAP1TA. bot. fian. (Plumier.) Syn. d'Ochna. y. ce mot. (b.)

* JABOTI. b.ept. ciiÉij. (Marcgraaff.)Syn. de Testudo tubulata, Sch.

V. Tortue. (b

JABOTIÈRE. ois. Syn. vulgaire de Cygne de Guinée. V. Canard.

(dr..z.)

* JABUTICABA. bot. phan.

L'Arbre brésilien mentionné sous ce nom par Pison a été regardé comme appartenant au genre *Cynomèle*. (b.)

JAC, JACA et JACK A. bot.

Tian. D'où Jaquier. Noms de pays de V *Artocarpus integrifolia*, L. p~.

Jaquier, (b.)

* JACAMAICI. ois. Espèce du genre *Jacamar*. V. ce mot. (b.)

* JACAMACIRI. ois. Syn. de Venetou. y. *Jacamar*. (b.)

JACAMAR. *Galbula*. ois. Genre de la seconde famille de l'ordre des *Zygodactyles*. Caractères : bec long , droit ou légèrement incliné vers la pointe , grêle , quadrangulaire , non échancré; uarines placées de chaque côté du bec et à sa base, ovalaives, couveïies dans leur moitié postérieure par une membrane nue; pieds très-courts; trois ou quatre doigts; toujours deux en avant, réunis jusqu'à la troisième articulation ; ailes médiocres , les trois premières rémiges étagées, moins longues que les quatrième et cinquième ; douze rectrices , les deux latérales plus courtes.

L'histoire des *Jacamars* est encore peu connue , et leur synonymie offre beaucoup d'obscurité; il serait à désirer qu'un naturaliste -voyageur songeât à s'occuper d'une monographie de ce genre qui paraît d'autant plus facile à entreprendre que le

JAC

nombre des espèces sur lesquelles elle s'étendrait est peu considérable et que toutes habitent des contrées rapprochées dont elles ne franchissent point les limites. Un semblable travail dissiperait beaucoup d'incertitudes relativement aux mues périodiques auxquelles ces Oiseaux doivent être assujettis, si l'on en juge d'après les différences que l'on observe sur des individus de même espèce et de même sexe rapportés à des époques différentes de leur patrie 13 .1 taie. Tout ce que l'on sait des mœurs et des habitudes de, Jacamars se réduit à quelques notions générales assez vagues. Ces Oiseaux se tiennent, à ce que l'on assure, dans les retraites les plus sombres des forêts, où l'épaisse feuillée les déroberait aux regards et aux recherches des chasseurs; leur vie solitaire leur permet à peine de souffrir la société d'une compagne ; perchés sur une branche, ils y demeureraient immobiles pendant des journées entières , si le besoin de pourvoir à leur subsistance ne les forçait à s'élancer de temps à autre sur les petites proies qui voltigent autour d'eux. Leur vol est assez rapide, mais peu élevé , très-intermittent et comme par secousses , ce

qui les fait alternativement monter et descendre , toujours dans une seule direction. Quatre œufs verdâtres , largement tachetés de brun , trouvés dans un nid étranger où couvait une femelle de Jacamar vert , feraient croire que cette espèce , semblable à notre Coucou d'Europe et à plusieurs autres Oiseaux , ne se donne pas la peine de construire un nid particulier, mais qu'au moment du pont elle s'empare de l'un de ceux qu'elle trouve sur son passage, y dépose le fruit de ses amours , qu'elle ne quitte plus jusqu'à ce que la jeune famille soit éclos et parvenue au point de pouvoir se passer des soins maternels.

Du reste on ne pourrait encore assurer que cette observation qui n'a peut-être pas été renouvelée, soit applicable aux autres espèces. Le chant de ces Oiseaux est extrêmement borné , c'est

JAC

(ont au plus un petit sifflement cadencé qui ne se fait entendre que dans la saison des amours. Les Jacamars sont des Oiseaux propres à l'Amérique méridionale; ils y habitent les régions voisines de l'équateur vers le tropique. Ce genre se sous-divise en deux sections , division basée sur le nombre des doigts.

f Quatre doigts , deux devant et deux un arrière.

Jacamak Jacamaici , *Galbula grandis*, La th. , Ois. dor., pl. 6; *Alcedo grandis* ,|L. Parties supérieures d'un vert doré, cuivreux; premières rémiges brunes; lectrices caudales supérieures vertes, les inférieures cendrées, irisées en violet; plumes de la base des mandibules d'un rouge cuivreux ; menton blanc ; gorge et parties inférieures rouges ; bec et pieds noirs. Taille, dix pouces.

Jacamar a longue queue, *Galbula paradisea*, Lalh. , Bufl". , pl. enl.

27 1 ; *Alcedo paradisea*, L. Parties supérieures d'un brun noirâtre irisé; sommet de la tête brun ; menton , côtés du cou, poitrine et parties inférieures noirâtres; gorge et taches de chaque côté du l'abdomen blanches ; rémiges et rectrices d'un noir-violet irisé; celles-ci étagées avec les deux intermédiaires très-longues; bec et pieds noirs. Taille , onze pouces. La femelle a les couleurs ternes et sans reflets; les lectrices intermédiaire* sont aussi beaucoup plus courtes que celles du mâle.

Jacamar. Venetou , *Galbula albirostris*, Lalh. ; *Galbula Jlavirostris* , Vieil L P ai lles .supérieures d'un vert doré cuivreux , irès-brillant; fiont et région oculaire d'un brun noirâtre irisé ; grandes rémiges brunes avec la base des baibes internes fauve; lectrices élagées, les deux intermédiaires d'un vert doré, toutes les autres rousses; menton blanchâtre; gorge roussâtre; poitrine d'un vert cuivreux; parties inférieures d'uu roux vif; bec jaunâtre à la base, noir vers l'extrémité. Taille, huit pouces. La

JAC 47

femelle a toutes les teintes plus sombres.

Jacamar a ventre blanc , *Galbula leucogastra* , Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; côtés de la tête d'un vert sombre , bleuâtre; rémiges et rectrices vertes , dorées, bordées de bleu irisé; gorge et ventre blancs; le reste des parties inférieures d'un vert doré; bec et pieds noirs. Taille, huit pouces.

Jacamar vert, *Galbula viridis* , Lath.,Bu(F.,pl. enl. 258; Alcedo*Galbula* , L. Parties supérieures d'un vert doré brillant ; front et région oculaire d'un brun noirâtre, irisé; sommet de la tête , bord des rémiges et des rectrices d'un vert bleuâtre foncé; premières rémiges noirâtres; menton cendré; gorge blanche ; poitrine d'un vert doré cuivreux; parties inférieures rousses. Taille, huit pouces. Cette espèce varie dans la couleur de la gorge qui est quelque fois semblable à celle du ventre.

f-j- Trois doigts, deux en avant, un seul en arrière.

Jacamar tridactyle, *Galbula tridactyla* , Vieill. Parties supérieure; d'un brun noirâtre, irisé en vert; sommet de la tête et base du bec noirâtres avec le bord des plumes qui sont assez longues ,

d'uu roux cendré ; gra«des rémiges et rectrices brunes , bordées extérieurement de vertdoré ; moyennes rémiges brunes, lisérées de fauve ; côtés du cou d'un brun cendré; menton fauve; gorge gloire; milieu de la poitrine et du ventre d'uu blanc roussâtre; flancs et tectrices caudales inférieures noirâtres, frangées de roussâtre; bec et pieds noirâtres. Taille , sept pouces.

(DR..Z

t J ACAMARALCfON. ois. (Levaillant.) Syu. de Jacamar tri-dactyle. V.

ce mot. ' (b.)

JACAMEROPS. ois. Nom que plusieurs auteurs ont appliqué à une division du genre Jacamar.

JACANA. Varia, ois. Genre de l'ordre des Grallcs. Caractères : bec

AG

d'une longueur médiocre, ne dépassant pas celle de la lête , droit , grêle, comprimé légèrement , i enflé vers la pointe , déprimé à sa base , qui se dilate sur le iront en plaque ou se relève en crête; mandibules d'inégale longueur, l'inférieure un peu courte et formant avec ses bases un triangle un peu plus ouvert ; narines placées sur les côtés et vers le milieu du bec> ovales, ouvertes , percées d'outre en outre; pieds très-longs , grêles , avec la majeure partie de la jambe nue; quatre doigts très -longs et trèsminces , entièrement divisés , munis d'ongles droits et fort acérés ; le

pouce portant à terre sur plusieurs articulations, un peu moins long que l'ongle qui le termine ; ailes années d'un éperon corné et très-pointu ; première rémige presque égale aux se* coude et troisième qui sont les plus longues.

Le nom imposé à ce genre est celui que l'espèce principale, qui fut long-temps la seule connue des ornithologistes , porte au Brésil; on eût pu le changer depuis que l'on a trouvé des Jacanas dans toutes les contrées chaudes et humides des deux continents ; mais comme à ce nom ne se rattachait aucune application particulière , rien ne s'opposait à ce qu'on t'eût conservé. Il n'en était pas de même avec celui de Chirurgien , que les pointes acérées dont les ongles et les poignets de ces Oiseaux sont munis leuravaient, comparativement avec des lancettes , fait appliquer vulgairement. t

Les Jacanas, au moyen des- longs doigts qui tei minent leurs jambes élevées et grêles , se soutiennent aisément sur les Plantes aquatiques dont les feuilles s'étendent a la surface des eaux dormantes; ils courent avec une extrême légèreté d'une feuille à l'autre pour saisir les petits Insectes qu'ils savent apercevoir de très-loin.

Cette agilité, jointe à beaucoup de défiance naturelle , rend très-rare l'approche et la surprise des Jacanas.

Ces Oiseaux, quoiqu'armés de manière à devenir redoutables, soit dans

JAC

l'attaque , soit dans la défense, ont cependant l'humeur très-pacifique; tous les observateurs qui sont parvenus à les appro-

cher et à les étudier dans l'état de liberté s'accordent à dire qu'ils n'ont trouvé les Jacanas aucunement querelleurs et médians j ils les ont vus , au contraire, Irès-familiers entre eux et se prodiguant entie époux, qui semblent être réciproquement fort attachés , "les témoignages d'une vive affection. Lorsque, pressé d'échapper à quelque danger , l'un des deux a dû fuir d'un vol précipité , on l'entend , après avoir donné en partant le signal d'alarme par un cri bref et aigu , rappeler bientôt l'objet de sa tendresse par un sifflement plaintif. Tout porte à croire que chez ces Oiseaux les unions sont durables. Us établissent leurs nids au sein des Herbes les plus' élevées, dans le voisinage des marais dont ils s'éloignent rarement; il arrive même quelquefois que ces uids, composés de Joncs et de brins d'Herbes entrelacés ,sont portés par ces larges feuilles que l'on voit surnager en tous lieux où se trouvent de grandes mares. La ponte est de quatre à cinq œufs verdâtres , tiquetés de brun foncé. Les Jacanas onl le vol rapide, mais peu élevé ; très-silencieux pendant le jour, ils font , la nuit , retentir les airs de cris de rappel qui s'entendent de très-loin et portent partout des impressions désagréables.

Jacana Aguapeazo, Parra ChiLensis , Var. , Lath. V. Aouapeca-
ca de ce Dictionnaire. Parties supérieures d'un rouge de carmin;
front, tête, cou, poitrine, abdomen et grandes tectrices alaires
d'un noir pur ; flancs, croupion, tectrices caudales etrectrices
d'un rouge vif; îémiges nuancées de jauneetde vert , terminées de
noir; petites tectrices alaires noirâtres , terminées de blanc; tec-
trices alaires inférieures roussâtres ; barbes des plumes générale-
ment désunies ; bec jaune, couvert sur la moitié de sa longueur
par une membrane rouge qui s'étend jusqu'à l'angle de l'œil, puis
remonte sur la tête où elle forme

JAC

deux lobes iftVondtf , non adhcren- ; celte membrane descend ensuite circulai* cmi-nt sous le bec; pieds «l'un gris de plomb; OOglel IleXibbs r;r <;!;<»-

tiques, noirâtre*. Taille, dix pouces.

' .Son ni ni piéteud que cette cs| «éce est identique avec le Jacana l'Intel De l'Améi i(|iic im'i idionalc.

.1 m:\na Bnoszt, Parratenea ,Cuv.

L'ai lies supérieures '1 un v<;rl bronzé, avec Ici teeti ires alaires vertes; croupion , teelrkef caudales et icctricc»

d'un roux sanguin; corps noir, insé

«lit lu un ql • i • ' viole! ; une tache hwn-

i lu: (lin ici c I œil. Du Biésil. Kspécc

douteuse.

Jacana cannki.i.k, ParraÀj'ricana, OmeJ., Lnth. Parties su périetueed'iin brun roux; dciriérc du cu.ii , nuque cl rémiges il un noir pur) sourcils biitacs , gai ge Manche ; poUrtne jau-

uue , tachetée et rayée di! noir comme MU cotés, du cou; pailic> uil'ci icures d'un brun foncé; bec noirâtre avec la pointe cendrée; plaque Cronlale bleue, ipii devient noirâtre api es la imoi t; pieds d'uu noir verdâlie; épine numérale petite et noire. T'aille, neuf ■pouces. I)' Afrique.

Jac\na commun, Paria Jacana, L., Bull'. , pl. enl. 3-21. Partie» supérieures d'uu brun marron , les inférieures d'une teinte plu-

obscur*; tête, gorge, cou et poitrine d'un noir irisé; rémiges d'un vert jaunâtre, bordées de noirâtre ; bec jaune ; 'membrane frontale non adhérente, jaune et divisée en trois lobes; deux hululions charnus descendant de chaque côté de la mandibule supérieure, d'un jaune rugeâtre ; pieds d'un gris verdâtre ; épine humérale grande, conique et blanchâtre. Taille, dix pouces. Les jeunes (Bull., pl.

enl. A if)) ont , eu général, «lu blanc à la tête et aux parties inférieure»; les teintes de noir, de brun marron et de verlsont moins loin ces ; ils sont aussi d une taille un peu moindre.

Jacana C'oudi'y , Parra indlaa , Lalh. l'ai tics supérieures d'un brun cendré, les inférieures ainsi que ta tête et le cou d'un noir bleuâtre ; lémiges d'un violet noirâtre ; sourcils

TOMK IX

JAC 40

blancs; Itec jaune avec la baie de la mandibule supérieure d'un bleu uoirâlic; une la<;he muge à l'angle des mandibules; pied-biunâtres.

Taille, neuf lignes. Du Bengale.

til(ANI) Jacana vkht a ciiétb , l'aria crislala, Vieill. Parties supérieures d'un vert bronzé; tête, cou, haut du dos, poitrine et ventre d'un vert sombre; un large -ouicil blanc; grandes tectrice:» alaires cl lémigea d'un vert noiîâtre; croupion , lianes, abdomen cl rectiices d on brun iougçâlîe; bec jaune; uuiubraie 1 1 o»— taie relevée en crêle charnue, lisse, d'un lougc cramoisi ; pieds et doigts verts ; ongles bruns. Taille , dix pouces. De Ceylen,

Iaoas'a ji vt ssr coi. ijouk, Paria ciimaniomca , Cuv. Parties supérieures d'un bi un marron , le» inférieures d'un brun foncé ; tête noire; bas du cou blanc ; poitrine loussâlie; bec jaunâtre , avec la membrane frontale' d'uu gris bleuâtre; pieds verdâtres.

Taille , on/.e a douze pouces. Du Sénégal.

Jacana a i.omu i; orj'.t k, Pana Sinemia , Luth. Parties supérieures d'un brun rougeâtre , les inférieures d'un brun pourpre foncé; tête, gorge cl devant du cou blancs, encadrés de noir; occiput noir; derrière du cou d'un jaune doilé brillant ; tectrices alaires blanches; grandes rémiges noues, les moyennes blanches, bordées de noirâtre , les suivantes entièrement blanches, enfin les plus rapprochées du corps d'un brunmarron , quelques-unes d'elles terminées par un appendice pédicule, formant une petite rame allongée; lectrices noires, les quatie intermédiaire» dépassant de beaucoup les auties par une courbure élégante; DM bleuâtre; point de plaque fronl.dc; pieds verts; épine numérale moyenne et de couleur de corne.

'J'aille , dix -huit à vingt pouces. Les jeunes ont le sommet de la tête d'uu In un foncé; un sourcil blanc , puis une ligne oui borde le cou et descend jusqu'à l'épaule; celte ligne est blanche, lisérée de brun, et dégénère;

•r'« JAC

en jaunâtre; les parties supérieures brunes ; la gorge et le ventre blancs; le milieu de la poitrine brunâtre , rayé de noir; les grandes rémiges noires, les autres blanches, les trois extérieures ont les appendices pédiculés ; le bec grisâtre; les pieds noirâtres. De l'archipel des Indes.

Jacana noir , Parra nigra , Lath; Parties supérieures noires; les inférieures et les tectrices alaires brunes; rémiges vertes , bordées de noirâtre ; rectrices noires ; bec jaune ; membrane frontale rouge ; pieds cendrés.

Taille, dix lignes. Du Brésil. Cette espèce, distinguée par plusieurs auteurs, paraît n'être qu'une variété du Jacana commun.

Jacana Peca , Pana Brasiliensis , Lath. Tout le plumage d'un vert obscur, avec les ailes brunes; l ectrices d'un noir verdâtre ; bec jaune; point de plaque frontale ; pieds d'un gris verdâtre ; épine humérale droite, très-pointue et jaune. Taille, onze pouces. De l'Amérique méridionale.

Jacana Thégel , Parra Chilensis , Lath. Parties supérieures d'un brun violet ; tête, gorge et portion de la poitrine noires; rémiges et rectrices d'un brun noirâtre; ventre blanc; bec très-long, noiiâtre ; plaque frontale épaisse, charnue , divisée en deux lobes rouges; pieds d'un noir verdâtre ; doigts médiocrement longs; épine humérale grande et jaune.

Taille , douze pouces. De l'Amérique méridionale. Il paraît que c'est cette espèce d'un naturel criard et querelleur qui a fait penser que toutes les autres partageaient les mêmes habitudes. Molina , qui a observé ces Oiseaux pendant son séjour au Chili, dit que jamais ils ne quittent les prairies voisines des savanes noyées , qu'ils y sont constamment appariés, qu'ils ne témoignent pas une grande défiance, si ce n'est lorsqu'on cherche à s'emparer de leurs nids; alors ils entrent en fureur, se jettent sur l'agresseur et défendent leur progéniture avec un courage extraordinaire. Leur ponte est de quatre œufs fauves, picotés de noir.

Jacana vert, Parra oirulis, Lath., Parties supérieures d'un vert noirâtre ; tête , gorge , cou , poitrine , rémiges et rectrices noirâtres, irisés en violet; base du bec rouge , l'extrémité jaune; plaque frontale ronde et bleue; pieds verdâtres; épine humérale petite et grise. Taille , douze pouces. (DR..Z.)

JACAPA. Ramphoceltis . ois. Espèce du genre Tan gara , dont Vieillot a l'ait le type d'un genre particulier. fF\

TaNGAHA. (DR..Z.)

JACAPANI. ois. Le Japacani de Marcgraaff espèce du genre Troupiale. V.. ce mot. (DR..Z.)

* JACAPAS. ois. Dénomination donnée par Desinarest à sa troisième division des Tangaras. (dr..z.)

* JACAPE. bot. phan. La Graminée du Brésil et de Saint-Domingue designée sous ce nom par Marcgraaff et par Nicolsou, n'est pas déterminée.

JACAPU. ois. (Marcgraaff.) Syn de Jacapa. V. ce mot. (b.)

JACAPUCAYA.BOT.niAN. (Marcgraaff.) Espèce brésilienne du genre L. cythis. (b.)

JAC ARA ou JACARE. beft. saur.

(Marcgraaff.) Nom de pays du Caïman à lunette. /"". Crocodile, (b.)

JACARANDA. Jacaranda. bot.

phan. Genre établi par Jussieu (Ge/i.

Plant.) dans la famille des Bignoniacées et qui offre pour caractères : un calice monosépale campanule , à cinq dents; une corolle monopétale, tubuleuse , infundibuliforme ou subcampanulée , ayant son limbe à cinq lobes inégaux, disposés en deux lèvres; quatre étamines inégales et didynames , avec le rudiment d'une cinquième avortée ; un style terminé par un stigmate formé de deux lamelles rapprochées. Le fruit est une capsule allongée, comprimée, ligneuse , à deux loges et à deux valves , portant chacune la moitié de la cloison sur le milieu de leur face interne. Les graines sont striées , bor-

JAC

dées d'une aile membraneuse. Ce genre a été formé aux dépens du genre Bignonia, dont il diffère surtout par le mode de déhiscence et la forme de sa capsule , qui est allongée, siliquiforme, avec la cloison opposée aux valves, tandis qu'elle leur est parallèle dans les véritables espèces de Bignonies. Au genre Jacaranda se rapportent les Bignonia cœrulea et B.

Jacaranda, L., ainsi que trois espèces nouvelles, croissant également en Amérique , savoir : Jacaranda acutifolia et J. obtusifolia de Kunth (in Humb. Nov. Gen. , 5 , p. 145) , et J. rumbifolia de Remy (/■/). Eschsch.) Ce sont toutes de grandes et belles Arbrées, ayant le port des Mimosa , des feuilles opposées, pinnées, et dont les fleurs , en général violettes , sont axillaires ou terminales, quelquefois disposées en panicules. (a.r.)

' JAC A 13 ATI A. bot. phan. Les tiges desséchées du Cactus brésilien désigné sous ce nom par Pison , servent de flambeau aux naturels pendant leurs voyages. L'espèce n'en est pas déterminée. (B.)

JACARD. mam. fBelon.) Syu. de 1 Chacal. V. Chien. • (b.)

* JACARE. rept. saur. Jacara. Le nom de Jacahe est aussi donné dans l'Inde au Gavial , sans qu'on sache de quel pays ce nom est origi- : naire , s'il est passé d'Asie en Amérique ou d'Amérique en Asie. (b.)

JACARINl. ois. Espèce du genre i Gros-Bec. P~. ce mot. (b.)

JACCHDS. mam ^".Ouistiti.

JACEE. Jacea. bot. phan. Tournefort fonda un genre Jacea qui fut adopté par Vaillant , mais que Linné réunit aux Centaurea. Jussieu, formant de nouvelles coupes dans ce dernier genre, rétablit le Jacea , mais il en élimina une espèce fort remarquable (J. pratensis) qu'il relégua : parmi les Rhaponlicum. Enfin plusieurs auteurs adoptèrent la séparation des Jacécs d'avec les Centaurées ; mais ces auteurs n'ont ni bien caractérisé ni bien composé les groupes

JAC 5i

qu'ils ont proposés. Du moins tel est le sentiment de Cassini qui fait remarquer que le caractère essentiel des Jacées réside dans la structure de l'appendice des folioles intermédiaires de l'involucre, lequel n'est point spinescent au sommet, ni décurrent sur le bord de la foliole- Il ajoute que le Jacea difflère du Cyanus par le style dont les branches stigmatiques sont plus ou moins soudées , tandis qu'elles sont complètement libres jusqu'à la base dans les Cyanus. Jje genre Jacea qui doit renfermer le Centaurea pratensis éloigné mal à propos par Jussieu et Mceuch, fait partie de la tribu des Centaurées de De Candolle et Cassini.. Il en a été fait mention à l'article Centaurée de ce Dictionnaire , où tous les

groupes formés aux dépens de ce genre vaste et très-naturel sont considérés comme de simples sections.

La Violette a quelquefois été nommée Jacée de printemps; le *Lychnis dioica*, Jacée des jardiniers, et le *Serratula tinctoria*, Jacée des bois.

JACINTHE. *J. yacanthus*. bot.

phan. Ce genre, de la famille des Liliacées ou Asphodélées, et de l'Italie, se compose d'un grand nombre d'espèces qui toutes sont des Plantes à racine bulbueuse, ayant toutes les feuilles radicales étroites, les fleurs disposées en épi à la partie supérieure de la hampe. Chaque fleur se compose d'un calice tubuleux, un peu renflé vers sa partie inférieure, ayant son limbe évasé, à six divisions recourbées et égales. Les étamines sont au nombre de six, incluses, attachées à la paroi interne du calice; leurs filets sont très-courts; les anthères introrse, allongées et à deux loges. L'ovaire est libre, sessile, ovoïde ou globuleux, à six côtes, à trois loges contenant chacune environ huit ovules attachés sur deux rangées longitudinales à l'angle interne. Le style est d'une longueur variable, à trois angles obtus, terminé par un stigmate à trois lobes. Le fruit

JAC

est une capsule ordinairement triangulaire, quelquefois déprimée vers son centre, à trois loges et plusieurs graines dans chacune d'elles.

Elle s'ouvre en trois valves septilobes sur le milieu de leur face interne. Les graines sont ovoïdes ou globuleuses, offrant quelquefois à leur point d'attache un rudiment de caroncule; ;

elles contiennent sous un tégument propre noirâtre , un endosperme blanc et charnu vers la base duquel se trouve un embryon dressé, presque cylindrique.

Quelques auteurs, à l'exemple de Miller, ont retiré du genre Jacinthe les espèces qui ont le calice globuleux, resserré à sa partie supérieure,

pour en former le genre Muscari ; tels sont *V. Hyacinthus Muscari* , \H.

racemosus , *Y. H. comosus* , *VH. botryoides* de Linné. *F. Muscari*.

Le genre *Hyacinthus* est extrêmement rapproché par ses caractères et par son port du genre *Scilla*. Mais dans ce dernier, le calice est formé de six sépales distincts les uns des autres jusqu'à leur base et plus ou moins étalés, tandis que dans les Jacinthes les six sépales sont tellement soudés que le calice paraît monosépale.

La plupart des espèces de Jacinthes sont des Plantes d'agrément. Mais, parmi toutes ces espèces, il en est une surtout qui est cultivée en abondance, c'est la Jacinthe des Jardiniers. Nous allons d'abord la décrire à son état naturel de simplicité , après quoi nous ferons connaître quelquesunes de ses principales variétés et son mode de culture et de multiplication.

Jacinthi. *p. Orient*, *Hyacinthus Orientalis*, L.. Vulgairement Jacinthe des Jardinières. Cette belle espèce est originaire d'Orient et de l'Asie-Mineure ; mais aujourd'hui elle est en quelque sorte naturalisée dans toutes les parties de l'Europe où l'on s'occupe de la culture des Heurs. Son bulbe est simple, ovoïde, formé de deux

niques emboîtées les unes dans les autres, et recouvertes extérieurement d'écaillés sèches d'un gris violacé.

Du plateau ou de la couronne sur la-

JAC

quelle le bulbe est assis à sa partie inférieure naît une racine composée de fibres cylindriques, simples et blanches. Les feuilles sont les unes dressées, les autres étalées, allongées, étroites, un peu Canaliculées et pointues, d'un vert agréable. Du centre de ce faisceau de feuilles s'élève une hampe nue de six à neuf pouces d'élévation, quelquefois davantage, cylindrique, glabre, terminée par un épi de jolies fleurs bleues ou blanches, répandant une odeur extrêmement suave. A ces deurs succèdent des capsules déprimées, à trois angles très-saillans et obtus, s'ouvrant en trois valves et contenant des graines globuleuses qui offrent chacune une caroncule très-saillante à leur point d'attache. C'est l'espèce que nous venons de décrire qui, transportée il y a plus de deux siècles dans les jardins de la Hollande, et particulièrement dans ceux de Harlem, a fourni à la longue, par les soins du cultivateur, ces innombrables variétés à fleurs simples et doubles dont le nombre s'élève aujourd'hui au-delà de deux mille. Aujourd'hui le goût des Jacinthes, de même que celui des Tulipes, n'est plus aussi généralement répandu qu'autrefois, surtout en France.

11 fut un temps où les amateurs de Jacinthes payaient jusqu'à deux et trois mille francs un seul oignon d'une variété nouvelle. Dans les premiers temps où la culture de cette belle Liliacée commença à s'introduire-»

re en Hollande, on ne recherchait que les variétés à fleurs simples; celles à fleurs doubles étaient considérées comme des

monstruosités et sans nulle valeur. Plus tard , le goût des amateurs changea entièrement, et l'on n'attacha plus de valeur qu'à celles dont les deurs étaient bien pleines. Pour qu'une Jacinthe ait encore du prix, il faut mi'elle soit non-seu* lement grande et bien pleine , mais il faut qu'elle soit bien rég hère , c'est-à-dire que ses divisions soient égales et recourbées en dehors. Elle acquerra une voleur plus grande encore si le cœur est d'une couleur dif-

JAC

fèi eule de celle des divisions externes.

On peut établir Lois classes parmi lies nombreuses variélsde Jacinthes :

celles à fleurs etiliè: emenl simples, celles qui sont doubles et enfin celles qui sont pleines. Les deux premières classes se multiplient de cayeux et de graines, les dernières seulement par le moyen des cayeux, parce que leurs fleurs sont tout-à-l'ait stériles. C'est | par le mo\en des graines que les lieu— ristes hollandais obtiennent chaque année un grand nombie de variétés nouvelles; par les cayeux, au contraire, ils piopagent et conservent les variétés déjà connues. Dans une excellente histoire des Jacinthes publiée à Amsterdam en 1768 , l'auteur cite plus de dix-huit cents variétés qui toutes ont un nom particulier. On conçoit que depuis celte époque le nombre s'en est encore de beaucoup augmenté.

La culture des Jacinthes , bien que ces Plantes soient assez rustiques , exige des soins particuliers , surtout à cause de leur floraison très-précoce.

En effet , sous le climat de Paris il n'est pas rare do voir les Jacinthes fleurir dès la fin de mars ou dans les premiers jours

d'avril. Les Jacinthes se plantent ordinairement en planches de trois -pieds environ de largeur sur une longueur variable, suivant le nombre que l'on en possède. ■

Chaque planche doit être creusée à une profondeur de dix pouces et rem- ; plie d'une terie particulière qui est un mélange de fumier de Vache et de sable de Bruyère. On unit bien cette terre et l'on y trace des lignes longitudinales et transversales, éloignées les unes des autres de six pouces ; on enfonce un oignon à chaque ' point d'intersection , après quoi on recouvre le tout d'une nouvelle couche de terre préparée de trois à quatre pouces d'épaisseur que l'on soutient sur les côtés avec des tringles de bois. Ce travail doit se faire vers le milieu de septembre ou le commencement d'octobre. La Plante doit être ensuite recouverte avec des coquilles d'Huîtres pilées, si l'on peut

JAC

s'en procurer. Lorsqu'on craint de trop fortes gelées pendant l'hiver, on recouvre les oignons d'un lit de paille sèche. Quand au printemps les Jacinthes commencent à fleurir, elles exigent île nouveaux soins. Les amateurs sont dans l'habitude de recouvrir chaque planche d'une sorte de petite tente qui les garantit à la fois et de la neige et du soleil , qui hâte trop le développement des fleurs.

Ceux qui n'ont pas de tente se servent de paillassons soutenus sur des traverses de bois et qui remplissent à peu près le même objet. Il faut néanmoins avoir soin de ne pas les laisser couvertes trop long temps, afin que les liges ne s'allongent pas trop par suite d'un esort d'étiollement. La tige d'un grand nombre de variés demande à être soutenue avec un petit tuteur de bois , à

cause du poids des fleurs qui la terminent. Quand les fleurs sont passées, on attend que la tige et les feuilles jaunissent et se fanent, avant de retirer les oignons de terre. Pour cela on doit choisir un beau jour. On peut, si le temps est bien sûr, les laisser à terre pendant une quinzaine de jours, afin qu'ils achèvent de bien mûrir. On les rentre ensuite et on les place sur des tablettes. Quand ils sont bien secs, on les épluche, c'est-à-dire que l'on ôte les feuilles et les racines desséchées, ou détache les cayeux que l'on met de côté. Après quoi on replace de nouveau les oignons sur des planches jusqu'à l'époque où l'on doit les replanter. Il y a des variétés dont les oignons durent ainsi vingt et même vingt-cinq ans. Ce sont particulièrement celles qui ne poussent que deux ou un très-petit nombre de feuilles chaque année.

Parmi les espèces indigènes, nous signalerons les suivantes :

Jacinthe des uors, *Hyacinthus non scriptus*, L., *Scilla nutans*, O.C., Fl. Fr. Cette espèce est excessivement commune dans quelques bois, au printemps. Son bulbe est petit, globuleux; ses feuilles linéaires; sa hampe; haute d'environ un pied,

954 JAC porte un épi de fleurs d'un beau bleu de ciel et reversées. C'est à tort qu'elle a été placée par quelques auteurs dans le genre *Scilla*.

Jacinthe de Rome, *Hyacinthus romarinus*, L. Cette espèce croît en abondance dans les champs incultes de la campagne de Rome où nous l'avons recueillie en fleurs vers la fin de mars; elle vient également dans le midi de la France. Son bulbe est très-gros; ses feuilles sont linéaires, étroites; ses fleurs d'une teinte grise, sombre, forment un épi très-serré à la partie supérieure de la hampe.

Jacinthe tabdive, *Hyacinthus serotinus* , L. Cette espèce ressemble à la précédente par la couleur sombre de ses fleurs. Ses feuilles sont plus étroites et comme canaliculées ; ses fleurs forment un long épi unilatéral, les trois lobes externes du calice sont recourbés en dehors. Elle croît dans le midi de la France et la Barbarie; Bory de Saint-Vincent l'a retrouvée en Andalousie , surtout dans les détritiques schisteux de la Sierra-Moréna.

On a beaucoup discuté pour savoir si l'Hyacinthe des anciens était une espèce du genre auquel Linné appliqua ce nom. On sait en effet que ce nom était célèbre dans les fables mythologiques des Grecs et des Romains.

Apollon , jouant au disque avec le jeune et bel Hyacinthe, son favori, le frappe involontairement à la fête d'un coup auquel il succombe. Désespéré, le dieu change en fleurs les gouttes de sang de son ami et leur donne le nom d'Hyacinthe. Les poètes qui nous ont transmis cette fable n'ayant pas donné de description de la Plante qu'ils nommaient Hyacinthe , les botanistes modernes ont beaucoup varié sur ce sujet. Ainsi, les uns , tel que Linné, ont cru que l'Hyacinthe était le *Delphinium* *Jacis*, parce que, suivant Ovide, on lisait les mots ai ai sur les fleurs de l'Hyacinthe , rappelant les cris plaintifs que poussa le mourant. Sau-, maisc , Sprengel et» Sibthorp pensent que c'est le Glayeul , *Gladiolus communis*. D'autres, et en plus

JAC

grand nombre, croient que l'Hyacinthe des anciens est le *Lilium Martagon* de Linné, parce que cette Plante présente dans la couleur de ses fleurs, dans les lignes qu'elles offrent, beaucoup de ressemblance avec ce ^ que les anciens nous ont transmis sur leur

Hyacinthe. Mais ou conçoit qu'une pareille question ne saurait être résolue d'une manière positive et incontestable , el tel est le vague qui règne sur ce sujet que, quelle que soit l'opinion qu'on adopte, on ne manquera ni d'argumens pour la défendre, ni de raisons pour l'attaquer.

Le nom de Jacinthe a été étendu , par les jardiniers, à la Tubéreuse, à plusieurs Scilles , à une Ornithogale , ainsi qu'à une variété de Prunes.

JACKA. BOT. phan. y. Jac.

JACKAASHAPUCK. bot. phan.

Selon Valmon de Bomare, les Américains du Canada donnent ce nom à l'Airelle dont ils fument la feuille eu guise de Tabac. (b.)

JACKANAPER. mam. Ce nom désigne dans quelques anciens voyageurs qui ont parlé des îles du cap Vert , le Simia sabœa , espèce du genre Guenon. V . ce mot. (b.)

JACKIE. rept. batr. Espèce du genre Grenouille V. ce mot. (b.)

* JACKIE. Jackia. bot. phan.

Genre de la famille des Rubiacées , et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par Wallich (IL Ind. 2 , p.

3a i) qui lui attribue les caractères suivans : calice adhérent avec l'ovaire infère, à limbe unilatéral trifide; corolle monopétale infundibuliforme, à tube filiforme, à limbe campanule , à cinq lobes; anthères filiformes sessiles et incluses; style très long terminé par un stigmate bilobé.

Capsule couronnée par le limbe du calice unilatéral et développée ; à une seule loge contenant une seule graine. Ce genre ne se compose encore que d'une seule espèce, *Jactia ornata*, toc. cit., grand Arbre tiès- touffu et

JAC

nimlié qui croît aux enviions de -Singapore dans l'Inde ; ses feuilus vioru opposées et presque décussés , .obovales , elliptiques , acuminées , icourtemnt pétiolées ; les fleurs formnent de grandes panicules axillaires ■opposées et pendantes. (a.B.)

JACKOU. ois. (Dampier.) Et non JJacion. Syn. d'Ara rouge. P Ara.

J ACKSONIE. Jacksnnia. BOT.

PH an . Genre de la famille des Lég-

. mineuses et de la Uécandrie Rlouo-

.gynie, L., établi par K. Brown {Hurt.

tXjew. , 2* édit. , vol. 5, p. u) qui l'a ainsi caractérisé : calice à cinq divi-

• sions profondes et presque égales ; corolle papilionacée dont les pétales

-sont caducs, ainsi que les étamines

gui ont leurs filets libres ; ovaire à eux ovules, surmonté d'un style sn- ! bulé et d'un stigmate simple. Le : fruit est un légume un peu renflé, ové ou oblong , à valves pubescentes intérieurement; graines dépourvues d'arilles calleux (Strop/iiolœ). Ce geni

re a d'abord été constitué sur une i Plante que Labillardière
{Nov.-Holl.

Spec, i, p 137, t. i 36) avait décrite et : figurée sous le nom de
Gompliolobium sp ht os uni. Outre cette espèce, Brown en a pu-
blié une autre sous le nonvde Jacisonia scoparia. De Candolle
{Proilrom. Syst. liegn Veg. T. u, | p. 107) vient d'augmenter ce
genre de trois espèces, savoir : J. horrida , nouvelle espèce ; J.
furcettata ou Gumpholubiurn furcellatum , Bon pl.

{Noi>. , 50 , t. 1 1) , et J. reticulala ou Daviesia reticulala de
Smith {Traits.

Linn. Soc, 9, p, a56). Les Jacksonies sont des Arbrisseaux par-
ticuliers à la INouvelle-Hnllande , presque dé-

f»ourvus de feuilles lorsqu'ils ont pris euraccroissement ,
ayant leurs branches souvent anguleuses, et les ramuscles folii-
fonnes. Leurs Heurs sont jaiines. (g..n.)

JACO. ois. Nom vulgairement donné à la plupart des Perro-
quets réduits en domesticité. (b.)

JACOB/EA. BOT. l'HAN . V. Jaco- M&E.

JAC .î5

J ACOByEASTRUM. bot. phan.

Ayant subdiviséle genre Jacobœade Tournefort, Vaillant don-
na le nom de Jacobœastruni au groupe dont les espèces étaient
pourvues d'un iuvulucré simple, de fleurs mâles et de demi-fleu-
rons femelles. Comme ce nom était contraire aux règles imposées
par Linné dans sa Philosophie botanique, il le changea en celui
d'Ot/ionna. f'. ce mot. (g..N.)

JACOBtEOIDES. bot. tian. Ce nom avait été donné par Vaillant à l'un des genres qu'il avait formés aux dépens du Jacobœa de Tournefort.

Linné le changea en celui de Cineraria. V. Cinkbaibe. (g..N.)

JACOBEE. Jacobœa. bot. phan.

Sous ce nom Touruefoi t distinguait des Senecio les espèces dont les clemifleuron3 marginaux étaient tiès-apparens , mais il y confondait plusieurs Corymbifères dont on a fait depuis les genres Cineraria et Uthonna.

Vaillant subdivisant le Jacobœa de Tournefort , sépara ces deux derniers sous les noms de Jacobœoides et de Jacobœastruni qui n'ont point été admis vu leur désinence contraire aux règles delà glossologie botanique. Le caractère essentiel du Jacobœa ne parut point assez important à Linné pour être employé comme générique; en conséquence ce genre ne devint plus à ses yeux qu'une section du Senecio. La ptupait des auteurs se sont rangés à l'avis de Linné , et avec d'autant plus de raison qu'il devenait fort difficile de connaître les limites du Jacobœa. En effet, ceux qui ont admis ce genre s'accordent trèspeu sur sa composition. Vaillant en avait séparé sous le nom de Solhlogo les espèces à feuilles entières ; cellesci lui furent réunies par Adanson , auxquelles il adjoignit les Plantes formant le Jacobœoides ou Cineraria de Linné. Gacrtner , en excluant ces dernières , s'estconforméàpeuprèsau sentiment de Vaillant. Necker imagina inutilement le nouveau mot de Senecio pour désigner le groupe en question. Les genres Senecio et Jaco-

boëa de Moench sont distingués comme ils l'étaient par Tournefort, mais ce botaniste a créé en outre sur le *Senecio cernuus*, L., un genre *Crassocephalum*, L., qui n'a pas été adopté. Enfin, comme pour augmenter la confusion, Thunberg a changé les anciens noms, donnant au *Jacobœa* celui de *Senecio* et au *Senecio* celui de *Jacobœa*. Cet exposé sommaire des versatilités des auteurs louchant le genre *Jacobœa* ne nous semble pas inutile; il doit prémunir contre les innovations faites d'une manière inconsiderée ou par une subdivision qui tend de plus en plus à rompre certains groupes très-naturels, quoique ceux-ci présentent de légères modifications dans la structure de leurs divers organes. Il nous semble donc plus convenable aux intérêts de la science d'en revenir, relativement au *Jacobœa*, aux idées de Linné, c'est-à-dire de ne point le séparer complètement du *Senecio*. C'est ce qu'a fait H. Cassini qui ne l'admet que comme un simple sous-genre; néanmoins il en a tracé des caractères tellement circonstanciés qu'on serait disposé à lui donner une grande importance. C'est à l'article *Sénéçon* que nous donnerons ceux qui seront nécessaires pour distinguer ce sous-genre.

On a quelquefois appelé Jacobée maritime le *Cineraria maritima*, L.

* JACOBÆES. *Jacobœa*. bot. piian.

Dans ses Familles naturelles des Plantes, Adanson donnait ce nom à l'une des dix sections suivant lesquelles il partageait les Composées; mais la manière artificielle dont il l'a caractérisée, et l'exclusion du genre *Senecio* si étroitement lié avec le *Jacobœa* que Linné les a réunis, ont empêché d'admettre la tribu formée par Adanson.

Le nom de Jacobee a été récemment donné par Kunth (A'of. Gêner, et Spec. Fiant, œquinoc. T. iv, p.

154) à la quatrième section qu'il a établie dans les Synanthérées de l'Amérique équinoxiale, et qu'il a com-

JAC

posée des genres suivans : *Perdium*, *Dumerilia*, *Kleinia*, *Calcia*, *Culcitium*, *Senecio*, *Cc/ura/ia*, *JVerneria*, *Tagetes* et *Boebera*. F. ces mots et Synanthérées. (g..n.)

JACOBIN, ois. Espèce des genres Corbeau et Gièbe. P' . ces mots. Ce nom est encore synonyme de Morillon, espèce de Canard. On a aussi appelé J acobin Huppe, la femelle de l'Edolio, espèce du genre Coucou. V. ce mot- (b.)

" JACOBIN, bot. cbypt. Paulet appelle ainsi un Champignon du genre Agaric, qu'il nomme également Ventre brun et Ventre blanc. (b)

JACOBINE, ois. Espèce d'Oiseau- Mouche. V. Colibri. On a aussi donné ce nom à la Corneille mantelée. (B.)

JACODE. ois. Syn. vulgaire de Draine, r. Merle. (dr..z.)

* JACOS. pois. Les Poissons gros comme des Veaux, qu'on pêche à la Côte-d'Or en Guinée, et dont il est question dans l'Histoire des voyages, ne sont pas connus. ^b.)

JACOD. ois. / ^Marail et Yacou.

JACQUIER, bot. pn an. Pour Jaquier. V. ce mot. (b.)

JACQUINIE. *Jacquinia*. bot.

pu AN. Ce nom imposé par Linné et par Jussieu à un genre de la famille des Sapotées , a été donné postérieurement par Mutis au genre Trilix dé Linné. Le premier de ces genres doit seul conserver le nom de Jacquinia; il offre les caractères suivans : le calice est monosépale, persistant, à cinq lobes incombans par leurs parties latérales; la corolle est monopétale, subcampanulée. Son limbe est à dix lobes, cinq alternes plus peiils, en général dressés, et cinq plus grands , réfléchis cl externes. Les élamines, au nombre de cinq, sont insérées à la base de la corolle. L'ovaire est uniloculaire contenant un assez grand nombre d'ovules attachés à un trophosper'me basilaire. Cet ovaire est surmoulé d'un style très-court que

JAD

i termine uu stigmate obtus. Le fruit i est une baie sèche , globuleuse , api- • Culée à son sommet , envirpnnée à sa I base par le calice persistant, contenant d'une à six graines attachées à sa base. Ce genre se compose de huit i espèces , toutes originaires du continent ou des îles de l'Amérique méridionale. Ce sont des Arbrisseaux ou des Aibustes, ayant leurs feuilles tantôt éparses , tantôt opposées ou verlicillces , toujours très - entières. Les fleurs sont terminales, disposées en épis ou en grappes, rarement solitaires. Le genre Jacquinia avait été place par Jussieu dans la famille des tapotées. Mais aujourd'hui il fait partie du nouveau groupe des Myrsinés ou Ardisincées. Il faut en exclure le Jacgui/iia venosa de Swaitz, qui est une Plante de la famille des Rubiacées , à laquelle Valu* a donné le nom de Psychotria megalosperma. (a.r.)

* JACUAGANGA. bot. tuan.

(Pison.) Syn. de Co.slus. (ît.)

JACULUS. mam. Nom scientifique d'une Gerboise. F. ce mot.
(u.)

* JACULUS. hept. oi'ii. V. Erix.

JACURUTUou JACUTURU. ois.

V. Chouette , sous-genre Hiboux

JADE. min. Ce nom ue se rapporte à aucune espèce minérale bieu déterminée ; il a été donné à des substances très-différentes , telles que le Feldspath tenace , la Prehnite , et des roches composées de Pétersilex et de Talc , de Feldsp.ith compacte et de Diallage, etc. Ces substances ont en général des teintes verdâtres ou blanchâtres , et à cause de leur dureté elles suppléent souvent à l'emploi des matières métalliques chez les peuples peu civilisés. On en distingue trois variétés principales :

Le Jade neimihétique , ou la Néphrite, vulgairement appelé Jade oriental. Il paraît être un mélange de Pétersilex et de matière talqueuse. Il est très-dur , et pèse spécifiquement a,95. Il fond en email

JAD 57

blanc par l'action du chalumeau.

Sa cassure est écailleuse, et sa trans-

fiareuce imite celle de la cire. Ou e travaille difficilement , et le poli qu'il reçoit a toujours quelque chose de gras. Ses couleurs

sont le verdâtre , l'olivâtre et le blanchâtre.

Il nous vient de la Chine, sous la forme d'objets sculpté» et travaillés à jour avec beaucoup de délicatesse. 11 est composé, suivant une analyse de Kaislner, de : Silice 50,50; Alumine 10,00: Maguésie ai ,00 ; Oxide de Fer, 5,50; Oxide de Chrome, 0,05; Eau , 2,75. Cette variété de Jade est du nombre des substances minérales qu'on employait anciennement comme amulettes, c'est-à-dire que l'on portait sur soi pour se soulager ou se préserver de certains maux. C'est parce. qu'on la croyait propre à guérir la colique néphrétique qu'on lui a donné les noms de Pierre néphrétique et de Pierre divine. On trouve cette substance en masses roulées dans le lit des torrens qui descendent de la grande chaîne de l'Himalaya eu Asie.

Il paraît que ce sont ces masses détachées qui fournissent aux artistes chinois la plus grande partie du Jade qu'ils travaillent.

Le Jade ascien ou axinien, Beilstein , Wern., vulgairement Pierre do hache. Très-dur; à cassure écailleuse; couleur d'un vert olivâtre:

susceptible de poli. Il existe à Tavaï-Punama , île méridionale de la Nouvelle-Zélande. Il tire son nom de Pierre de hache de la forme sous laquelle les Sauvages l'ont façonné, pour l'employer aux mêmes usages que nos haches et nos coins.

On lui a donné aussi les noms «le casse-tête et de Pierre de la circoncision. On trouve de ces Pieries de hache dans beaucoup d'aulies pays , et même en Europe : elles se rapportent à différentes c.-pèces de roches.

l'Opbite, la Seipenline , etc.

Le Jade de Saussure (Voyages, dans les Alpes , n° 11 a et 113) ; Saussurite , Théodore de Saussure. Trèstenace; couleur blanchâtre, verdâtre ou bleuâtre. Susceptible d'allé-

58 JAG

ration;, comme le Feldspath des Granités. Saussure en faisait une variété du Jade; mais la plupart des minéralogistes le réunissent au Feldspath compacte. V. Feldspath. C'est un des principes composans de l'Euphotide. (g. del.)

JADELLE, JODELLE ou JOU- DARDE. ois. Syn. vulgaires de la Foulque Macroule. V. Foulque.

DH..Z

* JADEN et LADEN, bot phan.

Syn. arabes de Ciste ladanifère. K.

GLSTE. (b.)

* JIÉGERIE. Jœgeria. bot. phan.

Genre de la famille des Synanthérées, Corymbifères de Jus-sieu, et de la Syngénésie superflue, L. , établi par Kunth (Afot>. Gêner, et Spec. Plant, œquin. T. IV , p. 277) qui l'a placé dans la tribu des Hélianthées, et l'a ainsi caractérisé : involucre campanule, composé de cinq folioles égales dont les bords sont roulés en dedans ; réceptacle conique, couvert de paillettes ; fleurons du disque tubuleux , nombreux, hermaphrodites; ceux de la circonférence en languettes et femelles; akènes oblongs-cunéiformes,

dépourvus d'aigrettes. C'est par ce dernier caractère que ce genre se distingue du Wiborgia ; il diffère de YUnxia par son réceptacle conique et paléacé. Le Joegeria mnioides, Kunlh (loc. cit., tab. 400), est une petite Plante herbacée dont la lige est simple, ordinairement à un seul capitule, rarement à plusieurs. Ses feuilles sont opposées, entières, sessiles, ovalesallongées, marquées de trois nervures et très-légèrement velues des deuxcôtés. Les fleurs sont petites, pédonculées et jaunes. Cette Plante croît dans les lieux tempérés près d'Ario , au Mexique. (g..n.)

* JAGGREÉ. bot. phan. Sorte de sucre que les habitants de Sumatra retirent de la liqueur qui découle de l'Aréquier , et que les Français prononcent Chagari ; d'où Marsden croit par une étymologie un peu forcée que le mot Sucre est dérivé, (ii.)

JAL

* JAGO. Gallus giganteus. ois.

(Temminck.) Espèce du genre Coq.

F. ce mot. (b.)

JAGON . moll. Il est difficile, pour ne pas dire impossible , de rapporter cette espèce d'Adanson (Coquil. du Sénégal, pl. 18) à son véritable genre; mais il est probable que c'est un Cardium, puisque dans sa description il dit. que la charnière est semblable à celle du Kaman qui est bien certainement un Cardium. (n..n.)

* JAGORACUCU. mam. L'Animal brésilien mentionné sous ce nom par Lachênaye-des -Bois , paraît être une grande espèce de

Chai.

JAGUACAGUARA. pois. (Marcgraaff.) Syn. de Moucharra, espèce du genre *Glyphisodon*. V. ce mot. (b.)

* JAGDACINI. mam. Ou ne connaît pas le Carnassier brésilien mentionné sous ce nom par Lachênayedes-Bois qui le compare au Renard et le dit très-dormeur, se nourrissant de Crustacés et de cannes à sucre.

JAGUAR et JxiGU ARETE, mam.

Espèces du genre Chat. V. ce mot.-

JAGUAR, pois. Espèce brésilienne de Bodian. V. ce mot. (b.)

JAGUARUNDI. mam. Pour Yaguarondi. V. ce mot. (b.)

JAIS. min. V. Lignite.

* JAJON. moll. Nom vulgaire du *Venus ebitrnea*. (b.)

* JAKAIKACHI. bot. phan. Syn.

caraïbe de *Cedrela odorata*, L. V.

CÉDB.ÈLE. (b.)

JAKAMAR. ois. Pour Jacamar.

JAL

a.'appa, L.), qui est fort employé en médecine. Le Jalap nous vient du Mexique et de l'Amérique septentrionale. Ainsi qu'on la

trouve dans le commerce , la racine de Jalap est en morceaux globuleux ou hémisphériques , quelquefois en rouelles de jeux à Irois pouces de diamètre. Sa surface externe est d'un brun sale; mou intérieur est d'une couleur moins oncée , marque de zones ou de couches concentriques emboîtées les unes dans les autres, comme les couches ligneuses dans la tige des Arbres dicotylédonnés ; sa cassure est irrégulière, offrant quelques points brillans : de matière résineuse. Son odeur est désagréable et nauséabonde , surtout lorsqu'il est réduit en poudre ; sa saveur est acre et irritante. On doit au docteur Félix Cadet-Gassicourt , une analyse très-soignée de cette racine, publiée dans son excellente Dissertation sur le Jalap. Ce chimiste a trouvé sur 500 parties de cette racine : Résine 50; Eau 24; Extrait ;gommeux 220; Féculé 12,5; Albumine 12, 5 ; Phosphate de Chaux 4 ; ^Muriate de Potasse 8,1; et quelques 1 autres Sels. Le principe le plus actif du Jalap est sans contredit la Résine, qui forme environ la dixième partie de son poids total : aussi en employant cette Résine est-on sûr d'obtenir des effets plus constans que par l'usage de la racine elle-même. Le Jalap est un médicament puissamment purgatif, qui, donné à une dose un peu élevée, peut déterminer des super- , purgations violentes, l'inflammation des intestins et d'autres accidens très-graves. Son usage convient surtout aux individus chez lesquels prédomine le système lymphatique , et à ceux dont la susceptibilité nerveuse est presque nulle. Ainsi plusieurs médecins en ont retiré d'heureux effets dans l'hydropisie ascite essentielle , dans les scrophules et pour combattre les Vers intestinaux. On doit au contraire s'en abstenir toutes les fois qu'il y a fièvre ou irritation locale violente. La dose du Jalap en poudre est d'environ trente à qua-

JAM Tarante grains pour un adulte. Il est presque toujours préférable d'employer la Résine que l'on donne à li dose de quatre à huit grains, (a. R.)

JALOUSIE, bot. fh.vn. Nom vulgaire de l'Amaranthc tricolore et d'une variété de Poires. (b.)

JAMAÏQUE, m Nom vulgaire et marchand du Venus pensylvanica. ("•)

JAMAR. moll. Linné avait rapporté le Cône Jamar d'Adanson (Coquil. du Sénégal, pl. 6, fig. 1) à son Conus Géniiitnvs ; mais ce- Cône ne pouvait être admis par la synonymie; car on voit qu'il y a confondu plusieurs espèces distinctes. Ce serait au Cône papilionacé de Lamarck qu'il se rapporterait, mais nous douions beaucoup que le Jamar soit la même espèce. (D..H.)

JAMARALCION.ois.(LcvailIant) Même chose que Jacamai alcion. V.

ce mot. (g.)

JAMBE, conch. Nom vulgaire et marchand de YOstrea isognomoi. (js.)

JAMBIFRS. bot. crypt. Paulet a établi sous ce nom une famille d'Agarics, dont l'un est le Jambier bi.anc, etFautrc le Champignon Réglisse. De tels noms ne sauraient être adoptés. (b.)

JAMBLE. moll. L'un des noms vulgaires des Patelles. (b.)

JAMBOLANA.. bot. piian. La Plante désignée par Ruruph sous ce nom reproduit par Adauson, semble être une Myrtce et même une .espèce à'Eugenia ou de Myrtus. Cependant Linné eut en vue une toute autre Plante, lorsqu'il constitua son genre J am-

boitjera , auquel il assigna pour synonyme le Jambolana de Rumph : car la Plante linnéenne est une Rutacée. /". Jambolifev.a.

JAMBOLIFERA. bot. phaw. Sous ce nom , Linné établit un genre qu'il décrivit d'une manière fort obscure et auquel il assigna pour synonyme le Jambolana de Rumph. Celui-ci fut re-

JAM

connu pour une Myrtée , tandis que l'autre fut placé dans les Rulscées et décrit par Gaertnev {de Fruct. i , p.

280) sous le nom de Cyminosma. Les auteurs et particulièrement De Candolle {Proclrom. Syst. Iiegn. P'eg. 1, p. 722) ont adopté le nom substitue* par Gaertner. F~. Cyminosme. Le mot de Jambolifera fut de nouveau appliqué à la Plante de Rumph par Gaertner qui en fit un genre distinct.

MaisKunth a démontré (Mém. de la Soc. d'Hist. Nat. de Paris, T. i,p.

524) que ce genre devait être réuni au Myrtus , conjointement avec VEugenia , le Sisygiuin, le Greggia et le Caryophyllus. V. Myrte. (g..n.)

JAMBON, conch. Nom vulgaire et marchand du Pinna saccata. V.

Pinn-e. (B.)

JAMBONNEAU, moel. Nom sous lequel Adanson a réuni plusieurs genres, tels que Moules, Mod'ioles et Pinnes , et qui n'a pas été admis. On donne plus particulièrement le nom de Jambonneau aux Coquilles du genre Pinne. P . ce mot. (d..h.)

JAMBOS, JAMBOSA et JAM- BOSILR. BOT. PIIAN. Noms français empruntés du malais , pour désigner le genre Eugenia qui, d'après Swartz et Kunth , doit être réuni au Myrtus dont il ne diffère nullement. V. Myr-

JAMESONITE. min. INom sous Jequel plusieurs minéralogistes ont réuni les deux substances qui ont été décrites jusqu'ici sous les noms d'Andalousile et de Macle. V. ce dernier mot. (g.dei)

* JAMM et JAM M A. Ces noms japonais sont des adjectifs qui, dans Ja langue japonaise, signifient des espèces sauvages et alpines ; ils sont tassés dans les dialectes malais : de-là tant de Végétaux qu'ils précèdent, jels que Jambose et Jamurose dont il a été question , qui est ce qu'on nomme encore Jamrosade dans les colonies françaises ; Jamma-buki , le Çurchurus oiitorius; Jammaeac, \ Eu-

JAN

genia racemosa; Jammana, YAntirfisma sylveslrtri; Jamha-simira , le Cuinus japonicits , etc., etc. (b)

* JANACA. mam. C'est probablement un Antilope que Uapper entend designer sous ce nom. (b.)

JAINDIROBE. bot. piian. (Valmon de Bomare.) Pour INandirobe.

W. ce mot et Fetjiixée. (b.)

* JANDOU. ois. (Lachênaye-des- Bois.) Même chose que Yandou. F.

ce mot. (b.)

* JANDOU. bot. phan. Espèce indéterminée du genre DJuscorea qui croît naturellement sur les bonis du Zaïre , et dont on mange la racine comme celle des- autres Ignames, (e.)

. * JANFRU. pois. Le Razon à Malte et dans quelques àutres points du bassin de la Méditerranée. (b.)

* JAING. mam. Le P. Navarelic mentionne sous ce nom un Animal fabuleux , qu'il dit se trouver à la Chine où il se nourrit de l'air qu'ij aspire, n'ayant cependant pas de bou-r cbe. (b.)

JANGOMAS. bot. phan. L'A.hre mentionné par Bontius sous ce nom, est le Stigmarota de Loureiro. (b.)

JANIE. Jania. Polyp. Genre dé l'ordre des Corallinées, dans la division des Polypieis flexibles ou non entièrement pierreux , de la section des Calcifères, c'est-à-dire de ceux dans lesquels la substance calcaire , mêlée avec la substance animale ou la recouvrant,, est apparente dans tous les étals. Ses caractères sont : Polypier muscoïde, capillaire, dichotome /articulé ; articulations cylindriques ; axe corné; écorce moins crétacée que celle des Corallines. Tous les zoologistes ont réuni les Janies aux Corallines, sans en faire même une section particulière; cependant ces deux groupes de Polypiers diffèrent par des caractères bien Irancbés et

qui n'offient point d'anomalies. Les Corallines sont conslammentricbo tomes, les Janies se divisent toujours par dichotomies : les premières ont leurs arta-

TAN

i dilations plus ou moins comprimées , ;ont deltoïdes , cylindriques seulement sur quelques parties des Polypiers , tandis que les secondes offrent cces mêmes articulations d'une loi me cylindrique depuis la base jusqu'aux rextreçinités. La position des Polypes eest peut-être différente. Seraient-ils pplacés au sommet des ramifications • comme dans les genres p/i écédens ?

iDans les Corallines , loin d'indiquer ■ ce caractère , ils semblent , au contraii<i*e, couvrir toute la surface du Poly- : pier sous forme de filamens très courts, et visibles seulement au mi- I croscope sur les individus que la mer nn'a jamais découverts, il est vrai, mitais doués d'un mouvement qui ce peut êtie dû qu'à la vie. Les Janies sse rapprochent des Corallines par la • substance , et surtout par les corps iiovoïdes que l'on regarde comme des ro-vaires, et qui offrent une analogie ppni faite dans ces deux groupes; ils se ilient naturellement l'un à l'autre paille Jania cora-icaulata qui présente ^quelquefois tous les caractères d'une vvraine Coralline dans sa partie inférieure, tandis qu'il ne s'en trouve aucun dans la partie supérieure. Aiusi , ces Polypiers sont intermédiaires «n- : tre les Corallines et les Galaxaurcs , -sans appartenir ni aux unes ni aux antres. Les Janies ne varient point dans leur forme générale ; la longueur des articulations, le plus ou

- moins de divergence des rameaux, la longueur et l'habitation fournissent seules les caractères spécifiques, qui sont très difficiles à apercevoir à cause de la petitesse de ces êtres. Dans quelques espèces, le nombre des variétés est

considérable; peut-être ces variétés sont-elles de véritables espèces qui se perpétuent et qui ne varient jamais ;

- mais tant de caractères les lient à leurs congénères, qu'il est presque impossible de les définir d'une manière bien exacte. Ces Polypiers, dans

le sein des mers, paraissent d'un violet tendre ou roseâtre ; celle couleur se change en un rose ou un rouge brillant, plus ou moins foncé,

JAN fit

qui devient d'une blancheur éclatante par l'action de l'air et de la lumière. Leur grandeur n'est pas considérable et ne dépasse jamais quatre centimètres, il en existe de deux à trois millimètres de hauteur. On les trouve à toutes les latitudes, à toutes les profondeurs, en général parasites sur toutes les Plantes marines qu'elles couvrent quelquefois entièrement de leurs touffes épaisses. Certaines espèces, semblables à un grand nombre d'Insectes, ne viennent que sur la Plante marine qu'elles semblent affectionner ; il en est même que l'on ne trouve que sur quelques parties du Végétal et point sur les autres. Le *Jania pumila* en offre un exemple ; on ne le voit jamais que dans la concavité des feuilles du *Sargassum turbinatum*. Ces Polypiers peuvent remplacer la *Coralline officinale* ; et il n'est pas rare de voir, dans les

meilleures pharmacies , de la Coralline de Corse entièrement composée de Janies de différentes espèces- (lau..x.)

JANII'ABA. cot. fiun. (Ma.cgraall'.J Syn. de Genipayer. V. ne mot. (b.)

JANIPJiA. bot. ph/vn. Genre de la famille des Euphorbiacé^s , et de la iWoncecie Polyandrie, L. Il présente des fleurs monoïques et un calice campanule quinquéparli , sans coiolle. Dans les fleurs mâles , on trouve dix étamines libres insérées sur le contour d'un disque charnu et qui sont alternativement plus longues et plus courtes ; dans les femelles, un style court, trois stigmates à plusieurs lobes qui sont réunis ensemble en une seule masse parcourue par des sillons irrégulièrement sinueux et profonds ; un ovaire porté sur un disque charnu , à trois loges contenant un ovule solitaire. Le fruit est une capsule à trois coques bivalves. Les espèces de ce genre sont des Arbres ou des Arbrisseaux remplis d'un suc lactescent, à feuilles alternes et palmées, et donHe.s (leurs sont disposées en grappes paniculées, axillaires ou terminales. Elles sont au nombre de

bi JAN

cinq et toutes originaires d'Amérique.

L'une d'elles est très-répandue à cause de l'emploi alimentaire de sa racine , si connue sous le nom de Manioc (F~. ce mot); celle des autres paraît être analogue jusqu'à un certain point, c'est-à-dire contenir une grande quantité de fécule mêlée à un principe acre et vénéneux qui se volatilise par la chaleur. Ce genre était autrefois réuni au Jatropha ou Médecinier, qui en diffère par plusieurs caractères et notamment par la présence d'une corolle. Déjà Adanson l'eue avait séparé-sous le nom de Manihot, nom un

peu barbare auquel on a dû substituer celui de Janip/ia proposé par Kunth et tiré d'une autre espèce qu'il servait à désigner. V. Kunth , Nou. Gen. T. n , p. jo6, lab. 109 , et Adr. de Jussieu , Essai sur les Euphorbiacées, p. 37, tab. 10, n° 35.

* JANIRE. Janira. acal.- Genre de l'ordre des Acalèpbes libres , dans la classe des Acalèpbes , proposé par Ocken , dans son Système de Zoologie, aux dépens des Béroés, pour deux espèces de ce groupe qui ont des nageoires longitudinales, la bouche pédiculée et deux tentacules branchiaux; ce sont les Beroes p/iscus et hexagùna qui appartiennent , du moins le dernier, aux Callianires de Lesueur. (lam..x.)

JANOUARA et JANOUARE. MAM. Premiers noms sous lesquels le Jaguar fut connu en Europe d'après les anciens voyageurs , d'oii le Janovaké de Séba. (b.)

, JANRAJA. bot. t?h an. (Plumier.) Syn. deRajania qui est l'anagramme du célèbre botaniste Jean Rai. (b.)

JANSOUNA. bot. ìhan. (Gouan.) La grande Gentiane en Languedoc.

* JANTHINE. beft. oph. Espèce du genre Couleuvre. K. ce mot. (b.)

JANTHINE. Janthina. moix. Connu depuis long-temps,' ce genre n'en, a pas moins resté vacillant dans les Méthode!, comme nous le verrons

AN

bientôt. Le premier auteur qui en ai parlé , est, a ce qu'il paraît , Fabius Cotumna((/e Purpurea, p. i5 , fig. 2), dont l'ouvrage fut publié en 1616. La ligure qui accompagne sa description est très-bonne pour le temps ou elle fut faite. Lister, dans son grand ouvrage (Sjnops. Conc/i., pl. 572), a donné la figure de la Coquille et de l'Animal , probablement d'après Fabius Columna qu'il a soin de citer.

Breyuius, en 170"), sans citer Columna ni Lister, donna de nouveau les figures de l'Animal de la Janthine , mais ces figures sont mauvaises. D'autres auteurs, tels que Sloane en 1707 , Browne en 1756 et Rumph dans quelques ouvrages qui ont pour but la connaissance des productions de certains pays , ont donné la figure de la Coquille seulement du genre qui nous occupe. Un ouvrage qui aurait dû avoir une grande influence sui l'esprit des zoologistes, est celui de Forskahl , ou on trouve de bonnes figures d'un assez grand nombre de Mollusques; publié plusieurs années avant la treizième édition du Systema Naturæ , il aurait pu servir à y apporter plusieurs modifications importantes, si la direction imprimée alors aux sciences naturelles n'eût été différente. L'Animal de la Janthine, bien connu dans sa configuration extérieure, ainsi que dans sa manière de vivre , n'aurait pas dû être confondu avec les Hélices , et l'on doit s'étonner que Linné ait commis une paieille erreur. Aussi le genre Janthine, que Lamarck proposa dans ses premiers travaux, fut-il adopté sur-le-champ. Depuis, Bosc donna de nouveau la figure de l'Animal dans son Traité des Coquilles, et y ajouta une bonne, description ; néanmoins, comme l'observe Cuvier, on ne connaissait point encore assez les rapports des tonnes extérieures avec l'organisation , pour fixer

invariablement la place de ce genre. C'est dans l'intention de décider cette question que Cuvier entreprit l'anatomie de la Janthine, ayant eu à sa disposition plusieurs individus de

AN

même espèce, rapportés de mers très éloignées. Malgré cette anatomie, nous ne voyons pas encore les auteurs d'un accord unanime sur le rapport de ce genre. Cuvier le place dans ses Conchilics avec les Phasiades et les Ampullaires. Lamarck le tient isolé entre les Néritacées par lesquelles il semble l'avoir oublié, et les Macroslomes. Férussac le rapporte à sa famille des Trochoïdes dans laquelle il rassemble aussi bien les Idées Janthines que les Mélaeuopsides, des Nérites que les Scalaires, etc.

Blainville, sans adopter absolument l'opinion de Lamarck, en a une qui s'en rapproche plus que d'aucune de

- celles de ses autres devanciers; il propose en effet, dans son second

ordre des Asiphonobranches, une cinquième famille sous le nom d'Oxibotoines pour le genre Janthine lui seul. Cette nouvelle famille se trouve immédiatement après celle des Ilémis-

- cyclostomes qui correspond entièrement à celle des Néritacées de Lamarck. Latreille enfin, dans ses Faunilles Naturelles, a manifesté une opinion différente de toutes celles que nous venons de mentionner. Cet auteur établit six familles dans la seconde section des Pectinibranches ;

- la seconde, sous le nom de Turbiimécs , est consacrée aux genres Tur-

- ritelle, Turbot, Ampullaire et Janthiue. Cette dernière opinion , dans laquelle on aperçoit quelque similitude avec celle de Cuvier et de Fé-

i russac, n'est point entièrement semblable à celle de ces deux zoologistes ; ■ elle leur est plutôt intermédiaire, i Parmi toutes les opinions que nous \ venons de rapporter, celle qui nous ! paraît se rapprocher le plus de la véi rite , est celle de Lamarck et de Blain- ' ville, et c'est aussi celle que nous i adopterions de préférence. D'après les ' travaux de Cuvier et de Blainville, on peut caractériser le genre Jautbine de la manière suivante : Animal de ! forme ovale, spiral, pourvu d'un pied circulaire , ■ concave , en forme de ventouse , accompagné d'une masse vésiculaire , sub-carlilagineuse , et de

JAN

chaque côté, d'espèces d'appendices natatoires; tête fort grosse; tentacules subulés, peu contractiles ; les yeux portés au-dessous de l'extrémité ; d'assez longs pédoncules situés au côté externe des tentacules et paraissant en faire partie; bouche à l'extrémité d'un muflle fort gros , pprobosciforme entre deux lèvres verticales , subcartilagineuses, garnies d'aiguillons qui se continuent jusqu'à la base d'un petit renflement lingual ; organes de la respiration formés par deux peignes branchiaux; l'ovaire se terminant dans la cavité respiratoire; l'organe excitateur mâle assez petit et non rétractile (Blainv.). Coquille ventrue , conoïdale , mince ,

transparente ; ouverture triangulaire; columelle droite , dépassant la base dir bord droit; celui-ci ayantun sinus dans son milieu; opercule remplacé par une masse vésiculaire subcartilagineuse , attachée sous le pied.

Le nombre des espèces de Janthine est peu considérable. Lamarck en a indiqué deux seulement dans ses Animaux sans vertèbres. Blainville en a ajouté deux autres sur lesquelles nous conservons quelques doutes, surtout pour celle qu'il nomme globuleuse, qui ne diffère de la Janthine naine de Lamarck , que par un peu moins d'élévation dans la spire. La Janthine prolongée du même auteur est décrite d'une manière trop abrégée pour pouvoir la reconnaître avec exactitude; les principales différences sont dans la columelle qui se prolonge un peu plus en un angle saillant , ce qui allonge un peu l'ouverture , ainsi que dans une suture plus profonde. Ces légères nuances suffisent-elles pour établir une espèce ?

Janthine commune , Jantkina commuais , Lamk. , Anim. sans vert.

T. vi, p. 206, n. i ; Janlhina fi agilis, Lamk., Encyclop. , pl. 4, 5, 6 , fig. i , a , b ; Hélix Janlhina , L. , Gmel. , p. 3645 , n. io3 ; Lister, Conchyl. , tab. 5, 7,2, fig. 34.

Cuvier, Ann.- du Mus. T. 11 , p. i a3. Cette espèce était la seule cou-

b4 JAN nue avant les travaux de Lamarck ; elle, acquiert un grand vohme, elle a une belle couleur violette moins foncée vers la spire; quelquefois la carène arrondie, qui existe constamment dans le milieu du dernier tour, sert de point de partage dans la distribution de la couleur, se trouvant souvent presque blanche

en de-sus , et tout-a-fait violette en dessous; dans quelques individus, une zône unique , violette , se remarque dans le milieu du dernier tour; une partie de la base et la spire d'un blanc violâtre. Cette Coquille est trochiforme ; son ouverture est subtriangulaire; la columelle, qui est droite, légèrement torse vers son milieu , forme un des côtes du triangle; le bord droit, qui est très mince et très tranchant, forme un sinus plus ou moins profond à l'endroit de la carène. Nous avons observé ce sinus dans tous les individus que nous avons vus , et si quelques-uns mutilés ne le présentaient pas , on pouvait toujours reconnaître son existence par les stries d'accroissement qui sont sur la surface de la Coquille. Cette espèce, la plus commune, se trouve presque partout, dans la Manche , la Méditerranée , l'océan Atlantique, la Jamaïque et le Chili. Plusieurs individus très-grands nous ont été donnés par notre estimable ami Lesson , qui les avait recueillis au cap de Bonne-Espérance. Leur diamètre est de quarante-quatre millimètres à la base.

Janthine naine, *Janthia exigua*, Lamk. , Anim. sans vert. T. vi, p.

206 , n. 2 ; Lamk. , Encycl., pl. 4, 5, 6 , fig. 2, a, b. Petite espèce bien caractérisée par son volume aussi bien que par les stries lamelleuses et longitudinales qui ornent toute sa surface; l'échancrure est aussi plus profonde que dans l'espèce précédente; ses tours de spire plus arrondis; la suture plus enfoncée ; et le sommet qui est aigu est transparent , subvitreux. Cette jolie espèce , dont on ignorait la patrie , a été rapportée par Lesson qui l'a trouvée au Chili. Elle

a cinq à six millimètres de diamètre à la base. (d..h.)

* JANUS. ins. Espèce du genre Bombyx qui se trouve à Surinam.

* JAPACANI. ois. (Marcgraaf.) V. Jacapani.

JAPARANDIBA. bot. phan. Adanson, d'après Marcgraff, appelle ainsi un Arbre de la famille des Myrtacées qu'Aublet regarde comme son genre figuré. V. ce mot. (a. h.)

JAPONAIS, pois. Espèce de Cotte.

V. ce mot , sous-genre Aspidophore

*JAQDERL bot. phan. Pison mentionne sous ce nom deux Mimosées brésiliennes. (b.)

JAQUEROTTE. bot. phan. La Tubéreuse dans certains cantons de la France , particulièrement vers la Loire. (b.)

JAQUES, ois. Un des noms vulgaires du Geai. (a. a.)

* JAQUET. ois. Syn. vulgaire de Sourde. V. Bécasse. (dr..z.)

JAQUETTE, ois. Syn. vulgaire de Pie. V. Corbeau. (dr..z.)

JAQUIER. Jrtocarpus. bot. phan.

Genre de la famille des Urticées , section des Arlocarpées, et de la Monœcie Monandrie de Linné , qui se compose de plusieurs espèces arborescentes, toutes fort intéressantes à cause de leurs fruits qui sont un aliment extrêmement précieux dans les pays où

elles croissent , ce qui les a fait désigner sous le nom vulgaire d'Arbres à pain. Voici les caractères du genre Jaquier : les fleurs sont unisexuées et monoïques , disposées en chatons placés à l'aiselle des feuilles supérieures. Les chatons mâles sont cylindriques , un peu renflés vers leur partie supérieure , longs de douze à quinze pouces sur un diamètre d'à peu près deux pouces. Les fleurs sont extrêmement nombreuses et serrées sur l'axe du chaton. Chacune d'elle»

se compose d'un calice monosépale

JAQ

tronqué à son sommet , à trois angles équilatéraux , et d'une seule étamine dont le filet long et grêle naît de la base interne du calice. Les chatons femelles sont globuleux ou ovoïdes , également pédonculés et placés à l'aiselle des feuilles. Leur axe est très-épais et renflé , tout couvert de fleurs excessivement serrées les unes contre les autres. Chaque fleur offre un calice oblong bifide, au fond duquel on trouve un petit ovaire libre surmonté d'un style très-long , un peu latéral , grêle, terminé par deux stigmates filiformes et divariqués. Chaque chaton et la feuille à l'aiselle de laquelle il est placé , sont d'abord entièrement enveloppés dans une spathe roulée , foliacée et très-caduque- Le fruit est tout-à-fait analogue à celui du Mûrier, mais il est plus grand , c'est-à-dire que les calices deviennent excessivement charnus, épais, s'ouvrent et s'entreflent entre eux , et finissent par former une sorte de baie composée , dont la surface externe ne présente une infinité de petites saillies irrégulièrement hexagonales , formées par le sommet de chaque fleur. Le centre de cette baie est occupé par un axe très-renflé et fibreux.

Jaquieh a feuilles incisées, *Artocarpus incisa*, L., v//? yj/., Lamk., ///.

. 744. Vulgairement Rima ou Arbre . i pain d'Oiaïti. C'est un Aibiedont e (ronc, de la grosseur d'un Homme, icquiert une hauteur de quarante à linquanle pieds. Son bois est mol , launâtreet léger; son écorce est luisante et fendillée. Toutes ses parties, oorsqu'on les entame , laissent échapper un suc blanc laiteux et visqueux.

'>es rameaux se réunissent à la partie supérieure du tronc , en formant une < èle presque globuleuse. Les feuilles lont grandes , alternes , pétiolées .

)vales, aiguës, comme pinnatifides i:t fendues dans leurs deux tiers supérieurs en sept ou neuf lobes lan- :éolt:s, aigus, séparés par des sinus >btus. Les chatons mâles et femelles >ont portés sur le même rameau , et places à l'aisselle des feuilles supé-

TOME IX

JAQ 65

rieurcs. Les fruits sont globuleux , à peu près de la grosseur de la tête d'un Homme. Leur surface est raboteuse et couverte de petites saillies anguleuses verdâtres. Leur pulpe est blanche, farineuse, légèrement fibreuse, devenant jaunâtre et succulente à leur parfaite maturité. Le réceptacle ou axe central est claviforme, charnu et très-fibreux. L'Arbre à pain est originaire de l'Inde , de la côte du Malabar et des Archipels de la mer du Sud ,

où il croît en abondance. Les Européens l'ont ensuite transporté dans d'autres parties du globe.

Ainsi on le cultive depuis longtemps à l'Ile-de-France, à Cayenne et dans la plupart des Antilles. Sonnerat et Forster nous ont transmis des renseignemens très- intéressans sur cet Arbre. Il présente deux variétés principales , l'une stérile et entièrement privée de graines , l'autre en contenant au milieu delà pulpe charnue du fruit. Cette dernière variété est celle que décrivent Rumph et Sonnerat. Selon Forster et plusieurs voyageurs modernes , on la trouvait aussi autrefois à Taïti ; mais elle en a tout-à-fait disparu , parce que les habitans se sont uniquement occupés de cultiver la variété sans graines , qui est plus productive et plus agréable à manger. Ces graines, à peu près de la grosseur de nos châtaignes , sont oblongues, anguleuses, aiguës à leurs deux extrémités , recouvertes de tuniques. Dans les îles Célebes les habitans les font cuire à l'eau ou sous la cendre chaude pour s'en nourrir. Quant à la variété sans graines, on la trouve aux îles Alariennes où croît également la seconde variété, aux nouvelles Hébrides et dans l'archipel des Amis , aux Sandwich, mais nulle part plus abondante qu'à l'archipel des îles de la Société; ses fruits bien mûrs sont pulpeux et d'une saveur douce et agréable , mais ils se putréfiaient facilement. Un peu avant leur maturité ils sont farineux, et lorsqu'ils ont été cuits dans un four ou sur le feu, ils ont une saveur agréable qui rappelle à la fois le

pain du froment , les tubercules de la Pomme de terre ou du Topinambour.

Ils sont alors un «liment aussi sain que nourrissant. Les habitans de Taïti et des îles adjacentes s'en nourrissent pendant huit mois de l'année, et pendant les quatre autres mois , c'est-à-dire

de septembre à décembre, c'est-à-dire que l'Arbre fleurit et mûrit ses fruits, ils mangent une sorte de pulpe cuite préparée encore avec ses fruits. On dit que les fruits de trois Arbres suffisent pour nourrir un Homme pendant une année. Ce n'est pas le seul avantage que l'on retire de l'Arbre à pain; son écorce intérieure est formée de fibres extrêmement tenaces, et l'on s'en sert pour tisser des étoffes dont les habitants se font des vêtements.

Une autre espèce non moins intéressante, d'abord placée dans ce genre, est *Y si rtocarpus integrifolia*.

Mais cette espèce, qui porte exclusivement le nom de Jaquier dans les colonies, est devenue le type du genre *Silodiyman* Banks, sous le nom de *Sitodium cauliflorum*. Elle est figurée dans Rhéede, Roxburgh et Gaertner. y. *Sitodium*. (a.r.)

JARACET JARARA. rept. oïh. Ces mots doivent signifier Serpent dans certains idiomes malais, car Jaka- Gafeba est, dans Rumph, un Python de Ceylan; Jaua-Epéija, un autre Python dans Rai; Jaraka, une Vipère javanaise dans Dandin; et Japarakuku, diverses Vipères; mais celles-ci sont brésiliennes, selon Ruysch et Rai, d'après Pison. (b.)

JARACATIA. bot. than. Ce nom se rapproche beaucoup de celui de Jacamlia donné par Pison à une Plante épineuse du Brésil, laquelle paraît être une espèce de Cactus.

Marcgraaff s'en est servi pour désigner une Plante également épineuse, mais dont les feuilles semblent être digitées. D'après les caractères qui lui sont attribués, on présume qu'elle a quelque affinité avec le Papayer, *Carica Papaja*, h. (g..n.)

JARAK. hot. piian. Il serait peul-

être intéressant de rechercher par quelle cause ce mol hébreu , qui signifie Herbe, est, selon Marsden, celui du Ricin chez les insulaires de Sumatra. (h.)

JARAVE. Jarava. bot. piian. Le genre de Graminées décrit sous ce nom par Ruiz et Pavon, est une véritable espèce de Stipa. V. ce mot.

JARAViEA. bot. phan. Ce nom a été donné par Scopoli et Necker aux espèces de Mélastomes dont le fruit est bacciforme à deux ou trois loges.

V. Meicastome, (g..n

* JARBUA. pois. Espèce de Perebe du sous-genre Térapon. V. Perche, (b.)

* JARDIN. Hortus. bot. Ce nom , qui littéralement désigne un lieu destiné à La culture des Plantes, a été donné par certains auteurs de botanique aux catalogues descriptifs des Jardins. Avant Linné, les botanistes donnaient même ce titre aux dorees de contrées fort étendues; V Hortus Malabaricus de Rhéede en est un exemple. La plupart des catalogues de Jardins contiennent seulement l'énumération des espèces que l'on y cultive , rangées par ordre alphabétique ou d'après un système quelconque. Ils ne servent alorsqu'à faire connaître la richesse et à faciliter la correspondance des Jardins entre eux. D'autres catalogues ont plus d'importance pour la science , c'est lorsqu'ilscontiennenldes phrases spel cifiques et même de courtes descriptions faites sur le vivant. U Hortus Cliffortianus de Linné peut être cité comme

un modèle en ce genre. Ils sont encore plus utiles pour la science, quand des botanistes habiles y décrivent de nouveaux genres : tels sont V Hortus Kewensis d'Aiton, augmenté par R. Brown, et le Catalogue du Jardin de Montpellier, par De Candolle. Enfin , dans quelques autres ouvrages aussi nommés Jardins, on ne décrit que les Plantes les plus remarquables. Parmi ccux-

JAll

i., nous citerons YHortus EllhamcniS de Dillen, les Hurtus Schoeiibrun— refais et P' indobonensis de Jacquin , ■-S Jardins de la Mallhaison et de Ccls, itar Venlenat, etc. Les ouvrages périodiques publiés en Angleterre sous :ss noms de Butankal Magazine , l.'ot. Regi.ster, Bot. Cabinet , sciaient bs cette catégorie , si les auteurs ne «produisaient pas le plus souvent un brand nombre de Plantes très-bien t écrites et figurées ailleurs. (o..N.)

J JARDIN DE BOTANIQUE. Hor- • s butanicus. L'étude des Plantes , la i ropagation de celles qui par leur Milité ou leur beauté contribuent au lonheurouaux jouissances de l'Homce civilisé, ont dû leurs plus grands rdgrès à l'établissement des Jardins botanique. Mais il fallait que la tD.laniquelet élevée au rangde scienpour qu'on eût l'idée de cultiver, mns un même lieu, le plus grand 'ombre possible d'espèces diverses ■ ont l'étude servît à l'enseignement , idependammentdes a van lages <|u'on >ouvait en tirer sous le rapport de utilité et de l'agrément.

I Quoique les arts , dans l'antiquité , Jssent en général atteint une baule erfecliou , celui rie la culture des Util tes était resté fort en arrière. Les inruins des Grecs et des Romains se Sduisaient à des potagers destinés à i culture des Plante» culinaires, à de auds vergers pour celle des Arbres uitiers , ou bien c'était des bosquets

lus enebanteurs à leurs yeux, par verdure et la fraîcheur des ouïra ges , que p*r la variété et la beauté ■es Ai bustes qui y croissaient. Trop te soins d'ailleurs étaient nécessaires iux anciens et trop peu de connaissants leur étaient acquises pour qu'ils tassent essayé de naturaliser les Planés des climats chauds, lois înèmc ails auraient pu se les procurer par :>urs fréquen tes coinnumica lions avec >s peuples de l' Afrique, de l'Asieincurc et des Indes-Orientales.

(Cependant leur goût pour les bel- :3 Heurs était poussé souvent jusqu'à oxcès. On dit que le sénat romain crut

J AU

nécessaire de réprimer par des lois la passion dont les citoyens s'éprirent pour les couronnes et les guirlandes.

On dit aussi que sous les empereurs dont la lâcheté et la mollescégalaien la cruauté, les Romains, imitateurs de leurs tyrans , ne se contentaient plus de ces tresses de fleurs , mais qu'ils les entassaient dans leurs lits et leurs appartemens comme pour se procurer une sorte d'ivresse. 11 y a lieu de croire que ces fleurs étaient celles des champs, si nombreuses et si briU lantes sous le beau ciel de l'Italie , ou bien qu'elles appartenaient à quelques espèces seulement cultivées en grand pour l'usage des Sybaites de cette époque. Pline, en effet, citant les Plantes cultivées dans les Jardins de son temps, ne parle, à propos de fleurs d'ornement, que de Roses et de Violettes. Dans les peintures brillantes que les poètes ont tracées des fameux Jardins des Hespéïdes, de Sémiramis et d'Aicinois , ils n'ont point dit, pour en augmenter les

délices , qu'ils fussent embellis de Heurs , et tout fait présumer que ces Jardins n'étaient que des retraites ombragées, arrosées et décorées de divers ninnumens.

Le nombre des Plantes cultivées soit pour l'ornement , soit pour l'utilité, ne s'augmenta pas en Europe durant toute la période barbare du moyen âge. Mais, au treizième siècle , lorsque les Croisés furent obligés d'abandonner aux Sarrasins l'objet de leurs pieuses conquêtes , ils en reçurent , par une sorte de compensation , de légères connaissances , les seules que ces preux mais ignares voyageurs étaient susceptibles d'acquérir; avec quelques notions d'Horticulture, ils rapportèrent de l'Orient plusieurs graines de Plantes utiles^, notre article Fagopyhtjm) en même temps qu'un certain nombre de fleurs d'ornement qui furent conservées dans les couvens des moines, dont elles charmaient la solitude et l'oisiveté.

Ainsi, pendant que l'Europe ne possédait encore aucun Jardin rc-

68 JAll

marquable par ses cultures, un goût très-vit' pour les Végétaux d'agrément, pour les parterres de Heurs et pour les Arbres fruitiers , dominait chez les Orientaux et surtout chez les Persans. A la vérité, cette passion n'a pas eu d'aussi beaux résultats que chez les nations occidentales dont la perfectibilité est un caractère essentiel. Le plus grand plaisir pour les Persans, au rapport de Kaempfer, est de se retirer dans leurs Jardins , d'en construire de nouveaux jusque dans les lieux les plus écartés, d'en tracer eux-mêmes le plan et de diriger leurs cultures. Mais, de même que les Chinois , peuple éminemment stationnaire dans la civili-

sation , ils se bornent à cultiver un certain nombre de Plantes qu'ils affectionnent , sans ajouter à leurs richesses celles qu'ils pourraient facilement faire venir d'autres climats qui , malgré leur éloignement, ont beaucoup d'analogie avec le leur.

Vers le milieu du seizième siècle, la botanique ayant fait quelques progrès, des Jardins furent consacrés à son enseignement. Mais comme cette science était , pour ainsi dire , fondue dans la médecine, on n'y cultiva d'abord que certaines Plantes sur les propriétés vraies ou imaginaires desquelles cette dernière science fondait ses principaux moyens thérapeutiques.

Les professeurs , sous le titre de Simplicistes , y démontraient les Simples et en commentaient les vertus d'après Dioscoride. Rarement leur attention se portait sur des Plantes qui n'auraient pas eu d'application médicale; mais comme heureusement il régnait une croyance universelle , que chaque Plante était flouée d'une vertu particulière, on s'efforçait d'en connaître les nouvelles afin de trouver de nouveaux moyens curatifs ; et ce fut ainsi qu'un préjugé servit à l'avancement des connaissances en botanique. A cette époque cependant, plusieurs princes ou riches particuliers en Italie se passionnèrent pour la culture des Plantes. Ils établirent des Jardins où rien n'était épargné pour se procurer les Végétaux les plus rares et les plus

JAll

beaux. Cet exemple fut suivi par les Allemands , les Belges , les Français et les Anglais qui surpassèrent bientôt les Italiens. Il est même remarquable que la culture des Heurs est maintenant presque entièrement négligée dans cette Italie qui en fut le berceau ainsi que celui des plus belles institutions.

Si nous voulions faire ici l'histoire de l'établissement des principaux Jardins de Botanique et suivre les perfectionnements qu'ils ont subis jusqu'à ce jour, nous risquerions d'excéder les limites d'un ouvrage où tout doit être esquissé à grands traits; il existe d'ailleurs sur ce sujet un excellent Mémoire de Deleuze (Ann. du Mus.

d'Hist. Nat. T. ix, p. 149) auquel nous renvoyons nos lecteurs; ils y trouveront d'intéressants détails sur l'origine et la fortune des Jardins, tant publics que particuliers, qui ont joui d'une certaine célébrité. Cependant nous n'omettons pas de parler des Jardins les plus remarquables de l'époque actuelle, parce que leur splendeur semble donner la mesure de l'état de la science dans les diverses contrées de la terre.

Parmi les Jardins publics que possède la France et qui sont presque en aussi grand nombre qu'il y a de villes un peu considérables, celui de la capitale domine et par sa vaste étendue et par les soins dont il est l'objet de la part d'une savante administration. Cet établissement a reçu, depuis Buffon qui en fut l'intendant, une extension telle qu'on a dû en changer le nom et le décorer du titre de Muséum d'Histoire Naturelle. La botanique n'en est plus qu'une partie; mais dirigé par des hommes aussi profonds que nos honorables maîtres De Jussieu, Desfontaines, et par ce respectable Thouin qui vient d'être enlevé à l'horticulture, le Jardin des Plantes de Paris offre tous les moyens possibles d'instruction. De vastes serres y nourrissent en abondance les Végétaux des climats tropiques; une école de botanique y présente plus de six mille espèces disposées suivant les

milliers naturels; d'immenses carrés sont destinés à cultiver les Plantes d'ornement, les Végétaux utiles, il faut reproduire en

abondance les ■ ombreuses variétés que la culture a mit naître. C'est dans ce JarJiu que Uusieurs de nos contemporains ont uui-sé , par l'étude de la série des êtres uu'on y conserve, les principes fixes uui donnent à la botanique toute la Habilité d'une véritable science; c'est ee ce JarJiu que sont sorties la plupart des Plantes remarquables par :uur utilité ou leur élégance. Le Ca- 3jer qui fait la lichessedes Antilles, as Robiniers, les Erables , les Pavia, ■=js Marronniers , en un mot presque ous les Arbustes qui décorent nos oosquets, ontencoreleurs vieux pèies ians quelques coins du Jardin des liantes de Paris. Les Arbustes de a Nouvelle-Hollande et de l'Améidquc septentrionale y ont singuèiemcnt prospéré. Plusieurs sont ultivés en pleine terre et ne semblent pas beaucoup souffrir de l'in- IJémence des savons. Parmi les Planés des pays chauds , il en est même uuelques-unes qui ont réussi bien auelà île ce qu'on avait lieu d'espérer, • ar jamais , dans leur pairie .elles n'al- .eignent d'aussi grands développemens. Tels sont les Cliamœrops plarés devant l'ampliilhéâtre , le Cactus veruuianus pour lequel on a construit nne maison, le Cèdre du Labyrinthe, le. , etc.

Plus favorisé par la nature , le Jar- Jn de Montpellier, aîné de celui de farts, a l'avantage de nourrir quelques Plantes qui ne vivent pas ou ont très-chétives dans ce dernier. Cependant, malgré l'activité et les taens des proie seurs De Candolle et •Oelile, ce Jardin est loin de pouvoir îui être comparé, quant au nombre :t au choix des espèces cultivées. La orésence d'une école spéciale de mélecine soutient cet établissement au- |uel les habilans de Montpellier paraissent assez inclifférens. Nous pour- ' nions en dire autant de tous les Jar- ! ilins publics des autres villes de ' France, qui néanmoins entretiennent

le zèle de la science chez quelques amateurs et la propagent jusque dans les classes inférieures.

Certains établissemens particuliers en France ont rendu de trop grands services à la botanique pour que nous omettions de les mentionner ici. Ainsi le Jardin de la Mal maison, fondé par l'impératrice Joséphine, était très-connu par ses productions rares et par l'ouvrage de luxe que Ventenat a publié. Cet auteur a également donné les descriptions des Plantes rares que contenait le Jardin de Cels , agronome et membre de l'Institut. Les Jardins particuliers de Joursault , de Noisette, etc. , reçoivent les fréquentes visites des botanistes, et leur procurent la connaissance des Plantes rares et exotiques que les propriétaires de ces établissemens font venir à grands frais, soit directement de toutes les parties du monde , soit indirectement par la voie de l'Angleterre. Près de Paris , les serres du Jardin de Fulchiron à Passy sont célèbres par les beaux Palmiers qu'on y cultive; mais c'est surtout dans celui de Soulange-Bodin, situé à Fromont, près Ris (Seine-et-Uise) , que l'on est enchanté de la variété des Arbres étrangers qui y végètent avec vigueur, grâce aux soins éclairés du savant propriétaire qui les cultive.

En Angleterre, les Jardins publics ne sont pas nombreux, mais en revanche les établissemens particuliers , d'une grande somptuosité , ont beaucoup contribué à répandre dans ce pays le goût de l'horticulture. Près de Londres , le Jardin de Chelsea qui fut donné par un gentilhomme à la com-

Eagie des apothicaires, devint célèbre par les travaux de Miller. Celui de Kew, dont le roi est possesseur, contient un nombre très-considérable de Plantes. Son catalogue, dressé par Alton , est devenu un ouvrage classique , dont la seconde édition est surtout

précieuse parla collaboration du célèbre R. Brown. Il existe dans les autres grandes villes des trois royaumes , des Jardins de Botanique qui

7<j JAÎl

oal acquis plus ou moins de développement, selon l'activité et le mérite des professeurs auxquels la direction en est confiée. Ainsi le Jardin de Glasgow , dont l'existence ne remonte pas plus haut que 1817, atteste, par son état florissant, le zèle éclairé du docteur Hooker. On ne peut lui comparer, quant à la rapidité de ses progrès , que le Jardin de Genève, qui a été fondé à la même époque par notre illustre collaborateur, le professeur De Candolle. Mais , comme nous l'avons dit plus haut , ce sont les établissements particuliers qui font la réputation de l'Angleterre et qui contribuent le plus aux progrès de la science. Les Jardins de Kew et de Chelsea ne sont pas , à proprement parler, publics; l'accès , il est vrai, n'en est pas très-difficile ; mais encore n'y va-t-on pas avec cette liberté dont jouit , par exemple, la population parisienne lorsqu'elle se" porte au Jardin du Roi. Outre ces Jardins célèbres, on en voit de magnifiques dans les environs du Londres , parmi lesquels nous citerons celui de Loddiges , auteur d'un ouvrage bien médiocre sous le rapport de la science , mais qui nous donne une idée à un grand nombre des belles Plantes qu'il cultive.

L'Allemagne et les Pays-Bas ne le cèdent point à la France et à l'Angleterre , quant au nombre et à la beauté des Jardins , soit publics soit particuliers. On doit placer, en première ligne , le Jardin de Berlin , qui , sous la direction de Willdenow, de Link et de Otto , et grâce à la généreuse protection du gouvernement prussien, est probablement le plus riche en espèces de tous les

Jardins publics. D'après la première partie du Catalogue publié par Link, il est à présumer que le nombre s'en élève à près de douze mille. Ce sei ait encore plus qu'en Angleterre où , si l'on s'en rapporte au Catalogue de Sweel pour tous les Jardins des environs de Londres , le nombre est à peu près de onze mille.

Le Jardin de Gaud , dans les Pays- Cas , est surtout remarquable par

JAÉI

les soins qui président à la culture :j des espèces rares cl exotiques. La Hollande , en raison de la passion jf que ses habitants ont toujours eue 1 pour les fleurs (passion qui a quel- t quefois dégénérée en véritable ma- H nie), a possédé de tout temps des Jardins splendides qu'enrichis.saient conl iuuellement les relations de ce r peuple marchand avec tout l'uni- V vers et surtout avec les Indes-Orien- sî taies et la Chine. Aussi les Jardins de i Leydc et d'Amsterdam peuvent-ils 1 être considérés comme les pépinières de tous les autres Jardins du continent. Dans le grand nombre de Jardins particuliers qui se remarquaient en Hollande , il en est un qui a ac- | 1 quis une grande célébrité par la publication d'un des premiers ouvrages c de Linné; c'est celui de Clifffort à [; Harticamp près Harlem. L'Allema-] gne est de toute l'Europe , la partie f ou la Botanique élémentaire est le plus universellement répandue. Elle doit cette supériorité d'instruction primaire à ses nombreuses universités qui toutes sont pourvues de Jardins publics destinés à la démonsrlration des Plantes par des professeurs spécialement chargés de ce soin. Indépendamment de ces Jardins uni-^ vcrsilaires , un grand nombie de princes et de riches particuliers ont fondé des Jardins plus ou moins remarquables. Dans celui de Hclicœnbi unu , l'empereur François I''

poussa au plus haut degré le luxe et l'art de la culture des Plantes étrangères.

Les dépenses qu'il fit pour l'envoi de Plantes exotiques , furent excessives. De très-grands Arbres, des Palmiers , furent expédiés des Antilles par Jacquin , sur un vaisseau frété exprès , puis transportés avec toutes les précautions imaginables de Livourne à Schoenbrunn. L'ouvrage publié par Jacquin , sous le titre d'Hortus Schoenbrunnensis , répond bien par le luxe qu'où y a déployé, à la magnificence du Jardin dont il fait connaître les productions.

. Quelqu'autant que soit le climat des contrées septentrionales de l'Eu-

rope, la culture des Plantes exotiques n'y a pas néanmoins été négligée.

En Suède, sous la direction de Linné , le Jardin d'Upsal fut un des plus florissants de son époque. Dans le Danemarck , celui de Copenhague a été , vers ces derniers temps , considérablement enrichi par les soins de Linné , et par les envois du docteur Wallerius. La Russie , dont la civilisation a été si tardive, n'a plus rien à envier aux régions de l'Europe plus favorisées de la nature. Le Jardin de Pétersbourg , récemment fondé, est placé sous la direction de Fischer : qui a été long-temps à la tête du beau Jardin de Gortchakoff. On dit que le plan en est admirable et gigantesque, et qu'une étendue de plus de cent cinquante mètres en longueur est affectée aux serres chaudes seulement.

Il est vrai que, sur les bords de la Néva , la plupart des Plantes ont besoin d'une chaleur artificielle , car telle est la ri-

gueur du climat , que le I Peuplier d'Italie ne peut y passer l'hiver sans être abrité.

Les pays méridionaux de l'Europe (Où nous avons vu que l'horticulture ; a pris naissance, sont aujourd'hui t fort en arrière , si on les compare aux (contrées septentrionales. Ainsi les Jardins d'Italie ne pourraient entrer en | parallèle avec ceux de France , d'An- ; gleterre et d'Allemagne. Cependant « celui de INaples , donl Tenore a la dii reelion , est remarquable par la beauté de certaines Plantes exotiques qui n'y paraissent pas beaucoup souffrir i de leur transportation.

Le Jardin de Madrid , ce! ui deGoïmbre en Portugal , étaient naguère trèsflorissans par les soins de Zéa , de Lagasca et de Brotero. C'est au zèle de ces infortunés directeurs que l'on doit la propagation d'une foule de Végétaux curieux de l'Amérique méridionale et du Mexique , Végétaux qui font aujourd'hui les ornementdes parterres somptueux du riche , de la chaumière du pauvre et delà modeste croisée de l'arlisian; tels sont, entre autres , le Dahlia cl le Cvboëa. Mais au moment où nous écrivons, tout se ressent

dans la malheureuse Péninsule du mouvement rétrograde que les fanatiques impriment aux bonnes institutions de leur pays. Zéa , qui depuis a été minisli e delà Colombie , et surtout L igasca , persécutés, proscrits, ont fait admirer sur une terre étrangère et leur mérite scientifique et leur couslance dans l'adversité. La botanique n'a donc plus de soutien en Espagne; d'autres intérêts absorbent toute l'attention des hommes puissans de ce pays.

Nous venons dépasser rapidement en revue les principaux établissemens de l'Europe. Il en est encore de très considérables

que nous désirerions mentionner ici , mais cette énumération nous entraînerait au-delà des bornes que nous nous sommes prescrites. C'est ce motif qui nous empêche de parler des Jardins de botanique fondés par les Européens dans.

leurs colonies américaines, asiatiques et africaines; de ceux de l'Ile-de-France, de Calcutta, de Pondichéry , de Cayenne , de Botany-Bay , du cap de Bonne-Espérance, de Ténériffe , de Mexico , de Philadelphie, etc. D'ailleurs nous n'avons sur ces établissements que des documens imparfaits , si ce n'est pour celui de Calcutta qui , suivant les rapports des voyageurs, n'a pas son pareil dans tout le globe. Voici ce qu'en dit Leschenault dans une lettre en date du 10 novembre 1819, adressée au professeur de Jussieu. « Ce Jardin, situé sur les bords du Gange, a plus de deux lieues de tour; le sol en est d'une grande fécondité. Le docteur Wallich, qui le dirige , reçoit tous les moyens de l'enrichir, et il y met toute son application. Le nombre des personnes attachées au Jardin est de trois cent quarante-cinq. Il a des collecteurs sur tous les points de l'Inde qui lui envoient des semences, des Plantes vivantes et des Plantes sèches.

Il possède une belle bibliothèque ; quatorze dessinateurs sont sans cesse occupés à augmenter la collection des dessins coloriés , qui est sans doute une des plus complètes et des plus

belles qui existent. Ces dessins sont d'un grand format et d'une rare perfection. »

Après l'aperçu que nous venons de donner sur les Jardins de botanique existans , il est convenable d'offrir quelques considérations sur les modifications qu'on doit apporter dans la disposition de chacun d'eux, d'après la nature de leur institution et

l'étendue qu'on veut leur assigner. En instituant des Jardins de botanique, les anciens avaient pour but presque exclusif, de procurer la connaissance des Plantes médicinales. Guy de la Brosse, qui fit paraître en 1641 le Catalogue du Jardin des Plantes de Paris , dit expressément que ses Jonctions étaient d'administrer par charité des Plantes aux malades , et d'enseigner leurs vertus à plus de deux cents écoliers accourus de toutes les provinces. Ce médecin annonçait pourtant la culture de beaucoup d espèces nouvelles des Indes , lesquelles (suivant ses expressions) « il falloit connoître par la vue avant que la main se meslat de leur application.

Que si vous hochez la teste , ajoutait-il , pour n'en savoir pas les propriétés , attendez que l'expérience les ait découvertes, et puis on vous les enseignera. » Ces dernières réflexions prouvent que le Jardin des Plantes de Paris fut , dès son origine ,, consacré à la science lors même qu'il avait pour but apparent d'être uniquement destiné à secourir les malades. Aujourd'hui, il n'y a plus de spécialité absolue dans l'établissement des Jardins de botanique; on veut que la science des Végétaux profite , aussi bien que la médecine et les arts, des travaux de l'horticulture. Peut-être pourrait-on reprocher aux fondateurs modernes de donner dans un autre excès , de vouloir atteindre une perfection que les circonstances locales ne leur permettent pas d'espérer. En agissant ainsi, ils restent, d'une part, toujours au-dessous des nécessités de la science, et de l'autre, ils privent les Végétaux importants des

soins qu'ils prodiguent à des Plantes à peu près inutiles.

Dans une grande capitale , où les trésors de l'Etat ne sont point épargnés pour tout ce qui tend à son embellissement , la plus grande extension doit être donnée à un Jardin de botanique,

pourvu que son administration en soit confiée à des professeurs instruits et à des jardiniers intelligens, chez lesquels cependant l'abondance des objets ne soit pas une source d'erreurs et de confusion. Mais il est nécessaire que le directeur du Jardin de botanique d'une ville peu considérable, modère son ambition; il ne faut pas qu'il s' imagine l'emporter sur les grands établissemens, pour la culture de toutes les espèces par exemple , de tel genre , quand il sera privé des représentans d'une foule d'autres genres dont la connaissance est presque indispensable à celui qui veut étudier la botanique ; car on ne doit pas perdre de vue que l'enseignement de la science est le principal objet de l'institution. Cette passion pour la culture d'un, seul genre est au contraire très-louable dans les établissemens particuliers. C'est elle qui enrichit la science d'espèces nouvelles , ou ce qui vaut mieux encore , qui porte la lumière dans le chaos des grands genres, sépare les espèces confusément réunies, et rassemble celles que l'arbitraire ou l'ignorance avaient disjointes.

Lorsque les Jardins publics sont affectés à des établissemens spéciaux , comme ceux des écoles de médecine et de pharmacie , des hôpitaux d'instructions de la marine ou de la guerre , ils doivent être régis sous le double point de vue de l'enseignement des principes de Botanique et de la connaissance approfondie des Plantes usuelles. C'est ici qu'il serait important de s'attacher préférentiellement à la culture, non-seulement des espèces utiles, mais de celles qui sont nuisibles , et surtout d'apporter le plus grand soin dans leur détermination. Le nombre de ces Plantes

est d'ailleurs assez considérable pour que leur élude suffise aux besoins de Renseignement élémentaire.

Avant de 1er miner cet article , nous idcvrions , peut-être, éuu-
 mércr les ivvarilages que la science des Végétaux et l'Economie
 publique ont reîi- "és des Jardins de Botanique; mais chacun de
 nos lecteurs a déjà pressenti Et apprécié ces avantages. Nous a
 liions voulu présenter quelques obsaervations sur le régime inté-
 rieur de xxs établisseinens , si nous n'avions rétléclii queces ob-
 servations ne pourraient être générales et qu'elles devraient se
 modifier suivant une foule de circonstances , variables d'un pays
 .i un autre, et trop nombreuses, par -conséquent , pour que nous
 puissions les indiquer ici. (g..n.)

JARDINIER, ois. L'un des noms vvulgaires de l'Ortolan, y. Bru
 INT.

JARDINIÈRE, jns. Le Carabe doué, la Courtilière et d'autres
 Insccttes qui attaquent les racines polagèires, soit à l'état parfait,
 soit à celui ide larves, portent vulgairement ce inom dans la plu-
 part des départemens île la France. (li.)

JARDINIÈRE, moll . (Geoffroy.) 5Sy n . d 'Hélix hortensis .
 (b.)

JARET. rois. L'un des noms vulgaires du Spart/s Moëna , L.
 V, Spare.

IDelaroche , qui éci il JARRET , dit que ■ c'est le Sf/iaris aux
 îles Baléares, (u.)

JARGON, min. ^.Zircon.

JARGONEELE. bot. piia.v. Variété de Poire d'été. (b.)

JARNOTE. bot. piian. y. En-

NNOTE.

JARRA. bot. piian. L'un des unoms vulgaires du Genêt dans
ccr- Mains départemens de la France, (b.)

* JARRET, pois. r. Jaret.

* JARRET IMPÉRIAL, pois. (De- Uaroclic.) Syn. de Sparts
Zébra iaux îles Baléares. (b.)

JARRETIÈRE, rois. y. L'En-

IIDOI'E.

* JARRI-NÉGRIER. bot. phan.

Le Quercus Tuza dans quelques parties du centre de la France.
(u.)

JARS. ois. On appelle ainsi communément le mâle de l'Oie do-
mestique. A'. Canard. (DR..Z.)

* JASERAN. bot. crypt. Ancien synonyme d'Oronge vraie, par-
ticulièrement dans les Vosges, (b.)

JASEDR. Jiombyciuora. ois. Genre de l'ordre des Omnivores.
Caractères :

bec court, droit, élevé ; mandibule supérieure dentée, faible-
ment arquée vers l'extrémité ; narines placées à la base du bec ,
ovoïdes , recouvertes de poils rudes dirigés en avant; qua:re
doigts, trois en avant, l'extérieur soudé à l'intermédiaire; un
pouce; ailes médiocres; première et deuxième rémiges les plus
longues.

Les ornithologistes avaient coufendu successivement parmi
les Merles , les Pie-Grièches et les Cotinga* , les deux seules es-
pèces qui, jusqu'à présent, composent tout ce genre.

Quoique la séparation eût été depuis long temps indiquée par Schwenckfeld , elle n'a été faite que récemment par Vieillot; Temminck et Cuvier l'ont ensuite confirmée en l'adoptant.

D'après le nom latin imposé à ce genre , il semblerait que les Jaseurs dussent faire une consommation habituelle de Lépidoptères nocturnes et de Insectes ailés; cependant ils ne les chassent que lorsque leur nourriture favorite, qui consiste en baies et en fruits, vient à manquer absolument.

Ces Oiseaux sont voyageurs, et quoique l'on eût appelé Jaseur de Bohême l'espèce européenne, on ne la trouve pas plus fréquemment dans ce pays que partout ailleurs à la même latitude ; il paraît qu'elle réside de préférence et plus longtemps dans les contrées septentrionales, qu'elle s'y occupe de sa reproduction dont les détails sont encore peu connus; elle ne quitte ces lieux que lorsqu'un excessif abaissement de température en rend le séjour inhabitable , et c'est à ces intempéries locales que nous devons de voir accidentelle-

ment ces jolis Oiseaux dans nos provinces tempérées. Quoique l'on assure que les migrations des Jaseurs nous amènent ordinairement ceux-ci en troupes si nombreuses que le ciel en paraît obscurci , jamais nous n'avons vu ces troupes se composer de plus de cinq ou six individus : du reste , il ne serait pas impossible que , dans les pays du Nord, ces Oiseaux aient des mœurs plus sociables, et il est même assez probable que les forêts boréales formées d'Arbres résineux, dont quelques espèces offrent en abondance des fruits charnus , sont des points de réunion pour les Jaseurs qui peuvent encore ne renoncer à la vie sociale que lorsqu'une circonstance fortuite contrarie totalement leurs habitudes, et les oblige à se disperser. Le nom français donné à

ces Oiseaux n'est pas plus heureux que le synonyme latin; en effet, il semblerait que les Jaseurs se fissent remarquer par un caquet soutenu; cependant leur prétendue jaserie se borne à un petit cri , à un gazouillement très-ordinaire qui n'est pas plus souvent répété que celui des autres Oiseaux. Peut-être ce gazouillement, plus accentué au temps des amours, époque peu connue et dont aucun auteur ne parle, aura-t-il paru à plusieurs observateurs une sorte de caquelage, en raison du nombre d'Oiseaux réunis qui le faisaient entendre simultanément. C'est sur quoi nous n'avons pas été à même de nous éclairer. Quelques auteurs prétendent aussi que ces Oiseaux sont un excellent gibier; il est possible que , dans les contrées où ils sont aussi communs que les Merles et les Grives le sont ici, leur chasse présente les mêmes avantages.

GiiANi) Jaseur, *Ampelis Garrulus* , Gmel.; *Bo/nbycilla Eohe-mica* , Brjiss. ; *Bombycluora pol/ocœlla* , Meyer ; *Boinbycù'ora Garrula* , Ihiff. , pl. eul. 26k Parties supérieures d'un cendré vineux; le; inférieures d'une teinte un peu plus claire; plumes de la huppe longues et disposées en huppe ; front , bandeau , sourcils et

gorge noirs; rémiges noires, terminées par une tache angulaire blanche et jatine, les secondaires blanches à l'extrémité qui se termine par un prolongement cartilagineux en forme de palette , d'un rouge vif; tectrices caudales inférieures d'un brun marron ; lectrices noires, terminées de jaune; bec jaunâtre, avec la pointe et la mandibule inférieure noires; pieds noirâtres. Taille, sept pouces et demi. La femelle a moins de noir à la gorge , et seulement quatre ou cinq petites palettes ronges aux rémiges d'Europe.

Petit Jaseur , Bomby cilla Cedrum, Vieill.; Garrulus americanus , Dum. ; Ampelis Garrulus, var. La th., Ois. de l'Amérique septentrionale , p-.

57. Parties supérieures d'un cendré roussâtre; les inférieures moins foncées en couleur ; huppe composée de plumes effilées , moins longues et moins soyeuses que celles du grand Jaseur; bande noire du front entourant les yeux et venant se terminer sur les joues ; gorge noire ; croupion d'un gris ardoisé; rémiges cendrées, frangées de grisâtre, dont quelquesunes des plus rapprochées du corps sont terminées par une étroite palette ronge; rectrices terminées de jaune; menton blanc; poitrine d'un gris roux*; ventre jaunâtre; abdomen et tectrices caudales inférieures gris ; bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces trois quarts. De l'Amérique septentrionale où elle niche dans les forêts, sur les Cèdres. On assure que la ponte qui se fait d'ordinaire en juin, se renouvelle en août. (dillz.)-

JASIONE. Jasione. bot. phan.

Genre de Plantes de la famille des Campanulacées et de la Pentandrie Monogamie , mais que Linné avait placé dans la Syngénésie Monogamie, parce que les anthères sont légèrement soudées entre elles par leur base. Ce genre se compose de trois à quatre espèces annuelles ou vivaces, ayant leurs fleurs disposées en capitules globuleux, environnés à la base d'un involucre polyphylle, dont les

lobes sont quelquefois disposées sur deux rangées. Chaque fleur offre un calice soudé par sa partie inférieure au tube avec l'ovaire qui est infère, ayant son limbe découpé en cinq divisions étroites; une corolle monopétale fendue presque jus-

qu'à sa base en cinq lanières étroites, linnéaires et dressées ; cinq étamines insérées tout-à-fait à la base de la corolle, beaucoup plus courtes qu'elle, rayant les filets grêles et dressés, et les anthères à deux loges bilobées à leur base où elles sont légèrement soudées entre elles. Coupé transversalement l'ovaire qui est infère offre deux loges contenant chacune un très-grand nombre d'ovules attachés à deux trophospermes hémisphériques | placés sur le milieu de la cloison. Le style est long, renflé dans sa partie supérieure ou il se termine par un stigmate allongé, glanduleux, velu et bilobé. Le fruit est une capsule globuleuse couronnée par les lobes du calice, s'ouvrant seulement par son sommet au moyen d'une ligne transversale. Trois espèces de ce genre croissent en France, savoir : *Monarda* : *monarda*, L., très-commun dans les lieux secs et sablonneux, aux environs de Paris; *Jasione* : *monarda*, L. /.

humilis, l'un et l'autre vivaces.

JASME. *Jasione* ph. an. (Daléchamp.) ; Syn. de *Androsace* *filluosa*, L.

JASMIN. *Jasminum*. bot. tian. Ce genre de la Diandrie Monogynie, L., forme le type de la famille des *Jasminées*. Les auteurs modernes y réunissent

- sent h; genre *Mugorium* de Jussieu,
- qui n'en diffère que par le nombre des divisions du calice et de la corolle.

Les Jasmins, dont on compte aujourd'hui au moins une quarantaine d'espèces, sont des Arbustes; quel- • quefois sarmenteux et grimpans, originaires des Indes-Orientales, d'Ail-

rique.de la Nouvelle -Hollande ou i du lillor.-d de ia Méditerranée. Leurs feuilles sont opposées, très-rarement alternes, simples ou composées. Leurs fleurs , qui généralement répandent

JAS f5

une odeur agréable , sont blanches , quelquefois jaunes ou roses , pédonculées et placées soit à l'aisselle des feuilles, soit à l'extrémité des rameaux. Chaque fleur offre l'organisation suivante : un calice monosépale, turbiné , à cinq ou huit divisions plus ou moins allongées , quelquefois très-courtes (./ . odu/alinsimum' } ; une corolle monopétale , hypocratériforme, à tube long et grêle , à limbe plane , à cinq ou huit lobes, d'abord emboîtée les uns dans les autres et tordus en spirale avant l'épanouissement de la fleur ; deux étamines sessiles, attachées à l'intérieur du tube; un ovaire libre , presque globuleux , à deux loges contenant chacune deux ovules suspendus et apposés. Le style est ordinairement long et grêle , terminé par un stigmate renflé et bifide. Le fruit est une baie profondément bilobée cou didyme, à deux loges contenant chacune une ou deux graines; l'une des loges avorte quelquefois , et alors la baie semble déjetée d'un côté. Les graines contiennent un.

embryon dressé , renfermé dans un endosperme mince dont la plupart des botanistes ont méconnu l'existence.

Un grand nombre d'espèces de Jasmin sont cultivées dans les jardins. iNous mentionnerons ici les plus intéressantes.

f Fleurs jaunes.

Jasmin fruticieux ou à feuilles DE CYTISE , *Jasminum fruticana* , L. Oïginaire des parties centrale et méridionale de la

France et de l'Espagne, cette espèce forme une touffe ou buisson de trois à quatre pieds d'élévation. Sa lige est dressée, rameuse; ses rameaux verts portent des feuilles persistantes, composées de trois folioles, vers la partie inférieure, réduites à une seule foliole vers la partie supérieure des rameaux. Les Heurs sont jaunes, inodores, placées au nombre de deux à trois à l'aisselle des feuilles supérieures. Ses baies sont didymes, noirâtres. On la cultive dans les jardins où elle fleurit pendant la plus

grande partie de l'été. Quoique peu délicate sur la nature du terrain, cette espèce préfère une terre légère.

Elle craint les hivers rigoureux pendant lesquels elle doit être recouverte. On la multiplie de marcottes ou de rejetons.

Jasmin odorant, *Jasminum ocloratissimum*, L. On l'appelle encore Jasmin Jonquille, à cause de la couleur et de l'odeur de ses fleurs, assez semblables à celles du Narcisse Jonquille. Cette belle espèce, qui nous vient de l'Inde, forme un petit Arbrisseau de trois à six pieds de hauteur. Ses feuilles sont persistantes, alternes, composées d'une seule ou de trois folioles assez grandes, luisantes et d'un vert agréable. Ces folioles sont ovales-obtuses. Les Heurs sont grandes, d'un beau jaune, d'une odeur extrêmement suave, portées sur des pédoncules triflores qui naissent du sommet de la tige. Cette espèce doit être rentrée en orangerie pendant l'hiver. On la multiplie de graines ou de marcottes.

ff Fleurs blanches ou rosées.

Jasmin officinal ou ordinaire, *Jasminum officinale*, L. Sous-Arbrisseau dont la hauteur varie beaucoup.

Ses rameaux sont longs , effilés et glabres. Ses feuilles opposées sont profondément pinnatifides et paraissent composées ordinairement de sept folioles ovales -aiguës , entières, les trois supérieures étant souvent confluentes entre elles par leur base. Les tuteurs , blanches et d'une odeur très-forte et très-suave, sont disposées par petits bouquets auxiliaires et pédonculés. Chaque fleur elle-même est ensuite pédicellée. Son calice offre cinq lanières linéaires , aiguës , dressées. Le Jasmin est une Plante indienne , naturalisée depuis un temps immémorial dans toutes les contrées de l'Europe, où on la cultive non-seulement comme Plante d'ornement , mais aussi pour extraire le principe odorant de ses fleurs. C'est particulièrement en Provence que le Jasmin est ainsi cultivé pour l'usage de la parfumerie.

Nous en avons vu des champs entiers aux environs de Grasse et de Nice.

Autrefois très-employées comme antispasmodiques , les tuteurs de Jasmin sont aujourd'hui presque entièrement inusitées en médecine. Il est de même de leur eau distillée que l'on faisait entrer à la dose d'une à deux onces dans les potions calmantes.

Cette espèce se cultive en pleine terre ; quelquefois on la place le long des murs et des habitations , qu'elle ne tarde pas à recouvrir de ses rameaux longs et flexibles. En le taillant et l'arrosant souvent , le Jasmin donne des fleurs pendant presque toute la belle saison.

Jasmin a grandes fleurs , *Jasminum grandiflorum* , L. Cette belle espèce, qui vient de l'Inde et qu'on désigne vulgairement sous le nom de Jasmin d'Espagne, a beaucoup de ressemblance avec la précédente.

Gomme elle , c'est un sous-Arbrisseau à rameaux longs et flexibles. Ses feuilles se composent de sept folioles ovales-obtuses ; les trois supérieures souvent confluentes par leur base. Les fleurs sont beaucoup plus grandes que dans l'espèce précédente, blanches en dedans, rougeâtres à leur surface externe ; les lobes de la corolle sont obovales-obtus. Ces fleurs répandent une odeur très-agréable. On cultive aussi cette espèce en Provence pour en retirer le principe aromatique. Le Jasmin d'Espagne se multiplie en le greffant en fente sur le Jasmin ordinaire.

Jasmin des Açores , *Jasminum Jzoricum* , L. L'une des plus jolies et des plus agréables espèces de ce genre; il forme un buisson de trois à quatre pieds d'élévation , dont les rameaux sont garnis de feuilles opposées , composées de trois folioles cordiformes, grandes, glabres, d'un vert agréable et luisantes à leur face supérieure. Les fleurs sont blanches et forment des bouquets à la partie supérieure des ramifications de la tige.

Ce Jasmin, qui demande à être rentré dans l'orangerie, se multiplie de graines et de marcottes.

On cultive encore plusieurs autres espèces de ce genre; telles sont les *Ifasminum humile* d'Italie, *J. votubile* \ lu Cap; *J. mauritanum* del'Ile-de- France ; *J. geniculatum* des îles de la mer du Sud ; *J. triumphans* , etc., etc. (A..R.)

Le nom de Jasmin a été étendu , [par des voyageurs peu instruits et [par des jardiniers, à d'autres Arbustes qui n'y ont aucun rapport , comme le *Iljfcium afrum*, qu'on appela Jasmin t d'Afrique; le Gayac, Jasmin d'Amérique; Je *Plumeria rubra* , Jasmin fen Arbre; le Philadelphie corollarius , Jasmin bâtard ou blanc ; ;une Clématite et le Lilas , Jasmin sblt.v; le Gardénia /lu-

rida, Jasmin iduCap; le Bignonia radicaus, Jas- NBfin de Virgine, etc., etc. (b.)

JASMIN DE MER. polyp. Quelques marchands d'objets d'histoire imaturelie donnent ce nom au Millepore tronqué. Pr. Milléfore.

LAM..X

JASMINÉES. Jasmineœ. bot. piiax.

FFamille exlrêmement naturelle appartenant à la classe des Plantes dicotylédones monopéiales hypogynes, et que l'on peut caractériser ne la ■ manière suivante : les Heurs sont généralement hermaphrodites, excepté Idans le seul genre Frêne oh elles sont ; polygames. Le calice es! monosépale, tÂurbiné dans sa partie inférieure, diwisé en quatre, cinq ou huit lobes; Ida corolle est monopétale, régulière, <à quatre, cinq ou huit lobes, tantôt Idncombans et légèrement lo.dus, tantôt se touchant seulement par les abords avant leur épanouissement; >iqueunquefois elle est fendue jusqu'à sa boâsc de manière qu'elle est fermée de [quatre à cinq pétales distincts {Or/ii/s, Chionanthus). Elle manque quelquefois entièrement ainsi que le calice (Fraxinus , si délia ligustrina). Les étamines sont généralement au nomt'bre de deux , insérées à lu corolle , ayant leur filet couit et leur anthère idntorse , à deux loges, s'ouvrant par un sillon longitudinal. L'ovaire est libre, sessile au fond de la fleur,;> deux

loges contenant chacune deux ovules suspendus , c'est-à-dire naissant de la partie supérieure de la cloison et pendans dans la

loge. Le style est simple, terminé par un stigmat bilobé. Le fruit offre d'assez grandes différences dans les différents genres par suite d'avortemens presque constans.

Il est tantôt sec, déhiscent ou indéhiscent, à une seule ou à deux loges, qui contiennent une ou deux graines; ou bien il est charnu, à une ou à deux loges quelquefois osseuses. Les graines se composent d'un tégument propre, membraneux, mince ou quelquefois épais et charnu, d'un endosperme blanc, charnu ou légèrement corné, quelquefois très-mince et comme membraneux, et d'un embryon dont la radicule cylindrique, quelquefois très-courte, correspond au hile. Les Jasininées, telles qu'elles ont été circonscrites par Jussieu, sont des Arbustes, des Arbrisseaux ou même de très-grands Aibres dont les feuilles généralement opposées, très-rarement alternes, sont simples ou composées. Les Heurs sont ou placées à l'aisselle des feuilles ou formant des grappes pyramidales à l'extrémité des rameaux.

Jussieu {Gêner. Plant.) avait formé de ux sections dans sa famille des Jasininées, suivant que ses genres ont le fruit sec cl capsulaire ou charnu.

A la première île ces sections appartiennent les genres Nyc-tanlhes, Lilac, Hebe et Fraxinus; à la seconde les genres Chio-nantlius, Olea, Phillyrea, Mogorium, Jasminum et Ligustrum.

Vcnlenat (Tableau du Rcg. Vég.) fit deux familles distinctes des deux sections établies par Jussieu. 11 nomma Lilacées celle qui renferme les genres à fruit capsulaire, et retint le nom de Jas-minées pour celle dont les genres ont le fruit charnu.

Link et Iloll'mansegg, dans leur Flore du Portugal, firent une famille des Oléinée, dont le genre Olea devint le type. Cette fa-

mille fut adoptée et mieux caractérisée par R. Browu [Pivdr. Flor. Nov.-Ulland.) qui ne

7 a .TAS laissa parmi les Ja s minées que les seuls genres Nyc-
tanthes et Jasmiirium , réunissant à ce dernier le genre Mogotiu-
ni de Jussieu. Mais iiqu s avons prouvé (M cm. de la Soc. d'Hist.
Nat.

11. il) que ces deux familles ne sauraient être séparées l'une de
l'autre, et qu'elles n'en forment réellement .qu'une seule, ainsi
que l'avait établi l'illustre auteur des Familles Naturelles. En ef-
fet, les caractères que l'on a donnés pour distinguer ces deux
groupes sont erronés. Ainsi on a dit que dans les Jasminées les
loges sont monospermes et les graines dressées , taudis qu'elles
sont disperines et que les gi aines sont suspendues dans les Oléi-
nées. Mais il est certain que dans l'ovaire des Jasminées on
trouve deux loges contenant chacune deux ovules renversés, aus-
si bien que dans les Oléinées. L'endosperme , que l'on avait dit
manquer dans les Jasmins , y existe toujours , quoiqu'il soit plus
mince, et dausl'iin et l'autre groupe la pointe de la radicule est
constamment dirigée vej'S le bile, c'est-à-dire vers la base de la
graine. Il n'existe donc aucune différence marquée entre les Oléi-
nées et les Jasminées, qui doivent être réunies en une même la-
mille. Les genres qui forment la famille des Jasminée s peuvent
être partagés en deux sections, suivant que leur fruit est sec ou
charnu.

Fc section. — Fruit sec.

(Lilacées, Vent.)

Lilae , Ton m. , Jtissl; Kangiurn , Juss.; Hebe , Comm., Juss.;
Fontanesia , Labill.; Schrebera, Roxb. ; F rosinus, L. ; Nyclanthes

, L.

JP section. — Fruit charnu.

(Jasminées, Vent.)

Chionanthus, L.; Nolea, Vent., R. Brown; Borya, Willd.; Noronha, Du Petit-Thouars; Olea, L.; Phillyrea, L.; Tetrapilus, Lour.; Ligustrum, L., et Jasminum, L.

JASMINOIDS. bot. n. an. (Tournefort et Willd.) V. Cestrum. (is.)

JASMINUM. bot. n. an. V. Jasmin.

* JASMIN. ins. Espèce de papillon de la division des Chevaliers grecs de Linné. (b.)

JASMIN. Jasmin. bot. n. an. H.

Cassini (Bull., de la Soc. Phil., octob. 1815) avait proposé sous ce nom un nouveau genre de la famille des Synanthérées, et de la tribu des Inulées. Mais il n'en avait point indiqué les caractères, et il y avait fait entrer mal à propos les Ertgeria foetidula et longifolia, qui sont de vrais Erigeron, quoique toutes les fleurs de leurs calathides soient de couleur jaune. Il a depuis reconnu et rectifié son erreur en restreignant le Jasmin à un sous-genre de la section des Inulées. Le Jasmin est, et dont voici les principaux caractères :

l'ovaire composé d'écaillés imbriquées et linéaires; réceptacle plane, fovéolé ou alvéolé; calathide dont le disque se compose de plusieurs fleurs régulières, hermaphrodites, et la corollette de demi-fleurons sur un seul rang, en languettes et femelles; ovaires hispides, surmontés d'une aigrette double, l'ex-

térieure courte , composée de poils distincts , l'intérieure longue composée de poils inégaux et légèrement plumeux.

L'espèce qui peut être considérée comme type de ce sous-genre , a été nommée par l'auteur *Jasoniaradiata*; c'est *Y Erigerait tiiberosum* , L., ou *Initia lubeivsa* de la Flore Française.

Cette Piaule croît dans les montagnes du midi de la France. Une seconde espèce a été ajoutée à la précédente sous le nom de 1. *discuidea* ; elle était cultivée au Jardin des Plantes; de Paris, mais Cassini a négligé d'observer ses caractères spécifiques.

JASPE. MIN. Quartz Jaspe de Haiiy.

Substance résultant du mélange de la matière quarzeuse avec différentes matières colorantes , ayant une cassure terne et compacte et des couleurs plus ou moins vives, jointes à l'opacité. Les variétés rouges et jaunes

doivent leurs couleurs à l'oxide de Fer ; la variété verte est colorée tantôt par l'oxide de Nickel et tantôt par la Clilorite ou la Diallage; /autres sont redevables de leurs teints à des matières argileuses. Les Jaspes noirs ou Phénix doivent la leur

I l'Anthracite. Les Jaspes sont susceptibles de poli et s'emploient dans des usages d'ornement et la bijouterie.

— On trouve ces substances dans les terrains anciens , en l'orme de couches ; de peu d'épaisseur , divisées par les fissures naturelles ou fragments à peu

de homogénéité Elles sont quelquefois mélangées de Manganèse oxydé et d'Argile, et se décomposent lorsqu'il y a surabon-

dance de Fer et Ice Manganèse. — On trouve aussi du iaspe dans les terrains modernes , nais seulement en amas et non en uouche.i. Il s'y rencontre oïdinaireneut dans les Argiles sablon-neuses un des sables ai gilifèi es. On a distingué par des noms particuliers les dif- •éreiites variétés de Jaspe, d'après les "Ou-leurs qu'elles présentent, surtout lorsqu'elles sont taillées.

Jaspe agatiié. Mélange de J.i.-pe ; t d'Agathe dans le même morceau.

Jaspe égyptien , ou Caillou d'Eyppte, offrant des bandes contournées d'un brun foncé sur un fond l'un jaune brunâtre. On le trouve ■ous la forme de cailloux roules dans i désert à l'est du Caire.

Jaspe fleuri , offrant des taches et ces mélanges de plusieurs couleurs, •armi lesquelles le vert domine.

Jaspe Onyx et Jaspe rubanné.

composé de bandes successives diverlement colorées, tantôt circulaires

I I tantôt parallèles.

Jaspe panaché. Mélange de coueurs distribuées sans ordre.

Jaspe Porcelaine ou Porcei.lam'E. Thermantide jaspoïde, Uaiiy.

iubstanec ayant l'apparence d'un iaspe, mais qui est d'une toute autre lature. C'est une matière argileuse ijui a été altérée par le contact des >ochcs pyrogènes.

Jaspe sanguin. Jaspe ou plutôt Agathe d'un vert obscur dont le fond

JAU

est parsemé de petites taches d'un rouge foncé../7'. Héliotrope

Jaspe schistoïde, Jaspe noir ou Piitanite , 11. Coloré par l'Anthracite. 11 fournil des Pierres de Touche

qui ne sont pas très-estimées à cause de leur trop grande dureté, (g.del.)

JASPEE. iNs. Nom vulgaire du Phulura syriugaria. (g.)

* JASSE. ins. V. Tasse.

* JATABOCA. bot. piian. Marcgravia désigne sous ce nom , ci comme un grand Roseau , une espèce de Bambou brésilien dont les entre-nœuds servent de cruche pour conserver et transporter l'eau. (n.)

J A ï A ROM. Jalaron us . con ci r .

C'est le nom géographique qu'Adanson a proposé (Coq. du Sénégal, pl. 15) pour des Coquilles que Lamarck a réunies sous le nom de Cames, y' . ce mot.

Le même auteur a nommé Came anuelé , Ckqma creulata, l'espèce décrite et figurée par Adanson.

* JATI. bot. piian. Même chose que C.ijii-Jati. PT. ce mot. (b.)

JATOU. Mo i , i . Adanson (Coq. du Sénégal. , pl. g, fig. 21) a ainsi nommé une Coquille du genre Murex ; c'est le Murex gibbusus de Lamarck cl Le Murex Lingua ve/veciuade Chemnitz.

/' . Murex. (d..u.)

JATROPIIA. bot. pu an. F, Mé-

DICINIERi

JAUGUE. bot. piian. Et non J aube ou Jauge. h'U/ex européus daus les Landes arjuianiques que couvre , en certains lieux sablonneux , cet Arbuste déchirant, (r.)

JAUMEA. bot. pu an. Le genre ainsi nommé par Persoou estle même que le Kleinia , déciit en i805 par Jussicu. V". Kleinia. (a.ii.)

JAUNEAU. bot. rnAN. L'un des noms vulgaires de la Ficaire dans les i.épartemens du centre de la France.

(il.)

JAUNE ANTIQUE, min. Sorlô de

8o JEA

Marbre employé par les anciens. V.

Marbre. (a.r.)

JAUNE DE MONTAGNE, min.

Espèce d'Ocré. V. ce mot. (a. n.)

JAUNE D'OEUF, moix. Nom vulgaire et marchand du Nerita-pritellus, L. On nomme aussi Jaune d'oeuf aplati le Nerita Albu-

men. (b.)

JAUNE D'OEOF. bot. On a donné indifféremment ce nom au fruit du Caïmitier et à l'Oronge vraie, (b.)

* JAUNET. pois. Nom vulgaire du Doré , espèce du genre Cheilion.

V. ce mot. (b)

JAUNET D'EAU, bot. than. L'un des noms vulgaires du Nénuphar jaune. V. Nénuphar. (b.)

JAUNGHILL. ois. Espèce du genre Tantale. V. ce mot. (b.)

JAUNOTTE. bot. cbyft. V.

Blanchette.

* JAVAN. ois. Espèce du genre Calao. P. ce mot.

* JAVANAISE, rept. oph. (Daudin.) Espèce du genre Vipère, (b.)

* JAVAR. bot. phan. (Leschenault.) Syn. de Chou palmiste chez les Javanais. (b.)

JAVARI. mam. Syn. de Pécari.

JAVELOT, rept. oph. Espèce du genre Erix. V. ce mot. (b.)

* JAVUS. pois. Espèce du génie Sidjan. V. ce mot. (b.)

JAYET. min. V. Lignite.

* J E AN-BOULAN G. pois.

(Ruysch.) C'est du genre Bâliste qu'il faut rapprocher ce Poisson d'Amboine peu connu, quia la peau très dure, dont la couleur est jaune, avec des raies bleues, et la caudale semilunaire rouge. (b.)

JEAN-LE-BLANC. ois. Espèce du genre Faucon, sous-genre Aigle. f~.

ce mot. (dr..z.)

JEANNETTE, bot. phan. Syn. de Xi-anissus 2'oetici/s, L. P. Narcisse.

IEF

* JEAUNELET. bot. crypt. L'un des noms vulgaires du Merulius Cantarellus. (b.)

JECK.O. rept. saur. Pour Gecko.

V. ce mot. (b)

JEFFERSONIE. Jeffersonia. bot.

piian. Genre établi par Barton {ylct.

Soc. Am.% 3, p. 354) pour le Podophyllum dip/iyllum de Linné et qui fait partie de la famille de Podopli^llées et de l'Octandrie Monogynie, L.

Ce genre se compose d'une seule espèce , *Jeffersonia binata*, Barton , /oc. cit. cum ico/ic , ou *J. Bartonis* , Michx. , ou *J. diphylla* , Pers. Plante vivace , originaire des vallées ombragées de l'Amérique septentrionale.

Ses feuilles sont toutes radicales, longuement pétiolées , sub-conjuguées , fendues du sommet à la base en deux lobes aigus et un peu obliques ; elles sont très-glabres et d'une teinte glauque h leur face inférieure. Les pédoncules radicaux sont simples , dressés, un peu plus longs que les feuilles et les fleurs. Le calice est formé de trois à cinq folioles lancéolées, un peu concaves et caduques; la corolle de huit pétales assez semblables aux sépales du calice. Les étamines , au nombre de huit , opposées aux pétales, hypogynes comme eux, ont leurs filets très-courts , leurs anthères à deux loges s'ouvrant par une sorte de valve qui s'enlève de la partie inférieure vers la supérieure , comme dans les Berbéridées. L'ovaire est libre, allongé, à une seule loge, contenant un assez grand nombre d'ovules attachés à un trophosperme longitudinal. Le style est court , terminé par un stigmate pectiné à quatre lobes. Le fruit est une capsule ovoïde, terminée à son sommet par une pointe mousse , offrant à l'extérieur une ligne longitudinale, saillante, qui correspond au point d'insertion des graines , et s'ouvrant vers sa partie supérieure par une scissure transversale incomplète.

* JEFFERSONITE. min. Variété de Pyroxène augite découverte dans

ces Etats-Unis d'Amérique par le professeur Keating. (c.d.l.)

* JEJUNUM, zool. V. Intestin.

JEK. rept. oph. Le Serpent bré-

lilien mentionné sous ce nom par lluysch qui en rapporte des cho-es ixtraordinaires, paraît être une Coë;ilic exagérée. V. Coe-cilie. (b.).

JELIN. MOLL. Arlanson (Coquill.

!Ju Sénég. , pl. il, lig- 6) rapporte à son genre Vermet un tube lestacé qui, ce nous semble, est une véritable Sermle. Linné l'a placé dans ce genre r>ous le nom de Scrpula i/itesli/ialis.

W. Sertule et Vermet. (d..h.)

JELS12MLNUM. bot. pu an. Syn.

Ile Jasminum et de Jasrné dans quelques botanistes anciens. (b.)

JENAC. moll. Nom sous lequel \ldanson a décrit une petite es-pèce ile Crépidule que Linné a désignée •lions le nom de Patella Gorensis , et ljuì n'est probablement qu'une variéé de la Crépi-dule unguiforme de LLamarck. (D..H.)

* JENSEN. ois. Espèce du genre Canard. V. ce mot. (B.)

JEU BOA et JERBU. mam. Syn.

ide Gerbo. f . ce mot à l'article C i:r- «01SE. (b.)

JERNOTTE. bot. ph an. Même e chose qu'Ernotle. F. ce mot. (b.)

JEROSE. bot. m an. On a proposé ;ë nom pour désigner en français le { ;çeh re Anastatica. F. ce mot. (b.)

' * JESES. fois. V. Jesse et Able.

• JESITE. Jesites. moll. Monlfort

. il placé parmi ses Polybalames {Cun-
i -fil. Syst. T. i, pag. 10-j) un corps
; 'adhérent enroulé comme un Spiror-
I ie. mais diyiaé par plusieurs cloisons-
. <<Soldani avait déjà l'ait connaître ce
. :orps ; il est figuré dans le Te.stacea
. '■Muruscop. de cet auteur, pl. 30, vas.
; \A\$, x, également parmi les lJoly—
, haiames. Quoique l'on sache aujourd'iui que plusieurs es-
pèces de Gépha-
I <iopodns vivent adhérentes à la manière
| les Spirorbes , celui-ci en a si bien
\$ ee port et la structure que l'on doit

JEU

rester dans le doute jusqu'à ce que des observations nouvelles viennent confirmer ou détruire l'opinion de ces auteurs. On sait d'ailleurs qu'il existe un assez grand nombre de Serpules qui se cloi>onnent par suite des accroissemens de l'Animal ; plusieurs Siliquaires sont dans ce cas ; il n'est donc pas impossible de penser que ces petits corps appartiennent à des Annclides qui se sont irrégulièrement cloisonnés. Le doute que Férussac a conservé en

rapportant ce genre aux Céphalopodes , pourrait servir à continuer notre opinion. (o..ll.)

JESON. moll. (Adanson, Coquill.

du Sénégal, pl. i5, lig. 8.) Syn. de Cardita crawicoi/a, Lamarck. (d..h.)

JESSE. Jeses. pois. Syn. de Chevaune, espèce d'Able. y. ce mot.

JET D'EAU MARIN, acal. Quelques auteurs ont donné ce nom aux Ascidies à cause de l'eau qu'elles lancent lorsqu'on les comprime. Cette eau est quelquefois irritante et produit, dit-on, des pustules ou d'autres éruptions sur les parties du corps qu'elle frappe. '(lam..x.)

JEUX DE VAN-IELMONT. Ludus Ielmuillii. min. Concrétions pierreuses , renfermant dans leur intérieur des prismes courts à quatre pans, qui, brisés, 1 essemblent a des cubes ou dés à jouer. Van-Ielmont les avait appelés Luiius Parace/si , et leur attribuait de très-grandes propriétés. Elles sont composées ou de calcaire marneux gris de fumée , li ès-compacte et même susceptible de poli, ou de Fer carbonalé litboïde et argileux , et les cristaux calcaires sont souvent ferrileux et magnésiens.

On remarque quelquefois dans les interstices des cristaux de Quarlz, de baryte, de Fer spathique , etc. Enlin ers concrétions sont remarquable* par la constance île ces particularités et par leur disposition en lits dans les couches d'Argile schisteuse des mines de Houille , et des terrains de Calcaire alpin. #fj Concrétions.

JOH

* JIBE. bot. phan. Syn. de Ba-damier scion Rhéede. ■ (b.)

* JIHAE. bot. piiAN. y. Ca-

IJADE.

* JIRASEKIA. bot. phan. L'Jnagaltis tenella, L. , a été érigé, sous ce nom , en un genre distiuct par Sehmidt/« Uster. Jnn. 2, p. aj4); mais ce genre n'a pas été adopté.

Co..N.)

* JOACHIMIA. bot. phan. Le genre de Graminées ainsi nommé par Tenore , dans sa Flore de Naples , est le même que le Beckinannia qui , ayant l'antériorité, ne peut changer de nom. V. Beckmannie. (a.b.)

JOANNESIA. bot. phan. Peisoon {Enchirid. T. 11, p. 383) a surchargé -inutilement de ce nouveau mot la nomenclature, en le substituant sans motif à celui de Johannia , Willd. , qui lui-même était superllu, puisqu'il désignait un genre nommé antérieurement Chuquiraga par Jussieu. V. ce mot. (G..N.)

JOCKO. MA M. V. ORANG

* JODAMJE. moll. Defrance, dans le Dictionnaire des Sciences Naturelles , a établi ce genre qui nous semble avoir les plus grands rapports avec les Sphéiulites , et que nous mentionnerons en traitant de ce genre, f. Sphérujlite. (d..h.)

JODELLE et JOUDARDE. ois.

La Foulque, en vieux français, (b.)

JOËL. pois. Espèce du genre Athérine. V. ce mot. (b.)

. JOHANNIA. bot. phan. Le genre Chuquiraga de Jussieu a reçu de Willdenow ce nouveau nom qui n'a pas été adopté. F\ Chuquiraga.

* JOHNNIA. bot. phan. Genre de Ja Triandrie Monogynic , L., nouvellement établi par Roxburgh (in Hor.

Ind. 1 , p. 172) et adopté par De Candolle (Prodrom. System. Reg. P'aget.

T. I , p. 571) qui l'a placé dans la fa- ' mille des Hippocraléacées , et lui a donné pour caractères essentiels :

trois anthères sessiles au sommet de

JOH

l'urcéole; fruit en baie , à cinq loges et à un ou deux ovules dans chaque loge avant la maturité, ne contenant qu'un petit nombre de graines lorsqu'il est mûr. Ce genre est composé de deux espèces , savoir : 1° Joh/ia salacioides , indigène du Bengale, et remarquable par ses fleurs orangées , et sa baie bonne à manger , à deux ou trois graines ; 2° J. coroma/ideliana , qui croît dans les forêts des montagnes du Coromandel. Cette espèce a des baies monospermes semblables à de petites cerises. (g..N.)

JOHNIDS. pois. Qu'on a francisé sous le nom de John. Ce genre , formé par Bloch , ne saurait être admis et rentre entièrement parmi les Sciènes.

Pr. ce mot. (b.)

JOHNSONIE. Johnsonia. bot.

phan. Genre de la famille des Asphodélées , et de la Triandrie Monogitnie5L., établi par R.Brown(/J/ou'/-6i/n.

Fl. Nov.-HolL, p. 287) qui l'a ainsi caractérisé : périanthe à six divisions égales , péraloïdes , marcescenles et décidues ; trois étamines dont les filets sont insérés à la base des divisions intérieures du périanthe , dilatés et connés infériem ement ; ovaire à loges dispermes, surmonté d'un style filiforme, et d'un stigmatte obtus; capsule triloculaire à trois valves qui portent les cloisons sur leur milieu ; deux graines dans chaque loge ayant leur ombilic muni de slrophioles ; l'une d'elles pendante, fixée au sommet d'une colonne centrale grêle plus courte que la capsule.

L'auteur a placé la Plante qui constitue ce genre auprès du Borya. Elle en diffère par le port , l'inflorescence et la structure de la fleur, mais elle s'en rapproche par plusieurs caractères. Cette Plante , Juhnsonia lupiilina, R. Br., croît sur les côtes méridionales de la Nouvelle-Hollande.

C'est une herbe vivace , ayant une racine fibreuse, des feuilles distiques, linéaires , dilatées et demi-engainantes à la base. La hampe est très-simple et ne porte vers son sommet qu'un seul épi oblong, dont la forme

JOIN

limite les fleurs du Houblon , Humulus Lupulus (d'où le nom spécifique), cet qui se compose de bractées imbriquées colorées; les inférieures (petites et stériles, les autres unilobées et persistantes. Les fleurs sont

petites , sessiles; chacune d'elles est accompagnée d'une bractée intérieure et latérale.

Le nom de Johnsonia avait été donné à divers genres qui n'ont point

été adoptés : ainsi le Johnsonia de Kålci- rentre dans le Callicarpa de Linné; celui de Necker n'est qu'une «division des Solanum; enfin Adanson la nommé Jonsonia le Cedrela, L.

JOL. moll. Tel est le nom qu'Adanson a donné à une petite espèce de Buccin de la section des Nasses; mais le peu de netteté de la figure me permet pas de pouvoir la rapporter à une des espèces décrites par les auteurs. (D.H.)

JOLIBOIS. bot. phan. Syn. vulgaire de Daphne Mezereum/Jon étendu ((quelquefois à d'autres Lauréoles. (u.)

JOLITE. min. Pour Iolite. ce «mot. (g. del.)

JONC. Juucus. bot. phan. Type dans la famille des Juncées, ce genre , tel qu'il a été limité par Adanson et De Candolle , n'est pas le même que le Juucus de Linné; il en diffère par ses feuilles cylindriques et par sa capsule polysperme. Voici quels sont ses caractères : le calice se compose de six sépales écailleux glumacés, disposés sur deux rangs; les étamines sont au nombre de six attachées à la base du calice, quelquefois il n'y en a que trois seulement. L'ovaire est «ovoïde, plus ou moins triangulaire, à une ou trois loges incomplètes contenant plusieurs ovules. Le

style est simple , terminé par trois stigmates ifiliformes et velus. Le fruit est une capsule uniloculaire , polysperme , s'ouvrant en trois valves. Les graines sont ovoïdes; elles contiennent un ■ embryon basilair dans un endosperme charnu. Les espèces de ce genre sont vivaces, très-rarement annuelles.

JON S

Les tiges sont nues ou feuillées, quelquefois articulées , munies de feuilles cylindriques. Les fleurs sont généralement petites et disposées en panicule; rarement elles sont grandes et solitaires.

De Candolle a retiré du genre *Juncus* de Linné , toutes les espèces qui ont les feuilles planes et la capsule uniloculaire, pour en former un genre particulier sous le nom de *Luzula*.

Desvaux, dans le *Journal de Botanique*, a divisé le genre *Juncus* de De Candolle en quatre genres, savoir :

Marsippospermum qui a pour type le *Juncus grandiflorus* , *Jostkovia* , le *Juncus magellanicus* , *Cephaloxis* et enfin *Juncus*. Mais les différences sur lesquelles ces genres sont fondés sont trop peu importantes pour que ceux-ci aient pu être adoptés. Dans une Monographie que va publier le docteur De Laharpe , de Lausanne, on compte soixante-dix-neuf espèces. Réparties sous toutes les zones , dit ce jeune botaniste, et à des hauteurs variables, alpines sous l'équateur, préférant les plaines et les montagnes sous la zone tempérée, les diverses espèces de ce genre habitent particulièrement les lieux marécageux de l'Europe, des deux Amériques et de la Nouvelle-Hollande; quelques-unes

n'abandonnent jamais les bords de la mer et des grands lacs ; d'autres ne peuvent vivre et se reproduire qu'à côté des glaciers des Alpes et des neiges du pôle ; certaines enfin, vraies cosmopolites , se rencontrent partout sous les pas du botaniste.

Parmi les soixante-dix-neuf espèces actuellement connues , trois seulement habitent indistinctement toutes les zones de tous les climats ; ce sont les *Juncus communis* , *maritimus* et *Bufo-nius*. L'Europe en contient trente-huit espèces; l'Amérique méridionale, quatorze; l'Amérique septentrionale, vingt-six; la Nouvelle-Hollande, douze; la Barbarie et les îles Canaries, quatorze; l'Asie, huit; le cap de Bonne-Espérance , sept; les hautes Alpes et la Laponie , dix ; enfin quatorze sont communes à l'Eu-

rope et à l'Amérique septentrionale.

Aucune des espèces de ce genre n'est cultivée dans les jardins. On fait avec les feuilles de plusieurs espèces et particulièrement du *Juncus glaucus* , des liens fort employés dans le jardinage. (a. à.)

L'on a étendu le nom de Jonc à des Plantes qui n'appartiennent pas à ce genre; ainsi l'on a vulgairement appelé :

Jonc carré, un Souchet dont la tige présente quatre angles.

Jonc des Chaisiers , le *Scirpus lacustris*.

Jonc à coton ou de soie , les Linaigrettes ou Eriophores.

Jonc cotonneux. *F. Tomex*.

Jonc d'eau , les *Scirpes* , *Schoenus* , etc.

Jonc épineux ou marin, *Wlex europæus*.

Jonc d'Espagne , le *Spartium junceum*.

Jonc d' étang, le *Scirpus lacustris*, h.

Jonc faux, les *Triglochin*.

Jonc fleuri, le *Butomus umbellatus* , L.

Jonc des Indes , les cannes faites avec le Rotang.

Jonc marin. V. Jonc épineux.

Jonc à Mouches , le *Senecio Jacobceus* , L

Jonc du Nil, le *Cyperus Papyrus* , L.

Jonc odorant, X *Andropogon Sc/iœnanihe* et X *Acorus verus*.

Jonc de la Passion, la Massette (*Typaa.*) (R.)

JONC DE PIKRRE. *Juncus Lapideus*. PoLYi*. Mereati donne ce nom à une Caryophyllie fossile, tandis que d'autres or'y clo-graphes rappliquent à des Tubipores pétrifiés, (laal.x.)

* JONCAGINÉÏS. *Juncagiiiœe*.

■ rot. fhan. Famille naturelle de Plantes moucotelédones à élamiues hypogyncs , prop'osée par le professeur Richard (Méra. Mus., i, p. 365) pour quelques genres autrefois placés dans la famille polymorphe des Joncs de Jussieu. Les Joncaginérs, qui se com-

posent des genres *Triglochin* , Scheu- " chze/ia et *Lilœa* , peuvent être caractérisées de la manière suivante : les fleurs sont hermaphrodites ou unisexuées, munies d'un calice ou nues.

Dans les fleurs hermaphrodites on trouve ordinairement six étamines à filaments très-courts, à anthères cordiformes et biloculaires. Le centre de la fleur offre de trois à six pistils réunis entre eux et plus ou moins soudés par leur côté interne. Leur ovaire est libre, à une seule loge contenant un ou deux ovules dressés; le stigmate est ordinairement sessile. Dans les fleurs unisexuées, les mâles se composent d'une seule étamine accompagnée d'une écaille, et les fleurs femelles d'un pistil nu. Le fruit est un akène ou une capsule renflée et déhiscente, qui contient une ou deux graines dressées. Ces graines se composent d'un tégument propre et d'un embryon dressé, ayant la même direction que la graine, c'est-à-dire dont la radicule correspond au bile.

Cette pépite famille ne se compose, ainsi que nous l'avons dit, que des seuls genres *Triglochin* et *Scheuchzeria* de Linné, *Lilœa* de Bonpland.

Leurs espèces sont de petites Plantes aquatiques, vivent sur le bord des étangs et dans les endroits marécageux. On pourrait considérer l'organisation des deux genres *Triglochin* et *Scheuchzeria* sous un autre point de vue, et regarder leurs fleurs comme étant également unisexuées et monoïques. En effet, dans les espèces de *Triglochin*, les six étamines pourraient être regardées chacune comme autant de fleurs mâles monandres, et les six pistils comme autant de fleurs femelles. Cette opinion nous paraît d'autant plus vraisemblable, que ces six étamines ne sont pas placées sur le même plan et qu'il y en a trois plus intérieures et trois plus extérieures. V- les mots *Triglochin* et *Scheuchzeria* où cette opinion sera développée.

Les Juncaginées viennent naturellement se placer entre les Nuyades et les Alismacées. Elles se distinguent

es premières par leurs graines dressées et leur embryon ayant la même direction que la graine, tandis que dans les Nuyarles la graine est recourbée et l'embryon a une direction opposée à celle de la graine ; dans ces Alismacées, les graines sont spatulées et l'embryon est recourbé en arc à cheval. (a. h.)

JONCÉES. Juncæ. bot. piian.

ette famille , telle qu'elle a été limitée par De Candolle et plus récemment par R. Brown [Prodr. Fl. fiov.- \Holl., 1 ,p. 25;], appartient au groupe des Plantes monocotylédones à .filamines périgynes , et peut être ainsi caractérisée : fleurs hermaphrodites , rarement unisexuées et monoïques.

Calice profondément divisé en six lanières glumacées , disposées sur deux rangées. Étamines au nombre de six, attachées à la base des divisions du calice , quelquefois , mais plus rarement, au nombre de trois seulement. Les trois répondent aux trois divisions du calice. Ces étamines ont leurs filets subulés et leurs anthères à deux loges. L'ovaire est libre au fond de la fleur. Il est tantôt à une , tantôt à trois loges contenant chacune une ou plusieurs graines. Il se termine à son sommet par un style simple que surmontent trois stigmates filiformes ou un stigmate unique et trilobé. Le fruit est sec, capsulaire, à une ou trois loges, s'ouvrant en trois valves septifères sur le milieu de leur face interne. Quelquefois il est indéhiscent et monosperme par avortement. Les gamètes sont revêtues d'un tégument propre , membraneux , qui , selon R. Brown , n'est jamais crustacé, ni de couleur noire. Elles contiennent un endosperme charnu ou cartilagineux dans lequel est renfermé un embryon [presque cylindrique.

Les Joncées sont des Plantes ani nuelles ou vivaces, nues ou-feuillées , aayant en général les feuilles engaînantes, planes ou cylindriques. Les I fleurs sont généralement petites, disposées en grappes, en particules ou en icimes.

JON 8f.

Les genres qui appartiennent à cette famille sont : Juncus, D. C. ; Luzula , D. C. ; Abama , Adanson.

R. Brown y a joint les suivans :

Xerotes , Dasjpogon et Cafectasia cjui sont nouveaux. Il a ajouté à la fin de cette famille comme ayant de l'aflinité avec elle, les genres Flagellaria, L. ; Philydrum , Banks, et Burmannia , L. Un jeune botaniste très-distingué de Lausanne , De Laharpe , que nous avons cité en parlant du genre Jonc, a lu à la Société d'Histoire Naturelle de Paris un Mémoire fort intéressant contenant une monographie détaillée des genres Jurions , Luzula et slbama qui, selon lui, sont les seuls qui entrent dans la famille des Joncées. Ce travail doit êtreimpi imé dans le troisième volume des Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle. (a. r.)

* JONCÆR. bot. pu an . L'un des noms vulgaires du Spartium junceum , L. (b.)

JONCINELLE. bot. phan. Des botanistes ont proposé ce nom pour désigner le genre E/ïucaulon. fr. ce mot. (b.)

JONCIOLE. iiot. piian. Le genre Apliyllanlhe a reçu ce nom dans le Dictionnaire de Dé'tervil le. f. Aphyllantiie. (b.)

JONCOIDES. bot. phan. Syn. de Joncées. On a aussi proposé ce nom pour désigner le genre Luzule. V. ce mot. (b.)

JONCQUETIA. bot. phan. Schreber appelle ainsi le genre Tapira d'Aublet. V. Tapira. (a. h.)

JONCS. Junci. bot. phan. Famille qui , telle qu'elle avait été établie par Jussieu dans son Gênera Plantarum , a été divisée, par suite des travaux de plusieurs botanistes modernes , en plusieurs autres très-distinctes. Ainsi, dans la première section renfermant les genres à ovaire unique , à capsule triloculaire et à calice glumacé, on trouve les genres Eriocaulon , Iiestio et Xyris qui for-

ment la famille des Resliacées de R.

Brown ; dans la seconde section , dont le calice est semi -péla-loïde , sont les genres Callisia , Comrnnelina , Tradescantia formant avec quelques autres les Commélinées de R. Brown; dans la troisième section , le genre Butomus forme le type des Bulomécés du professeur Richard, les genres Damasorrium , ALisma et Sagittaria les vraies Alismacées. Parmi les genres de la quatrième section, le Cabomba est devenu le type des Cabombées du professeur Piichard , le Scheuchzeria et le Triglochin appartiennent aux Joncagiuées, et enfin les genres Narthecium , Helonias , Melanthium.y Fe rat ru m et Colchicirrn constituent la famille des Colchicacées de De Candolle. Il résulte de -là que les genres qui formaient la famille des Joncs de Jussieu , constituent aujourd'hui huit familles naturelles distinctes , savoir : les Rcstiacées , les Comméjinées , les Butomées, les Alismacées , les Cabombées , les Joncaginées, les Colchicacées et les Joncécés proprement dites. P~. chacun de ces mots, (a.r.)

JONDRABA. bot. phan. (De Candolle.) V . Biscutelle.

JONÈSE. bot. phan. Pour Ionésie. fr. ce mot. (g..n.)

JONGEKMANNE. bot. ckyft.

Pour Jungermanne. V. ce mot. (u.)

JONGIE. bot. phan. Pour Jungie.

V. ce mot. (b)

JONOPSIS. bot. phan. Pour lonopsis. V. ce mot. (b.)

JONQUILLE, bot. Espèce du genre Narcisse. V. ce mot. Paulet appelle Jonquille de Chêne un Champignon de la famille de ses Oreilles, qui est simplement un Agaric des botanistes. (B.)

JONSONIA. bot. phan. (Adanson.) Syn. de Cédrière. V. ce mot. (b.)

JONTHLASPI; bot. phan. Les anciens botanistes et même Tournefort donnaient ce nom à une petite Crucifère qui est devenue le type du genre

V. Clypéole. (g..n)

JOPPE. Joppa. ins. Genre de l'ordre des Hyménoptères , famille des Pupivores , tribu des Ichneumonides, établi par Fabricius et adopté par Latreille (Fam. Natur. du Règne Anim.). Ses caractères sont : bouche point avancée en manière de bec; palpes maxillaires de cinq articles trèsinégaux el dont le troisième est en forme de hache; palpes labiaux de quatre articles; extrémité des

mandibules distinctement bidentée; antennes sélacées, composées d'un grand nombre d'articles ; tarière cachée.

Les Joppessont des espèces du grand genre Ichneumon de Linné qui ont les mêmes habitudes qu'eux ; ils ont le chaperon court, corné, arrondi, entier; leurs mâchoires sont unidentées et la lèvre membraneuse , comprimée et plus épaisse au bout. L'abdomen est pétiolé , ovoïde, voûté eu dessus; leur corps est orné de couleurs jaunes sur un fond noir. La plupart des espèces viennent de l'Amérique méridionale. V. Ichneumon et Ichneumonides. (g.)

JORENA. bot. phan. Ce nom a été donné par Adanson à un genre formé sur *Y Alsinoides* de Lippi , et placé près du *Suriana* dont il diffère par ses feuilles opposées et ses graines ovoïdes assez grosses. (g..N.)

JOSEPHIA. bot. phan. Knight et Salisbury , dans leur Mémoire sur les Protéacées , ont ainsi désigné un genre que R. Brown , qui d'abord avait adopté ce nom , a changé depuis en celui de *Dryandra*. V . ce mot. On s'est récrié contre ce changement de nom , sans réfléchir qu'il y avait abus de dédier deux genres très-voisins à un seul individu (Joseph Banks) , quelque grands qu'aient été les services qu'il a rendus à la science. Les noms de *Josephia* et de *Banksia* rappelant le même personnage et étant placés dans la même famille naturelle, semblaient trop

JOS

un concert de dédicaces, et, ce qui ppis est , pouvaient introduire de la leconfusion. (G..N.)

JOSÉPHINIE. Josep/iinia. bot.

rriiAX. Genre établi par Ventenat v'Jard. de Mal m. , et Mém. Inst. Se. lPhys. , 1 806 , p. 7 1) et adopté par R. EBrown qui l'a placé dans sa famille ides Pédalinées. Les caractères de ce sgenre sont : calice à cinq divisions (Idressécs et égales; corolle monopétale rayant un tube court et un limbe évasé eet campanule, à cinq lobes inégaux, 1 disposés en deux lèvres, l'une supé- 1 rieure , redressée et bifide , l'autre in- Ifc'rieure, à trois lobes, celui du milieu létant plus long que les. autres; étannines, au nombre de quatre, diidynames et plus courtes que la coirolle; il y a le rudiment d'une cinquième étamin'c avortée. L'ovaire est I libre , appliqué sur un disque hypojgvne, formant un bourrelet ciixulaire. Cet ovaire est surmonté d'un •style que termine un stigmatc quac di ifide. Le fruit est une drupe hérissée de pointes , à quatre ou huit loges monospermes. Les graines sontatta- 1 ebées à la base des loges. Elles contiennent un embryon dressé, dépourvu d'endospenne.

Ce genre ne se compose encore que de deux espèces. Ce sont des Plantes élégantes , vivaecs, rameuses, à feuilles très-entières et à (leurs purpurines. L'une et l'autre sont originaires de la Nouvelle-Hollande. La première qui ait été connue et décrite , est la Josephinia Imperatricis , Vent. , Malm., tab. io3. Sa lige , cylindrique dans sa partie inférieure et tétragone supérieurement, s'élève à environ deux pieds. Elle est rameuse et couverte de feuilles opposées, pétiolées , ovales , cordiformes et rabattues.

Les fleurs, d'un gris rose , tachées de points pourpres , naissent dans l'aisselle des feuilles .supérieures et forment un épi allongé au sommet de la tige. Cette espèce a fleuri pour la première fois dans le jardin de Malmaison , où l'impératrice Joséphine accordait de si puissants encouragemens à la bo-

JOU

tauique. Elle provenait de graines rapportées par le capitaine Hamelin , commandant de la corvette le Naturaliste , dans l'expédition dont Péron et Freycinet nous ont fait connaître les résultats.

La seconde espèce , caractérisée par H. Brown [Frodr. F/or. Nov.-Holl.

1 , p. 540) , porte le nom de *Josephinia grandiflora*. (a. r.)

* JOSICM. bot. phan. (Belon.) Syn. de Jasmin jaune. (b.)

JOTA. ois. Le Vautour décrit sous ce nom par Molina paraît être le même que l'Aura. P. Cathart. (r.)

* JOUAITOBOUT. bot. phan. (Surian.) Syn. caraïbe de *F. tamacetum spatulatum*. (B.)

JOUALETTE. bot. phan. L'Helianthus pimpinelloides dans certaines parties de la France centrale. (B.)

JOUBARBE. Sempervivum. bot.

PHAN. Genre de la famille des Crassulacées et de la Dodécandrie Dodécagynie, L. , offrant un calice monosépale , persistant, divisé en six, huit ou douze lanières; une corolle de six à dix-huit

pétales lancéolés quelquefois légèrement réunis entre eux par leur base ; des élamines en nombre double de celui des pétales, à insertion périgynique; des pistils au nombre de six à dix-huit , disposés circulairement au centre de la fleur.

En dehors de l'ovaire, on trouve quelquefois des appendices de forme variée qui sont des élamines avortées.

Chaque ovaire est allongé, à une seule loge contenant plusieurs ovules attachés à un trophosperme longitudinal. Le style est simple , terminé par un stigmate capitulé. Le fruit est une capsule allongée , s'ouvrant par une suture longitudinale , et renfermant plusieurs graines insérées à un trophosperme suturai.

Les espèces de ce genre , au nombre d'environ une trentaine , ont des feuilles épaisses et charnues , quelquefois disposées en rosettes à la base de la tige, d'autres fois placées sur les ramifications de la tige. Les tiges

JOU

sont simples ou rameuses. La plupart des espèces croissent aux Canaries , en Europe , ou au cap de Bonne-Espérance. Nous mentionnerons ici quelques-unes des espèces de ce genre.

La plus commune est la Joubarbe des toits , *Sempervivum tectorum* , L. , qui croît en abondance sur les vieux murs et le chaume des masures.

Ses feuilles sont épaisses , charnues, imbriquées, ovales , pointues et ciliées , disposées en rosettes. Du centre de ces rosettes ,

dont un grand nombre restent stériles, s'élève une tige d'environ un pied de hauteur , cylindrique , épaisse , charnue , écailleuse, rougeâtre, terminée par un épi de fleurs rougeâtres et assez grandes , pédonculées et tournées du même côté.

On en cultive dans les jardins un assez grand nombre d'espèces, telles que *Sempervivum arbureum* , canariense , aizucles , gland ulosum , etc. ; elles sont d'orangerie. »

On a aussi appelé vulgairement Petite Joubabbu le *Sedum album* ; Joubarbe des vignes, le *Sedum Telephium*; Joubarbe pyramidale , un Saxifrage; JOUBAB.BE AUX vers, le *Sedum acre*, etc. (a.r.)

* JOUBARBES, bot. phan. F.

Cbassulacées.

JOUDARDE. ois. V. Jodeele.

* JOUEUR DE LYRE.rept. oph.

J Séba mentionne sous ce nom un Serpent américain dont les sifflemens mélodieux auraient la propriété d'enchanter les Oiseaux même qui chantent le mieux. (Bo

* JOUG AU. ois. Espèce du genre Chouette. V. ce mot. (b.)

JOUGRIS. ois. Même chose que Sougris. V. Guèbe. (b.)

JOURDIN. fois. Espèce du genre Lutjan. (B)

JOURET. moue. Nous ne sommes pas de l'opinion de Gmelin , qui a rapporté à la *Venus macula*/a (*Cytherca maculala*, Lamk.) le Jouret

JUB

d'Adanson (Coquil. du Sénégal, pl. 17) qui nous semble une espèce bien distincte "que les fiuleurs n'ont point encore mentionnée d'une manière satisfaisante. (D..H.)

JOUTAI, bot. phan. (Dict. de Détérville.) V. Outea. (b.)

JODZION. pois. L'un des noms vulgaires du *Squalus Zygoena*. (b.)

JOVELLANA. bot. phan. Genre de la Diandrie Monogynie, L., établi par Ruiz et Pavon (Fl. Peruu. 1, p.

i3, t. 18, f. 1 et 6), et qui a été réuni par Smith et Lamarck au *Calceolaria*. Persoon (Enchirid. 1, p. i5) en a fait une section du genre *Boea* de Jussieu, en lui conservant le caractère essentiel, ainsi tracé par les auteurs de la Flore du Pérou : capsule ovée-conique, à deux sillons, biloculaire, s'ouvrant au sommet en deux valves bifides. (G..N.)

JOYEL. MOLli. V. Choel.

JOZO. pois. Espèce du genre Gobie. V. ce mot. (b.)

JUANULLOA. bot. phan. Les auteurs de la Flore du Pérou ont donné ce nom à un genre qu'ils ont dédié à la mémoire de don George Juan et de don Antoine Ulloa, auteurs d'un voyage au Pérou renfermant des observations d'Histoire Naturelle. Persoon (Synops. 1, p. 218) a changé ce nom complexe en celui de Ulloa. Ce changement a été justifié par De Candolle (Théorie Elém. de la Botanique, deuxième édition, p. 265), en rappelant aux botanistes qu'ils ne doivent pas établir des noms génériques composés de ceux de deux personnes. V. Ueloa. (g..n.)

JUB. Juba. rois. Espèce du genre Pri, lipome. F", ce mot. (b.)

JUBiEE. Jubœa. bot. phan. Genre delà famille des Palmiers ,
établi par Kunth (In llumb. Aov. Gen. 1 , p.

308, lab. 96; qui le caracléiise ainsi : fleurs hermaphrodites ;
calice double, l'un et l'autre tripartis , l'extérieur beaucoup plus
court que l'intérieur ; étamines en très-grand nombre,

JUG

siyant les filets libres , les anthères •.iagillées; ovaire à trois loges,
surirronté de trois stigmates ; drupe sèche , ovoïde; noix percée
de trois tcrous à son sommet; endosperme ccreux.

Ce genre se compose d'une seule cespèce, Jubœa spectabilis ,
Kunth , Hoc. cit. Ce beau Palmier est oiiginaire du Chili. On le
cultive dans les j. |ardins , jusqu'aux environs de Poppayan où on
le nomme Coquilo de iChile. Son stipe est nu , sans épines, ■'cou-
ronné par des frondes pinnés.

SSes régimes de fleurs sont rameux , [renfermés d'abord dans
une spatlie mnonophylle. Cet Arbre paraît avoir ueaucoup de
rapports avec le Cucos LC/iUensis'aa Molina. (a. n.)

JDBARTE. MAM. Espèce du genre B8aleine. V. ce mot. (b.)

JUCA et JUCCA. bot. phan. Cette corthographe vicieuse de
Yucca (A7", ce imot) a été regardée , ou ne sait comrment,
co.r.mc celle du nom qu'on dionnait au Jatropha Jllani/iot flans
çcertains cantons de l'Amérique mériliionale. (B.)

* JUCIIIA. bot. phan. Necker lElcm. Bot. i, p. 1 35) a établi , sous ce nom, un genre aux dépens des i.Lobélies de Linné , et qu'il caractérisait par sa corolle régulière, ses lantlières connées, son stigmaté bilanié et sa capsule biloculajj'e. Ce genre est remarquable par la régularité iile la corolle (caractère que présente i u ussi I e gen re Cyp/iaa éga lemen t foi m é iiux dépens du Lobelia); cependant ee JucJiia de Necker était trop incomplètement connu pour pouvoir litre adopté. ?' '. LobÉlie. (G..N.)

* JUDAÏQUES ou PIERRES JU- DAÏQUES, éciï in. On a donné ce nioni à des pointes d'Oursins fossiles , ninsi qu'à des articulations d'Encrine.

JUG

ainsi que le Gigeri de Saint-Domingue , une corruption de Gan-giea qui désigne la même Plante au Congo.

JUGLANDEES. Juglandcœ. bot.

phan. Le genre Noyer, Juglans , d'abord placé dans la famille des Térébinthacées , en diffère tellement par un grand nombre de caractères importants , qu'il en a été retiré et est devenu leUpe d'un ordre naturel nouveau qui porte le nom de Juglandées. Les Juglandées ont des Heurs monoïques.

Les mâles sont disposées en chatons simples ou composes. Chaque fleur offre une écaille calyciforme , partagée latéralement en deux ou six lobes plus ou moins profonds; des étamines en nombre indéterminé, ayant les filet s extrêmement courts et les anthères à deux loges. Ces chatons mâles naissent constamment

vers la partie supérieure des rameaux de l'année précédente, il n'en est pas de même des Heurs femelles qui , au contraire , se développent à l'extrémité des rameaux de l'année. Chaque fleur femelle se compose d'un calice double, adhérent avec l'ovaire infère; rarement le calice est simple, à quatre divisions. L'ovaire est infère , uniloculaire, contenant un seul ovule dressé. Il est surmonté par deux stigmates très-épais, ou par un style court e; un stigmate quadrilobé. Le fruit est une drupe peu charnue, globuleuse ou allongée, quelquefois munie de deux ailes latérales, contenant une noix à deux ou quatre valves. La graine est bosselée et comme cérébriforme à l'extérieur, plus ou moins quadrilobée à sa partie inférieure , recouverte d'un tégument propre, membraneux, sous lequel on trouve un gios embryon ayant les cotylédons charnus et bilobés , la radicule supérieure.

Le genre Noyer , qui formait »

lui seul cette famille, a été , depuis , divisé en trois genres, savoir : Noyer proprement dit qui a pour type le- *Juglans regia*, *Ca/jade Nutlaï*, dans lequel on place les *J. olivœfurnis* ,, *alba*, *sulcata* , *aquatica* , etc. , et Pte-

go *JUJ*

rocarya de Kunth , ou *Juglans Pieroc a/y a* de Michaux.

A ces trois genres , Kunth ajoute le genre *Decostea* de Ruiz et Pavon , qu'il rapproche avec doute de la famille des Juglandées. F. Noyer.

JUGLANS. bot. phan. V. Noyer.

JDGOLINE. bot. phan. Pour *Jugéoline*. P". ce mot. (b.)

JUGULAIRES, pots. Second ordre de la classe des Poissons dans le Systema naturæ de Linné , qui répond exactement aux Auchénoptères de Diiméril. V. ce mot. Il était caractérisé par la position des nageoires abdominales situées sous la gorge, en avant des pectorales. (b.)

JUIF. ois. Nom vulgaire du Bruant de roseaux et de l'Hiron-delle Martinet, (b.)

JUIF. Pois. L'un des noms vulgaires du *Squalus Zigoena*. On le donnait anciennement à l'Ichthyocolle , espèce du genre Esturgeon. (b.)

JUJUBE. Ji/ji/ba. BOT. PHAN.

Fruit du Jujubier. V. ce mot. (b.)

JUJUBIER. *Zizyphus*. bot. phan.

Ce genre , de la famille des Rhamnées , et de la Pentandrie Digynie, L., établi par Tournefort, avait été réuni par Linné au genre *Rhamnus*.

Mais Jussieu , Lamarck et presque tous les auteurs modernes l'ont distingué de nouveau comme genre particulier. Voici ses caractères : calice étalé, à cinq divisions ; corolle formée de cinq pétales très-petits , dressés; cinq étamines à filets courts, placées en face des pétales , et insérées ainsi que ces derniers autour d'un disque périgyne qui tapisse le fond du calice et environne l'ovaire; celui-ci est à deux loges, surmonté de deux stigmates. Le fruit est une drupe charnue contenant un noyau à deux loges. Les Jujubiers sont des Arbrisseaux ou de petits Arbres épineux, ayant des feuilles alternes, accompagnées à leur base de deux stipules subulées , persistantes , se changeant en épines. Leurs fleurs sont

JUJ

hermaphrodites et très-petites. Parmi ces espèces, nous distinguerons les suivantes :

Jujubier commun, *Zizyphus vulgaris*, Lamk. , 111. tab. i85, fig. 1.

Arbrisseau de quinze à vingt pieds d'élévation, offrant sur ses branches de petits rameaux filiformes verts , qu'il renouvelle tous les ans , et sur lesquels se développent les feuilles et les fleurs. Ces feuilles sont alternes , presque sessiles, ovales, obtuses, acuminées; celles de la base sont arrondies ; toutes obscurément dentées, glabres , luisantes , marquées de trois nervures longitudinales. On trouve à leur base deux stipules subulées , très-aiguës, persistantes et devenant des aiguillons. Les fleurs sont petites, jaunâtres, rassemblées par pelils glojnérules à l'aisselle des feuilles. Le fruit est une drupe ovoïde , rougeâtre, lisse, de la grosseur d'une Olive, contenant un noyau osseux, à deux loges monospermes. Le Jujubier est originaire d'Orient et particulièrement de la Syrie. Selon Pline, il a été introduit en Italie par Sextus Papirius. Aujourd'hui il y forme un Arbre indigène aussi bien qu'en Espagne et dans le midi de la France.

Les Jujubes, ou fruits du Jujubier, lorsqu'elles sont fraîches , ont une chair ferme, mais sucrée et agréable. On les mange en cet état dans les provinces où cet Arbre est cultivé. Celles que l'on emploie en médecine ont été séchées au soleil. Unies aux Dattes , aux Figues et aux Raisins secs , elles forment les fruits pectoraux et béchiques , très-employés en tisane dans le traitement des maladies de poitrine.

Jujubier Lotos , Zizyphus Lotus , Desf., Fl. Atl. 1, p. 200; Act. Acad.

1788 , tab. 21. Cette espèce ne forme qu'un Arbrisseau buissonneux qui ne s'élève guère à plus de quatre à cinq pieds; ses rameaux sont irréguliers, tortueux, blanchâtres, armés d'épines binnées ; les feuilles sont alternes, petites, ovales, obtuses, à peine dentées, offrant trois nervures longitudinales. Les fleurs , d'un blanc

JUL

rpâic et très-petites , sont groupées à l'aisselle des feuilles. Les fruits qui succèdent sont des drupes globuleuses , arrondies, d'une couleur brune, de la grosseur d'une Merise.

Leur chair est pulpeuse et agréable.

(Cet Arbrisseau croît sur les côtes de la Barbarie et surtout de la Cyrénaïque ; ses fruits sont une des espèces de Lotos que mangeaient les anciens. Déjà l'Ecluse et J. Bauhin savaient soupçonné que le Lotos des anciens Lotophages était un Jujubier, mais c'est Desfontaines qui, dans un (excellent mémoire consigné dans ceux de l'Académie des Sciences pour l'année 1788 , a mis cette vérité dans tout son jour. f. Lotos.

Ce genre renferme beaucoup d'autres espèces dont on mange les fruits; tels sont le Zizyphus spinosa C/irisfi , qui croît en Egypte , en Barbarie et dans l'Arabie; le Zizyphus Jujuba, Lamk. , des Indes-Orientales , etc.

Le nom de Jujubier blanc a été 1 donné par Dalécliamp au lile-
lia Aze- 1 darack, et par l'Ecluse à YElœagnus <angustifolius. (a.
B.)

JULAN. moll. Nom donné par . Adanson (Coquil. du Séné,!;.,
pl. 10) à une petite espèce de Pbolade in'di- ' quée par Linné sous
la dénomination 1 de P/iolas striata. (d..h.)

JDLE. Juins, pors. Espèce du gen- 1 re Able. V. ce mot. (b.)

* JDLE. ins. Pour Iule. V. ce mot.

JDLIBRISIN. bot. piiàn. Espèce Ifort élégante d'Acacie qui ré-
siste en (pleine terre aux hivers dans les déipartemens méridio-
naux de la France.

* JDLIE. ins. (Geoffroy.) y. Msn- ;ne.

JDLIENNE. pois. L'un des noms 1 vulgaires de la Lingue-Gade
du sous- - genre Lotte. V. ces mots. (b.)

JDLIENNE. Hesperis. bot. phàn.

I Genre de la famille des Crucifères et 'de la Tétradynamie sili-
queuse, L.

111 fut établi pur Tournefort et adopté

JDL 91

par Linné et tous les auteurs modernes ; ceux-ci l'étendirent
plus ou moins et y firent entrer des Plantes qu'on en a depuis sé-
parées pour constituer de nouveaux genres ou pour réunir à
d'autres déjà établis. Ainsi Y Hesperis A Maria de Lamarck ou
Erysimum Alliaria , L., est devenu le type du genre Alliaria. R.

Brown , dans le quatrième volume delà deuxième édition de Y Hortus Kewensis , 9.

constitué les genres *Malthiola* et *Malcornia* , dont la plupart des espèces étaient placées par Linné et Lamarck parmi les *Hesperis*. Le genre *An— drzeioskia* de De Candolle [Prodrom.

Syst. nat. Veget. T. 1, p. 1 90) a été formé sur les *Hesperis glandulosa* et *pinnata* de Persoon. Nous passerons sous silence les erreurs des autres auteurs relativement à des Plantes qui font maintenant partie des genres *Heliophila*, *Câorispora*, *Arabis*, etc., et qu'ils avaient réunies au genre dont il est ici question. Ces fausses transpositions sont trop nombreuses pour qu'il soit convenable d'en faire ici l'énumération. Dans le second volume de son *Systema Vegetabilium* , le professeur De Candolle a débrouillé la synonymie de toutes les Plantes rapportées au genre *Hesperis*, et il a ainsi fixé les caractères de celui-ci : calice fermé dont les sépales sont connivens et dont deux sont bossus en forme de sac à la base ; pétales ongiculés , ayant un limbe étalé, obtus ou échancré; élamines libres, les latérales munies à leur base de glandes vertes et à peu près en forme d'anneau; silique droite, presque tétragone ou comprimée , terminée par deux stigmates droits, sessiles et connivens; graines oblongues, pendantes et disposées sur un seul rang, pourvues de cotylédons planes et incombans. Ce genre est placé dans la tribu des *Sisymbrées* ou *Notorhizées* siliqueuses de De Candolle. lia beaucoup de rapports avec plusieurs autres genres de *Crucifères* et surtout avec le *Cheiranthus* et *Erysimum* ; mais la structure de son stigmate le différencie suffisamment. 11 s'éloigne.

JUL

en outre du *Cheiranthus* par ses cotylédons incombans ; de *Erysimitm* par sa silique qui n'est pas exactement te'tragone; du *Sisymbrium* par son calice à rleux bosses; enfin des *Matthiola* et *Malcomia* qu'on a formés à ses dépens, par son stigmat sans appendices , très- épais et obtus. Les Plantes qui composent ce genre sont herbacées , annuelles, bisannuelles ou vivaces, à racines fibreuses , à tiges dressées ou étalées.

Leurs feuilles sont ovales, lancéolées ou oblongues, dentées ou lyrées. La plupart des espèces sont couvertes de poils , les uns lymphatiques, simples ou rameux, les autres, surtout vers le sommet , glanduleux et sécrétant une humeur visqueuse. Les fleurs sont disposées en grappes droites, terminales et sans bractées. Elles sont tantôt blanches , tantôt purpurines, quelquefois versicolores , et elles répandent une odeur agréable. Toutes les Juliennes croissent dans l'hémisphère boréal. Les champs cultivés et les haies sont leurs stations habituelles. Sur les vingt espèces décrites jusqu'à ce pur, une habile l'Amérique septentrionale, six l'Europe et treize l'Afrique boréale, l'Orient et l'Asie tempérée. De Candolle les a distribuées en deux sections qu'il a nommées *Hesperis* et *Deilosma*. La première est caractérisée par le limbe des pétales linéaire, rougeâtre et odorant, parla silique à deux côtés tranchans , à valves carénées et à cloison fongueuse. La deuxième se distingue, au contraire , par le limbe des pétales obové et par sa silique cylindracée ou à peine tétragone,à cloison membraneuse. C'est dans cette section que se trouve l'espèce suivante, remarquable par la beauté et l'odeur agréable de ses fleurs.

La Julienne oes dames , *Hesperis matronalis* , L. , a une tige cylindrique, velue, presque simple et qui s'élève jusqu'à six décimètres. Ses feuilles sont ovales-lancéolées, pointues et dentées. Les fleurs sont terminales, portées sur des pédicelles de la longueur du calice ; il leur succède

JUN

des siliques dressées , glabres et dont les bords ne sont point épaissis. Cette espèce croît naturellement dans les lieux couverts et cultivés , dans les vignes et le long des haies et des buissons de l'Europe méridionale. On la cultive dans les jardins comme fleur d'ornement sous les noms de Julienne, Cassolette, Beurée , Damas , etc. Elle y produit plusieurs variétés de couleur , ainsi que des monstruosité dont la plus curieuse est celle que l'on a nommée foliiflora, et dans laquelle les pétales, les étamines et le pistil sont convertis en feuilles d'un vert tendre. La Julienne des dames est une Plante de pleine terre qui demande peu d'arrosement, un sol substantiel, léger, et une exposition au midi. Les variétés à fleurs doubles se multiplient par la séparation de leurs boutures dans le mois de septembre. Elles prennent aisément racine lorsqu'elles sont dans un terrain favorable. (g..n.)

* JULTFÈRES. bot. ni an. (Lamarck.) Syn. d'Amentacées. ï-r. ce mot. (n.)

JULIS. pois. T'. Girelle et LA- BRE.

JUM AR. Onotaurus. mam. Le Mulet provenant de l'accouplement du Taureau et de la Jument ou du Cheval avec la Vache, désigné sous ce nom par les anciens , n'a jamais existé.

JUMEAUX, bot. crypt. Nom bizarre de l'une des familles plus bizarres encore, s'il est possible, oii le docteur Paillet place des Champignons qu'il nomme Nombril-blanc, Chapeau-Canneille, etc. Ce sont tout simplement des Agarics. (b.)

JUMENT, mam. La femelle du Cheval. V. ce mot. (b.)

JUNCAGO. bot. phan. (Tournefort.) Syn. de Triglochin. F. ce mot.

JUNCARIA. bot. phan. Vieux synonyme à *Ortega hispanica*. (b.)

JUNCELLUS. bot. phan. Ce nom

JUN_

désigne les petites espèces du genre *Scirpe* chez les anciens botanistes.

CM

JOINCDS. bot. phan. V. Jonc.

* JONDZILLA. bot. phan. De (Candolle) *Sp. e. i. Veget. T. IX*, p. 56) intentionné un genre établi sous ce nom par Audouin, mais qui, [formé sur le *Cochlearia Draba*, L., il doit être réuni au *Lepidium*. DeCandolle (Journ. de Bot. 3, p. 165) avait déjà proposé l'établissement du même genre et qu'il nommait *Cardaria*. V.

Lepidium. (g.n.)

JUNGERMANNE. *Jungermannia*.

tbot. crypt. (Hépatiques.) Ce genre, l'un des plus nombreux en espèces et des plus généralement répandus, est la Cryptogamie, est en même temps l'un des plus naturels, ce qui n'a pas empêché plusieurs auteurs de chercher à le subdiviser. Il a été «établi par Ruppert, adopté par Micheli et par Linné qui a réuni sous (ce nom les trois genres désignés par 'Mucodi sous les noms de Marsipha, de Jungermannia et de Muscoides, (divisions qui, étant uniquement fondées sur le port, ne peuvent être

adoptées que comme sections de genre. La plupart des auteurs ont

adopté le genre tel que Linné l'avait ■ circonscrit. Hedwig en a cependant : séparé avec raison le genre Androea qui appartient évidemment à la famille des Mousses.

Les Jungermannes sont particulièrement caractérisées par une capsule renfermée dans un calice membraneux, en sortant à sa maturité, et est portée sur un pédicelle plus ou moins long et se divisant jusqu'à la moitié ou jusqu'à la base en quatre valves, Cette capsule renferme des sésinules Nombreuses entremêlées de Glamens < :n spirales auxquels on a donné le nom d'elater; ces Glamens naissent

tantôt du fond «le la capsule, tantôt

de toute la paroi interne des valves, et tantôt du sommet de ces valves; il ne paraît pas qu'ils donnent insertion aux sésinules, mais leur usage

semble borné à faciliter, par leur

élasticité , la dispersion de ces graines. La capsule varie dans ce genre par sa forme ronde ou allongée, par sa division en quatre valves jusqu'à la base ou seulement jusqu'à la moitié. C'est sur ce dernier caractère, propre seulement à un petit nombre d'espèces , et particulièrement aux *Jung*, *serpyllifolia* et *minutissima* de Hooker, que mademoiselle Libert a fondé le genre *Lejeunia*. V. A un. Génér.

des Se. Phys. publiées à Bruxelles, Raddi , qui a publié un travail très étendu sur les *Jungermannes* de la Toscane, et qui les a subdivisées en plusieurs genres , a laissé ces espèces parmi les vraies *Jungermannes* , mais il a séparé de ce genre, sous le nom de *Fussombronia* , le *Jung*, *pustula* , *Uotb* , Hook. , différant de la plupart des autres *Jungermannes* par sa capsule qui se divise en lambeaux irréguliers. Mais c'est particulièrement sur les différences que présente l'espèce de calice qui enveloppe la base du pédicelle de la capsule, qu'il a fondé ces genres. Cet organe, qui a généralement la forme d'un sac membraneux , ouvre à son sommet, varie en effet beaucoup dans ce genre comme Hooker l'avait déjà indiqué dans son superbe ouvrage sur les *Jungermannes* de l'Angleterre. Raddi a fondé sur ces variations les genres suivans : *Bellisocinia* , calice comprimé, lisse, presque bilabié, à bord lacinié. Il a pour type le *J. lœvigata* , H. et G. — *Intoiria* , calice comprimé , bilabié , à lèvres entières , arrondies. Raddi rapporte à ce genre le *Jung*, *ptatyphylla* , mais il est douteux que l'espèce à laquelle il donne ce nom soit bien la même que celle que les botanistes du nord de l'Europe ont nommée ainsi. — *Frullania* , calice tuberculeux extérieurement , presque trigone , divisé à son sommet en trois lanières : ce genre renferme les *Jung*. *Tamarisci* et *dilatata*. — *Candollea* , calice tronqué au sommet , plus ou

moins comprimé. Raddi rapporte à ce genre les *Jung*, *asplenoides*, L. ; *compacta*, Rolh; *nernorosa*, L. ; *complanata*,

'9* JUN

L. — Les *J ungerinannia* proprement dites sont caractérisées par leur calice membraneux, tubuleux, plus ou moins plissé vers son orifice. Ce genre renferme encore le plus grand nombre des espèces ; telles sont : les *Jung*, *polyantkus*, *scalaris*, *bidenlata*, *repians*, etc. — *Calypogeia*, calice cylindrique, épais, adhérent à la tige par le bord de son orifice. Ce genre, l'un des plus remarquables par la singulière insertion de son calice, renferme le *Jung*, *trichomanes* et deux espèces nouvelles décrites par Raddi.

— *Melzgeria*, calice membraneux, turbiné, naissant de la partie inférieure de la fronde. C'est à ce genre qu'appartient le *Jung*, *furcata*, L., et le *Jung*, *tomentosa*, Hoffin. — *Roemeria*, calice cylindrique tronqué, charnu, dressé, adhérent par sa base à la face inférieure de la fronde. Les *Jung*, *multijida*, *palmala* et *pinguia* se i apportent à ce geure. — *Pellia*, calice cylindrique, tronqué, naissant de la face supérieure de la fronde.

Raddi ne place dans ce genre que le *Jung*. *cpipkyLla*.

Ces genres sont fondé.-, la plupart sur des caractères extrêmement minutieux, et sur les variations d'un organe qui paraît avoir peu d'importance ; ds n'ont jusqu'à présent été adoptés par aucun botaniste, et en effet, le genre *Jungei* maune paraît si naturel et si bien limité qu'on ne peut le diviser qu'en sections fondées sur le port et la disposition des femelles comme la plupart des naturalistes l'ont déjà (ait.

Une première grande division' renferme les espèces dont la fronde est simple, plus ou moins lobée , presque toujours palmée , étendue sur le sol , et ne présente pas de folioles distinctes. Telles sont les *Jung*, *epiphylla* , *piuguis* , *furcala* , etc.

Toutes les autres espèces ont une tige simple ou rameuse , rampante ou redressée, couverte de petites feuilles distiques de forme li ès-variable. Celle division , de beaucoup plus nombreuse en espèces que la précédente , se divise en deux groupes, suivant

JUN

que les feuilles sont nues à leur base ou qu'elles sont accompagnées de stipules caulinaires qui forment en général à la face inférieure des tiges un double rang de petites folioles.

C'est à ces organes que quelques botanistes étrangers, ne voulant jamais adopter dans la Cryptogamie les mêmes termes que pour les Plantes phanérogames, et multipliant ainsi inutilement le vocabulaire de la science, ont donné le nom d'*Amphigastres*. .

Le nombre des espèces connues de ce genre s'élève à environ trois cents dont près de quatre-vingt croissent en Europe. L'Amérique septentrionale en produit un nombre assez considérable ; L. De Schweinitz en énumère cinquante-huit dont plusieurs , il est vrai , sont communes aux deux continents. Les régions équatoriales en nourrissent aussi un grand nombre, et cette famille ne paraît même pas diminuer en allant du pôle vers l'équateur, comme on l'a prétendu, à tort, relativement aux Cryptogames , car la Laponie en produit que trente espèces d'après Wahlenberg, et l'île de Java , dont les espèces sont cependant moins complètement connues, en renferme, d'après Nées & E. Enck , près de soixante. Il en est de même du Brésil, du cap de Bonne-

Espérance , de l'Inde, etc., qui en produisent beaucoup , ainsi que Mascareigne dont Bory de Saint- Vincent a rapporté plus de trente espèces.

Quoique les espèces de tous ces pays ne soient pas encore bien connues, on doit remarquer le nombre considérable que Menzies a rapportées de la Nouvelle-Zélande et que Hooker a figurées dans ses Musci exotici , car ce nombre paraît confirmer l'observation qu'on a déjà faite de la grande prédominance des Cryptogames dans cette île et non vers les pôles, (ad.b.)

*JUNGGERMANNIÆ. bot.crypt.

On a quelquefois employé ce nom comme synonyme d'Hépatiques. V.

ce mot. (b.)

JUNGHANSIA. bot. fian. Le

JUN

genre établi sous ce nom par Gmelin Sja/. Veget., p. iii) est le même que le *Curtisia* d'Aiton , fondé sur une espèce de *Sida* de Burmann. V. Curtisie. (g..W.)

JUNGHAUSIA. bot. pu an. Pour *Junghansia*. f. ce mot. (g..n.)

JUNGIE. Jurigia. bot. phan. Genre de la famille des Symplocarées et que la Syngénésie séparée, L. , établi par Linné fils (Suppl. fian., p. 59;)) qui le dédia à la mémoire de Jungius, auteur d'ouvrages estimés et renommés, selon Du Petit-Thouars , les premiers fondateurs des méthodes de classification des Plantes. Adoptant ce genre , Cassini l'a placé dans la

(tribu des Nassauviées, près du genre *LDumerilia* dont il diffère à peine , et *Uni* a donné les caractères suivans :

involucre cylindric, formé de folioles à peu près sur un seul rang , égales , oblongues et obtuses; réceptacle plus ou moins garni de paillettes analogues aux folioles de l'involucre; calathide sans layons, composée de [plusieurs fleurons bilabiés et hermaphrodites; ovaires oblongs , grêles, anguleux , surmontés d'une aigrette filiforme et plumeuse. Les calathides sont réunies par trois et quatre en capitules, entourés chacun d'un involucre général formé de bractées analogues aux folioles des involucre par-flores. Le *Jungia ferruginea* est l'unique espèce du genre. C'est une Plante (de l'Amérique méridionale, dont les tiges sont ligneuses, couvertes d'un duvet couleur de rouille. Les feuilles sont alternes, pétiolées , arrondies , échancrées en cœur à la base et divisées en cinq lobes obtus ; les capitules de fleurs sont petits et disposés en une panicule terminale très-ramifiée.

(Cette espèce n'a été observée depuis Linné fils par aucun botaniste. Cependant Gaertner, qui n'a fait que : transcrire la description du genre , a changé arbitrairement son nom en celui de *Trinacra*. Quant au *Jungia ferruginea* Gaertn.; A". Escaloni. (g.n.)

.*TUNIA* bot. ru an. (Adanson.)

JDR 95 Syn. de *Cleome* , L. V. ce mot.

JUNIPERUS. bot. phan. V . Genièvre ou Genévrier.

* *JDNON*. ins. Espèce de *Staphylium* de Geoffroy , qui est un Stème de Fabricius. (b.)

* JDJNSA. bot. phan. La Plante désignée sous ce nom par Linscot , paraît être l'Arachide. (b.)

JUPUBA. Cassicus Ilœorrhous.

Ois. (Vieillot.) Nom de pays d'une espèce de la division des Caasiques dans le genre Troupiale. F. ce mot. (b.)

* JURINEE. Juinea. bot. phan.

Genre de la famille des Synanthérées, Ciuarocéphales de Justieu , et de la Syngénésie égale, L. , proposé par Cassini dans le JDict. des Scienc. Nat. , et placé par ce botaniste dans la tribu des Carduinés. Voici les caractères qu'il lui attribue : involucre formé de folioles imbriquées, appliquées , oblongues , coriaces , les intérieures sans appendices, les extérieures surmoulées (l'un appendice étalé et spinescent ; réceptacle planiuscule, hérissé de paillettes inégales et subulées) calathide sans rayons, formée de fleurons à corolle oblique, nombreux, égaux et hermaphrodites; akènes obovoïdes , tétragones, glabres, striés, présentant une alvéole basilaire, très-oblique et intérieure , une aréole apiculaire entourée d'un rebord crénelé, et portant une cupule qui s'accroît beaucoup par la floraison, devient un corps épais, lubuleux, bémispheïque ou cylindracé , et se détache après la maturité du fruit; aigrette blanche et légèrement plumeuse, attachée autour du bord externe et inférieur de la cupule. Cette cupule forme le caractère essentiel du genre Juinea qui diffère seulement en cela et par la structure de l'involucre, du Lardus et du Serra- /u/a.H. Cassini en a donné une description longue et minutieuse, et l'a regardée comme formée par la réunion intime du plateau et de l'anneau , parties du fruit des Carduinés qui

ordinairement ne s'accroissent point après la floraison, mais qui , dans le genre dont nous nous occupons, changent au contraire de forme, -en sorte que l'anneau ou la partie extérieure, considérablement augmenté , se détache du fruit après la maturité et emporte avec lui le plateau ou la partie centrale qui n'a pas participé à l'accroissement.

L'auteur du genre *Jurinea* en a fait connaître deux espèces, savoir : i° *Jurinea alata*, H. Cass., ou *Serratula alata* , Desf. , Cal. Jard. Paris; *Serratula cyanoides* , Gaertn . ? 2° /. *tomcmtosa* , Cass., ou *Carduus mollis*, Marsch. , FL Taur. - Cauc. ? Cette dernière Plante est originaire du Cnucnse , et il est douteux que ce soit le *Carduus mollis* de Linné. L'autre est cultivée au jardin de Paris , sans indication d'origine. H. Cassini présume que c'est le *Carduus polyclonos* , Willd. , ou *Setratula potyclonos* , D. C. (g..n.)

* JURIOLA. pois. (Dslaroche.) Syn. de *Trigla Lyra*, L. , aux îles Baléares. V. Triglk. (b.)

* JURURA. REPT CHEE, V. Gu-

hitra au Supplément. Cette Tortue est peut-être la même que celle dont le nom a été écrit Jtjrtjcua. (b.)

JDSELE. pois. L'un des noms vulgaires de la Mendole. (b.)

JUSQDIAME. *Hyosciamus*. bot. phan. Genre de la famille des Solanées, et de la Penlandrie Monogynie, L., offrant des caractères exli êmejnt tranchés qui le font reconnaître facilement. On peut le caractériser ainsi : calice tuhuleux, subcampaniforme, à cinq lobes ; corolle inlundibulifoime; limbe oblique» cinq lobes obtus, inégaux; cinq élu mines déclinées vers la partie inférieure

de la fleur; style terminé par un stigmate capitulé simple ; le fruit est une pyxide , c'est-à-dire une capsule allongée, nu peu ventrue à sa base, biloculaire , s'ouvrant horizontalement en deux valves, superposées , enveloppée en entier par le calice qui

JUS

est persistant; les graines sont brunes , réniformes et tuberculées.

Les Jusquiates , dont on compte une quinzaine d'espèces, sont toutes des. fiantes herbacées annuelles, bisannuelles ou vivaces, ayant la tige généralement velue et visqueuse, les leuilles alternes , d'un vert pâle; les fleurs assez grandes , disposées en une sorte d'épi unilatéral au sommet de la tige. Toutes ces espèces sont des Plantes narcotiques et vénéneuses.

La plus importante à connaître et en même temps la plus commune dans noire climat, est la Jusquiame noire, *Ilyoseiamus niger*, L. (Rich., Bot.

méd. 1, p. 296). C'est une Plante annuelle, très-commune sur le bord des chemins et dans les lieux incultes. Sa tige, haute de dix-huit pouces à deux pieds , est cylindrique , un peu recourbée en arc, rameuse supérieurement, toute couverte de poils longs et yisqueux , qui existent également sur les feuilles; celles-ci sont alternes, éparsesou quelquefois opposées sur le même pied ; elles sont sessiles, grandes, ovales , aiguës, piofondément sinueuses sur les bords et molles. Les fleurs presque sessiles , tournées d'un seul côté, et disposées en longs épis , sont d'un jaune sale , veinées de lignes pourpres. Le calice est à cinq dents écartées et aiguës ; la corolle infundibuliforme. Le fruit s'ouvre par un-,opercule hémisphérique. L'aspect de la Jusquiame noire et son odeur

nauséabonde suffiraient seuls pour en faire soupçonner les propriétés délétères; ses feuilles flasques, d'un vert terne, hérissées de poils visqueux; ses fleurs d'un jaune sale, parcourues de lignes rougeâtres, sont autant d'indices de ses mauvaises qualités. En effet la Jusquiame noire est un poison narcotique acre, dont on combat les accidents par l'usage de l'émétique, et ensuite pas les boissons acidulés. Malgré cette action délétère, la Jusquiame est quelquefois employée en médecine. Elle agit à peu près de la même manière que la Belladone. C'est principalement en l'administrant contre les af-

JUS

vétions du système nerveux, que l'on m'a retiré quelque avantage; ainsi dans le tic douloureux de la face, dans les névralgies sciatiques, la paralysie, plusieurs auteurs ont célébré ses bons effets. C'est ordinairement sous forme d'extrait que l'on administre ce médicament à la dose, un à deux grains. Les mêmes propriétés se retrouvent dans la Jusquiame blanche et la Jusquiame rouge, autres espèces qui croissent communément dans la France méridionale. (a. 71.)

JUSSIA. bot. phan. (Adans.) n. de Jussieu. ^Jussée. (a. b.)

UDSÉE. Jussieu. bot. phan.

■ étire de la («mille des Onagrées et de Octandrie Monogynie, L*, très-voisin du genre Onagre, dont il diffère par les caractères suivants; le caule est tubuleux inférieurement où adhère avec l'ovaire; son limbe est (Quatre ou cinq divisions étalées et persistantes. La corolle se compose de quatre à cinq pétales insérés au calice. Les étamines sont en nombre double des pétales et insérées

comme \xsurle calice. Le style est surmonté mn stigmaté à quatre ou cinq lobes m marqués. Le fruit est une capsuallongée, à q'uatie ou cinq loges ik autant de côtes, couronnée par 1 limbe du calice persistant. Cette visule s'ouvre entre chaque côte r? une fente longitudinale. Chaque te contient un grand nombre de mines attachées à leur angle inter- . Les espèces de ce genre sont des unies herbacées, très-rarement des ■ as-Arbrisseaux originaires du content des deux Amériques ou des tndes Indes, oii elles vivent en gérai dans les lieux marécageux ; ■ alques-unes sont rampantes ou naitit à la surface des eaux. Leurs illes sont alternes et le plus souittt très-entières ; leurs fleurs sont ldbnculées , solitaires à l'aisselle des illes. Le plus souvent elles sont unes , très-rarement blanches. Ce tare dédié par Linné à l'illustre aunr des Familles Naturelles, a été

TOME IX

JUS r,7

nommé *Jussia* par Adanson , *Jussicva* par Schreber. Quant au *Jussicua* de Houston , c'est le genre *Jatropha* de Linné. Kunth {in Huinb. Nov. Gen.

6 . p. 96) a décrit dix espèces nouvelles de ce genre recueillies par H umboldt et Bonpland , dans les parties de l'Amérique visitées par ces deux illustrées¹ voyageurs. Il en a figuré quatre sous les noms de *Jussioea salicifolia* , /oc. cit., p. 99, t. 550; *Jussioea jnaypiireusis* , toc. cit., p. 100, t. 55i; *Jussioea pilosa* , /oc. cit., p. 101, t. 552; *Jussia-a macrocarpa* , /oc. cit., p. 102, t. 555. (a. r.)

JUSSIEDA. bot. pu an. (Houston.) Syn. de Jatropha. Fî. ce mot.

JUSSIEVA. bot. phan. (Schreber.) Pour Jussiaea. V. Jussée.

* JDSTICA. bot. phan. (Næcker , Elem. Bot. , p. 550. ; Pour Justicia.

V. JusticiE. (G..N

JUSTICIE. Justicia. bot. phan.

Vulgairement Carmantine. Genre très-nombreux en espèces , qui fait partie de la famille naturelle des Acanthacées et de la Uianerio Monogynie , L. Il se distingue par les caractères suivans : son calice est à cinq divisions profondes , et souvent accompagné d'un calicule extérieur. La corolle est monopétale , irrégulière , tubuleuse ; son limbe est à deux lèvres, dont la supérieure est échancrée et l'inférieure à trois lobes. Les étamines sont généralement au nombre de deux, saillantes hors de la corolle et insérées à son tube. Dans un assez grand nombre d'espèces les deux loges sont écartées l'une de l'autre de manière à représenter quatre étamines , soudées deux à deux par leurs filets. Les espèces où l'on observe cette disposition constituent le genre Dianthera de Linné qui ne doit être considéré que comme une simple section du genre Justicia. L'ovaire est porté sur un disque annulaire, hypogyné, qui forme un cercle saillant à sa base. Coupé trans-

veraalenieit , il présente deux loges qui contiennent chacune environ huit ovules attachés sur deux rangs à leur angle interne. Le style est simple et se termine par un stigmate à deux lobes inégaux. Le fruit est une capsule globuleuse ou allongée , quelquefois un peu comprimée latéralement , à deux loges et à deux valves qui s'écartent l'une de l'autre avec élasticité, emportant sur le milieu de leur face interne la moitié de la cloison , en sorte qu'elles représentent chacune deux demi-loges.

Les graines, ordinairement globuleuses, sont attachées par le moyen d'un podosperme court et en forme de crochet.

Les Juslicies sont en général des Arbustes élégans on les trouve dans les Plantes herbacées dont la lige est cylindrique ou anguleuse; les feuilles opposées, rarement ternées ou alternes. Les fleurs, qui offrent souvent les couleurs les plus vives , sont accompagnées chacune de deux ou trois bractées , quelquefois assez rapprochées pour former une sorte de calicule ou un épi écailleux.. Ces fleurs sont assez ordinairement en épis axillaires , d'autres fois elles sont presque solitaires et portées sur des pédoncules dichotomes qui naissent de l'aisselle des feuilles supérieures. Toutes ces espèces sont exotiques et croissent dans les régions chaudes du nouveau et de l'ancien continent. Jussieu a séparé de ce genre immense un certain nombre d'espèces distinctes par la structure de leur capsule et dont il a formé le genre *Dicliptera*. Jf., *Diceip-TÈrtE*. Nous mentionnerons quelquesunes des espèces les plus remarquables du genre *Justicie* , surtout parmi celles que l'on cultive le plus communément dans les jardins :

Justicie en Arbre , *Justicia Adhatuda* , L. Cette espèce , qui est originaire de l'Inde , et qui porte aussi le nom de *Noyer des Indes* et de *Ceylan* , est une de celles que l'on voit le plus souvent en

Europe. Elle forme un Arbuste qui peut s'élever à dix ou douze pieds. Sa tige est

JUS

ligneuse ; ses rameaux sont nombreux et redressés, portant des feuilles opposées , ovales, lancéolées, aiguës , pubescentes , d'un vert clair.

Les fleurs sont grandes, blanches, veinées de pourpre, réunies en épis axil {aires écailleux. La corolle offre deux lèvres ; l'une supérieure , échancrée; L'autre inférieure , à trois lobes inégaux. Cet Arbrisseau craint peu le froid, et ne demande, pendant les hivers à Paris, que la chaleur de l'orangerie. On le multiplie de boutures ou de marcottes.

Justicie pectorale , *Justicia pectoralis* , L. Ses tiges sont herbacées , tétragones , d'environ un pied <le hauteur , glabres et noueuses; ses feuilles opposées sont linéaires , lancéolées, entières et glabres. Les fleurs sont purpurines , et forment des épis dichotomes groupés en une sorte de panicule terminale. Leur calice, qui offre k sa base trois bractées, est à cinq divisions profondes. Leur corolle est tubulcuse et bilabée. Cette espèce, qui est commune dans les Antilles , y est fort employée. Le suc que l'on en exprimées! appliqué avec avantage sur les coupures et autres plaies récentes , dont il favorise la cicatrisation ; de-là , le nom vulgaire à' Herbe aux charpentiers , qui lui est donné aux Antilles. On en prépare aussi un sirop fort agréable , et que l'on emploie aux mêmes usages que le siop de Capillaire en Europe.

Justicie écarlate, *Justicia coccinea* , Cavanil. Originaire de 1 Guiane , ce joli Arbuste peut s'élève à une hauteur de six à huit pieds Ses feuilles opposées sont lancéolées aiguës , marquées de

nervures assez saillantes. Ses fleurs , d'un rouge éclatant , constituent de longs épis , dont les fleurs se succèdent presque toute l'été. Elle demande les mêmes soins que la première espèce et se multiplie de la même manière. Elle ne passe l'hiver en pleine terre dans le midi de la France.

Justicie peinte , *Justicia picta* L. Indigène des Indes-Orientales
cet Arbuste élégant peut s'élever

KAC

à sept ou huit pieds. Ses jeunes rameaux sont carrés et portent des feuilles opposées, persistantes, ovales , aiguës. Ses fleurs sont grandes , d'une belle couleur rouge, souvent marquées de taches jaunes, disposées en épi foliacé, tétragone. Cette espèce , qui se multiplie de graines, demande la serre chaude pendant l'hiver.

JUSTICIE EN ÉPI *Justicia* , Jussieu-

Justicia irifurciculiformis , L. Salisbury, qui a figuré cette Plante dans le *Paradis us Londinensis* , tab. 12, lui a donné le nom de *Crossandra undulatifolia*. C'est un charmant Arbuste qui croît dans l'Inde, et dont les feuilles (opposées sont ovales , aiguës , ondulées , d'un vert foncé. Ses fleurs , d'un jaune safrané, forment de longs épis

KAD

axillaires et pédonculés. Elle se cultive en serre chaude.

JUSTICIE À FEUILLE D'HYSSOPE ,

Justicia hyssopifolia , L. Cet Arbuste croît naturellement à Madère. Sa tige, liante de trois à quatre pieds , est en tout temps

ornée de ses feuilles, qui sont presque sessiles , lancéolées , épaisses , «labres. Les fleurs sont jaunâtres, le plus souvent solitaires à l'aisselle îles feuilles. (a. il.)

* JUSTINE. iNs. (Geoffroy.) Syn.

de Libei/ula vulgatissima. (b.)

* .1UVIA. bot. thaïs. C'est le nom que les babitans des bords de l'Orénoque donnent au Bert/iolletia excetsa de Bonpland. (g..n.)

JYNX.ois. Syn.deTorcol. (B.)

1K.AATE. bot. phan. (Linscot.) .'Syn. A' Acacia Catechu et non d'Aréquier. (H.)

KA.BAN. moll. Pour Kalan. V. ce mot. (u).

KABASSOU. mam. -Nom de pays •'adopté par Bu (Ton , pour désigner le iTatou à douze bandes. (b.)

* KABEL. ois. L'un des noms de ' ' la petite Mouette rieuse. Pr. Mauve.

' i (DR..Z.)

KABELTAU. rois. Même chose que Cabélieu et Cabillau. V. ces finnois. (,,)

KABU et KAMB. bot. crypt.

(Flydropâytes.) Thunberg rapporte que les Japonais qui désignent sous ces noms le Laminaria succàarina , font grand cas de cette Plante comme comestible , et la mangent crue ou çuite. (B.)

* KACALA. bot. phan. Même chose que Cacaloa. V. ce mot. (b.)

. KACHIN. moll. Nom donné par

Adauson (Voyag. au Sénégal. , p. 187, pl. 13) à uuc Coquille du genre Troc/u/s. Linné eu a fait son Truc/ius P c/il/ierinus en y confondant , à tort , une autre espèce d'Adanson qui en est Bien distincte. Cette espèce paraît être le Troque Turban , Trockus Tuber de Lamarck. (d..h.)

KACIPi. ois. L'un des noms de pays du Gypaète barbu. 'pr. ce mot.

KAD. bot. phan. V. Cad.

KADALI. bot. phan. V. Cadali.

KADANACU. bot. phan. V. Caha-Naku.

* K ADE-CANNY. bot. phan. (Leschenault.) Syn. de Panieum mi Haie uni , L., aux environs de Pondichéry. V. Panic. (b.;

* KADELARI. bot. phan. V. Ca-

DELARI.

KADELÉE. bot. phan. Ca-

I1ELIUM.

? KADELI- POE A. bot. phan. V.

CADELI -PoEA.

KADENAKO. bot. phan. V. Ca-

DENACO.

* KADSURA. bot. PHAN. Genre établi par Jussieu *Ann. Mus.*, 16, p.

340), et dont *V* [/varia Japonica de Thunberg, ou Kadsura de Kœmpfer, t. 477, est le type. Ce genre, adopté par Dunal (*Anon.*, p. 57) et par De Candolle (*Syst. Fat. Veg.* 1, p. 465), a été placé, même avec doute, dans la famille des Anonacées, dont il s'éloigne surtout par sa tige volubile et ses feuilles dentelées en scie. Voici du reste les caractères qui ont été attribués à ce genre : son calice est à trois divisions profondes ; sa corolle composée de six pétales ovales obtus ; les étamines sont nombreuses et ont leurs filets très-courts. Les pistils au nombre de trente à quarante sont réunis sur un gynophore charnu, ovoïde, globuleux, prenant de l'accroissement après la fécondation. Les fruits sont charnus, agglomérés sur le gynophore, uniloculaires et contenant deux graines dont on ne connaît pas encore l'organisation, circonstance qui empêche de pouvoir déterminer bien exactement si ce genre appartient réellement à la famille des Anonacées.

Le Kadsura Japonica, Dunal, loc.

cit., p. 57, seule espèce de ce genre, est un petit Arbruste étalé, rameux, dont la tige est brune et verruqueuse, les feuilles courtement pétiolées, ovales-oblongues, amincies en pointe à leurs deux extrémités, épaisses, coriaces, glabres, dentées en scie ou sinuées sur leur bord. Les fleurs sont blanches, pédonculées, solitaires, opposées aux feuilles. Les carpelles sont charnus, rouges, placés sur un gynophore blanc et charnu. (a. h.)

* KADDLA et KADDTAS. bot.

phan. (Théophraste.) Syn. de Cuscuta. V. ce mot. (b.)

* KJELA. bot. phan. (Adanson.) y. Cjela-Dolo.

KJEMPFIÉRIE. *Koempferia*. bot.

ru an. Genre de la famille des Scitaminées ou Amomées, et de la Monandrie Monogynie , L., offrant pour caractères : un calice tubuleux , double , à six divisions , trois extérieures longues , linéaires et étalées, et trois intérieures dressées , disposées comme en deux lèvres, l'une supérieure composée de deux divisions , l'autre inférieure formée d'une seule division profondément bilobée. L'anthère est simple , dilatée , membraneuse et péraloïde à son sommet qui est bifide. Le style est long et grêle , terminé par un stigmate orbiculaire , concave et cilié. Le fruit est une capsule trilobulaire , trivalve et polysperme. Les espèces de ce genre au nombre de cinq à six sont originaires des Indes-Orientales. Leur racine est tubéreuse, charnue, quelquefois fasciculée. Elles sont dépourvues de tiges; les feuilles sont généralement assez larges et les fleurs sont radicales. Tantôt ces dernières naissent au milieu de l'assemblage des feuilles, tantôt elles naissent à côté. Parmi ces espèces, nous dirons quelques mots des trois suivantes

KjEmpiérie ronde , *Koempferia rolunda*, L., Red., LU. 1, t. 4g. La racine de cette espèce est formée de tubercules charnus irréguliers , blanchâtres, tantôt arrondis, tantôt allongés , ce qui constitue deux variétés connues sous les noms de Zédoaire ronde et longue. Mais ce ne sont pas deux espèces distinctes, ainsi que l'ont voulu quelques auteurs.

Les feuilles naissent immédiatement de ces tubercules et au nombre de trois à quatre; elles sont roulées les unes dans les autres, ovales-oblongues, un peu pointues, entières, d'un vert clair à leur face supérieure, d'une teinte 'violette très-intense à

leur face inférieure. Les fleurs qui sont fort grandes, sortent de la racine, à côté des feuilles; elles sont réunies au nombre de cinq à sept qui se développent successivement et ont chacune une petite spathe membraneuse. Les trois divisions externes et les deux divisions internes et su-

KAG

Supérieures sont blanches, l'interne et l'inférieure est violette. Cette espèce fleurit assez souvent dans les serres. Sa racine est très-aromatique ; on l'employait autrefois en médecine.

Koempferia Galanga, L., Red., Lil. 3, 1. 144. Cette espèce qui croît dans les forêts sombres de l'Inde, a sa racine composée (d'une touffe épaisse de tubercules allongés, fusiformes, quelquefois renifles. De cette racine naissent deux à trois feuilles rétrécies en un pétiole (engainant; ces feuilles sont ovales, larges, ondulées sur leur bord, aiguës au sommet, glabres en dessus, un peu pubescentes à leur face inférieure. Les fleurs au nombre de trois à quatre, plus petites que dans l'espèce précédente, naissent du collet (de la racine au milieu des feuilles; les fleurs sont blanches, marquées de deux taches violettes.

K. EMPFÉRIE A FEUILLES LONGUES,

Koempferia longifolia, Willd., Red., Lil. 7, t. 38g. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente. Mais sa racine est formée de tubercules globuleux; ses feuilles sont plus allongées, blanches inférieurement. La division interne et inférieure des calices est d'une teinte violette foncée. Elle est aussi originaire de l'Inde.

* KAFAGINA. bot. phan. r. Ca-

I FAGINA.

KAFMARJAM. bot. tian. (De- Uile.) Syn. arabe de Vitex Jgnus-caslus. (b.)

KAGENECKIE. Kagencckia. bot.

i fiiian. Ce genre , de la Diœcie Polyandrie, et non de la l'oly garnie Monœ- (Cĭe, L. , a été établi par Ruiz et Pawon (Tlor. Verv. Syst. T^eget. , p.

. ago). En le rapportant à la tribu des îSpiréacées, de la famille des Rosa- (céas, Kunth (in Humb. et Bonpl. Itov.

(Gêner., 6, p. 337) en a ainsi ex- I posé les caractères : fleurs dioïques ; I les mâles ont un calice hémisphérique dont le limbe est à cinq divisions r {profondes, régulières, et se recouv vrant par les bords avant l'ouverture

KAH

de la fleur; cinq pétales orbiculés , égaux, sessiles sur l'entrée du tube caticinal; seize à vingt élamines , ayant la même insertion et sur ,un seul rang, à filets subulés , libres, et à anthères oblongues, biloculaires et déhiscentes longitudinalement. Les fleurs femelles sont composées d'un calice et de pétales comme ceux des fleurs mâles; d'étamines avortées; de cinq ovaires libres, renfermant chacun vingt ovules fixés sur deux rangées à l'angle interne , surmontés de cinq styles et de stigmates dilatés. Le fruit est formé

de cinq capsules coriaces, en forme de sabot, disposées en étoile, uniloculaires , déhiscentes longitudinalement et par le dessus.

Chacune renferme environ vingt graines déprimées , ailées au sommet , disposées transversalement et se recouvrant un peu les unes les autres.

Ces graines ont un double tégument, l'extérieur très-mince, l'intérieur plus épais et adhérent; elles sont dépourvues d'albumen ; leur embryon est droit ; la radicule et les cotylédons sont elliptiques.

Ce genre très-voisin , mais assez distinct du *Quillaja* de Ylolina (*Srnegmadermos*, \\ uiz et Pavon), se compose de deux espèces auxquelles les auteurs de la Flore du Pérou ont donné les noms de *Kagencckia lanceolata* et *K. oblonga*. Ce sont des Arbres indigènes du Pérou et du Chili. Leurs feuilles sont éparses , simples , entières, accompagnées de stipules géminées et très-petites. Les fleurs sont terminales ; les mâles disposées en corymbes ; les femelles solitaires.

* KAGOLCA. ois. Syn. de Milouinan , espèce de Canard, f. ce mot. (u.)

* KAH ALI. bot. rHAN.(Forskabl.) Les Arabes emploient, sous ce nom, la racine de l'*Ec/iinm rubrum* comme cosmétique. (B.)

* KAHIAU. MA», Espèce du genre Guenon. A", ce mot. (b.)

KAHIRIA. bot. phan. Forsknhl (Flora .<Egrpt.-s/raù.,p. i55)a établi

ii>2 KAL

sous ce nom un genre qui est le même que Yelludia de Linné.
V. ce mot.

^ * KAIAMA. eot. pb an. (Oviédo.) Syn. de Caryota urens. V.
Cabyota.

KAID A. bot. piian. (Rhéede , Mal.
2, tab. i-5.) Syn. de Pandaiius dans quelques parties de l'Inde.
(b.)

* KAINITO. BOT. PB an V. C.vi-
NITO. .

* KAIROLT. BOT. PBAN. V. Cai- ROLI.

* KAJAN. bot. pban. Pour Cajan.

V. ce mot. (b)

KAJU. bot. pban. Adanson donne ce mot comme synonyme
d'Acajou. Il n'est probablement que le mot Caju qui signifie bois
dans les idiomes malais autrement écrits. V.

Caju. (b.)

KAKA. bot. pban. Pour Kauka.

F. Caûcantbïi.

* KAKALTSEL. pois. Espèce du genre Glyphisodon. V. ce mot.
(b.)

KAKATOÈS. Cacalua. ois. Nom imposé à une petite famille de Perroquets, que Vieillot , d'après Brisson , a érigée en genre. V. Perroquet. (dr..z.)

KAKELIK ou KAKERL1K. ois.

Espèce du genre Perdrix, qui n'est peut-être qu'une variété de la Perdrix rouge. V. Perdrix. (dr..z.)

KAKERLAK. mam. Syn. de Chacrelas. Variété monstrueuse du genre Homme. (b.) :

KAKERLAQUE. ins. Même chose que Cancrelat. (b.)

* KAKERLOE. ois. L'un des noms du Pluvier doré. (nu..z.)

KAKI. bot. pjian. Espèce du genre 'Diospyros , probablement la même chose que Chicoy. V. ce mot. (b.)

KAKILE. bot. phan. Même chose que Cakile. V. ce mot. (b.)

* KAKLA. bot. pban. P'. Cacbla.

* KALABA. bot. pu an. V. Ca- J/ABA. r .q

KAL

* KALABOTIS. bot. pban. Ce mot désigne quelquefois l'Oignon dans les livres hébreux , particulièrement dans les Prophètes. (b.)

* KALABURA. bot. pban. Même chose que Calabure. V. ce mot. (b.)

* KALAGRIOCHTENI. congu.

V. CtITENI

* KALAKA bot. pban. Nom de pays de Carissa. V~. ce mol. (b.)

A KALAMAGROSTIS. bot. pban.

(Dioscoride.) Syn. de Roseau, d'où Calamagrostis. f. ce mot. (b.)

KALAN. moli,. Nom qu'Adanson (Sénag. , p. 107 , pl. t) a donné à un Stiombe qui est le *Slrombus lenliginosus* de Linné, et que l'on pourrait rapporter à d'autres espèces , si l'on s'attachait à toute la synonymie donnée par Adanson qui cite des figures que Linné et d'autres ont appliquées à des espèces bien différentes.

P";. Stiiombe. (d..b.)

KALANCHEE. bot. pban. Pour Kalanchoë. fr. ce mot. (a.r.)

KALANCHOE. Kalanchoe. bot.

pban. Genre établi par Adanson et adopté par De Candolle, dans sa Monographie des Plantes grasses , pour quelques espèces de Cotylédon de Linné. Ce genre qui a été nommé *Veilia* par Kennedy, appartient à la famille de Crassulacées , et peut être ainsi caractérisé : calice persistant à quatre divisions très-profondes; corolle rasonô'pétalé régulière, infundibuliforine, renflée, à quatre lobes étalés et réfléchis; étamines au nombre de huit, disposées sur deux rangées ; quatre glandes nectarifères à la base des pistils, qui sont eux-mêmes au nombre de quatre et deviennent autant de capsules allongées , uniloculaires, polyspermes. Les espèces de ce genre, au nombre d'environ six, sont des sous-Arbrisseaux ou des Herbes grasses , originaires de l'Inde ou de l'Afrique; leurs feuilles sont opposées, plus ou moins profondé-

ment dentées ou même pirinatifides , Irès~ràremëïff entières ou simplement dentées vers:

leur sommet. Les fleurs sont jaunes ,

K.AL

KAL

i ilauches dans une seule espèce , disposées en corymbe à l'extrémité des liges. Parmi ces espèces, celle que /on voit le plus fréquemment dans les urdins est le *Kalanchoe laciniata* ,))). C, Pl. gr., qui croît dans l'Inde et >rn Egypte. C'est une Plante grasse, IVcnviron deux pieds de hauteur , uyant la tige rameuse, cylindrique, Irrès-glabre , ainsi que les feuilles qui «.ont opposées profondément et irrégulièrement découpées. Les fleurs ■ coût jaunes et les divisions de la corolle aiguës. Elle a été retrouvée par >3ory de Saint-Vincent dans l'île de Mascareigne. Cette espèce , ainsi que [coules les autres du même genre , doit 'être tenue en serre chaude, (a. r.)

* KALANIOS. bot. fhan. (Tl.éophraste.) Syu. tiArundo, L. V. Ro- S3EAU. (b.)

KALENGI - CA1NSJAVA. bot.

l'PHAN. f '. CANSJAVA.

K.ALLRIA. bot. riiAN. Et non iCaleria. Genre lbrmé par Adanson ;(Fam. des Plant.), el qui répond au .'Silène de Linné. (b.)

KALESJAM. bot. phan. L'Arbre adu Malabar décrit par Rhéede , sous ce nom , paraît se rapprocher du >genre Melicocca de la famille des sSapindacées. (a. H.)

KALI. bot. PUAN. Nom de pays <!devenu scientifique d'une espèce du çgenre Soude. (b.)

KALIFORMIA. bot. crypt. (Hydrophytes.) Le genre formé sous ce i nom par Stackhouse , dans sa Néréide Ibritannique, rentre dans le Gigarlina ide Lamouroux. f. ce mot. (b.)

* KA LIMÉ RIS. bot. puan. Le genre Aster Linné ayant été divisé en [plusieurs sous-genres par H. Cassini ,

ce botaniste a désigné l'un d'eux - sous le nom de Kaliméris. Parmi les caractères qui servent à le distinguer des autres sous-genres , voici les plus essentiels : involucre orbiculaire tur- I biné , composé de folioles à peu près i égales , sur un ou deux rangs , oblongues et lâchement appliquées ; récep-

tacle élevé , presque conique ; ovaires aplatis, munis d'une bordure cartilagineuse sur chacune des deux arêtes extérieure et intérieure ; aigrettes extrêmement courtes et plumenses.

Suivant un usage qui lui est particulier, l'auteur de ce sous-genre a décrit une espèce en lui imposant la dénomination nouvelle comme nom çénéique. Cette Plante {Kaliméris ptatycephala) est cultivée au Jardin de Paris, ou elle est nommée, peut-être à tort, ylstér Sibiricus. (G..N.)

* K.ALIP-DAASSIE. mam. Pr. Daman.

* KALISON . moll. Le Kalison d'Adanson (Sénég. , p. 4a , pl. a) est un petit Oscabion que Linné el Lamai clc n'ont point rappor-

té dans leur synonymie, qui nous paraît être bien distinct de toutes les espèces connues, et que l'on ne saurait confondre avec linlin vil le comme variété du Chilon fasciculaire de Linné.

* KALKATRICI rept. opu. Les Nègres de la Guinée donnent ce nom à des Serpens aquatiques , qu'on trouve jusque dans les étangs, mais qui pourraient bien ne pas appartenir au genre Hydre. V. ce mol. (b.)

* RALLIAS, bot. phan. D'après Adanson , ce nom , dont l'éty-mologie grecque signifie beauté, était appliqué à une belle espèce d'Anthémide.

H. Cassini s'en est servi pour désigner un sous-genre de X 'He-liopsis, et il l'a caractérisé par ses fruits à péricarpe drupacé el ridé, ainsi que par les corolles des tleurs marginales qui ne sont point articulées , mais continues avec l'ovaire. Quoique l'auteur de ce sous-genre n'ait point prétendu le séparer complètement du genre Hcliopsis , il n'en a pas moins décrit l'espèce sur laquelle il l'a établi , avec la dénomination de Kallias. Il est à craindre que ce nouveau mot ne lasse prendre le change aux botanistes , et qu'ils ne le considèrent comme un nom générique. Le Kallias wata , Cass. , avait déjà été rapporté au genre He liopsis par Dunal (Mém. du Mus.

T. v, p. 57) qui l'avait nommé Hel.

bup/ualmoides. Nous croyons que ce dernier nom doit être seul admis , parce qu'il a la priorité sur celui de Cassini et qu'il rappelle VAnthentis buphtalmoides dont Jacquin a donné une belle figure {Hort. Schoc. 11brunn., \o\ . Il, p. i3, tab. j5i). Ortéga , auquel on doit la première connaissance de celte Plante , la plaçait aussi dans le genre Anthémis et la nommait A. ovalifolia. En-

fin, Persoon (Enchirid. 2 , p. 47 3) lui donnait le nom à! *Acmella buphtalmoides*.

C'est une belle Plante herbacée dont les tiges , très-rameuses , portent à leur extrémité de grandes calatliides jaunes. Elle est cultivée, sans exiger beaucoup de soins , dans le Jardin Botanique de Paris.

Ūileliopsis canescens de Kuntli (flou. Gêner, et Speè. Plant, œcjuin., 4, p. 212) est peut-être une variété delà précédente. Cas-sini en a formé une seconde espèce de son sous-genre en la nom-mant *Kallias dubia*. (g..n.)

K ALLSTROEMI A . bot. fhan. Scopoli appelait ainsi un genre nouveau qu'il formait sur le Tribu/us maximas. V. Herse, (a.e.)

KALMIE. *Kalmia*. bot. than.

Genre de la famille des Rhodoracées et de la Décandrie Mono-gynie , L., dont toutes les espèces sont des Arbustes élégans , tou-jours verts , originaires de l'Amérique septentrionale.

Leur calice est étalé à cinq divisions; leur corolle monopétale est déprimée et renflée, ayant son limbe à cinq lobes courts et ré-fléchis et offrant vers sa partie inférieure dix petites fossettes. Les étamines sont au nombre de dix, insérées tout-à-fait à la base de la corolle et placées horizontalement, de manière que le sommet de chaque anthère est reçu et engagé dans l'une des dix petites fossettes dont nous venons de parler. L'ovaire est libre , globu-leux , à cinq loges polyspermes. 11 est surmonté d'un style assez long au sommet duquel est un stigmate déprimé , à cinq lobes à peine marqués. Le fruit est une çap-

suie globuleuse à cinq loges, s'ouvrant en cinq valves par le milieu des cloisons.

On compte cinq espèces de Kalmies; ce sont des Arbrisseaux buissonneux , très ri'am eux , ayant leurs, feuilles alternes, quelquefois éparses et comme verlicillées, entières et persistantes ; leurs fleurs généralement roses formant des espèces de grappes ou de corymbes à l'extrémité des rameaux. Toutes ces espèces présentent un phénomène extrêmement remarquable, à l'époque de la fécondation. Nous avons déjà dit tout à l'heure que leurs étamines étaient étalées horizontalement et que les anthères étaient engagées dans les petites fossettes qui existent à la base delà corolle. Dans cet état, comme les fleurs sont généralement dressées, que le style est assez long , on con-^ çoit que la fécondation ne pourrait pas s'opérer. Mais voici ce qui a lieu ; chaque élamine se redresse successivement, et pour dégager son anthère on voit le filet se recourber, former un arc qui , diminuant sa longueur , fait sortir l'anthère 'de la petite poche où elle était enfoncée. Elle se redresse alors contre le stigmate sur lequel elle verse son pollen. Plusieurs des espèces de ce genre sont cultivées dans les jardins; telles sont les suivantes :

Kalmie a lauges tevyli,ts.s, *Kalmia latifolia* , L. Bel Arbrisseau de six à huit pieds de hauteur, ayant son écorce lisse et brunâtre , ses feuilles opposées, pétiolées, elliptiques , aiguës , entières, coriaces , très-glabres ; ses fleurs d'une couleur rosé pâle, portées sur de longs pédoncules velus et visqueux , forment des espèces de corymbes à la partie supérieure des jeunes rameaux. Le Kalmic à larges feuilles fleurit au mois de juin , il refléurit quelquefois en septembre.

KALMIE A FEUILES ETROITES, K.

angitstifolia , L. Un peu moins grand que le précédent dans toutes ses parties, cet Arbrisseau porte des feuilles verlicillées par trois , quelquefois simplement opposées, elliptiques, allou-

KAM

pijées , un peu obtuses , d'un vert clair Il leur face supérieure, légèrement glauques inférieu renient , entières et irèi-glabres. Leurs fleurs sont pédiwellces , fort petites , disposées par >oetiles grappes à l'aisselle des feuilles supérieures , de manière à foi mer une iuorte de corymbe terminal ; quelquefois un jeune rameau s'élève au- Jiessus du corymbe , qui alors n'est)hlus terminal. Cette espèce fleurit eu iuin et juillet.

Kalmie glauque , *Kalmia glaufC/i*, L. Petit Arbuste buissonneux IH'un pied à un pied et demi d'élévation, Fameux. Ses feuilles sont sessiees , opposées , lancéolées , aiguës , glabres , entières et à bords recourbés len dessous , d'un vert clair et luisantes à leur face supérieure, Irès-glau-][ues inférieurement. Les Heurs roses et conguinent pédicellées , forment des joouquets corymbiformes vers la parie supérieure des rameaux. Ces trois •sspèces, originaires de l'Amérique septentrionale, se cultivent en pleine cerre sous le climat de Paris. Elles iloiveut être placées clans les platesbandes de terre de Bruyère , dont biles sont un des plus jolis orneuneus , par leur feuillage toujours ^ert , et surtout par les bouquets de eeurs belles Heurs roses. On les muliplie de rejetons ou de boutures; nnais les plus beaux individus sont :eux qui proviennent de graines.

* KALOSANĪHES. bot. phan.

IHaworth.) V . Cuassule.

* KALTA VYRIEN. bett. oph.

Nymphe au mot Bongare. (b.)

* KAMAIJKSSOS et KAMAIjEDKE. bot. phan. (Dioscoride.)
"Syn. de Glécbome. V. ce mot. (b.)

KAMAN. conch. C'est ainsi qu'A- ! lanson (Voy. au Sénag. , p. a43 , pl. '8) nomme une espèce fie Bucarde ort remarquable , qui est le Cardima :osiatuin de Linné ou la Bucarde exoique des marchands de Coquilles.

* KAMARON BOT. PHAN. V. CA- ■iIAUON.

KAM io5

K AMBEUL. moll. Adanson (Sénag. , p. 1 4 , pl. 1 , fig. î) a donné ce nom a une Coquille terrestre que Lamarck a désignée sous le nom de Bulitnus Kambeulk l'imitation de Bruguière.

Férussac l'a fait figurer de nouveau dans les excellentes planches qui accompagnent son ouvrage sur les Mollusques. (D..H.)

K.AMTCHI. ois. Palamedea. Genre de l'oidre des Alectorides. Caractères : bec court, conico-convexe , droit , très-courbé à la pointe, comprimé dans toute sa longueur; mandibule supérieure voûtée , l'inférieure plus courte, obtuse; fosse nasale grande couverte d'une peau nue ; narines éloignées de la base du bec , ovaires, ouvertes sur les côtés; tête très-petite , duveteuse ; pieds courts et gros ; quatre doigts , les trois intérieurs très-longs, les latéraux égaux , l'externe uni à l'intermédiaire par une membrane ; ongles médiocres pointus; pouce allongé portant un ongle

plus long que celui des autres doigts et tout-à-fait droit ; ailes très-samples; les deux premières rémiges plus courtes que la troisième et la quatrième qui sont les plus longues; deux forts éperons à chaque bord.

Jusqu'ici l'on n'est point encore parvenu à pénétrer les véritables intentions de la nature lorsqu'elle a pourvu le poignet de certains Oiseaux, d'éperons ou aiguillons forts et pointus; il semblerait qu'elle les ait destinés à des combats opiniâtres dans lesquels ils eussent pu faire usage de ces armes puissantes, et cependant presque tous ceux de ces Oiseaux, dont les mœurs nous sont connues, se font remarquer par leur douceur, par un caractère paisible et même craintif; on ne les a jamais vus, par des attaques dirigées contre les autres Animaux au milieu desquels ils vivent, troubler ainsi la.

tranquillité de leurs demeures habituelles. Tous les auteurs qui ont pu observer les Kamichis, soit sauvages, soit en domesticité , s'accordent à leur prêter des qualités qui les rap~.

io6 K.VM

prochent des Gallinacés, avec lesquels, d'ailleurs , ils ont de grandes analogies de formes. Tranquilles habitants des savanes marécageuses ou des plaines riveraines des fleuves qui coupent en tous sens la partie méridionale du Nouveau-Monde, ils y sont uniquement occupés de la recherche de leur nourriture qui se compose d'herbes tendres , de graines et autres matières végétales; lorsqu'ils ont subi le joug de la domesticité, non-seulement ils se familiarisent avec le maître qui pourvoit à leurs besoins , mais ils lui rendent de petits services par leur exactitude docile , par leur intelligente vigilance à prévenir et empêcher la perte ou

la fuite des autres volatiles de la basse-cour. Les Kamichis vivent en société; ils sont naturellement défians , mais peu sauvages ; ils ont la voix forte et sonore ; ils se tiennent assez souvent à terre dans les broussailles , quelquefois on les trouve perchés à la cime des Arbres élevés qui forment çà et là des bouquets isolés sur les lertres des plaines marécageuses. C'est au milieu des buissons abrités qu'ils établissent, à peu d'élévation, un nid spacieux dans lequel la femelle pond deux œufs proportionnés à la taille de l'une ou l'autre des deux espèces qui composent tout le genre. Les jeunes naissent couverts de duvet , et sont bientôt en état de pourvoir à leur subsistance sous la conduite des parens , ce qui établit encore un-point de ressemblance avec les Gallinacés.

Kamichi cornu , *Palamedea cornu/a*, L., Buff., pl. enl. 45i. Parties supérieures d'un noir cendré ou ardoisé, parsemées de quelques taches grises ; tête garnie de petites plumes duveteuses variées de blanc et de noir; abdomen blanc; lectrices alaires inférieures roussâtres ; rectrices égales, ce qui rend la queue currée.

Bec d'un jaune brunâtre ; sommet de la tête surmonté d'une corne droite et grêle dont la base est revêtue d'un fourreau semblable à un tuyau de plume; jambes et pieds recouverts d'une peau écaillusc noirâtre; lon-

KALN

gueur du doigt intermédiaire, quatre pouces. Taille , trois pieds.

Kamichi Chaïa ou Cïïaja, *Palamedea Uiava/ïa*, Ternm., pl. color.

219. Parties supérieures d'un noir ardoisé avec les plumes frangées de brunâtre ; sommet de la tête d'un bleu d'ardoise tache té de noir; nuque garnie déplumes longues et effilées d'un bleu noirâtre avec l'une des barbes plus claire; front, joues, gorge et haut du cou garnis de plumes duveteuses blanches ou d'un blanc bleuâtre ; un collier presque nu d'un blanc rougeâtre suivi d'un autre beaucoup plus large et plus épais garni d'une foule de petites plumes serrées, noires; le reste du cou et les parties inférieures d'un bleu ardoisé, varié de teintes 11 un peu plus foncées ; abdomen blan- > châtre; bec noirâtre, avec sa base 1 rouge; aigillons des ailes jaunes; 1 auréole des yeux et pieds rouges; ongles noirs. Taille, trente-deux pou- 1 ces. — Cette espèce est le type du gen- (re Chauna d' l'Ulger (Prod/o/aus Ma/a- (maliu/n et kvium). N'ayant pas pu , plus que ce profond naturaliste , étudier les caractères génériques du Cha- » ja, nous avùns dû suivre les erremens de tous les ornithologistes que j nous avons pu consulter, et nous L avons, d'après Temminck, adopté (T. m, p. 528 de ceDict.)legenre Cliavaria , dans lequel nous avons donné deux descriptions très- fautives d'une seule et même espèce que nous reportons aujourd'hui et ici dans sa véritable place. Nous la décrivons d'après uue dépouille parfaitement conservée et rapportée de la partie la plus méridionale du Brésil, (dil.z.)

* K AMPM ANNIA.hot. fhan. (Rafinesque.) Syn. de Zaathoxylum tricarpu/a, Michx. V. Zanthoxyle.

KANAHIA. bot. i'han. Genre de la famille des Asclépiadées et de la Pentandrie Digynie , L. , établi par R.Brown (Me/a. Hein. Suc. 1, p.

5g) qui lui a donné les caractères suivans : corolle campanulée , à cinq divisions profondes ; colonne it

KAN

i DÎ» ie renfermée dans la corolle; mironne staminale placée au sommet

ii tube îles filets, à folioles subulées, Hâtées par leur Jiarlie inférieure, impies en dedaus; masses polhnniiies pendantes; follicules grêles, iriés; graines aigrettées ?

iLc type de ce genre est X slsclepias •niflora de Forskahl et de Yahl \iy/nb. i, p. a5, lab. 7) , Planle in- :gène de l'Arabie heureuse, et qui été rapportée récemment par Sait !! l'Abvssinic. En adoptant le nom nnérique imposé par Brovvn , Schulss (Syst. Ircget. 6, p. g4) nomme :tle Plante Kannahia Kannali.

I KAN ARA - PDLLU. bot. puan.

iom de pays du Cynosurus indiens,

** KANAWA. uoT. puan. Syn. de lùrdia Seùeslena, L. , à Amboine.

'*KANCHIL. m a. m . Espèce du gen- 1 Chevrotin , V. ce mol , ou , par eruur , il a été écrit Krançhil. (b.)

•* KANDAR. ois. Syn. d Anhinga il Sénégal. (b.)

* KANDAWAR ou KOLKEN- OATI. pois. (Rcnard.)Svn. de Baltes > in gens , L. f-' . Baliste. (b.)

** KAN DEL. bot. phan. V. Can-

' * KANDIS. bot. phan. Adansou Vain, des Plant., 11, p. a désigné uus ce singulier nom générique le

epidium pe/fbtialiirn , L. (g..N.)

1KANEELSÏEIN. min. (Werner.) test-à- dire Pierre de Can-
nelle. Nom uus lequél les Allemands ont décrit >s pierres
connues dans le commerce dus le nom à ' Hyacinthes , et qui ,
lour la plupart , se rapportent à l'Es- :mite d'Haiiy. Quelques-
unes cepen- «nt, comme celles de Porto-Rico et

1 Groenland , sont des Zircons. fr.

ssonite et Grenat. (g. del.)

KANÈVE. bot. phan. L'un des Jins vulgaires du Chanvre. (b.)

KANGUROO. Kangurits.uxu. Ce

KAN 107

genre, l'un des plus remarquables, à tous égards, de la famille
des Marsupiaux, a reçu de Shaw el dilliger, les noms de Macro-
pus et d \ Ilalmaturits. Mais ces noms, tirés delà langue grecque ,
conviennent tout aussi bien à d'aulres Marsupiaux , tels que le
genre Poloroo , et même à beaucoup de Rongeurs, tels que les
genres Gerboise , Gerbille , Mérione et quelques autres : aussi
adopterons-nous de préféience, avec Lacépède , Dcsmarest,
Tiedemann , Quoy et Gainiard , le nom de Kangurtis fort ancien-
nement proposé par Geoffroy Saint-Hilaire. — Dans ce genre, le
membre antérieur , fort petit et assez peu reniai quable en lui-
même , a cinq doigts , dont les deux latéraux sont les plus petits,
et sont terminés par des ongles assez forts ; la paume de la main
est nue, et le radius permet à l'avant-bras une rotation entière.
Quant au membre postérieur, il s'éloigne tellement de 1 anté-
rieur, soit sous le rapport de ses formes, soit sous celui de ses di-
mensions, qu'il n'y a point de genre ou la diiférence soit aussi
prononcée.

Les pieds sont tétradactyles ; le doigt externe est assez gros et allongé; mais il n'est nullement comparable encore au doigt voisin, dont les dimensions dépassent toute proportion; son ongle, qui est un véritable sabot, et son métatarsien, sont surtout remarquables par leur volume. Cet os est six fois aussi long que le plus long des métacarpiens; fait d'autant plus digne d'attention , que le métacarpe conserve très-généralement les mêmes rapports de grandeur dans toute la série des Mammifères, comme on peut le voir, par exemple , chez tous les Carnassiers , à deux seules exceptions près.

Toutes les phalanges digitales, surtout les premières , sont pareillement très-grosses et très-allongées. Les deux doigts internes sont confondus ensemble jusqu'à l'ongle, en sorte qu'à l'extérieur ils font l'effet d'un seul doigt terminé par deux ongles.

Us ont aussi beaucoup de longueur,

io8

KAN

mais ils sont d'une extrême ténuité ; leurs métatarsiens , par exemple, n'ont qu'un diamètre douze fois environ moindre que celui du grand doigt ; ce qui forme une différence de volume véritablement énorme. Enfin , toutes les autres portions du membre postérieur présentent des dimensions considérables ; les deux os de la jambe sont près de deux fois aussi longs que ceux de l'avant-bras , et leur épaisseur, du moins celle de l'un d'eux, est aussi fort grande; disposition au reste qu'il est facile de prévoir à cause des nombreuses fractures qui , autrement , ne pourraient manquer d'être causées par les sauts prodigieux qu'exécutent les Kangaroos. — L'extrême allongement du pied est ce qui a valu à

ces Animaux le nom de Macropus : celui qu'ils ont reçu d'Illiger se rapporte à l'usage qu'ils font de leur queue pour le saut.

Ce prolongement caudal , si peu utile chez la plupart des Mammifères , et qui n'est même , chez beaucoup d'entre eux, qu'un organe rudimentaire, simple vestige qui semble ne plus exister que pour témoigner de l'utilité du plan général de la nature, est ici un organe de haute importance , on peut dire, véritablement un troisième membre. Le nombre des vertèbres caudales est ordinairement de vingt environ ; mais il augmente encore dans, certaines espèces , et il en est où il arrive même à former la moitié du nombre total des vertèbres.

Toutes , à l'exception des dernières , présentent toujours des dimensions (Considérables, et sont comme hérissées de larges et longues apophyses , tellement qu'on trouverait difficilement ailleurs la vertèbre dans un plus grand état de complication. Il est facile de juger , d'après ces détails, de la force des muscles auxquels elles donnent attache. Au reste , la simple inspection de la pelletterie de l'Animal suffit pour indiquer ce que prouve l'étude du squelette. On voit en effet que la queue, d'ailleurs couverte de poils dans toute son étendue, est d'une force et d'une épaisseur

KAN

considérables. Enfin, la présence de la bourse chez la femelle , et de testicules extrêmement développés chez, le mâle; celle de l'os marsupial aplati et assez long, et surtout les proportions du corps , beaucoup plus gros vers la région inférieure que vers la supérieure, d'où résulte pour l'ensemble de l'Animal une forme presque que conique , achèvent de démontrer la richesse extrême

du développement de tout le train postérieur. Le même fait, qui s'observe d'une manière plus ou moins distincte chez tous les Marsupiaux, est le mode particulier de génération de ces Animaux, tiennent à une seule cause, à l'absence d'une av-r 1ère, comme Geoffroy Saint-Hilaire est

J'ai revu à le découvrir, et comme nous le montrerons avec détail dans un autre article. ^". Marsupiaux. — Les Kangaroos ont la tête assez allongée ■ (Surtout dans les grandes espèces); les oreilles de forme variable, et les moustaches peu développées; leur verge n'est point fourchue comme celle de plusieurs autres Marsupiaux. Leur système dentaire est très-re marquable par l'absence des canines et par la disposition des incisives inférieures; celles-ci, au nombre de deux seulement, sont très-longues très-fortes, et ont une direction tout-à-fait horizontale; les supérieures qui sont au contraire au nombre de six, sont larges, disposées sur une ligne courbe, ont une direction verticale, et sont, du moins dans la plu part des espèces, à peu près égales du reste, aux deux mâchoires, les' incisives sont séparées des autres î(1[dents par un espace assez considérable. On a cru long-temps que lei ^ molaires étaient au nombre de cinq de chaque côté et à chaque mâchoin chez tous les Kangaroos, mais on avait trop généralisé ce que l'observatioi avait montré seulement à l'égard di quelques espèces. Fr. Guvier a re-|* connu qu'il existeseulement chezplu sieurs quatre mâchelières, au lieu d cinq; il a même pensé, à cause d cette différence dans le système dentaire, devoir subdiviser le genre Kan

KAN

ijmroo, et il a proposé d'adopter pour premiers, le nom d'illiger, Hal-Vtaaturus, et pour les seconds, celui j|" Shaw, Macro-

pus. Le même zoo- ;>:giste avait plus anciennement par- [lîgé le genre d'après la considération |f: la présence ou de l'absence d'un lluufle; m!iis il n'a pu encore vérifier cces deux modes de division se correspondent.

II La Nouvelle-Hollande et les îles pivironnantes sont la pairie des Kin- Imroos , mais ils vivent très-bien IddS nos contrées et peuvent même | f reproduire. Ce sont des Animaux •scnlielle- ment frugivores, mais qui langent sans répugnance tout ce i Von leur donne , comme l'ont cons- Ué Quoy et Gaimard, qui, ayant wssédé vivant un de ces Animaux, mit vu manger plusieurs fois de la aande et du cuir même. Le même mimai buvait aussi du Vin et de ■?àu-de-vie. Dans l'état de liberté, • > Kanguroos habitent les lieux boi- *s, et vont ordinairement en troupes Mil nombreuses. Ils se tiennent hattillellement dans la situaion vertille, posant sur toute la longueur !! leurs pieds de derrière et sur leur meue qui fait véritablement l'office :un troisième membre. Ils peuvent , : t-on , franchir d'un saut r une disnnce de près de trente pieds , ce qui

paraîtra pas incroyable, si l'on se rppelle la force prodigieuse de leurs oemhrcs postérieurs et de leur queue, if emploient souvent aussi poïlr la "ogression leurs membres anlé- ■eurs , et même avec assez d'avan- Jge , parce qu'alors une succession uus rapidedes mouvemens compense iup peu d'étendue. Quoy et Gaimard, iii ont assisté à plusieurs chasses ix Kanguroos , ont même remarqué

que lorsqu'ils étaient vivement uirsuivis par les Chiens, ils couieni toujours surlelirs quatre pieds, ' n'exécutaient de grands sauts que îand ils rencontraient des obstaes à franchir. » Au

reste, pour la nirse comme pour le saut, ils ne rent pas moins d'avantage de la chesse de développement de leur

KAN 109

queue. Dans le saut, elle leur sert tour à tour de ressort et de balancier : dans la course, ils l'appuient sur le sol, et enlevant avec force leurs membres postérieurs , ils les rapprochent avec rapidité de ceux de devant; d'où résulte un mode de progression analogue , à quelques égards , à celui d'un Hommequi marche sur des béquilles. Leur queue ne leur est pas moins utile dans les combats qu'ils se livrent entre eux*; soutenus sur elle, et s'appuyant

J>ar leurs membres antérieurs sur eur adversaire lui-même, ils lui lancent de violens coups do pieds , et lui font, au moyen des ongles de leurs grands doigts , de profondes et dangereuses blessures. On a vu même quelquefois à la ménagerie du Muséum , ou l'on nourissait, il y a quelques années , de grands Kanguroos , ces Animaux attaquer de cette manière leurs gardiens euxmêmes.

Les espèces de ce genre sont nombreuses, et il esta penser qu'il en reste plusieurs encore à découvrir.

Celles que nous allons faire connaître d'abord, ont été, jusqu'à Geoffroy Saint-Hilaire , confondues sous les noms de Kanguroo Géant, Dide/phis (iigantea , Gmel; Macropus major, Geoff. St.-Hil. , parce que les couleurs générales de leur pelage sont généralement à peu près les mêmes; mais néanmoins elles se distinguent, on peut dire , par de nombreux caractères.

Le Kanguroo brun enfumé, *Kangurus ftiliginosus* j Geoff. St.-Hil. , a quelquefois six pieds de hauteur. Il e*t généralement d'un brun fuligineux en dessus, gris roux en dessous, roux sur les flancs; ces couleurs se fondant sur leurs limites l'une avec l'autre : les quatre pâtes , une portion de l'extrémité du museau , Je derrière du coude, sont d'un brun noirâtre ; les oreilles , brunes sur leur face convexe, sont bordées de poils blancs; enfin, la queue , rousse en dessous , est en dessus d'un brun d'abord clair, mais qui devient très-

no KAN

foncé, et passe même au noir vuis son extrémité. , ,

Le Kangukoo a moustaches , *Kaiiguriis /abiattts*, Geoff. St. -H., est moins grand que le précédent. Son pelage est plus clair en dessus : ltj dessous de son corps, la face interne de . la jambe et de lavant-bras, 1" larse , une grande portion du dessous de l.i queue , sont d'un gris roussâtre. Les oreilles sont brunâtres sur leur face convexe, blanches sur l'autre.

Aux membres antérieurs les doigts sont noirâtres; aux postérieurs , leur face supérieure est noire , avec du roussâtre tout autour de chaque tache noire. La queue, d'abord grise, passe dans son dernier tiers environ au brun noirâtre en dessus et sur les côtés, au roux en dessous. Enfin le bout du museau est blanc, et l'on remarque sous le menton deux lignes brunes parallèles en devant , mais qui se réunissent en arrière. Cette espèce habite , ainsi que la précédente , la Nouvelle-Hollande, i Le Kanguiioo gius-tîoux , *Kangurus rufo-griseus*, Geoff. St. -H., est encore moindre que le Kanguroo à moustaches : il n'a que troispieds et demi. Il est généralement d'un gris-roux tirant sur le blond; celte couleur. devient

très-pâle en dessous , et le dessous du corps est même blanc sur sa partie médiane ; mais elle est beaucoup plus foncée en dessus : elle passe au gris brunâtre sur les quatre extrémités , et au brun noirâtre sur la dernière partie de la queue. Les oreilles sont plus arrondies que dans les espèces précédentes. La Nouvelle-Hollande est également la patrie de cette espèce.

Le Kanguhoo a col houx , *Kaiigurus rujicollis*, Geoff. St. - H. , est encore beaucoup plus petit : il est d'un gris plus ou moins roussâtre en dessus et sur les flancs; mais la légion postérieure du col est rousse. La face interne des membres est blanche, ainsi que la partie médiane du dessous du corps; mais cette partie blanche n'a qu'une très-petite largeur, et n'est presque, pour ainsi dire , que linéaire. Ce caractère , non

KAN

encore remarqué , est cependant un de ceux qui la distinguent plus la distinction de cette espèce. Le dessus de la queue est gris roussâtre , le dessous blanchâtre. Les oreilles sont de même couleur que dans les premières espèces , mais de même forme que dans le Kangaroo gris roux. Les pales de devant sont noires; les doigts des postérieures sont gris-brunâtres , mais avec du roussâtre en devant.

Le lèvre l'œil est roux , et celui de la bouche blanc; cette dernière tache se prolonge un peu vers l'œil.

Cette espèce a été trouvée à l'île Kingi; F. Cuvier a décrit sous le nom de Kangaroo vineux un Kangaroo qui présente tous ces caractères , mais dont le pelage est plus gris , et la tache labiale blanche un peu; plus prononcée : le Muséum possède] aussi un autre individu qui est au contraire pins roux. : mais un troisième

fait si bien le passage de celui-ci au Kanguroo vineux, qu'il est difficile de ne pas les considérer comme appartenant à la même espèce.

Le Kanguroo de l'île Eugène, Pérou; *Kangurus Eugenii*, Desm.

Cette espèce a été découverte par Pérou dans les îles de Saint-Pierre, où.

on la rencontre en grandes troupes; elle paraît ne pas exister dans le continent. On prendrait au premier coup d'œil ce Kanguroo pour un jeune âge de l'espèce précédente, à cause de ses couleurs qui sont fort peu différentes, et de sa petite taille; en effet, il n'a qu'un peu plus d'un pied et demi:

mais il se distingue par l'épaisseur et le moelleux de sa fourrure, par la largeur de la partie blanche du dessous de son corps, et par quelques autres différences dans sa coloration :

mais il faut avouer que ces petits caractères n'autoriseraient pas à le regarder comme une espèce à part, si Pérou ne nous donnait la certitude de ce fait, en nous apprenant qu'il vit en troupes nombreuses.

Le Kangukoo a bandes, *Kangurus fasciatus*, Pér. et Les., est généralement gris-roussâtre; mais la moitié inférieure du corps est en dessus

KA.N

,ayéc transversalement de gris, de .loux et de lioir, de manière à produire un effet très-agréable; d'oii le laom de Kanguroo élé-

gant', qu'un a il ussi donné à celle espèce. Le dessous ilu corps est gris; les tlnncs, les membres et le museau sont , au contraire , blus roux que le reste du corps La |i|ueue est grise avec son extrémité îaoire. Le museau est court , et la tête globuleuse. Cette espèce vient de l'île dernier et des îles voisines.

Le Kanguroo Filandre , Kangu- :us P/iiiander, Geoll". , qui a reçu aus.-i •es noms de JJidelphis asiatica, l'ail., rOi(/c//>/iis ffru/iti, G en., Kangums EBn/nit, Desm., habite les îles d'Aroe, celle de Solor , et quelques autres de :celles de la Sonde. 11 est généralement brun en dessus; mais le dessous du corps et la partie interne des membres sont roux : le museau et ees doigts sont noirâtres , et la queue >st noire avec un peu de blanc à son extrémité. Les oreilles sont brunâtres, wee du roux à leur base. L'individu ipue possède le Muséum, était élevé rn domesticité à Batavia , sous le nom Me Pelauduc ou Felandor Aroè , ou ^apiu d'Aroè : il a environ deux pieds 1 1 demi de hauteur.

Le Kanguroo df. Ladillaudièie , >Xangurus BUlardierii. Desmarest a tonné ce nom à une espèce découtrte à la terre de Van-Diémen par oabillardicrc ; elle ressemble beaououp pour sa coloration à l'espèce précédente , mais elle s'en distingue »ar ses mains qui sont d'un brun doux , et sa queue de même couleur me le corps, ç esl-à-dire brunâtre en cessus et roussâlre en dessous. A ces taractères ou peut joindre en outre 62S suivans : une ligne jaune se remarque sur la lèvre supérieure, et •■e prolonge en arrière un peu au-delà fe la commissure des lèvres. Les on- I les sont très-compi imés , au lieu d'erre déprimés , comme ils le sont dans 'espèce précédente; et toutes les inisives supérieures sont presque égaes : les deux inférieures sont larges t allongées. F. Cu- vicr est le pre- 1 nier qui ait regardé cette espèce

KA.N

comme dislineie du Filandre, et qui l'ait décrite. Desmarest lui a depuis donné le nom du voyageur auquel nous en devons la connaissance. Au reste l'individu que possède le Muséum pourrait bien u'être qu'un jeune âge , soit de quelque espèce encore inconnue , soit même de l'espèce précédente.

Le Kanguhoo laineux , Kangums laniger {F. planches de ce Dictionnaire), découvert et décrit sous ce nom pu- Quoy et Gaimard , est un des objets les plus précieux dont leur beau voyage ail enrichi la Zoologie. Cette espèce nommée aussi par Desmarest Kangurus ru/i/s , et qui est de même taille à peu près que le Kanguroo brun •enfumé, est d'un beau roux sur la tête, le col, les flancs, le dos, la face externe des bras et des cuisses , et le dessus de la queue , dans sa première partie : le re-te du pelage est blanc à l'exception des oreilles couvertes en dehors de poils grisâtres, et des doigts qui sont d'un brun roussâtre. Mais ce Kanguroo est surtout remarquable par ses membres encore plus allongés qu'ils ne le sont dans les autres espèces, et par son pelage qui rappelle celui de la Vigogue, tant par la nature de ses poils doux au toucher, frisés et véritablement laineux , que par sa belle couleur. L'individu rapporté au Muséum par Quoy et Gaimard, leur a été donné au port Jackson ; mais il venait des environs du port Macquarie.

Desmare>t a décrit sous le nom de Kanguroo Gaimard , une fort petite espèce rapportée également de la Nouvelle-Hollande par Quoy et Gaimard. Ces savans voyageurs la regardaient également comme une espèce du genre Kanguroo, et se proposaient de lui donner le nom de Lepturus : mais- avant ensuite retrouvé son

crâne, ils ont reconnu qu'elle n'était autre que le Kanguroo-Hat, espèce qu'on a séparée avec raison des Kanguroos , sous le nom de Potoroo :

nous renvoyons donc sa description à ce mot. (rs. o. st.-u.)

iiA KAR

KANNA. bot. phan". On ne connaît pas le Végétal que Kolhe désigne sous ce nom comme fournissant aux Hottentots une racine excitante qu'ils mangent, ainsi que les Indiens font du Gingembre. (b.)

* KANTA. bot. crypt. (Champignons.) Ce genre , établi par Adanson (Famille des Plantes , n , p. 3) figure dans la deuxième section de la famille des Byssus; il se caractérise ainsi : filaments cylindriques, ramifiés au sommet et réunis en bas , dans une grande partie de leur longueur , en une masse spongieuse, substance humide ou aqueuse se desséchant en peu de temps à l'air sec en une substance spongieuse. Ainsi circonscrit , le genre Kanta n'est qu'une division du Byssus de Micheli et de Dillen. Adanson n'ayant point fait de Species, il devient assez difficile de préciser les espèces de Plantes auxquelles il faut rapporter le genre Kanta. Il paraît à peu près certain que l'une est le *Telacodium* telare de Persoon et l'autre le *Dematium strigosum* du même auteur. Le genre Kanta n'a point été et ne pourrait être adopté. (a. f.)

KANTUFFA. bot. pitAN. Mimeuse d'Abyssinie mentionnée et figurée par le voyageur Bruce, mais que les botanistes n'ont encore pu détermi-

ner. (bO

KAOLIN» min. Espèce d'Argile.

V. ce mot. (b)

KAPIRAT. pois. V. Capirat et Cltjpe. (b.)

KAR A-ANGOLAM ou KARAN- GOLA.M. bot. phan. Rhéedc {Hort.

Malab. T. iv, p. bâ , t. 26) a décrit et figuré sous ce nom un Arbre de la coté de Malabar, dont le fruit est une drupe charnue de la grosseur d'une petite pomme. Adanson l'a rapporté à la famille des Onagres, mais ce rapprochement ne semble pas na- UireL (g..n.)

* KARABË. min. Syn. de Succin.

P\ ce mot. (B)

KAR

* K ARABIQUE, min. V. Succiniqtje au mot Acide.

KARABOU. BOT. PHAN. r. CARA- BOTJ.

* KARAD. bot. phan. (Forskahl.) J^ . Alcarad.

* KA.RAKAL. mà.m. Même chose que Caracal. V. ce mot et Chat, (b.)

* KARAMBOU. bot. phan. Nom de la Canne à sucre dans le centre de l'Indostan où l'on distingue deux variétés appelées, noire Seu-Karambou, et blanche Vallé-Kararnbou. (b.)

KARAPAT. bot. phan. V. Cakapat.

KARARA. ois. Syn. d'Anhinga.

V. ce mot. (dr..z

KARAT, bot. et min. V. Kuara.

KAR AT AS. Karatas. bot. phan.

Genre de la famille des Broméliacées et de l'Hexandrie Monogynie, L. , proposé par Plumier, réuni par Jussieu au *Bromelia*, mais qui, néanmoins , mérite de rester distinct. Ses fleurs forment des espèces d'épis ou des grappes rameuses; elles sont accompagnées de bractées très-grandes qui, quelquefois, les cachent entièrement. Leur calice est soudé par sa base avec l'ovaire infère; son limbe, légèrement tubuleux , est à six divisions, quelquefois inégales et un peu obliques ; trois sont extérieures , trois intérieures plus ou moins minces et plus colorées, semblent être en quelque sorte une corolle formée de trois pétales. Les étamies , au nombre de six, ont leurs filets courts , leurs anthères sagittées. L'ovaire est infère, à trois loges polyspermes; le style est terminé par trois stigmates oblongs et obtus. Le fruit est une baie quelquefois presque sèche, à trois loges polyspermes.

Ce genre se distingue surtout du *Bromelia* par ses fleurs distinctes les unes des autres, souvent disposées en grappes ou en panicules , et par ses fruits également distincts. Il faut y rapporter les *Bromelia Karatas*, *B. Pinguin*, etc. (a. r.)

KAR

IKARBENI. bot. phan. Adanson ?Pam. des Plantes, a, p. 116) donlit ce nom à un genre qui a pour rpe le *Centaurea benedicta*, L. V.

IENTAUBÉE. (G..N.)

•* KAREINA ou KEFSCH. bot.

uan. Syn. arabe de *Cynanchum arl'/eum*. (b.) '* KARETTA-AMELPODI. bot.

Han. (Rhéed., Mal. 5, p. 65, tab. 35, gg. 2.) Arbrisseau incomplètement iimnii qui croît dans les terrain»

merreux et sablonneux de la côte de malabar. Ses fleurs penlandres sont ùunies en panicules corym Informes jjx extrémités des rameaux; leur muleur est blanche, rayée de rose 11 dessous, et formée d'une corolle < cinq divisions ouvertes eu étoile; > s an-thères sont rouges ainsi que le \yle qui est fourchu. Le fiuitest une ippsule arrondie et verdâtre. (b.)

KARGILLA. bot. piian. Genre iroposé par Adauson (Fam. des liantes, a, p. i3o) qui y réunissait (C/irjsogo/tum , L. , le *Metam-podium*, . , le *Wedelia* de Jacquin, et des an tes placées dans les genres *Chijwnthemum* et *Bidens* par d'anciens .ateurs. Ce genre n'a pas été adopté.

1KAR1A. ins. V. Cakia.

I KARIBËPOU. bot. FHAN.(Rhéede, tort. Mal. , tab. 4 , pl. 55). Les Ma- Ibaics nomment ainsi une espèce

Azédarach qui est fort voisin de AAriabépou s'd n'est pas le même irbre. (b.)

1KARIBOU. mam. Pour Caribou.

"" . Cerf. (b.)

KARIL. bot. piian. f. Zalicô.

'* KAR1NE. ois. (Buflbn.) Syn. de iorbine. V. Cohbeau. (db..z.)

IKARI-VITANDI. bot. phan. V.

IABA.PU.

1 KAROD1. bot. phan. Nom que les ■ âmes donnent à lar-Plantc décrite I figurée par Rhéede {Hort. Malab.

• VI1 > P- 97 , tab. 52) sous le nom : Podava-Kelengu. Cette Plante, iiti a le port des Srnila.x , c'est-à-dire

TOME IX

KAR 1 1 5

qui a une tige volnbileet épineuse, et de grandes feuilles alternes à plusieurs nervures longitudinales , a été décrite trop incomplètement pour qu'on puisse être certain de sa classification. Cependant Jussieu lui trouve de la ressemblance avec le Trichosanlhes , genre de la famille des Cucurbitacées. (g..n.)

* KAROU-BOKADAM. bept. oph.

Nom de pays de la Cabère , espèce de Couleuvre. F. ce mot.
(b.)

* KAROU-VAIPYLAI. bot. phan.

(Leschnaull.) Syn. de Bergera Koenigii aux environs de Pondicliéry.

KARPATON. bot. phan. Genre de la famille de; Caprifoliacées et de la Diandrie Monogynie, L., établi par Rafinesque [Flur. Ludou., p. 79) qui lui a donné les caractères suivans :

calice adhérent, quadridenté ; corolle tubuleuse, divisée au sommet en quatre segmens formant deux lèvres ; deux étamines à anthers écartées; style placé sous la lèvre supérieure de la corolle; stigmate simple; capsule couronnée par le calice (uniloculaire?) , contenant quatre graines.

Ce genre , imparfaitement connu, paraît avoir quelques rapports avec le Dicella. Il ne renferme qu'une seule espèce , Karpaton hastatum , Raf. , loc. cit. C'est un Arbrisseau indigène de la Louisiane, ayant des tiges anguleuses, divisées en rameaux sessiles, à feuilles opposées, hastées, glabres et inégalement dentées vers leur base. Les fleurs sont petites, axillaires, agglomérées, sessiles" et verticillées. (g.N.)

* KARPOLITE. uis.Karp/iolite et Strohstein , Wern. Minéral en fibres soyeuses et rayonnées, d'un jaune

de paille, avec un éclat légèrement nacré, donnant de l'eau par la calcination , et l'indice du Manganèse par la fusion avec la soude. Pesanteur spécifique , 3,63. Il est composé , d'après une analyse de Stromeyer, de Silice, 36,1 5; Alumine , 36,67 ; Oxyde

de Manganèse , 19,16; Eau , 10,78; Oxide de Fer, 2,29; Chaux, 0,27;

ii4 KAT

Acide fluorique , 1,47. La Karpholile a été trouvée dans le Granité à Schlackenwald en Bohême, (g. del.)

KAROCK. ois. Espèce du genre Cassican. 'f. ce mot. (b.)

* KARPOU-OULOCNDOU. bot.

phan. (Lescheuaut.) Syn. de P/iaseolusMax aux enviions de Pondichéry .

TAM

KARUKA. ois. Espèce du genre Gallinule. V. ce mot. (b.)

* KARUMB. bot. phan. P~. Co-

RAMBÉ.

KASARKA. ois. V. Casarca.

KASCHODÉ. pois. (Sonnini.) V.

MoiUIYRE.

* KASMIRA. pojs. (Forskahl.)Syn. de Bengali , espèce de Ūia-cope. F \ ce mot. (B.)

* KATAF. bot. phan. Espèce du genre Amyris. V. ce mot au Supplément, (b.)

* K AT E- ALLHEN El . bot. phan.

Même chose que Chefe Allimar. V.

ce mot. (b.)

* KATENAKU et KATEVALA.

bot. phan. Syn. à'Alqe uulgaris , L., à la côte de Malabar. (b.)

* KATIANG-BALI. bot. phan.

(Ruinph, Amb., tab. 5, pl. 1 35.) Syn.

•de Cytisus Cajou, L. V. Cajan. (b.)

* KATOU-BELUTTA-ARCELPO- DI. bot. phan. (Rhéede, Horl. Mal.

5, lab. 35,fig. 1.) Petit Arbre indéterminé qui croît dans les lieux montagneux de l'Inde , et qui paraît trèsvoisiu du Karetta-Amelpodi. V. ce mot. (b.)

KAT

KATOU et KATTU. bot. phan.

Ces mots, de la langue malabare, et qui ont passé dans plusieurs des pays ou cette langue a pénétré , paraissent être une désignation générique, et entrent dans la composition de beaucoup de noms de Végétaux; ainsi l'on nomme :

Katou Adamboé , dans l'Inde; l'un des deux Arbrisseaux qui formaient le genre Adambaa de Lamarck. V.

Adambéci Lagerstromie.

Katou-Alou. V. Catu-Alu.

* Katou-Banda, à Madagascar, un Oldenlandia indéterminé.

Katou Calesjam , le Mce-Mœ des Iudous. Arbre qu'on ne peut reconnaître sur les indications imparfaites qui en ont été données.

Katou Cara, le Laurus Malabattrum .

Katou Gara-Walli, le Pisonia milis.

Katou Kadeli-Poeta , le Lagerstroëniia hirsuta.

* Katou- Kapei,, le Sang de Dragon ou quelque Aloës.

Katou Karoa , le Laurus Cinnamomurn. V. Laurier.

Katou-Konna , Ylnga ligemina.

Katou Narégam , le Punica Granatum. V. Grenadier.

Katou-Nichi-Kua , YAmomum Zerumbet , L.

Katou- Norum, le Pliyllanthus Maderaspatensis , L.

* Katou Pachale, le Base/la rubra.

Katou Patjotti , le Croton castaneifolium , selon Burmann.

Katou-Ponam Marawara , le Ma- l; Iaxis odorata.

Katou-Taudale , le Crotalaria - Juncea , L.

* Katou-Teka , un Arbre imparfaitement connu dont Adauson {Parti, Plant. 1, p. 15g} n'a pas laissé qu de former un genre dan»

la famille 1 des Onagraceae.

* Katou-Tjandi, le Dolé du Petit-Thouars a formé son genre 1 Canavali.

Katou Tjéroé , un Arbre imparfaitement décrit par Rhéede, don ;;

KEF

..Ullson (Fam. Plant, s , p. 84) a formé un genre dans sa famille des Onagraceae.

Katou Tsiaka , le Nauclea orientalis , L.

Katou-Tsiamisou , le Sorinètia indica , L.

Katou-Tsoulam, le Zizania teres/risi («•»)

KATRAKA. ois. (Burm.) E?pèce m genre Pénélope, P/istiani/s Mot- 110/, L. De l'Amérique méridionale.

. PENELOPE. (DR.iz.)

K. ATU B A R A-M AREC A. bot.

miAN. (Klischee.) f. Canavali.

* KAUKA. bot. niAN. V. Cauaanthé.

* KAULFUSSIA. bot. piian. Srfus ee nom, Nées d'Esenbeck {Hune '.'/ijsicœ Burulinenses , p. 55) a décrit un genre de la famille des Symplocarées , que Cassini avait fait connaître antérieurement sous celui de C/ia- \ieis. y. ce mot au Supplément.

KAUROCI. BOT. PIAN. V. Caj> UDLNION.

KAYEKIN. liOT. ru an. Nom d'une spèce tic Mimusops indéterminé de i côte de Coi omandel. (B.)

* K A Y- Y A R AGQUS,. bot. phan.

l'u'on prononce Kay-Vous. Syn. de fvhosu/vs Coracanus , L. , aux envims de Pondichéry V. CYXosrrur..

K.EBATH. bot. piian. Nom arabe l'une espèce du genre Ménisperme , 'ténisperme erfulc , Yalil , dont lorskahl avait formé un genre Cvba- ,ta qui n'a pas été adopté. Les fruits 3 cet Arbre sont une petite baicâcrc)Dnt ou extrait une liqueur enivrante.

* KEBER. Ins. (Scopoli.) Syn. de unnelon , Scarabœus Melulntha, L.

KEBÛULouKIEBOUL.eot.piian.

tnon Kelboul. f. Cieboul.

KEFFÉKILITHE; min. Substance uiuérale encore indéterminée , trouée près de Kaffa en Crimée , et ainsi

nommée par Fiscber qui la regarde comme uneLilliomarge endurcie. On a donné aussi ce nom à une Pierre argileuse compacte d'un rouge brun , a cassure coneboïde et à giams lins, trouvée à Weltin sur la Sàjak Elle a l'apparence du Jaspe sans en avoir la dureté. (a. dix.)

* KEFSCH. BOT. PHAN. V. Kabei- NA.

* KÉHÉLUAHA. bot. piian. L'un des homs'de pays du Bananier, àCeylan particulièrement, (b.)

* KLKLIK. pois. Espèce île Labre.

V. ce n:ot. (b)

KÉKUSCHK.A . ois. Espèce du genre Cana:d. F. ce mot. (b.)

* KELB-EL-BAIIR ou KELB-EL- MOYEII.pois. C'est-â^di'rè
Chien de fleuve ou Chien d'eau. Nom arabe des

Poissons du sods-genre Hydrocyn, qui indique la voracité de
ces Animaux, (b.)

* KELL. bot. piian. V. Cej.l.

KEMAS. imam. Probablement le Nagor dans Elien. V.
Antilope.

KEMETRI bot. piian. Hu-

MECTHE.

* KEMMOR. pois. ; Ilésychius.) Nom grec d'un Poisson ou
peut-être d'un Cétacé q'UÎ ne nous est plus connu. (b.)

* KE.M PH AANTJES. hept. s.vun.

Syn. île Lézard- Léguan. V. Iguane.

KEMUM. bot. piian. r. Kha-

MOUN

KÉNIGIE. bot. piian. Pour Kœii'gie. f. ce mot. (b.)

K.ENNA. BOT. PIIAN. F. CIENNA.

* K.ENNÉQIE. Kennedia. bot.

piian. Genre de la famille des Légumineuses, et delà Diadulpie Décandrie, L. , établi par Vntenat (Jard. Mal m. p. io4) pour quelques espèces de Clycine originaires de la Nouvelle- Ilollande , et qu'il caractérise ainsi : calice bilabié ; lèvre supérieure émaignéé, lèvre inférieure à trois divi-

ne

KEN

sions égales; corolle papilionacée ; étendard redressé et recourbé vers la base de la fleur, maculé vers sa partie inférieure; ailes étroites, rapprochées contre la carène qui est éloignée de l'étendard; étamines diadelphes ; style long, terminé par un stigmate obtus; gousse allongée, plane, séparée en plusieurs loges paire fausses cloisons membraneuses et transversales , à peu près comme dans les Casses ; graines solitaires dans chaque loge.

Ce genre se compose de quatre à cinq espèces , qui sont de petits Arbustes sarmenteux, àtige volubile; les feuilles sont alternes , pétiolées , composées de trois ou rarement d'une seule foliole coriace , articulée avec le pétiole. Les fleurs sont tantôt axillaires et tantôt terminales, portées sur des pédoncules simples ou mul-

flores. Quelques-unes des espèces de ce genre sont cultivées dans les jardins; telles sont les suivantes :

Kennédie purpurine , *Kennedia rubicunda*, Vent. , loc. cit., p. 104, tab. 104; *Glycine rubicunda*, Willd., Sp. Ce joli Arbuste a ses liges volubiles , ses feuilles pétiolées , composées de trois folioles ovales , aiguës , très-entières ; ses fleurs, grandes et purpurines , sont placées à l'aisselle des feuilles et portées sur des pédoncules rameux. Cette espèce fleurit pendant la plus grande partie du printemps et de l'été. On la cultive en orangerie.

Kennédie rouge , *Kennedia coccinea*, Yent., loc. c/A, tab. 10.ô. Cette espèce se distingue de la précédente par ses feuilles dont les folioles sont obovales , très-obtuses et un peu émarginées; par ses fleurs beaucoup plus petites, d'un rouge écarlate, ayant l'étendard marqué de deux taches jaunes à sa base. Ces fleurs sont réunies au nombre de sept à huit au sommet d'un pédoncule long et grêle.

Kennédie monophylli/le , *Kennedia monophylla*, Vent., loc. cit., lab. 106.

Cette jolie espèce est fort distincte des deux premières, par ses feuilles simples , cordiformes , lancéolées ,

KEN

obtuses; ses fleurs sont petites , violacées, formant des espèces de grappes rameuses, courtes, placées à l'aisselle des feuilles. (a., r.)

KÉNO. BOT. PHAN. V. Chéno.

* KENTADRIS. bot. phan. V.

Centaurion.

KENĬIA. bot. phan. Adanson avait établi , sous ce nom , un genre aux dépens des *Trigonella spinosa* et *polycerata* , L. Ce genre n'a été adopté par aucun botaniste, si ce n'est par Mœnch qui a changé son nom en celui de *Buceras* dont Allioni et Haller se servaient pour désigner le genre *Trigonelle*. r. ce mot. (g..n.)

KENĬRANĬHUS. bot. phan.

(Necker.) f. *Centranthus*.

KENTROPHYLLTJM. bot. phan.

A l'article *Centkophylle* de ce Dictionnaire , nous avons dit quelques mots sur ce genre établi par Necker {Elem. Bot., n° 155}; mais en annonçant qu'il avait été adopté par De Candolle, nous ignorions où ce savant professeur avait consigné son observation. C'est pour réparer cette omission que nous allons entrer dans quelques détails sur le genre *Kentrophyllum*. Il se compose d'espèces que Linné a placées parmi les *Carthamus*, et qui ont été réunies aux *Alractylis* par Adanson , Scopoli , Gacrtner et Mcencb. Enfin, De Candolle (*Flore Française*) les avait rapportées au genre *Centaurea*; mais, dans son premier Mémoire sur les Composées , il adopta le *Kentrophylian* de Necker, dont il fit un des genres de ses *Centaurees*. Mœnch avait bien observé que tous les fleurons de la calathide sont réellement hermaphrodites. Sous ce rapport, le *Kentrophyllum* est réellement distinct des *Centaurea* qui ont les fleurs marginales de la calathide stériles ou neutres. Par le reste de l'organisation et surtout par la structure des étamines , il se rapproche beaucoup des *Carthamus* et

Carduncellus, Outre les Carthamus lanatus et Carthamus creticus , qui sont les types) j1 du genre, et que Cassini a nommé fi:

KER

XZenrophyllum luteum et Kent, al- »um , cet auteur pense qu'on doit probablement y rapporter les Carthamus glaucus et o.-vyacanthia. àe Marslihall-Bieberstein ; peut-être aussi le Va//. Jlavescens de Willdenow.

* KEPTUSCHA. ois. Espèce de Itécasseau. T-' '. ce mot. (b.)

KÉRACHATE. jün. La Pierre précieuse désignée par Plinius ce nom, paraît être une Sardoine. (b.)

*KÉRAMION. bot.crypt. Adanson[Fam. Plant. T. II, p. 15] : » formé sous ce nom un genre qui répond à celui que Donati appelle Ceramian- Hfemum. V. Céhamianthème. (b.)

* K.ÉR ASELMA. bot. ph a.n. Necker LElem. Bot., n. 54) a créé, sous ce nom , un genre aux dépens de [Eu— nhorbia , L. , mais dont les caractères •étaient d'une importance si faible)iue les auteurs (Adr. de Jussieu et Læper) qui ont travaillé récemment des Euphorbes, n'en ont pas même fait une section de ce genre. (G..N.)

* KÉRATE. min. Nom donné par *Mohs à l'un des ordres de sa seconde classe , celui qui renferme les Minéraux qui ont une apparence de corne , tels que les muriates d'Argent et le Mercure. (g. del.)

* KÉRATELLE. Keratella. inf.

Genre de la famille des Brachionides Dans l'ordre des Crustodés , caractérisé par un organe de cirres vibratils >e développant en rotatoire complet , à test capsulaire , postérieurement denté ou armé et dépourvu de queue.

Mousen connaissons une seule espèce déjà trouvée par Millier dans l'eau des étangs; elle y vogue avec rapidité , sans qu'on voie par quels moyens.

>Sa forme serait celle d'un carré un peu allongé, si deux sortes de cornes ou de pointes presque aussi longues se voyant par derrière aux deux côtés opposés , droites et parallèles enroent allongées aux côtés du lest , ne lui donnaient une forme particulière.

(C'est le *Brachionus quadratus*, Mill.,

KER n7

Inf., tab. 4g ,f. 12-10; EiiGycl. Vers , pl. »8,f. 17, 18. (b.)

KÉRATITE ou KÉRATI LITE.

MIN. Pierre de corne. INom donné par Lamétherie au Néopêtre de Saussure , le Silex corné de Brongniart , et le Hornstein des Allemands en partie. (G- DEL.)

KÉRATOPHYTES. folyp. Ce nom, qui signifie Plante de Corne, a été donné par les naturalistes du moyen âge à la plupart des Polypiers flexibles , et spécialement aux Antipates et aux Gorgones. K. ces mots

et CÉPHATOPHYTES. (E. D..L.)

KÉRATOPLATE ou CÉRATO- PLATE. Keratoplatus. iNs.-
Nomdon-^ né par Bosc à un genre de Diptères.

P~. CÉIIIOFLATE. (g.)

* KÉRADDRENIE. Keraudrejiia.

bot. phan. Genre nouveau établi par Gay dans sa Monographie des Lasiopétalécs (Mém. du Mus. 7 , p. 43i) , et qui fait partie de la famille naturelle des Biiltnériacées. Ses fleurs sont disposées en corymbes opposés aux feuilles, les pédicelles sont articulés vers le milieu de leur longueur.

Le calice est pétaloïde , étalé , persistant. Il n'y a pas de corolle; les étamines , au nombre de cinq , toutes fertiles et distinctes, ont leurs filets élargis par la base, rapprochés et se recouvrant latéralement; les anthères à deux loges s'ouvrent par un sillon longitudinal. L'ovaire est globuleux , à trois côtes saillantes et à trois loges contenant chacune plusieurs ovules attachés à l'angle interne. Les styles longs et grêles , au nombre de trois, sont quelquefois soudés entre eux par leur base. Lefruit est une capsule globuleuse , hérissée , ordinairement â une seule loge par avortement , s'ouvrant en trois valves. Les graines, presque toujours au nombre de deux , sont recourbées , réniformes.

Ce genre ne se compose encore que d'une seule espèce, Keraudrenia, hermannioefolia , Gay, loc. cil. , tab.

C'est un Arbuste roide, ayant le

n8 KER

port d'un Ilcmannia . Ses feuilles sont ailées, très-courtement pétiolées, ovales, elliptiques, sinuées* , rugueuses et hispides, accompagnées à leur base de deux stipules sélacées, denticulées, persistantes. Les fleurs, de grandeur moyenne, forment des corymbes pédoncules opposés aux feuilles. Cet Arbuste a été recueilli à la baie des Chiens-Marins, sur la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande , par Gaudichaud, naturaliste plein de zèle et de connaissances , attaché à l'expédition du capitaine Freycinet.

KERKODON. mam. V. Carc.

* KERMA. mam. F . Ecureuil

COMMUN

KERMÈS, thermes, tss. Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Homoptères , famille des Gallinseotes, établi par Geoffroy et réuni par Latreille au genre Cocheuille, dont il ne diffère que par le corps des femelles dont la peau est tellement distendue, qu'elle ne présente pas le moindre vestige d'anneaux, tandis que , dans les Cochenilles proprement dites , on voit toujours des apparences d'articulations qui rappellent l'existence des anneaux. Linné et Geoffroy ont donné ce nom à des Insectes bien différents : le premier désigne ainsi les Hémiptères que Latreille nomme Psylles (V. ce mot), et que Degér nomme faux Pucerons.

Geoffroy donne ce nom , avec plus de raison, aux Gallinsectes de Réaumur, parmi lesquels se trouve la Cochenille qu'on connaît vulgairement sous le nom de Graine d'écarlate.

Les mœurs des Kermès , que Geoffroy désigne sous le nom de Gallinsectes, tandis qu'il nomme Progallinsecles les Cochenilles, sont absolument les mêmes que dans ces derniers. Les Insectes de ces deux genres ont les mêmes habitudes , les mêmes caractères, les mêmes différences entre les sexes et les mêmes métamorphoses ; la femelle vit de même sur les Végétaux, s'y fixe, y pond ses œufs et meurt après avoir gonflé son corps

KER

outre mesure, de manière à recouvrir ses œufs comme le fait la Cochenille. Ces Insectes vivent sur les Arbrissaux et les Plantes qui passent l'hiver. La durée de leur vie est d'un an; c'est pourquoi elles ne peuvent exister que sur des Végétaux qui vivent au moins ce laps de temps. Arrivés à la dernière période de leur vie , ces Insectes ressemblent à de petites boules attachées contre une branche et dont la grosseur varie depuis celle d'un grain de poivre jusqu'à celle d'un petit pois; mais le plus grand nombre ressemble à un plateau renversé et leurs couleurs sont les assez variées. Ces Animaux attaquent surtout les Arbres fruitiers , et l'on voit quelquefois, au printemps, des Pêchers tellement couverts de ces Kermès oblongs et en petits grains , que leurs branches en sont toutes galeuses. Ce genre se compose d'une vingtaine d'espèces; l'une d'elles est employée en teinture pour faire de l'écarlate, et on en faisait surtout un grand commerce avant la découverte (de la Cochenille du Nopal ; c'est :

Le Kermès du petit Chêne , *Chermes Jlicis* , N., *Coccus liieis*, L., Fabr. Femelle sphérique, d'un rouge brillant, légèrement couverte d'une poussière blanche. Elle se fixe sur les tiges et quelquefois sur les feuilles d'une petite espèce de Chêne à feuilles épineuses qui croît dans les parages chaudes de l'Europe

méditerranéenne , surtout dans le midi de l'Espagne , ou , selon Bory de Saint-Vincent , les pentes de la Sierra Morena B en sont couvertes. Beaucoup d'habitans du pays de Murcie n'ont d'autre moyen d'existence que d'y venir récolter le Kermès. Arrivé à son dernier degré d'accroissement, ce Kermès a une couleur rouge brun. Les personnes qui font la récolte de cet Insecte, le considèrent sous trois états différens : dans le premier qui a lieu au commencement du printemps, il est d'un très-beau rouge et ? enveloppé d'une espèce de coton qui lui sert de nid, il a la forme d'un I bateau renversé, Dans le second état ,

KER

J> : Kermès est parvenu à toute sa «rt'oissance , et le coton qui le confirait s'est étendu sur son corps sous la forme d'une poussière grisâtre; il est dans son troisième état qui arrive au milieu ou à la fin du printemps de l'année suivante , on trouve sur son ventre dix-huit cents à deux mille petits grains ronds qui sont les œufs. La récolte des Kermès a quelquefois lieu deux fois dans l'année ; ce sont des femmes ordinairement qui récoltent les œufs avec leurs ongles. On les lave de vinaigre le Kermès destiné pour la teinture, on ôte la pulpe ou la poudre rouge renfermée dans le grain, on lave ensuite ces grains dans du vin , on les fait sécher au soleil, on les lustre en les frottant dans un sac ou on les renferme en les mêlant avec une quantité de poudre basée sur le produit de ces grains : leur valeur dépend du plus ou moins de poussière qu'ils rendent. Le vinaigre altère la couleur du Kermès; mais on en use pour détruire sa postérité.

Le Kermès oblong du Pécher , (Charmes Persicæ oblongus , Geoll'r. , JHist. des Ins., t. 1, p. 506, pl. 10 , ff. 4; C. Persicæ ,

Fahr. La femelle est l'oblongue, très-convexe, d'un brun foncé ; le mâle est d'un rouge foncé , ses ailes sont blanches , plus longues (plus que le corps , bordées extérieurement d'un peu de rouge : son abdomen est terminé par deux filets oblongs entre lesquels est une espèce de queue recourbée en dessous. On le trouve en Europe. Nous renvoyons pour les détails d'organisation et de métamorphoses, au mot Cochenille.

On appelle aussi Kermès, en quelques cantons, le Chêne (Quercus coccifera) qui nourrit l'Insecte dont il vient d'être question. (g.)

KERN ERE et KERNÉRIE. Kerneria. bot. r. v. N. Genre de la famille des Crucifères, établi par Mé- ■ dik. (J. n. l. ut. heu. Ann. 2 , p.

4a) pour le Myagrum saxatile de Linné , dont De Candolle , à l'exemple de Lamarck, fait une espèce de Cochlearia , employant le nom de

KERNERIA

Kerneria pour celui de la première section de ce genre. V. Cochlearia.

Ce nom de Kerneria a également été donné à d'autres Plantes. Ainsi Willdenow avait fait un genre Kerneria du Zostera oceanica de Linné. Moench en avait formé un autre sous le même nom du Bidens pilosa. (a. r.)

* KÉROBALANE. Kerobalana.

inf. Genre de Microscopiques dont nous proposerons l'établissement dans la famille des Drodiées ou cependant il ne peut guère

demeurer qu'artificiellement.. Les formes des espèces qui le composent sont absolument celles des Urcéolaires. Ce sont de véritables godets , de petits sacs vivans, mais absolument dépourvus de cirres ou d'organes vibratiles quelconques. La privation totale de ces parties les rejette conséquemment parmi les Gymnodés , quand on serait tenté , d'après leur forme , de les placer parmi les Urcéolaires. Cet aspect devrait encore les rapprocher des Bursaires, puisque, de même que ces Animaux, ils présentent dans certaines positions la figure de bourses ouvertes; mais outre que leur corps ne s'allonge jamais à la manière de celui des Kolpodes et des autres genres voisins, deux appendices en manière de queue ou de cornes ajoutent à la bizarrerie de leur structure.

Nous connaissons deux espèces de ce genre où l'on pourra peut-être admettre le Gland cornu de Joblot, quand ce Microscopique aura été revu et mieux examiné. Ces espèces sont le Kérobale de Miiller, *Kerobalana Mulleri*, N. , *Voilicella cirraia* , Miill., Inf., pl. 37, f. 18, 19; Encycl. , pl. 20 , f. 14, 15 ; et le Kérobale de Joblot, *Kerobalana Jobloti* , N. , Bourse ou Pot au-Lait, Jobl. , Micr. , part. 2 , p. 67, pl. 68 , f. 10. La première vit dans les eaux pures, la seconde dans les infusions de paille de Blé ou elle n'est pas fort rare. (b.)

* KÉRODON. *Kerodon*. mam.

Genre de Rongeurs ainsi nommé par Fr. Cuvier dans son ouvrage sur les dents des Mammifères , où il eus

jao KER

fait connaître avec détail le système dentaire. Les dénis sont en même nombre que dans le genre Cobeie, dont le Kérodon se rapproche à beaucoup d'égards ; c'est-à-dire qu'il y a quatre mo-

laïres de chaque côté et deux incisives à chaque mâchoire ; mais les molaires ont une forme différente. Les supérieures sont toutes semblables entre elles, et sont composées de deux parties triangulaires, réunies du côté externe, et séparées du côté interne de la dent : chacune de ces parties est entourée de son émail propre , et l'angle de leur réunion forme une échancrure en partie remplie par du ciment. A la mâchoire inférieure les molaires sont de même forme qu'à la supérieure , mais elles sont retournées , la portion qui fait le côté externe des unes faisant le côté interne des autres. La première molaire est d'ailleurs formée de trois triangles , et non pas , comme les autres, de deuxseulement.

Les doigts sont au nombre de trois au membre postérieur , et de quatre à l'antérieur, de même encore que chez le Cobaie ; mais les jambes sont proportionnellement plus hautes, les doigts plus gros et plus séparés ; et les ongles sont larges, courts, assez aplatis , au contraire de ce qui se voit dans ce genre; en sorte, et c'est un fait remarquable, que les dents et les doigts , quoique identiquement les mêmes, quant au nombre , dans deux espèces qui appartiennent à la même famille , soient néanmoins , sous tous les autres rapports , assez dissemblables pour autoriser leur séparation en deux genres distincts.

Du reste,, la tête est conique, trèsallongée , de forme conique, avec le chanfrein presque tout-à-fait droit; les oreilles sont à peu près hémisphériques et présentent en haut une légère éebancrure , mais ressemblent à celles du Cochon d'Inde. Les moustaches, dirigées en arrière, sont d'une longueur si considérable qu'elles dépassentl'occipiit. D'autres poils, très-longs aussi , quoique bien moindres que les moustaches , mais de

même nature , et dirigés de même , naissent de la partie supérieure et surtout de la partie postérieure de l'orbite de l'œil ; la plante du pied est nue ; on aperçoit seulement quelques poils très-courts sous les premières phalanges des doigts ; la queue est comme chez le Cobaie, nulle, du moins à l'extérieur ; car il est très probable qu'il existe, comme dans ce genre, quelques vertèbres coccygiennes.

Le Moco , Kerodon Seiureus. Nous nommerons ainsi l'espèce qui a servi de type au genre, et qui est encore la seule connue ; elle est un peu plus grande que le Cochon d'Inde, et a neuf pouces environ de longueur , et quatre pouces et demi de hauteur.

Son pelage est gris , piqueté de noir et de fauve en dessus , blanc en dessous et à la région interne des membres ; et enfin , roux sur leurs parties externe et antérieure , ainsi que sur les parties latérales de la tête, et la face convexe des oreilles ; les moustaches sont entièrement noires. L'Amérique méridionale est la patrie de cette espèce. C'est à Auguste Saint-Hilaire que nous en devons la connaissance ; on ne possédait en effet avant son voyage dans ces contrées que le crâne seulement. Elle paraît cependant ne pas être très-rare au Brésil , d'où Auguste Saint-Hilaire en a envoyé plusieurs individus au Muséum ; il est connu des naturels du pays et a reçu d'eux le nom de Moco , ainsi que nous l'avons appris des notes du savant voyageur. Nous lui avons conservé ce nom en français comme on l'a vu. Celui de Kerodon Sciureus se rapporte à la nature et au système de coloration de son pelage qui ressemble d'une manière véritablement remarquable à celui de plusieurs es-

fièces d'Ecureuils, soit pour les coueurs , soit surtout à cause de l'abondance et même de la douceur et du moelleux du poil ; et la ressemblance est telle sous ce dernier rapport ,

3u'en touchant une peau de Kéroon on croirait véritablement tou-« cher une fourrure d'Ecureuil. On

KER

it que tous les Animaux de la ième famille , le Cabiai , le Coicon d'Inde , les Agoutis ont , au miraire, le poil roide, cassant, dur it toucher et très-peu abondant.

S. G. ST.-H

1KËRONE. Kerona. inf. Genre rimé par Muller, adopté par Brunière ainsi que par Lamarck , qui intil la nécessité d'y réunir les Hilantopcs du même auteur ; ses caicclères sont : corps déprimé , muni e 3 cirres vibratiles sur 1 un de ses cô- , -s ou tout autour, avec des appenices en dentelures aiguillonnées et égides, ou en manière de soies «xueuscs. Les Kcroncs rentrent con- : iquem- meilt dans l'ordre des Trichotés et comprennent plusieurs espèis de Trichodes de Muller. Nous en entacherons le Kcrona liostel- lum de eBt auleur, qui , dépourvu d'organes imelconques el de cirres vibrailles, rait être renvoyé dans l'ordre des i^ymnodés. Les cornes, appendices lia dents de scies et en herses , que iiosana , naturaliste italien, a donnés I plusieurs des Microscopiques qu'il i récemment figurés comme des Koloodes , dans les Mémoires de Turin , ous font supposer que ces Animaux, uand leur existence sera constatée >ar de plus amples descriptions et aar

des dessins moins imparfaits , oourront bien appartenir au genre m'\ nous occupe. Les Kéroues vivent eeu ou point dans les infusions; on les vouve en général dans les eaux dou- ■ 3S ou dans l'eau de mer , mais ja 'dupai t sont rares. Ce sont de petits T.ni-maux , dont quelques-uns peuient presque se distinguera l'œil nu; inranges par leur forme et par les apcendiecs qui les garnissent, agiles, <iageant de diverses manières , dont Idusieuis présentent quelques rapports d'aspect avec d'imperceptibles rustacés. L'agitation qu'elles donent à leurs cirres vibraïiles les rend auvent toutes brillantes, et il en ;t qui semblent former un passage ■ ces Acalèphes libres ou bien à ces i phrodites et à ces Amphinomes qui ">nt munis d'appendices singuliers ou

KER lai

de cils dont les mouvemens décom-

fiosentsi élégamment les couleurs de a lumière. Nous en connaissons une vingtaine d'espèces distribuées en deux sous-genres :

•j- Kéronxs proprement dites, ayant des appendices en aigillons et en crocs, parmi lesquelles nous citerons comme les plus remarquables le Kerona Silurus, Encycl. Vers. 111. , pl.

18 , fig. i5-i6 , toute hérissée en dessus comme une herse ; le Kerona Histrio, Encycl., pl. 17, fig. 7-8, qui nage en sautillant; le Kerona Haus- Irum, Encycl., pl. 17, fig.17, 1 1-1 5, ronde, dont la moitié est d'une transparucc vitrée et garnie decirres vibratiles très-longueset nombreuses , tandis que l'autre est obscure avec cinq ou six cornes; \e Kerona rostrata, IN. ,

3 ui était un Trichode dans Muller et ans l'Encyclopédie, pl 17, fig. i-3.

Elle vit dans l'eau où croît la Lenticule.

ff Himantopj:s, Himantopus , Miill. ; ayant leurs appendices fins et allongés e» soies. Les Himantopus Sannio, Encycl. , pl. 18, fig. 4, et Ludio, fig. 3, donnent une idée de la forme bizaire de ces Animaux qu'on trouve dans l'eau des marais ou dans celle qui demeure stagnante à l'ombre des grands bois. (b.)

KERPA. bot. piian. Pr. Ceupa.

* KERRIA. BOT. PIIAN. On cul tIVC, depuis le commencement de ce siècle , dans les jardins d'Europe, un joli Arbuste dont les fleurs sont jaunes et constamment doubles. ïhunberg en a fait une espèce de Corchorus , et c'est sous le nom de Corchorus japonic//i qu'ila été connu pendant plusieurs années, soit dans les jardins, soit dans les livres de botanique. Cependant Smith , dans la Monographie du genre liubus (in liées Cyclopœdia) avait rapporté le Corchorus japonicus de Thunberg au liubus japonicus , L. Possesseur du précieux herbier de Linné , il avait entre ses mains une preuve irréfragable de son assertion. Cette observation n'était pas connue du professeur De Candolle au

"2 KER

moment ou il s'assura par l'analyse que la Plante en question avait ses pédales insérés non sur le réceptaclèj mais sur le calice même, et que l'ovaire n'y était pas unique , mais qu'il y était multiple. Il en conclut que ce prétendu Corchorus était une Plante de la famille des Rosacées. Plus tard , ayant été instruit des remarques de Smith, il ne la rangea point dans le genre Bubus ainsi

que Linné l'avait fait, parce que ses fruits ne paraissaient nullement destinés à devenir charnus ; que, d'ailleurs, son port et la couleur même de sa fleur s'y opposaient trop fortement. Cette dernière considération, ainsi que l'unité des graines de chaque ovaire, lui firent rejeter l'idée de la placer avec les Spirées. En conséquence, il crut nécessaire d'établir un nouveau genre sous le nom de *Kerria* dont il exposa les caractères suivans [Trans. of Linn. Soc. ,vol. xii , p. i'56) : calice à cinq lobes ovales , trois obtus et deux terminés par une légère pointe , ayant une estivation imbriquée ; cinq pétales orbiculés, insérés sur le calice, et alternes avec ses lobes ; environ vingt étamines filiformes insérées sur le calice, à anthères ovées; cinq à huit ovaires libres , glabres, globuleux, chacun renfermant un ovule attaché latéralement et surmontés d'autant de styles ; capsules globuleuses (selon Thunberg J. Le *Kerria japonica*, De Caud. , est un sous-Arbrisseau qui croît naturellement au Japon , près de Nagasaki et ailleurs.

Il est rameux , sans épines, revêtu d'une écorce lisse et verte; ses branches latérales sont courtes et naissent d'un bourgeon écailleux ; ses fleurs sont le plus souvent solitaires et pédunculées sur les rameaux ; leur couleur est jaune , et elles se montrent extraordinairement disposées à devenir doubles , soit parce que les étamines se changent en pétales, soit parce que les ovaires changent aussi de forme ; mais il est à remarquer que ceux-ci ne sont pas complètement transfigurés. Les feuilles de cet Arbuste sont ovales ; lancéolées , acu-

KET

minées, à nervures pennées, et munies sur leurs bords de fortes dents et de dentelures. Cette Plante existe depuis plusieurs années, en pleine terre , à Paris et dans les départemens de

l'Ouest où elle a résisté à des ha j vers très-rigoureux. Elle affectionne les terres légères, et pour offrir une belle végétation , elle doit être exposée au levant.

Dans les Mémoires de la Société Linnéenne de Paris, T. I, p. 25 , on lit une note qui fait connaître l'opinion de Desvaux sur le *Corchorus ja- \ pouicus*. Sans faire mention du Mémoire de De Candolle, ce botaniste :

rapportela Plantecn questionaugenre *Spiroea*. Cette opinion a été embrassée par Cambessèdes (Anu. des Se.

Natur. T. i , p. 58g) qui, dans sa , Monographie des Spirées, a consli- , tué la cinquième section de ce genre avec le *Kerria japonica*. fy . Spirée.

KERSAJNTON. min. Nom donné " en Bretagne, dans les environs de Brest , à un Granité siénitique noirâtre, à petits grains, et susceptible \ d'un beau poli. L'Amphibole est d'un J noir gYi-sâlre; le Quartz blanchâtre ; le Mica brun; le Feldspath est peu abondant. Cette roche est facile à tailler , et s'emploie dans la sculpture el la décoration des monumens. Elle 1 est solide et inal-térable. De Cambry en \ a cité une carrière aux envii ons de Saiut-Pol; mais Bigot de Morogues 8 prétend qu'on ne la trouve qu'en k njorceaux roulés sur le bord de la s" mer. (g. del.) *

KERUA. BOT. PHAN. V. Cerua. ;e

* KESMESEN. bot. ?h an. V. Aca-

CALIS.

KESSUTH. bot. phan F. Chabath et Chasuth. t;

* KEÏMIA.. bot. phan. (De Can- cj dolle.) V. Ketmie.

KETMIE. Hibiscus, bot. phan. «j Genre très-nombreux de la famille des Malvacées , et de la Monadelphic Polyandrie, L.,qui peut être ainsi caractérisé : ses fleurs sont environnées

KET

KET

hao

uuu calicule polyphylle, irrégulièrement composé d'un petit nombre folioles soudées ensemble. Le calice est monosépale , à cinq divisions ;

corolle formée de cinq pétales, quelquefois auriculés d'un Sillon côté leur base. Les étamines forment un long tube central. Les pistils sont au nombre de cinq ; ils finissent par se unir et par former une capsule à cinq loges polyspermes , rarement conspermes , s'ouvrant en cinq valvées sur le milieu de leur face interne. Ce genre est voisin du Malva viscus qui en diffère surtout par son fruit charnu. De Candolle "W/\ Syst. i , p. 416) en mentionne ;ent dix-sept espèces , originaire de toutes les contrées chaudes du globe et qu'il divise en onze sections, ce genre offrant un grand nombre d'espèces intéressantes , soit par leurs usages, soit à cause de la beauté de leurs fleurs, nous allons faire connaître les caractères abrégés des sections établies par De Candolle , en indiquant les espèces curieuses que chacune d'elles renferme.

i°. Cii£ Montia. Pétales delà corolle unilobés, non auriculés; loges du fruit polyspermes. Ketmie a fleurs de Hibiscus //7/i/? oras, Cavan., Diss.

., |). i5* , tab. 57 , fig. 1. Cette belle i|.pèce , originaire des forêts mon tueurs de l'île de Mascareigne, est vivace; ses feuilles sont lancéolées, oblancées, entières , rarement trifides. Ses «urs ; sont grandes , rouges ou jaunes , pédonculés et groupées vers le »mmet de la tige ; sa corolle est éva- :ee et ses pétales sont velus et toineiiir- ^ux extérieurement.

! fl°. Pf. nstasfermum. La corolle est alalée; les loges de la capsule sont nqnospermes. Dans cette section , on ooitve les Hibiscus ovatus , hastatus -Mmiiialus de Cavanilles, l'Hibiscus ctta- carpo/i de Linné qui croît en >oscane et aux environs de Venise. | 3°. Manihot. Loges de la capsule tfujspermes; involucre composé de ualreàsix folioles; graines glabres; Idice à cinq dents , se fendant longiudinalement d'un seul côté. — L'Hi-

biscus Manihot , L., Cavan., lue. ci/, tab. 65, fig. 2 , ainsi nommé à cause de ses feuilles lobées , assez semblables à celles du iManibot, croît dans l'Inde et dans l'Amérique méridionale. Sa tige est dressée , ses feuilles sont glabres , divisées en cinq ou sept lobes acuminés, grossièrement dentées ; ses fleurs sont déclinées.

4e. Ketmia. Loges du fruit polys-

f>ermes ; graines glabres, corolle étaée; involucre de cinq à sept folioles ; calice à cinq lobes , ne se fendant pas lousitudialement. Cette section nous offre deux espèces très-souvent cultivées dans les jardins. L'une, Hibiscus Syriacus, L., Cavan., /oc. cit., est originaire de la Syrie et de la Carniole. C'est un Afbi isseau haut de huit à dix pieds, portant des feuilles obovales, cunéiformes, à trois lobes dentés , des fleurs très-grandes , tantôt blanches, tantôt roses ou panachées , simples ou doubles ; ces

fleurs ont un calicule formé de six à sept folioles. Cette espèce se cultive en pleine terre sous le climat de Paris.

L'autre, Hib. Jiosa-sinensis , est une espèce charmante qui nous vient de l'Inde et qu'on cultive en abondance dans les serres. Sa tige est ligneuse ; ses feuilles ovales , acumtées , glabres, luisantes , entières à leur partie inférieure, très- profondément dentées à leur partie supérieure. Les fleurs sont solitaires, très-grandes, ordinairement d'une belle couleur ponceau , quelquefois blanches ou même jaunes , simples ou doubles.

5°. Furcari a. Les carpelles sont polyspermes j les graines glabres ; les folioles de l'involucelle sont bifurquées au sommet, ou munies d'une grosse dent latérale. A cette section appartiennent les Hibiscus furcatus , Roxb.; scaber, Michx. ; bifurcatus.

Cavan., tab. 5i , fig. 1 , etc.

6°. Abelmoscuus. Carpelles polyspermes ; graines glabres ou inarquées d'une ligne velue sur leur dos; corolle étalée; involucelles composés de huit à quinze folioles entières.

Cette section est fort nombreuse. De Candolle y rappoile trente-cinq es-

la* KET

pèces. Parmi ces espèces , nous remarquerons les deux suivantes :

La Ketmie comestible , Hibiscus esculentus , L. , Cavan., Diss. 3 , tab. 61 , fig. 2. Cette espèce , connue sous le nom vulgaire de Gombo, est annuelle. Elle croît dans les deux Indes oii elle est

cultivée avec soin , parce qu'on emploie ses fruits mucilagineux dans le Calalou. V. ce mot.

Ses tiges sont dressée; , cylindriques , velues , hautes de deux à trois pieds.

Ses feuilles sont cordiformes , à cinq lobes obtus et dentés , portées sur des pétioles plus longs que les (leurs. Celles-ci sont axillaires , solitaires , courtement pédonculées ; leur corolle est mélangée de jaune et de pourpre. Ses fruits, parvenus à leur maturité , sont des capsules pyramidales , longues de trois à quatre pouces, terminées en pointe un peu recourbée à leur sommet , marquées de dix sillons longitudinaux séparés par autant de crêtes saillantes qui se fendent suivant leur longueur et dont les bords se roulent en dehors.

L'Abelmosch ou Ambbette , *Hibiscus Abelmoschus*, L., Cavan., loc.

cit., 3, tab. 62, fig. 2, ressemble beaucoup à la précédente pour le port; mais sa tige est ligneuse et sous-frutescente à sa base; ses feuilles sont

{iresque peltés , cordiformes, à sept obes acuminés et dentés ; sa tige est bispide; ses fleurs sont portées sur des pédicelles plus longs que les pétioles; sa capsule est velue; ses graines sont petites , réniformes , exhalant une odeur très-agréable de musc et d'ambre. Ou les emploie dans la parfumerie. L'Abelmosch croît naturellement dans l'Inde. On le cidtive aux Antilles.

C'est encore à cette section qu'appartiennent VH. palus/ris, L. , fort belle Plante des marais de l'Amérique septentrionale, et Y II. roseus découvert par Thore , qui ressemble beaucoup;') VH.

palustris , L., et qui est particulier aux bords de l'Adour, dans le département des Landes.

70. *Bombicella*. Carpelles polyspermes; graines couvertes d'un duvet

KEV

lanugineux; corolle le plus souvent étalée ; calicule de cinq à dix folioles. Tels sont les *Hibiscus gussypinus* , Thunb. ; *Hib. micranthus* , *Hib. clandestinus* de Cavanilles, etc.

8°. *Trionum*. Carpelles polyspermes; graines glabres ; corolle étalée; 1 involucre polyphylle; calice devenant vésiculeux et renflé. Dans cette section , nous ne trouvons que *VHibiscus Trionum*, L., Cavan., loc. cit. 5 , tab. 64, fig. 1, qui croît en Italie et en Carniole , et *VHib. vesicarius* , Cav., tab. 62 , fig. 2 , originaire d'Afrique.

9°. *Sabdariffa*. Loges de la capsule polyspermes ; graines glabres; 1 involucre monophylle mullidenlé; 1 Plantes herbacées et annuelles; Cette section a pour type *VHibiscus Sabdariffa* , L., Cavan., loc. cit. 5 , tab. 198, fig. 1 , vulgairement connue sous le nom d'Oseille de Guinée , parce que ses feuilles ont la saveur acidulée de notre Oseille.

10°. *Azara*. Cette section ne diffère de la précédente que par ses tiges 7 arborescentes. Parmi ses espèces, on compte les *Hibiscus iricuspis*, Cavan., tab. 55, fig. 2; *Hib. circinnalus* , Willd. ; *Hib. elatus* , Swartz, etc.

11°. *Lagunaria*. Involucre presque nul ou composé d'une seule foliole. Ici se rapporte le genre *Laguncæa* de Sims et de Ven-

lenat , sous le nom J d'Hibiscus Patersonii. Cette espèce est originaire de l'île de Worfolck.

h' Hibiscus populneus, L., est de- .

venu le type du genre Thespesia de Corrêa et de De Candolle.
V- ce mot.

* KETDPA. ois. F. Chouette, j sous-genre Hiboux. (b.)

KEURA., bot. fhan. L'Arbre décrit sous le nom de Keura odorifera par Fprskahl {F/or. JSgypt.-Arab., p. | 172) est le même que le Pandanm ni odoralissirnus , L. fils. V. Vaquois. J,

KEVEL. mam. Espèce d'Antilope (V. ce mot. L

KEVEL. min. On désigne sous c< nom en Angleterre , ainsi que sou '

KIB

lui de Cawk, un Minéral composé suHale de Baryte, de carbonate i de lluate de Chaux , et qui sert le tus souvent de gangue au minerais a Plomb du Derby shire. (g..n.)

* KEWER. BOT. PHAN. V. Ca- OjUAR.

KHACHYR. bot. phan. (Delile.) sjd. arabe A'Echinops spinosus, L.

. Échinope. (b.)

* KHAMOUN ou KEMUM. bot.

hhan. Même chose que Camiura. V.

eîmot. (b.)

KHAR - KHAFTY. bot. phan.

IDelile.) Fqrskahl écrit Garghafti.

l'Orme en Egypte, oii on le cultive ,ians quelques jardins , mais où il relève à peine à la hauteur d'un Arrrisseau. (b.)

* KHATMYCH. bot. phan. (Deile.) Même chose que Chatmice.
V.

tî mot. (b.)

KHOULAN. MAM. V. Cuoulan.

KHYSARAN. bot. phan. (Delile.)

*" \ CUAISARAN.

KIAI-TSAI. bot. phan. Même iihose queGay-Cu. V, ce mot. (b.)

RI AM BEAU. bot. phan.^ . Ciamiau. «

* KIAMPTAL. bot. phan. k.

.lilAMPTAL.

KIANGITCH ou KIANGUITS.

us. Noms kamtschadales d'une espèce de Canal d , Anas hyernalis , L. , rai signifient également Diacre , et uui ont été appliqués à l'Oiseau qui ■es porte par l'espèce de ressemblance qu'on trouve entre leur chant et celui ines Diacres russes. V. Aanga. (b.)

KI ATI. BOT. PHAN. V. CLATI.

KIBERA. bot. phan. Cette dénonciation avait été employée par tldanson (Fam. des Plantes, T. il, p.

Li7)nour un genre particulier établi lux dépens du Sisymbrium de Linné, je professeur De Candolle s'en est ervi pour désigner la cinquième section qu'il a établie dans celui-ci [Syst.

KIE

Vegel. nat. , vol. n , p. 477). V. Si-

SYMBRE. (G..N.)

KIÉBOUL. BOT. PHAN. V. ClÉ- BOUE.

KIEL. bot. phan. (Rumph , Amb.

T. IV, pl. 65.) Arbrisseau laiteux des Mol uq 11 es , dont le suc est employé dans la teinture et qui, malgré qu'il ait été figuré, n'est pas encore bien connu. (b.)

* KIÉSELGUHR. min. (Klaproth , Annal. Chim. T. v.) Minéral que ce chimiste avait reçu sous le nom de Cendre volcanique de l'Ile-de-Frauce.

Il est d'un blanc grisâtre ou jaunâtre, friable et terreux , tendre au toucher et happant à la langue. Sa pesanteur spécifique est de 1,57. Il est composé de Silice , 72 ; Eau , 2 1 ; Alumine , 2,5 ; Fer oxidé, 2,5. Il se rapproche beaucoup du Tuf du Geiser, dont il ne diffère que par une proportion d'eau plus considérable.

Kieselkuffer , John (Recherch.

Chim. T. ii , p. 252). V. Cuivre

HYDRO-SILICEUX

Kiesel ALACHIT, Hausmann (T.

ni, p. 1029). Variété de Cuivre dioplasique, composée de vingt-deux parties de Silice ; cinquante-quatre d'Oxide de Cuivre; et vingt-quatre parties d'Eau.

Kieselchiefer. Syn. du Jaspe schisteux de Brongniart, ou Phtanite d'Haüy.

KIESELSINTER et KIESELTUFF, Tuf

du Geiser, Quartz-Agathe concrétionné, Thermogène, Haüy. Variété de l'Opale hyalite, Beudant.

(g. de.)

* KIESELSPATH. min. Nom d'un Minéral décrit par Hausmann, et qui a, selon ce minéralogiste, un tissu feuilleté semblable à celui du Feldspath. Ses parties se séparent en grains; il est transparent et offre un éclat intermédiaire entre ceux du Verre et de la Nacre. D'après l'analyse qu'en a faite Stromeyer, il est composé de Soude, 0,09; d'Alumine, 0,20 ; de Silice, 0,70, et de quelques traces de Chaux, de Fer et de Manganèse. Ce Minéral a été trouvé près

126 KIG

Chesterfield, dans le Massachusetts et l'Etat de New-York. (g.)

KIGGELLARE. Kiggellaria.

bot. phan. Genre établi par Linné, placé par De Candolle dans la famille des Flacourlianées, mais qui a d'une autre part des rapports avec les Samydées. Ses fleurs sont dioïques ; les mâl'ès sont pédonculées et disposées par faisceaux ou bouquets. Leur calice est concave à dix divisions très-profondes , cinq intérieures plus minces et comme pétaloïdes, offrant à leur base une petite lamelle épaisse et glanduleuse', qui provient d'un disque périgyne tapissant le fond du calice; étamines au nombre de dix à vingt, dressées, placées sur deux rangs circulaires à la base des divisions caliciales; leurs filets sont très-courts; leurs anthères presque cordiformes , à deux loges , s'ouvrant par un petit orifice terminal. Dans les fleurs femelles qui sont pédonculées, solitaires à l'aiselle des jeunes rameaux , le calice et le disque sont les mêmes que dans les fleurs mâles ; l'ovaire est globuleux , sessile, uniloculaire, contenant des ovules attachés à cinq trophospermes pariétaux. Ces ovules, qui sont pendans , sont au nombre de deux à trois pour chaque trophosperme. Les styles sont au nombre de cinq ou de deux, terminés chacun par un stigmate bifide. Le fruit est une capsule globuleuse , coriace , s'ouvrant par sa partie supérieure en cinq valves épaisses, inégales, soudées entre elles par leur base, et portant chacune sur le milieu de leur face interne deux ou trois graines dont quelques-unes avortent fréquemment. Ces graines sont irrégulières et anguleuses, charnues extérieurement, et se composent d'un endosperme blanc et charnu , renfermant un embryon dont la radicule est inférieure , assez longue et cylindrique, et les deux cotylédons planes et courts.

Ce genre ne se compose que de deux espèces , originaires l'une et l'autre de l'Afrique méridionale.

KIL

L'une , *Kiggellaria af/icana* , L. , Sp. , Lamlc, III., t. 821 , est un Arbuaaffl ayant les feuilles dentées en scie, presque glabres à leur face supérieure; les fleurs mâles à dix étamines, les femelles à cinq styles. La seconde, *Kiggellaria integrifolia* , Jacq. , Cuil. , 2, p. 296, le. rar. , t. 628, qui croît au cap de Bonne-Espérance, a ses feuilles entières, velues des deux colés ; des fleurs mâles à vingt élamines et des Heurs femelles dont l'ovaire porte seulement deux styles, (a., h.).

* KIGGELL ARIÉÉS. Kiggclla- Heœ. jsot. piian. De Candolle(/J/W/*).

Sysi., 1, n. 257) appelle ainsi sa troisième tribu delà famille des Fiacourlianées , composée des genres *Kiggellaria*, *Melicytus* et *Hydnocarpus*.

FXi.YCOUrtTIANÉES. (A. R.)

KIKI. EO'J.'. PHAN. V. ClCl.

KILLAS. min. Nom donné par les mineurs du Cornouailles à un Schiste argileux plus ou moins fissile., et suivant Bionguiart, à toutes les roches fissiles de ce pays , qui contiennent les filons de Cuivre et d'Etain.

(g. del.)

KILLINGA. bot. rriAN. Ce genre d'Ombellifères , formé par Adanson (Fam. des Plant., 2, p. 3r), est le même que Y A lha-mantlia de Linné.

V . ce mot. (g..N

KILLINGE.bot. phan. Pour Kyfr lingie. V. ce mot.

* KILLIINITE ou KILLÉNITE.

Mirç. (Tayloi .) Substance d'un vert pâle, mêlédebrun ou de jaune, ayant un éclat vitreux , une structure lamelleuse, donnant par le clivage un prisme quadrangulaire d'environ 1 55.

Elle est fusible au chalumeau. Sa pesanteur spécifique est 2,70. Elle est composée , d'après le docteur Barker:

de Silice, 52,49 5 Alumine, s4,50; Potasse, 5,00; OxidedeFer, 2,4g; Oxide de Manganèse, 0.75; Eau, 5,00; Chaux et Magnésie, 0,50. On la trouve dans des veines de Granité qui traversent le Micaschiste , à Killincy , près de Dublin en Irlande.

Elle y est associée au Triphane, avec

KLN

Lequel elle a quelque analogie d'aspect, (g. del.)

KINA. bot. phan. Rhéede (Hort.

TiMalab.) et Hermann (Mus. Zeyl.) jont décrit , sous ce nom vulgaire à Ccylan , un Arbre d'où découle une rçomme blanche , transparente et sans codeur. Si, comme Rhéede l'indique, ccet Arbre était son Tsjerou-Panna , ton devrait le rapporter au Caloplyllium Calaba. But manu (T/ies. Zeyl.) ai aussi fait mention d'un Kine qu'il ai placé dans le genre Iiwphyllum , qqui est le même que le Caloplyllum.

Calophylle.

Plusieurs auteurs ont écrit Kina pour Quinquina. F", ce mot.
(g..N.)

* KININE. chim. V. Quinine.

* KINIQDE. chim. V. Acide.

KINKAJOD. Potos. mam. Genre (lie Carnassiers Plantigrades, avant aussi quelques rapports, par ses caractères zoologiques, soit avec les SSinges et les Makis, soit avec plusieurs Insectivores, soit même avec certaines Chauve-Souris, et qui mériterait, suivant Fr. Cuvier, à cause (ides combinaisons remarquables des caractères qu'il présente, de constituer à lui seul un ordre particulier.

SSon système dentaire n'est pas tout-à-fait celui des Carnassiers; il est encore moins celui des Quadrumanes, ■ mais il tient de l'un et de l'autre.

LLes incisives sont, comme chez les (Carnassiers, au nombre de six à l'une et à l'autre mâchoire, et les canines au nombre de deux. Il y a cinq unolaires de chaque côté et à chaque mâchoire» Les deux premières, séparées des canines par un petit intervalle, sont, aux deux mâchoires, pe- Uites f t à une seule pointe : ce sont de véritables fausses molaires. Les trois (Idernières ont la couronne tuberculeuse; celle du milieu est la plus jurande à la mâchoire supérieure. A l'inférieure, toutes les trois sont de forme elliptique : la première présente deux pointes, mais les autres n'offrent qu'une surface unie, et elles

KIJN 127

sont opposées couronne à couronne.

Les quatre pâtes sont pentadactyles ; et chaque doigt est terminé par un ongle un peu crochu et très-comprimé. Le pouce est beaucoup plus court que les autres doigts, aux pieds de derrière; le troisième et le quatrième sont les plus allongés. Aux pieds de devant , les trois doigts du milieu sont à peu près de même longueur ; les deux latéraux sont les plus courts. La queue, couverte de poils dans toute son étendue, est longue et susceptible de s'enrouler autour du corps; ce qui a suffi pour porter quelques naturalistes à rapprocher le Potto des Quadrumanes , parce que c'est

principalement parmi les Singes que on trouve des espèces à queue prenante; mais ce rapprochement, motivé d'ailleurs à quelques égards , ne l'est nullement sous ce point de vue ; car ce même caractère d'une queue prenante se retrouve, quoique beaucoup plus rarement à la vérité , dans plusieurs familles , comme chez les Rongeurs, les Marsupiaux et les Carnassiers eux-mêmes. La tête est globuleuse ; les yeux sont grands , les oreilles très-simples, sans lobule, de forme à peu près demi-circulaire ; les narines ouvertes sur les côtés d'un muile ; la langue , très-douce , est d'une longueur considérable ; les mamelles sont inguinales et au nombre de deux. Le poil est touffu et généralement laineux.

Ce genre est formé d'une seule espèce , placée d'abord par la plupart des auteurs systématiques parmi les ViverrinLy sous le nom de *Viverra caudivolvula* , par quelque's autres zoologistes parmi les Makis. Cuvier est le premier qui en ait formé , sous le nom de *Kinkaiou* , un genre particulier auquel Geoffroy Saint-Hilaire a donné le nom latin de *Potos*.

Les noms de *Cercoleptes* et de *Caudivolvulus* ont depuis été données au même genre, l'un par Illiger, l'autre par Dunnéril et Tiedemann.

Le Kinkajou Pottot , *Potos caudivolvulus*, GeoffFr. Si. -H., est à peu près de la taille de notre Chat dômes-

tique. Il est généralement d'un roux vit en dessous et à la face interne des quatre jambes, d'un roux brun à leur face externe et en dessus ; les pâtes et l'extrémité de la queue sont même presque tout-à-fait brunes. Le tour de la Douche est couvert aussi de quelques poils bruns. Au reste la coloration de cette espèce est assez variable : il y a des individus beaucoup plus clairs que celui d'après lequel nous avons fait notre description; et il en est chez lesquels une portion delà pate postérieure, et particulièrement le troisième et le quatrième doigt , sont de couleur fauve ; chez d'autres on distingue sous la gorge quelques taches de couleur plus claire que le fond du pelage.

Le Potto habite de préférence les contrées solitaires; c'est un Animal nocturne, d'une démarche lente, qui se tient ha bi tuellement sur les Arbres , en s'aidant de sa queue qu'il enroule autour d'une branche.- Elle paraît en effet avoir beaucoup de force, et il l'emploie souvent, dit-on, pour tirer des fardeaux assez considérables. Il atteint avec beaucoup de dextérité de petits Animaux dont il fait sa proie , et il est même à redouter pour les Oiseaux de basse-cour, qu'il saisit sous l'aile, et dont il boit le sang avec Une grande avidité, suivant les récits des voyageurs. Il est cependant bien loin d'être uniquement Carnivore; il se nourrit volontiers de matières végétales ; il aime beaucoup aussi le miel, et détruit pour s'en

Srocurer un grand nombre de ruches, 'où le nom d'Ours des ruches ou d'Ours du miel, qu'il porte dans quelques provinces. Il habite l' Amérique méridionale , et il paraît même qu'il existe aussi dans la partie méridionale de l'Amérique du nord. Il se

trouve abondamment répandu en plusieurs lieux, et il est bien connu des Américains , dont il a reçu divers noms , tels que ceux de Cuchumbi et de Manaviri'. (is.-g.st.-h.)

KINKINA. bot. ru an . Pour Quinquina. V. ce mot. (r.)

V. Cuba re

KIRGA1NELLI. bot. phan. (Rhéede, Malab. T. x, tab. i5.) Même chose que Bu j an-an- Valli. V. ce mot. (b.)

KIRGANELIA. bot. phan. Genre de la famille des Euphorbiacées , et de la Monœcie Pentandrie, L., caractérisé par des fleurs monoïques à calice quinquéparti. Dans les mâles on trouve cinq étamines, dont deux plus courtes que les autres et dont les filets sont soudés en une colonne:

dans les femelles un ovaire, entouré à sa base d'un petit disque quinquélobé et surmonté de trois styles profondément bipartis , à trois loges biovulées. Le fruit est une baie triloculaire , et c'est là ce qui distingue ce genre du Fhyllantkus avec lequel il a du reste les plus grands rapports. Il comprend plusieurs Arbrisseaux à feuilles pinnatifides et à fleurs fasciculées. (a. d.j.)

* KIRGHISITE. min. Nom donné par Treuller à un Minéral verdâtre , à cassure vitreuse, rayant le Quartz, pesant spécifiquement 5,7. On le trouve en Cristaux maclés dans le pays des Kirghis. (G. DEL.)

* KIR-MYSCHAK. mam. Nom de pays du Chaus, espèce de Chat. V.

ce mot. (b.)

* KIRSCHEN - WASSER. bot.

phan. Eau-de-vie obtenue des Cerises par la distillation. V~.
Cebisieb. (b.)

KISKIS. ois. Espèce du genre Mésange. V. ce mot. (b.)

* KISIT. moll. Dénomination sous laquelle Adanson (Voy . au
Sénégal , p. 193 , pl. 15) a désigné une petite espèce de Nérít marine que Linné a

KL A

Hmômmée Nerita Magdalene , parce qu'elle se trouve surtout
aux environs des îles Magdalene. (d.h.)

KITAIBELIË. Kitaibelia. nor.

Ippia an. Genre de la famille des Malva- Itix'cs et de la Mon-
naddplie l'olyanirie, établi par Willdenow.

U4ct. Sertit. Berl., a, p. 107. t. 4, f. 4) Ht qui présente pour ca-
ractères : un calice environné d'un calicille monophylle à sept
ou neuf lobes; une corolle évasée, formée de cinq pétales
loobés à la base; des capsules globuleuses, monospermes,
réunies en capitule.

Ce genre se compose «l'une seule espèce, Kitaibelia t'itifolia,
Willd., J. V. Valdest. et Kit. , Pl. Hung. 1, p. 29, t. Ipu. Cette Plante
vivace , qui croît en [Hongrie et «pie l'on cultive dans les jardins,
a ses tiges droites, haute» de Mieux à trois pieds, cylindriques, jli

triées , couvertes «le poils blancs ; ses Inutiles alternes, pétioolées, conhlbr- Ipici es , velues sur les «leux faces, à cinq lliu sept lobes aigus et dentés. Les llccurs sont blanches, axillaires, solitaires ou géminées , portées sur lees pédoncules simples. I-es capuules sont noirâtres et hérissées. Ce keore est très -voisin des Mauves Il t des Guimauves dont il diffère surfont par la disposition de ses capsules jiui sont groupées en capitule et non Intimes circulaire-ment comme dans tjs deux autres genres. (a. h.)

KITiYAN et CHITRAM. mot.

13IAN. V. Aj.KITRAN.

KL A AS. ois. (L :vaillant.) Espèce m genre Coucou. V. ce mol. (u.)

* KLAPROTIiLE. Klaprothia. iiot.

liUÀN. Genre nouvellement constitué ar Kunth(i« JJutnb. et Jivnpl. Not>, •ienur. T. vi, p. 120, lab. 637) qui «a dédié à la mé-moi e ilu célèbre chimiste Klaproth et l'a placé dans la 'imille «1rs Loasées. Il appartient à 11 Polvnndrie Monogynie, L. , et ses ttracleres sont les suivans : calice Uipère , persistant , à quatre di-visions profondes, ovales et égales entre llles ; quatre pétales in-sérés sur le

KL A

limbe et plus longs que lui , concaves et légèrement onguiculés ; étamincs nombreuses, ayant la même insertion que les pétales ; les unes par faisceaux de quatre ou de cin«i , opposées aux pé-

tales , et fertiles; les autics par cinq , opposées aux divisions calicinales, stériles, poilues , dilatées en membrane au sommet , et irrégulièrement lobées; anthères biloculaires, émarguées de chaque côté ; ovaire presque turbiné , uniloculaire, renfermant quatre ovules pendans , surmonté d'un style quadiilide au sommet ; baie à trois ou quatre graines. Ce genre tient le milieu entre le Loasa et le Mentzelia; il se distingue «lu premier par la structure de l'ovaire , du .second par ses étamines extérieures stériles, de l'un et de l'autre , par le nombre des parties de la fleur, ainsi que par la forme des élauiiies slérils.

Le Klaprvl/iia ///e/itze/ioides , unique espèce du gente, est une Plante herbacée, volubile, à rameaux couverts de gros poils rebroussés. Ses feuilles sont opposées , deniers et héliis.iées. Les (leurs, en petit nombre , de couleur blanche et accompagnées de bractées, sont portées sur des pédoncules terminaux qui deviennent axill aires et presque dicholomes.

(Jette Plante croît dans les Andes de Quindiu, près de Los Volcancitos, dans L'Amérique méridionale. (g..n.)

KLAPROTIIITE. MiN.La/.ulithde Klaproth; Azurite, Tyrolite, VVoraulitc. Substance bleue , cristallisant en prisme droit rhomboïdal d'environ 121" 50; rayani la Chaux phosphatée; pesanteur spécifique, 3,0; infusible.

Elle paraît être un mélange de phosphate d'Alumine , avec du phosphate de Magnésie et du phosphate de Fer.

L'analyse de Fuchs a donné : Acide phosphoriquic,4i ,81 ; Alumine, 55,75; .Magnésie, 91 ,34; Oxide de Fer , 2,64; Silice , 2,10; Eau, fi, 06. Un la trouve dans ries veines «le Quartz traversant le

Micaschiste «>u le Gneiss, à Worau en Styrie, ou à Werfen dans le pays de Salzbourg. (g. un*..)

i3d KLE

* KLAPTMUTSEN. bot. crypt.

(C. Bauhin.) Syn. de *Scu-gassurn bacciferum*. (B.)

* KLEBSCHIEFER. min. Nom donné par Werner à l'Argile schisteuse happante de Ménil-Montant, au milieu de laquelle se trouve la Ménilite. (g. del.)

KLEINHOFIE. bot. phan. Pour *Kleinhovia*. r. ce mot.

KLEIN HO VIE. *Kleinkoviu*. bot.

phan. Genre de la famille naturelle des Byttneriacées, auparavant placé parmi les Malvacées, dont les caractères sont : un calice à cinq divisions profondes; une corolle de cinq pétales, dont un plus long que les autres est échancré à son sommet; des étamines monadelphes formant un urcéole, divisé en cinq branches portant chacune trois anthères; chacune de ces branches est placée devant un des pétales. L'ovaire est stipité à cinq côtes et à cinq loges contenant quatre ovules. Le style est simple, terminé par un stigmate crénelé.

Le fruit est une capsule lurbinée, renflée, vésiculeuse, à cinq loges ronospermes par avortement. Les graines sont globuleuses; elles contiennent un embryon dont les cotylédons sont roulés en spirale autour de la radicule.

Le *Kleinhovia hospita*, L., Cav., Diss. 5, p. 188, t. 146, est la seule espèce de ce genre. C'est un Arbre de moyenne grandeur, qui croît naturellement aux Moluques, à Java, aux Philippines, et

que Rumph a décrit et figuré sous le nom indien de Cati-Maiits. Ses feuilles sont alternes, pétiolées , cordiformes, acuminées , entières et veinées ; ses fleurs sont purpurines et disposées en grappes axillaires ou terminales, (a. h.)

K L E I N I E. Kleinia. bot. phan .

Trois genres diflerens ont successivement porte ce nom . Ainsi Linné nomma d'abord Kleinia un genre que plus tard il appela Cacalia , nom qui a été adopté par tous les botanistes.

KLE

Jacquincn 1765 appliqua le nom de Kleinia au genre Porophyllum de Vaillant, qui avait d'abord été conservé sous ce nom par Linné. Jussieu (Ann. Mus. , 2, p. 4 j4), pensant avec juste raison que le genre établi par Vaillant devait conserver le nom de Porophyllum, se servit du nom de Kleinia pour désigner un genre nouveau de la famille des Synanthérées.

Cependant Persoon , se rangeant à l'avis de Willdenow, nomma Jaumea le genre de Jussieu. Néanmoins nous pensons que c'est ce dernier genre qui doit seul retenir le nom de Kleinia. Voici ses caractères :

les capitules sont globuleux ; leur involucre est hémisphérique, composé de grandes écailles obtuses, imbriquées et disposées sur trois rangs. Le réceptacle est nu; tous les fleurons sont hermaphrodites et réguliers. Les fruits sont couronnés d'une aigrette courte , sessile et plumeuse.

Ce genre se compose d'une seule espèce, Kleinia linearifolia , Juss. , Ann. Mus., 2 , p. 424, t. 61, f. 1. Petit Arbuste à feuilles opposées, linéaires, connées par la base , simples , entières, portant

des capitules terminaux et solitaires dont les fleurs sont jaunes. Cette Plante a été recueillie par Commeison vers l'embouchure du fleuve de la Plata. Le genre *Kleinia* doit être placé dans les Tagétinées. (a. r.)

* KLEINIEN. pois. Espèce de Balisle. V. ce moi. Ce nom a été donné à quelques autres Poissons comme spécifique. (b.)

KLEISTAGNATHE. Kleistagnatha. crust. Fabricius désigne ainsi son neuvième ordre de la classe des Insectes ; il correspond à la plus grande partie des Crustacés Décapodes que La treille nomme Brachyures; V. ce mot. (g.)

* KLEÏHRA.bot. phan. Ce nom employé par ihéophrasle pour désir gner l'Aune , est devenu la racine du nom d'un genre de la famille des Ericinées. V. Cléthriû. (b.)

KNA

KLINGSTELN. mjn. Sjn. de Phonolithe. V. ce mot. (g. del.)

* KLÏP-DASS. mam. C'est-à-dire [Blaireau de Rocher. V. Daman, (b.)

* KLIP-SPRENGER. mam. Même cchose que Gazelle sautante. V. AnrriLOPE. (b.)

KLOM1UM. bot. rnAN. Ce genre , 'établi par Adanson dans les Carduaccées, n'a pas été adopté. (G..N.)

KLOfODE. Klopoda. inf. Dans le [Dictionnaire de Déterville ce nom est t'employé pour Kolpode. V. ce mot.

* KLUK1A. bot. rnAN. Le prol'essseur De Candolle (Sysl. Veget. nat. , 'vol. it) mentionne un genre établi :sous ce nom par An-

dreziowski , aux i dépens du *Sisymbrium* de Linné. Des (quatre espèces dont il est composé , t trois entrent dans la cinquième section idout Adanson avait autrefois formé ;son Kibera; ce sont les *Sisymbrium*

supinum, *polyceralium* et *rigidum*.

L'autre est le *Sisymbrium officinale* , D. C. , ou *Erysimum officinale*, L.

1 Ce genre ne paraît pas devoir être ; adopté. V. *Sisymbre*. (o..N.)

KNAPPIA. bot. fiian. (Smith.) V.

I CLIAMACBOSTIDE.

KNAUTIIi. Knautia. bot. rnAN.

Linné établit ce genre de la famille • des Dipsacées , et de la Tétrandrie Monogyuic, sur des Plantes que Vaillant réunissait au *Scabiosa*. Adopté par Jussieu , il présente les caractères suivons : calice propre double , l'un et l'autre supère , l'extérieur dentelé ou presqu'entier, l'intérieur urcéolé très-petit, cilié ou plumeux .sur son bord ; corolle dont le tube est oblong, le limbe à quatre lobes inégaux , l'extérieur plus grand ; quatre étamines; stigmate bifide j akène couronné par le calice cilié ou plumeux; calice commun ou involucre renfermant un petit nombre de (leurs égales entre elles , cylindrique, composé de folioles coimiventes disposées sur un seul rang ; réceptacle petit, velu; fleurs terminales. Dans sou Mémoire sur 1rs Dip-

KiNE i5.

sacées , Th. Couller a retiié de ce genre les espèces linuéennes, dont le calice est aigrette sur son bord , et il en a formé le genre *Pteroceph/ialus*.

P. ce mot. D'un autre côté, il y a fait entrer le *Scabiosa arvensis* , L., qui avait été constitué par Schrader [Cal. Scm. Gott. i8i4) eu un genre distinct sous le nom de *Trichera*.

Ainsi réformé, le genre *Knautia* est composé des espèces suivantes K.

orientalis, L., espèce assez jolie qui croît dans l'Orient et que l'on cultive dans les jardins de botanique ; 1^o Kn. *propontica* , L.; 3^o Kn. *Urvillœi*, Coult., espèce nouvelle, découverte par d'Urville dans l'île de Léios , et que ce savant navigateur {Enum. i4, n. 119) avait confondue avec le Kn. *orientalis* ; 4^o Kn. *arvensis* , Coult., ou *Scabiosa arvensis*, L.

Cette espèce est subdivisée en quatre variétés qui comprennent plusieurs Scabieuses des auteurs ; telles sont entre autres les *Se. canescens* , Balb.; *integrifolia* , L.; *pubescens* , VVil-ld.; *bellidifolia* , Lamarck ; *sylvatica*, L.; *longifolia*, Waldst. et Kit., etc., etc.; 5^o *Knautia hybrida*, Coult., ou *Trickera hybrida* , Rœm. et Schult.

KNAVEL et RNAVELLE. bot.

pu an . Ces noms allemands, proposés par quelques botanistes français poulie genre *Sclérantlhe*, désignent dans Boerliaave le genre nommé *Velezia* par Linné et par les botanistes. V.

VÉlezie. (b.)

*KNÈBILITE. ;\i in. LenzetDobereiner, Phillips, p. 20G. Substance grisâtre ou bleuâtre , opaque, tenace , et trouvée seulement à l'état massif.

Sa cassure est imparfaitement conchoïde , et son état est assez vif. Sa pesanteurspécifique est de 5, 714. Elle est composée , d'après Dobereiner, de Silice , 32,5 ; protoxide de Fer, 52, 0 ; et protoxide de Manganèse , 55, 0.

(g. DEL.)

KNEMA. bot. phan. Loirciro {J'ior. Cochinch., éd. Willd., p. y4i) a formé sous ce nom un genre de la Diécie Monandrie, L., auquel il a as-

i5a KNI

signé les caractères suivans : fleurs dioïques; dans les mâles, le calice est nid; la corolle est monopétale , tubuleuse; le limbe à trois divisions conniventes, aiguës, extrêmement laineuses; dix à douze anthères disposées circulairement sur un filet dilaté (androphore). Les fleurs femelles ont un calice infère , très-court ; une corolle comme dans les fleurs mâles ; un ovaire arrondi, velu, surmonté d'un stigmate sessile et lacinié. Le fruit est une baie ovale , succulente et renfermant une graine pourvue d'un avilie.

Le *Knema corticosa* , Lour., est un grand Arbre des forêts de la Cochiuchine, dont l'écorce est épaisse , les rameaux ascendants, les feuilles lancéolées, très - entières , glabres, alternes et pétio- lées. Les fleurs , disposées sur des pédoncules terminaux , ont la corolle brune à l'extérieur et d'un jaune rougeâtre intérieurement.

IG..N

KNËPIER. bot. I'ian. On désigne quelquefois sous ce nom le genre *Mtlicocca*. V. ce mot. (a. r.)

KNI F A. bot. phan. Adanson formait sous ce nom tiré à la roue de la loterie un genre composé des Millepertuis à deux styles. (B.)

KNIGHTIE. *Knightia*. bot. phan.

Genre de la famille des Protéacées et de la Tétrandrie Monog[^]nie, L., établi par R. Brown dans son excellent travail sur celte famille {Lin. Trans., 10, p. igo). Voici les caractères de ce genre : calice régulier, formé de quatre sépales roulés en dehors; étamincs en même nombre attachées vers le milieu de la face interne des sépales; ovaire très-allongé, appliqué sur un disque hypogyne formé de quatre corps glanduleux, à une seule loge contenant quatre ovules ; style très-long; stigmate renflé en massue allongée , strié longitudinalement. Le fruit est un follicule simple , allongé, coriace, terminé par une longue pointe formée par le style persistant, à une seule loge contenant quatre graines membraneuses et ailées dans leur

KNO

partie supérieure seulement. Une seule espèce compose ce genre qui a beaucoup de rapports avec le *Ji/wpala*, dont il diffère par ses graines au nombre de quatre , ailées seulement à leur partie supérieure.

Le *Knigktia excelsa* , Brown , loc.

cit. , t. 2, est un grand et bel A.rbre originaire de la Nouvelle-Zélande.

Ses feuilles sont coriaces , éparses , pétiolées, oblongues, dentées en scie.

Les fleurs sont géminées, très-longues, formant des épis axillaires, presque globuleux. Les fruits d'environ trois pouces de longueur sont velus, (a. r.)

KNIKOS. bot. phan. (Théophraste.) D'où. Cuicus. F~. ce nrot. (b.)

KNIPHOFLi. bot. phan. L'J/etris Uvaria, L., forme le type d'un genre établi sous le nom de Kniphofia par Mcench. D.ins cette Plante, les élamincs débordent le calice, ce qui a paru à l'auteur du genre un caractère suffisant pour le distinguer des espèces du genre ■ feltheirnia , auquel Gleditsch l'avait réuni , et dans lequel les étamines sont plus courtes que le calice. (G..N.)

KNOWLTONIE. Knowltonia. bot.

PHAN. Ce genre , établi par Salisbury {Prodr. , 572)'pour quelques espèces du génie Adonis de Linné, a été nommé Thebesia par Neckeret Ana~ me/iia par Ventenat. Mais le nom de Salisbury est généralement adopté.

Les cinq espèces qui composent ce genre sont toutes originaires du cap de Bonne-Espérance ; elles sont vivaces^ et par leur port elles ressemblent beaucoup plus à des Ombcllifères qu'à des Renonculacés , bien qu'elles appartiennent réellement à cette dernière famille. Leurs racines sont fasciculées; leurs feuilles sont radicales , simples ou divisées en lobes nombreux et pinnatirides, roirles et coriaces. La hampe est di rssée , rameuse

surtout vers la partie supérieure où. elle forme une sorte d'ombelle composée, accompagnée d'un involucre irrégulier, formé de plusieurs fo-

KNO

KO A

lilioles simples ou découpées. Le calicxe est pentasépalc régulier; la corolle formée de cinq à quinze pétales étalés > sans appendice à leur onglet ; les étamines et les pistils sont fort nombreux ; ces derniers sont placés sur un réceptacle globuleux. Ils se composent d'un ovaire ovoïde, cotuprimé , uniloculaire , monosperme, d'un style long et grêle et d'un stigmate très-petit et simple. Les fruits sont autant de cariopses monospermes un peu charnues en dehors. Ce genre tient le milieu entre *Hydraslis* et *Adonis*; il a les fruits charnus du [premier et les fleurs du second. Toutes les espèces de *Knowltonia* sont âcres et vésicantes. (a.r.)

KNOXIE. *Knoxia*. bot. phan. Ce genre de la famille des Rubiacées, et de la Tétrandrie Monogynie , L. , a été (établi par Linné et ainsi caractérisé par Jussieu [Mém. sur les Rubiacées, p. 5): calice quadrifide; corolle tubuleuse, filiforme , dont le limbe est quadrifide ; quatre étamines ; fruit divisible en deux coques presque arrondies , acuminées, planes d'un côté , convexes de l'autre, attachées par leur partie supérieure à un axe filiforme. Le type de ce genre est le *Knoxia zeylanica* , L. , nommé Vissadali par Hermann et Adanson.

L'autre espèce { *K. corymbosa*) est aussi une Plante des Indes-Orientales, dont Gaertner a ligué le fruit {de *Frucl.* 1, t. 25). Ce sont de-, herbes à fleurs terminales ou axillaires , disposées en épis ou en corymbes.

Jussieu pense que les espèces d'*Houstonia* qui ont les loges de l'ovaire monospermes , sont congénères du *Knoxia*. Remy et Schultes (*Syst.*

Veget. 5, p. 53:2) ont, d'après les manuscrits de Vahl, décrit deux Plantes de l'Amérique méridionale , sous les noms de *Knoxia simplex* et de *K. dichotoma* , que Kunth {*Nov.*

Gen. et Spec. 3, p. 341 et 548; a fait rentrer dans le genre *Spermacoce* de Linné. V. ce mol. (o..N.)

* KO.BOT.ITALIAN.Etnon Co.Cemot désigne , au Japon , deux Plantes

très-différentes : le Riz et une espèce de Courge, *Cucurbita hispida* , Thunb. En Norvège , on donne ce nom à la résine du Sapin. (g..n.)

KOALA. *Phascolarctos*. MAM.

Blainville a donné le nom de *Phascolarctos* (c'est-à-dire Ours à poche) à un genre fort remarquable de la grande tribu des Marsupiaux , qu'il a eu l'occasion de voir à Londres il y a quelques années , qu'il a fait dessiner et qu'il a le premier décrit (dans le *Bulletin de la Société Philomatique*, T. v , 1816 , p. 108). On a donné depuis quelques autres descriptions du même Animal , mais toujours seulement d'après des dessins. Aussi croyons-nous devoir nous attacher à celle de Blainville, que nous citerons même textuellement. « Intermédiaire , dit ce savant zoologiste , aux genres

Phalanger, Ranguroo et Phascloine, ses caractères principaux sont :

six incisives supérieures, les deux intermédiaires beaucoup plus longues ; deux inférieures comme dans Ips Kanguroo; cinq doigts en avant , séparés en deux paquets opposables , l'intérieur de deux ; cinq en arrière, le pouce très-gros, opposable, sans ongle; les deux suivans plus petits et réunis jusqu'à l'ongle; la queue extrêmement courte. De la grosseur d'un Chien médiocre, cet Animal a le poil long, touffu , grossier, brun-chocolat; il a le port et la démarche d'un petit Ours; il grimpe aux Arbres avec beaucoup de facilité : on le nomme Colak ou Koala dans le voisinage de la rivière Vapaum dans la Nouvelle-Hollande. »

Nous compléterons autant que possible cette description, soit d'après la figure qui fait partie de la collection des vélins du Musée d'Histoire naturelle, soit au moyen d'autres documens. Le dessous du corps et la partie interne du membre antérieur sont blancs , ainsi que la face concave des oreilles , qui est couverte de très-longs poils. La tête est peu allongée, assez globuleuse; les narines presque terminales et entourées

KO A

«l'un muflé assez étendu vers le front ; les oreilles sont arrondies, et l'œil est à peu près châtain ; nous notons cette couleur parce qu'elle se retrouve également sur toutes les figures du Phascotarclvs que nous avons • vues. Il paraît certain qu'il n'existe de canines qu'à la mâchoire supérieure; mais on n'est pas d'accord sur leur nombre, non plus que sur celui des molaires. Cuvier a décrit

et même figuré ce genre dans son Règne Animal, en lui conservant son nom de pays, Koala. Il nous apprend que le Koala passe une partie de sa vie sur les Arbres , l'autre dans des tanières qu'il se creuse à leur pied , et que la mère porte long-temps son petit sur son dos ; ce qui s'accorde bien avec ce que nous avons rapporté précédemment d'après Blainville, et ce qui le confirme entièrement; mais que penser de ce qu'ajoute l'illustre professeur? Suivant' lui , le pouce manquerait au pied de derrière , et le pelage serait de couleur cendrée. Cette dernière circonstance peut assez bien s'expliquer par la supposition que les deux naturalistes ci-dessus mentionnés auraient connu deux espèces différentes, l'uncendrée, l'autre brune; supposition qui même ne serait pas sans quelque fondement, d'autant plus que les oreilles ont une forme beaucoup moins arrondie dans la figure de Cuvier que dans celle de Blainville.

Nous remarquerons d'ailleurs que le Vélin du Muséum représente le Koala de couleur cendrée , et c'est aussi cette couleur que lui a supposée Goldfuss en le figurant (Mammif. , bch. , 1817) sous le nom de *Lipunts ciriereus* : réunion de circonstances qui ne permet pas de douter de l'existence de Koalas cendrés. Quoiqu'il en soit, on a encore beaucoup plus de peine à concevoir une dissidence d'opinions sur un caractère aussi important et aussi tranché que celui de l'absence ou de la présence du pouce, surtout quand, suivant Blainville, ce doigt aurait un volume considérable. L'auteur du dessin d'après lequel Cuvier a fait sa description,

KOC

aurait-il omis le pouce , et causé ainsi une erreur? Il est difficile de croire à une pareille inexactitude. Mais comment imaginer

aussi que le pouce ait pu être ajouté dans la figure de Blainville, figure exécutée avec uii grand soin? Une addition ne seraitclle pas encore beaucoup moins vraisemblable qu'une omission , si grave qu'elle pût être? On n'admettra pas d'ailleurs qu'un naturaliste aussi exact que Blainville ait pu , au sujet d'un Animal qu'il a vu lui-même, commettre une aussi grave erreur.

Aussi , à moins de vouloir que le Koala et le Phascolarctos soient des Animaux tout-à-fait différents, et de genres entièrement distincts, ce qui ne nous paraît guère plus vraisemblable , il semble difficile de ne pas se ranger à l'opinion de Blainville , et de ne pas admettre avec lui que le genre Koala ou Phascoïarctos a un pouce assez gros, opposable aux autres doigts, et non onguiculé. (is.O.ST.-n.)

KOB. m.vm. Espèce du genre Antilope , différente du Koba , mais qui habite aussi le Sénégal, où elle est connue sous le nom de petite Vache brune. T~. A?;til6fe. (js. g. ST.-ii.)

KOBA. mam. Syn. d' Antilope du Sénégal. V. ce mot. . (fi.)

* KOBALTBLOTHE. min. (Werner'.J V- Cobalt.

* KOBES. ois. Espèce du genre Faucon. V. ce mot. (b.)

KOBRESIA. bot. phax. V. Coit RÉSIE.

KOCHIA. bot. fha». Genre de la famille des Cbéoopodés, et de la Pentandrie Digynie, E., établi par Koth (in Schrad. Journ. 1800, at p. 107, t. 11) et adopté par Rob.

Brown {J^rodr. FL Nov-Holland., p.

40g) qui l'a ainsi caractérisé : périanthe monophylle, quinquéfide, les découpures appendiculées ; cinq élamines insérées à la

base du péricarpe; ulricule déprimé , renfermé dans celui-ci; graine horizontale à tégument simple', dépourvue • d'albumen , ou

KOE

n'en contenant seulement qu'une 1 faible quantité ; embryon courbé , i non spiral. Ce genre , constitué aux . dépens rics *Salsola* de Linné , est : susceptible, selon R. Brown , d'être I subdivisé en deux , savoir : 'Kochia, i dont les appendices du péricarpe sont , subulés, épineux , et la graine dépourvue d'albumen; ff- ille-melia , ■ dont les appendices sont membraneux et dilatés , et les graines munies d'un albumen peu abondant. Ces divisions n'ont été employées que comme sections d'un même genre par Schultes [System, t'aget. 6, p. 244).

Cet auteur eu a décrit , d'après Rotli, Schrader et Brown , douze espèces dont plusieurs avaient appartenu au genre *Ctenopodium*. Ce sont des Plantes herbacées , qui croissent dans les lieux sablonneux , humides, et en général salés , de l'Europe et de la Russie asiatique. (g..n.)

KOELERIE. *Koeleria*. bot. phan.

Willdenow {Sp., pl. 4, p. 750) a fait sous ce nom un genre nouveau que Poileau avait décrit auparavant sous celui de *Rurnea*. Persoon s'est servi du nom de *Koeleria*, pour désigner un genre de Graminées

?ui pour son port se rapproche des hléoles et des Vulpins, tandis que par ses caractères il a de l'analogie avec les A ira et les Avoines. Sa lépicène est à deux valves comprimées en carène, contenant de deux à cinq fleurs; leur glume se compose de deux

valves , l'extérieure qui est entière à son sommet porte un peu au-dessous de sa pointe une petite arête courte; l'intérieure est bifide. Le fruit est nu, c'est-à-dire non enveloppe par la, glume. Persoon a réuni dans ce genre peu naturel le *Poa cristata* de Linné, 1' ' *Aira vallesiaca* d'Allioni , le *Festitia phleoides* de Villars , *Vàira pubescens* de Vahl. De Candolle y a ajouté le *Festuca calycina* de Lamarck et deux espèces nouvelles qu'il a nommées *Koeleria albescens* et *Koeleria macilentata*. Beauvoisy a également joint quelques autres espèces prises dans les géni es Pua, *Phalaris clFes- 'uca*. { a. K.)

KOE i55

K.OELLEA. bot. ru an. Biria , dans sa Dissertation sur les Renonculacées publiée en 1 8 1 1 , a nommé ainsi un genre qui était établi depuis 1807 par Salisbury, sous le nom d'*Erant/iis*. Le genre *Robertia* de Méral (Flore Paris. 181a) est encore le même que celui-ci. K. *Eranthis*.

KOELLIA. bot. riiAN. Le *Thymus Virginicus* , L. , était nommé *Koetl'ta capitata* par Moench. ; mais cette Plante a été placée par Michaux (lior. Boreali-A mer. a, p. 6) dans le genre *Brachy sternum* que l'on a réuni au *Pycnanthemum* du même auteur.

V. P YCN ANTII I. -M I . (G..N

KOELPIÏNIA. bot. phan. Pallas a constitué, sous ce nom, un genre qui a été réuni au *Lampsana* par Linné fils et au *Rhagaccliolus* par Schreber et Willdenow. IL Cassini s'est servi de ce mot pour designer la Plante de Pallas, comme un sous-genre auquel il

a assigné des caractères trèsdétailés, et que nous n'exposerons pas ici, parce qu'ils seront plus tard implicitement reproduits à l'article Rhagadiole. (g..N.)

* KOELREDTERA. bot. crypt.

(Hedwig.) V. Funaire.

KOELREUTÉRIE. Koelreu/eria.

bot. phan. Genre de la famille des Sapiudacées et de l'Octandrie Monogynie, L., établi par Laxmann (Nov .

Comrn. Petrop., 16 , p. 56 1 , t. 1 8) pour le Sapindus chinensis de Linné fils.

Ce genre oll're un calice monosépale campauulé, à cinq divisions très-profoudes; une corolle de quatre pétales étalés, ongiculés et appendiculés audessus de leur onglet , disposés de manière qu'il semble que le cinquième manque ; huit c ta mi nés dressées , appliquées sur un disque hypogyne et sinueux ; anthères introrsés à deux loges s'ouvrant par un sillon longitudinal; ovaire allongé à trois angles saillans , à trois loges contenant chacune deux ovules superposés , attachés à l'angle iuterne. Le style , qui se confond insensiblement avec le

KOE

KOK

sommet de l'ovaire, se termine par un stigmate à trois branches allongées et presque se'tacées. Le fruit est line capsule vésiculeuse très-renflée , ;\ trois loges conlenant chacune une ou deux graines globuleuses, renfermant un embryon roulé circulaire^ ment sur lui-même.

Le *Koeleria paniculata*, Lamx., loc. cit., l'Hérit., Sert. Angl. t. 19, est un petit Arbre originaire de la Chine et de l'Afrique. Il peut s'élever à une hauteur de quinze à vingt pieds. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, imparipinnées, composées ordinairement de treize à quinze folioles ovales, très-profondément et inégalement dentées; ses fleurs sont jaunes, assez petites, formant une panicule ou grappe rameuse à l'extrémité des jeunes rameaux. Cet Arbre est naturalisé dans nos jardins où on le cultive en pleine terre. Il se plaît dans les lieux ombragés et un peu humides. On le multiplie de graines, de marcottes ou de rejets.

Ses fleurs s'épanouissent en juin.

Persoon avait établi une seconde espèce de *Koeleria* sous le nom de *K. tripartita*, mais cette espèce fait aujourd'hui partie du genre *Utricularia* de Kunth.

Le nom de *Koeleria* avait encore été donné à d'autres Plantes.

Hedwig nommait ainsi un genre de Mousses qu'il a appelé plus tard *Tunaria*, et Murray avait donné le même nom au *Gisckia* de Linné.

(a. ta.)

KO 1NKGIE. *Koenigia*. bot. phan.

Genre de la famille des Polygonées, et de la Triandrie Trigynie, L., composé d'une seule espèce, *Koenigia islandica*, L., Lamk., III, t. Si. C'est une petite Plante herbacée, annuelle, qui croît sur les bords maritimes de l'Islande et des mers polaires. Ses racines partent deux ou trois fois grêles, d'un à deux pouces de longueur, dressées ou étalées, glabres, ainsi que

les autres parties delà Plantes chaque tige porte dans sa longueur une ou deux feuilles alternes, obovales-obtuses , rélrécies à la base , et deux ou trois

autres rapprochées les unes des autres au sommet de la tige où elles forment une sorte d'involucre. A la base de ces feuilles on trouve deux stipules très-larges, minces et scarieuses. Les fleurs sont fort petites , réunies en assez grand nombre à l'aisselle des feuilles supérieures. Leur calice est régulier , profondément tri-parti. Leurs étamines , au nombre de trois , sont insérées à la base des divisions calicinales. L'ovaire est surmonté de deux ou trois stigmates sessils. Le fruit est un akène enveloppé dans le calice. (a. h.)

* KOES-KOES. mam. V. Pha-

LANGER.

* KOGO. ois. Espèce du genre Philédon. V. Piilédon. (dr..z.)

* KOGOLCA. ois. Espèce du genre Canard. V. ce mot. (on..z.)

KOHLLENBLENDE. min. (De Born.)Syn. d'Anthracite. K. ce/not.

KOLLENIORNLENDE. min.

Nom allemand donné par Beyer à une matière noire , fibreuse , qu'on trouve dans la Rétinite de Saxe , et qui a été prise d'abord pour du Charbon , ensuite pour de l'Anthracite, et enfin pour de l'Amphibole charbonneux.

Vauquelinya reconnu les principes suivans : Silice, 00; Carbone, 35; Alumine, 11 environ; Fer, 6. La place de ce Minéral n'est pas encore bien déterminée, et l'on ne peut dire si c'est une

espèce mméralogique réelle ou un Minéral déjà connu, mêlé avec du Carbone. y. Rétinite. (g.)

* KOI WU otjCOIWD. bot. phan.

Syn. finlandais du Bouleau, *Betula alla*, L. (b.)

KOKERA. bot. phan. Adanson nommait ainsi un genre de la famille des Amaranthacées , et dont *Y/lchyrantkcs aliudma* était le type. C'est le même que le Digéra de Foiskahl.

y. Digère. (g..n.)

* KOKO. ois. Espèce du genre Ibis. V. ce mot. (b.)

KOL

KOLA. bot. than. Même chose jjqqe Cola. (b.)

* KOLAH. mam. Même chose que Koala. V. ce mot. (is.g. st.-h.)

KOLBIA. bot. phan. (Adanson.) liS3yn.dei//fl*/'i'fl,el qu'il ne fa ut pasconlii'ifonilre avec Kolbie. P~. ce mot. (B.)

KOLBIE. Kolbia. bot. fhan.

j CfjTiire établi par Palisot - Beauvois I ((Flore d'Ovvare et de Bénin , vol. a , I pp. 91, t. lao) qui l'a placé dans la fa- :ii<miile des Cucurbitacées et dans la I IDiœcie Pentandrie, L. , avec les caj racteres suivans : fleurs dioïques ; les 1 rmâles ayant un calice à cinq lobes; jaune corolle à cinq divisions profondes, bordées de glandules; appenj ildice foi nié de cinq lanières lancéo- 1 liées ,

périaliformes , de couleur bleue, : Lbo niées de longs cils plnmeux, al- 1 tternes avec les divisions de la corolle ; 1 ccinq étamines libres, insérées sur le 1 Lbord de ln couronne, à fdets courts ! eet à anthères conniventes. Les fleurs i ffemelles ne son! pas connues.

Le Kolbia elegans a été découvert i [par Palisol -Beau vois , dans le rova- I rme de Bénin en Afrique. C'est une libelle Planle à tiges sarmenleuses , ■ | pourvues de vrilles et de feuilles al- ' tternes , pétiolées , Irès-glabres , ovalles, aiguës, entières et ée- bancrées | (en cœur à la base. Elle a des fleurs 1 trouges, portées sur des pédoncules

■ qui partent d'un pédondule commun «et axillaire.

Le Kulbia A' Adanson est synonyme ide Blairia. F. ce mol. (o..N.)

KOLIN'IL. BOT. PH AN. V. CoLINIL.

KOLLYUTE. min. Cette subs- 1 t tance qui ressemble à de la gomme ,

■ a la cassure vilro-résinetise , et se 1 décompose eu partie à l'air, est rc- | gardée maintenant comme une vérit table espèce. Elle est formée d'un

atome de trisilicate d'Alumine com- 1 biné avec dix-huit atomes d'Eau.

IE'le donne beaucoup d'Eau par la i calcination. V. Argile Coi.lybite.

(g. del.)

KOL MAIN. bot. crypt. [Lichens.)

KOL

Le genre formé sous ce nom par Adanson qui le plaçait parmi les Champignons , répoud à nos Collema. F. ce mot. (a. f.)

* KOLOTES. rept. satjr. Syn. de Calâtes ou Galèote. Les anciens désignaient ainsi le Gecko. V. ce mot. (b.)

KOLPODE. Kolpoda. inf. Genre de l'ordre des Gymnodés dans la classe des Microscopiques , établi par Millier, adopté par Bruguière et par Lamarck, et dont les caractères que nous avons cru devoir réformer sont :

corps membraneux , transparent, offrant des globules plus gros que sa molécule constitutive, atténué au moins vers l'une de ses extrémités , plus ou moins variable, mais sans divergence, ni replis membraneux, ni cavité creusée en bourse dans son élen-Hue. Les Kolpodes seront ainsi distingués des Amibes dont ils n'ont pas les prolongemens rayonnés qui en changent si fort la physionomie, des Paramœcies dont ils n'ont point les replis ; des Bursaires qui sont excavées. Nous en connaissons plus de vingt espèces dont le plus grand nombre vit dans les infusions ; quelques-unes se trouvent dans l'eau des marécages , il en est peu ou point de marines, encore que l'eau des Huîtres en fournisse , mais il faut que cette eau soit déjà corrompue. Ce sont des membranes vivantes, translucides, variables , nageant avec, plus ou moins de gravité en glissant sur les objets ou entre deux eaux. Un naturaliste italien, Ldsana, a récemment publié dans les An-

nales de Turin , une monographie de ce genre, où le nombre des espèces est immense , mais les figures qui accompagnent ce travail sont si grossières , représentent des formes tellement bizarres et peu naturelles , outre que les descriptions qui accompagnent ces figures sont insuffisantes , qu'il nous serait impossible d'en citer aucune, parce que, dans notre esprit de circonspection , nous ne tenons pour existantes que les espèces qui ont été vues par plusieurs observateurs ex-

i33 KOL

périmenlés , dont nous avons retrouvé nous-mêmes des individus identiques ou du moins des espèces voisines qui nous en démontraient la possibilité. Les Kolpodes se subdivisent naturellement en deux sous-genres :

f Vibriontdes, ayant leur corps plus ou moins spatulé et allongé d'un côté , comme en bec ou en forme de cou auquel il manquerait une tête. La plupart étaient des Vibrions pour nos prédécesseurs , mais n'offrant pas le moindre rapport de forme ; me ou d'organisation avec les An- ; guilles du vinaigre qui sont le type de ce genre , nous avons dû les en éloigner. Les Kolpoda truncala, N.j Vibrio ulriculus , Miill., Inf., tab îrj, f. i5, Encycl., Vers. IU-, p-4, f. 28, et fasciolaris, N.; Vibrio j'anciola, Miill., Inf., pl.. 19, 1'. 18-19, Encycl., pl. 4 . f. 29 , 50 , donnent une idée de la forme des Animalcules que nous en rapprochons.

ff Kolpodes proprement dits, qui, quoique atténués antérieurement, ne se prolongent jamais de manière à s'éloigner de la forme anguleuse pu de poire. Ce sont en général les plus variables. Lçs espèces remarquables sont : Kolpoda cosmopolila , N., que nous avons rencontré très-fi équeminént. dans toute

sorte 4'infusious et auquel on doit rapporter une multitude d'Animalcules des anciens micrographes , représentés dans les figures 8 et 9 .de la planche 28 de Gleichcii , 1, a b c ci , et 24 de la planche 4 de Joblol , etc., etc. Il faut bien distinguer cette espèce terminée antérieurement en bec assez aigu , de celles qui sont obtuses, beaucoup plus difformes, et que ces auteurs .nomment Cornemuses dorées et Pandeloques ; celles-ci sont des Ami- Jies. — Le Kolpode Pintade n'est pas Aine espèce moins singulière de ce .sous-geure; on en avait confondu deux autres avec elle. Nous les avons ainsi distinguées : iQ Kolpoda JUEleagris , Miill., pl. i4, f. 1-6, Encycl., pl. 6, f. 17-2; — 20 Kolpoda kinidiriacea, N.; Meieagris , Miill., pl. i5,

KON

f. i-3, Encycl., pl. 6, f. i3-a5; — 3° Kolpoda Zigoena , N. ; Meieagris , Miill. , pl. , i5, f. 4-5, Encycl., pl. 6, f. 26-27. Le Kolpode Rein, Kol^ poda Ren, Miill., Inf., tab. n , f.

20-ii , Encycl. , pl. 7 , f. 20-22 , appartient encore à ce sous-genre.

Cette espèce presque'arroudie , plate, translucide , nage gravement dans l'eau où l'on met tremper des queues de bouquets au bout île peu d'heures d'infusion ; on la rencontre aussi dans les infusions de Foin , et dans les ruisseaux qui bordent les prairies. , (b.)

KOL-QUALL. bot. phan. (Bruce.) Syn. à'Eitphorbia antiquorum , L.

KOLUPA. bot. phan. (Adanson.) Syn. de Gomplirène. (b'A

KOMANA. bot. phan. (Adanson.) Genre formé de VHypericum monogynuni , qui n'a pas été adopté. (p..)

KOME ou WASf. bot. piivn.

Qu'on a aussi écrit Corne. (KœmpfeV.) Syn. japonais de Riz. (b.)

KOM.M ITfA.IIi. bot. phan. (Delile.) Syn. arabe de Poirier. (B.)

* KOMO-GOMMI. V. Come-

GOMMI.

KONDEA. ois. Espèce du genre Cpuroucou. F. ce mot. , (b.)

* KONDYLIOSTOAIE. Kondy- .liostoma. iNl-. Genre de la classe des Microscopiques et de l'ordre des Tri- ■chodés , formé aux dépens des Trichodes de Millier, ainsi caractérisé : corps .cy-liudracé , avec un orifice buccal latéralement situé à la partie antérieure amincie,, garnie tout autour de cils vibratiles , plus longs que ceux qui se montrent tout aulbur ou sur quelque autre pal lie de l'Animal. Les deux espèces qui composent ce genre se trouvent dans Peau de mer , et même dans l'eau douce longtemps gardée. La première, K. Lagenula,N., Tricàoda patula , Mull. , Inf., p. 181, pl. 20, f. 5-5; Encycl. , pl. 5i, f. a3-a5, est ventruée, épaissie dans la partie postérieure, auiin-

il KOO

ie mais obtuse en avant, et serait une éritable Bursaire, si des poils très- Jlcns n'en garnissaient tout le pourtour rJtt si elle n'avait de longs cils vibrallHHes autour de l'orifice. La seconde,

tKfondyliostoma Limacina, N. , Trihoila patens, Müll., Inf., p. 181, pl. Ip, f. 1 2 ; Encycl. , pl. 1 3, f. 21-32 , Itsst allonge'e, amincie en queue que Il Animal contourne vivement pour Ikee retourner, avec l'orifice buccal s'éllaargissant un peu en forme de curcjpDreille. Elle paraît glabre, si ce n'est pur ce qu'on peut nommer les lèvres f ni se voient des cils très-prononcés, ICoillans. (b.)

KONIG. bot. phan. Adanson Fam. des Plantes , 11 , p. 4ao) avait fformé , sous ce nom, un genre aux déjlrpens des sllys-sumæ. Linné. Ce genre llrn est considéré que comme une secjt-tion par le professeur De Candolle Veget. liai. T. 11 f p. 5 1 S) qui lilui a donné le nom de Lobularia sous Il lequel Desvaux l'a aussi distinguée |cgnériquement. V. Lobui.aria.

* KOMILITE. min. Nom donné par .'Macculocli à une substance qui panait n'être autre chose que la Silice [pulvérulente. (g.dix.)

KONITE. MIN. V. CONITE.

* KONOKARPOS. bot. phan.

' (Adanson .) Syn. de Conocarpc. K. ce 'mot. (B.)

KOOKIA. bot. pu an. Pour Cookia. P. ce mot. (B.)

* KOON. bot. phan. Sous ce nom, Gaertner {de Pritct. , vol . 3, p. 486, t. 18o) a décrit un fruit originaire de Ceylan. Ce fruit est composé de coques ovales comprimées, indéhiscents et munies de deux petits tubercules près de leur point d'attache.

Chaque coque est uniloculaire et ne renferma qu'une seule graine sans albumen , dont la radicule occupe une moitié de la loge partagée par un prolongement de l'ombilic , tandis que les

cotylédons repliés en hameçon occupent l'autre moitié. Gaertner présumait que ces coques avaient

KOS 1ĭ

été rassemblées sur un réceptacle commun , et qu'elles devaient appartenir au genre *Ochna*. Ce rapprochement ne paraît pas avoir été admis.

* KORALLĭON. polyt. r. Corail.

KORAX. ois. Syn. de Corbeau devenu scientifiquement spécifique du Corbeau noir. V. ce mot. (b.)

KOR.DERA. bot. crypt. {Champignons.} Ce genre , établi dans la cinquième section de la famille des Champignons d'Adanson , n'a point été adopté, non plus que la circonscription vicieuse de la famille enlièie lèlle que l'avait établie cet auteur.

Adanson rapportait à ce gc.nre le *Corallofutigus* de Vaillant , Bot. Paris.

tab. 8, fig. 1 . C'est le *STcsnterica argentea* de Persoon , *Merulius argenicits* de Fries , *Byssus parietina* de De Candolle. (A. F.)

KoRÉ1TE. min. Syn. de Pagodire ou Pierre de Lard. (g. Dix..)

* KORENBL rot. phan. Espèce du genre *Guattei* ie. V. ce mot. (b.)

KORKIR. bot. cbypt. {Lichens.} Adanson a placé ce genre' dans la seconde section de sa monstrueuse famille des Champignons. 11 répond aux genres *Opegrapha* , *Graphis* , *JLecidea* ,

Varwlaria , P'errucaria et Parmelia d'Acharius. Ce genre n'a point été adopté. (a.1\).

* KORKOR. pois. Espèce arabe du genre Perche, (b.)

KORN. bot. pu an. Ce mot signifie Blé dans les langues d'origine tudesque ou germanique.' (u.)

* KoRoV1K. bot. crypt. V. Bobo VIK.

* KORROS. rept. . opii. Reinwardt, naturaliste hollandais, a imposé ce nom au Coluber cancellatus d'Oppel. (b./

KORSAC. mam. V. Corsac

* K.ORUND. min. V. Corindon.

KOSARIA. bot. phan. Le genre

l4o KRA

établi sous ce nom , par Forskahl (F/or. JEgypt.-Arab. p. i64) , est le même que le Dorstenia de Linné, et l'espèce qui le constitue(.K'osrz/ïa.Fo/3kahlei, Gmel.) doit être rapportée au Dorstenia radiata , Lamk. P . Dorsté-

ETOILE

* KOSTER A. pots. (Lepéchin.) V. Esturgeon Schype.

* KOTNON et KOTON. bot.

phan. Syn. arabes de Gossypium indicum. V. Cotonnier. (b.)

* KOTTOREA. ois. Espèce du genre Barbu. K. ce mot. (b.)

ROULAN. mam, V. Choulan.

KOULIK. ois. Espèce du genre Aracari. V. ce mot. (b.)

KOEPARA. mam. (Barrère.) Nom de pays du Crabier, espèce du genre Chien. P. ce mot. (b.)

KOUPHOLITHE. min. Nom donné à une variété de Prénite en petites lames prismatiques. V. Prénite. (g. del.)

KOUROU-MA.RY. bot. phan. Barrère donne ce nom de pays au Roseau , des tiges duquel les Sauvages de la Guiane font leurs flèches. Les uns regardent cette Plante comme le *Saccharum giganteum* , les autres comme le *Ga/.a/iga arundinacea*. (b.)

KOUXEURY. pois. On ne sait à quel genre rapporter ce Poisson des lacs de l'Amérique méridionale dont on ne connaît que le palais rugueux comme une lime, et qui sert aux naturels pour râper et polir le bois.

KRACKEN ou KRAKEN. moll.

Animal fabuleux , auquel on attribuait une taille gigantesque , et dont le cerveau malade de Denys Montfort voulut faire un Poulpe , capable d'avaler une Frégate, ce qu'il a fait

KRA

représenter par une estampe dans la détestable édition de Buffon par Sonnini. V. Léviatan. (b.)

. • KR AM ÉRIE . *Krameria*. bot. ph an. Genre établi parLoe-fing, avant de grands rapports avec la famille des Polygalées , et faisant parlie de la Tctiandrie Monogynie , L. Ses caractères sont : un calice profondément quadriparti , à divisions presqueégales colorées à leur face interne et marquées de veines anastomosées ; une corolle de deux ou de trois pétales situés à la partie supérieure de la fleur, redressés, longuement onguiculés et soudés ensemble par leur base ; trois ou quatre étamines placées immédiatementau-dessous des pétales vers la parlie supérieure de la fleur et composées d'une anthère uniloculaire appendiculee à son sommet, à peu près conique, bilobée inférieurement et s'ouvra nt par un petit orifice terminal ; cette anthère est continue ou articulée avec le sommet.

Au-dessous des anthères, mais sur le même plan on trouve deux appendices écailleux, très-obtus, pressant l'ovaire latéralement. Celui-ci est libre, ovoïde, comprimé, à une seule loge contenant deux ovules opposés et suspendus. Le style est en général delà longueur des étamines, recourbé et terminé par un sligmate très-petit et à peine bilobé. Le fruit est sec, globuleux , hérissé de pointes épineuses à une loge contenant une ou deux graines suspendues. Cellesci se composent d'un tégument propre recouvrant un gros embryon dont la radicule est terminée vers le hile , et dont les cotylédons sont trèsépais et très-obtus. On compte sept espèces de ce genre qui toutes sont originaires de l'Amérique méridionale : ce sont des Aibustes rameux, portant des feuilles alternes, simples, ou trifoliolées , des fleurs sessiles oii pédonculces placées à l'aisselle des feuilles des jeunes rameaux. Les racines de plusieurs des espèces de ce genre et entre autres celles des *Krameria triandra* et *K. ixioïdes* , qui

KIU

«rfoissent au Pérou, sont employées jtii jnédecuic sous le nom de Ratan- Wia. Ces racines sont rameuses, li- Ihaéuses , d'un brun rougeâtre , d'une jlnvcur très-astringente. O.i les emjiMoic surtout dans le traitement de la lluarrrhée chronique. (a. R.)

* KRAiNCHIL. mam. V. Kan- [lhil.

K.RANHIA. bot. phaN. (Rafines- U ne.) Genre formé pour le Glycine mnttescens , mais qui n'a pas été liidoptésous ce nom. Glycine, (b.)

* K.RAPFIA. bot. pu an. Le genre file Reuonculacées établi sous ce nom Lar Ue Candolle [Sysi. flat. f^eget. 1, In. 828), n'est qu'une espèce de Rejuonculc. F", ce mot.

KRASCHENNIN1KOWIA. bot.

KHaN. Sous ce nom patronimique loresqu'impossible à prouocer , GuliLicnste.lt avait établi un genre qui fciie trouvait précédemment lonné par AAidauson. A. Eurotie et Diotide.

* KRATA. ois. Même chose que CCata. F. ce mot. (b.)

KREIDEK. bot. phan. Adanson a lfoi mé , sous ce nom , un genre coml iposé de la réuniou du Scoparia et du iù'aprarria de Linné. V. ces mots.

* KUEUZSTEIN. min. (Werner.) W. Harmotome.

KRIG1E. Krigia. bot. phan. Genire de la famille des Syuauihérées , (Chicoracées de Jussieu , et île la Syn- | génésie égale, L. , établi par Schreber 1 et adopté par Willdenow, Cassini et la (plu-

part des auteurs. Il est ainsi caractérisé : involucre dont les folioles sont] presque sur un seul rang, égales, appliquées, oblongues, lancéolées, membraneuses sur les bords ; réceptacle absolument nu ; calathide composée de demi-fleurons nombreux et hermaphrodites ; aigues courts, pentagones, noirâtres, comme tronqués au sommet, munis de côtes longitudinales, striés transversalement, surmontés d'une aigrette double, l'ex-

RRU 141

térieure courte, composée de cinq paillettes membraneuses, presque arrondies ; l'intérieure longue, formée de cinq soies capillaires, légèrement plumeuses. Le *Krigia virginica*, Villd., ou *Hyoseris virginica*, L., est le type de ce genre. C'est une petite Plante herbacée qui a le port des *Taraxacum*, et qui croît aux Etats-Unis de l'Amérique septentrionale. Cassini a proposé d'y joindre *Hyoseris montana* Michaux, qui par les caractères de sa (leur concorde avec le *Krigia virginica*. (g..n.)

* *KRISOMÉTRIS*. ois. (Aristote.) Probablement le Chardonneret, (b.)

KROCKERIA. bot. phan. Necker (Elern. Bol., n. 1097) a donné ce nom à un genre qui rentre dans *Y Unona* de Linné. Mcench a aussi employé la même dénomination pour un autre genre formé sur le *Lotus edulis*, L. Seringe (in De Cand. Prod.

Syst. végét., 3, p. 209) eu a constitué la première section du genre *Lotus*. V. *LOTIEK*. • (G..N.)

* *KRUBERA*. bot. phan. Hoffmann (Umb. Gen., \>. 104) a établi sous ce nom un genre dont le *Tordylium peregrinum* de Linné

forme le type. Cette Plante est une espèce de Cac/uys , selon Sprengel. V. Ca-

CHRYDE. (G..N.)

* KRUEGERIA. bot. phan. (INEcker, Etern. Bot., n. 1089.)
Syn. de P'ouapa d'Aublet. V. ce mot. (o..n.)

* KRUSENSIÈRIE. Krusensterna. polyp. Genre de l'ordre des Milléporées dans la division des Polypiers entièrement pier-
reux et dont les caractères sont : Polypier dendroïde en forme de
coupe ou d'entonnoir, à expansions grossièrement tréfilées ,
couvertes en dessus de protubérances planes irrégulières , cri-
blées de pores, lisses ou légèrement striées en dessous. Il a été
établi par Lamouroux dans son exposition méthodique des Poly-
piers, et il ne renferme encore qu'une espèce qui ne parvient qu'à
une taille médiocre. D'une sorte d'empâtement par lequel le Po-

i4b KUA

lyprier se fixe aux rochers, s'élève une ou plusieurs expansions
aplaties, irrégulièrement contournées, formées d'un très-grand
nombre de rameaux courts, épais, anastomosés et représentant
un réseau grossièrement maillé. Chaque petit rameau est compri-
mé latéralement , lisse ou légèrement strié en dessous , plus ou
moins onduleux sur ses côtés, et sa surface supérieure est cou-
verte de grosses verrues aplaties , tantôt séparées par une sinuo-
sité assez profonde, tantôt confluentes entre elles ; chaque verrue
est criblée de petits pores anguleux, inégaux, qui sont les orifices
de cellules tubuleuses perpendiculaires au Polypier et qui pé-
nètrent toute sa substance , de sorte que celle-ci est très-légère et
fragile. La couleur de ce Polypier est d'un blanc grisâtre lorsqu'il
est desséché, elle est verte ou rosâtre pendant la vie •des Polypes.

L'espèce unique de ce genre est le *Krusensterna verrucosa* , qui vit dans la Méditerranée , la mer des Indes , celres du Groenland et du Kaintschalka. (jg.d..l.)

* KTEIS. coNen. Aristote désigne sous ce nom une Coquille bivalve inunie de charnière et cannelée, où l'on a cru reconnaître un Peigne , une Bucarde , etc. (b.)

KUAPiA. bot. PHA.N. Bruce qui nous apprend que c'est le nom donné, parles Abyssins , aux graines de *Y Erykrina* indicâ {*F. Erythrine*) , raconte à cette occasion une chose assez remarquable, et qui donne l'étymologie du mot Karat , employé dans l'évaluation du poids de l'or et des pierres précieuses. Le voyageur anglais assure que lorsque les semences du Kuara sont sèches elles sont toutes d'une égale pesanteur, et que de temps immémorial les Sangalas de l'Afrique s'en servent pour peser La pondre d'or. Ils les nomment Karat.

L'évaluation par Karat passa dans l'Inde , et de l'Inde en Europe , lorsque les pierres précieuses s'y introduisirent avec le luxe de l'Orient.

KUH

* KUDAR.I. mam. F. Musc à l'article CIEVROTAIN. (j3.)

KDDDAMULLA. bot. phan. Syn.

de Mogorium Sarnbac. V. Mogori.

* KUDICI-VALLT. BOT. PHAN.

(Rhéede , Hort. Mal. 8, t. 27.) Plante imparfaitement connue de la côte de Malabar, dont le port offre assez de rapports avec celui des Liserons, (b.)

KUEMA. bot. crypt. (Champignons.) Ce genre , formé par Adanson , répond à *YJgaricus alneus* de Linné et paraît être le *Schizophyllum* de Fries. V. ce mot. (a. f.)

. MAM. V. EciTREUII.

SUISSE

KDHNIE. Kuhnia. bot. phan. Ce genre appartient à la famille des Synanthérées ,• Corymbifères de Jussieu, et il a été placé dans la Pentandrie Monogynie , par Linné à qui on en doit l'établissement. Ses caractères , d'après H. Cassini , sont :

involucre cylindracé , formé de folioles irrégulièrement imbriquées; les extérieures courtes, lancéolées ; les intérieures longues, linéaires; réceptacle petit , plane et nu; calathide sans rayons , composée de plusieurs fleurons égaux , réguliers et hermaphrodites; ovaires cylindracs, hispaulules, striés et surmontés d'une aigrette plumeuse. Les corolles sout glanduleuses , et les anthères sont libres ou très-faiblement soudées entre elles , et surmontées d'un appendice arrondi. La liberté des anthères est une structure assez remarquable d.ms la famille des Synanthérées ; cependant on ne doit pas , ainsi que l'observe (Jassini, lui attacher nue trop grop grande importance, puisque plusieurs espèces des genres *Eclipta*, *Zinnia* , *Hclianlhus* , *Artemisia* , etc. , ont aussi leurs anthères non-cohérentes , sans que pour cela on ait songé à les distraire de la Syngénésic. Jussieu a indiqué la réunion du genre *Kuhnia* avec le *Liatris* , et GaeiUner a placé dans le genre *Cri/onia* „la seule espèce connue de son

KUN

ijnips. Cependant Kunth {Nov[^] Ge[~] ..er. et Spec. Plant, œquin, T. iv, p. ;>04} l'a conservé en lui ajoutant une nouvelle espèce. Cassini le place dans .. t li ibu des Eupaloriées près du genjoe Coleosanthus. L'espèce qui a servi }de type à Linné est le Kuhnia Eupa- Isjriuidm , Plante herbacée, indigène Gtie la Pensylvanic, en Amérique. Midhaux a rapporté à cette espèce, sous le nom de Critonia Kuhnia que lui Mvait imposé Gaertner, une Plante hpai en a été séparée par Cassini et appelée Kuhnia paniculata. L'Eupato- \riutn canescens d Ortega , indigène ki Je 1 île de Cuba , a été réuni au Kuhnua par Ventenat , et nommé Kuhnia vrosmarinifolia. Enfin Kunth [toc. cit.

Dpi io5 , lab. 33g) a donné le nom de \iKuhnia arguta à sa nouvelle espèce ([qui a été trouvée, par llumboldt et Hoonpland, près de la ville de Porpa\an, dans l'Amérique méridionale. (g..n.;

KUHNISTERA. bot. phan. (Lamiarck et Jussieu.) Syn. de Petalosttcmmtm. K. ce mot et Daléa. ;b.)

* KULA. bot. phan. V. Coea.

* KULB. bot. phan. f. Calab.

KUMARI. bot. puas. Syn. indou içfjiloe uulgaris, L., dont Mélicus (proposait de faire un genre sous le nom de Kumara. (b.>.

KUMRAH. m A m . Et non Cumràch.

(Shaw.) Ce Serait le nom , en Barbarie, d'un prétendu métis de l'Ane et de la Vache. V. Jumart. (b.)

* KUNDMAÎNNIA. uot. phan Le.

Sium siculum , L., dont les pétales sont jaunes, le fruit cylindrique et les involucre polyphylles, a été séparé sous ce nom générique par Scopoli. Antérieurement , Adanson en avait constitué son genre *Sirduina*.

Le *Mauchartiadeticker* paraît aussi leur être congénère. (g..n.)

KUNTHIE. *Kunthia*. BOT. PIT AN.

Genre dédié à notre ami et collaborateur C.-S. Kunth par Humboldt et Bonpland (Plant. Equinox. 3, p. 148, t. 148). Ce genre qui fait partie de La

KUP 143

famille des Palmiers offre les caractères suivants : fleurs hermaphrodites et fleurs femelles placées sur des régimes différents sur le même individu.

Les fleurs hermaphrodites ont un calice double , l'un et l'autre à trois divisions profondes , l'extérieur plus court ; les étamines au nombre de six , ayant les filets libres , un ovaire à trois loges , surmonté d'un style épais et trifide. Le fruit est une baie globuleuse et monosperme , dont l'embryon est placé à la base de l'endosperme. Les fleurs femelles ont leur calice extérieur simplement tridenté , et leur ovaire surmonté de trois styles. Le *Kunthia montana*, H.

et B., loc. cit., est un Palmier de moyenne grandeur dont le stipe nu se s'élève à vingt ou vingt-quatre pieds , tandis que son diamètre est d'à peu près un pouce. Ses frondes sont pinnées ; ses régimes rameux d'abord renfermés dans des spathes polyphylles. 1.

Il croît dans les lieux inontueux < il tempérés du royaume de la Nouvelle Grenade , et se retrouve jusqu'à une hauteur de huit cents toises au-dessus du niveau de la mer. Les habitants le connaissent sous le nom vulgaire le Canada la Vibora. (a. H.)

* KDJNTSN. bot. phan. Mên est chose que Contsjor à Java. V. , ce mot. (b. ■)

* KUNZIA. bot. phan. Sprengel a donné ce nom générique au Tigar, ta de Pursh ou Pu/shia de De Can'doll e.

f. PUKSHIE. (G..N.)

* KUL'FER , KUPFERGLAÏ- i , KLTFERKILS. min. (Werner.) / f.

Cuivre.

* KUPFERGLIMMER. min. (Werner.) V. Cuivre arséniaté.

* KUPFERINDIG. min. (Br< »tâupt; Hoffmann, ILxndb. derMin.

ï. IV, p. 178.) Substance tendre, o[>aque, d'un bleu Indigo, tirant quelquefois sur le bleu noirâtre, se présente; int en masses aplatis ou en rognons sp h'éroïdaux , à surface cristalline, ayant une cassure conchoïdale , un e'< est faiblement résineux, une pesanteur

i44 KDR

spécifique de 3,81. Au chalumeau , elle brûle avant le degré de la chaleur rouge, avec une flamme bleue , fond en un globule qui est follement agité et dorme , à la fin , un bouton de Cuivre. Leonhard la considère comme une variété du fiunl-Kupferei z ou

Cuivre pyriteux hépatique. On la trouve à Saugershausen en ïhu-
ringe, et à Leogaug dans le Salzbouurg. (g. djjl.)

* KUPFERLAZUR. min. (Werner.) Cuivre carbonate.

* KUPFERSM AR AG D. min. (Werner.) P~. Cuivre diopase.

* KUPFER- VITRIOL, min. (Werner.) P~. Cuivre sulfaté.

TCUPHEA. bot. phan. Pour Cuphea. ^ . ce mot. (b.)

* KURKA. bot. phan. Même chose que Gurca'. Pr. ce mot. (b.)

* KURRAKKAN. bot. phan. On mentionne sous ce nom une
Graminée indéterminée de l'île de Ceylan , qui est probablement
quelque Eleusine , peut-être un Paspale, et la même que Caracan
, Coracan ou Couracan , des autres parties de l'Inde , d'où serait
venu le nom scientifique de Coracan a , donné à l'une de ces Gra-
minées. (b.)

. * KURTE. Kurtus. pois. Genre de la famille des Squammi-
pennes , dans l'ordre des Acanthoplérygiens de Cuvier, formé par
Bloch , adopté par le compilateur Gmelin, et caractérisé ainsi :
coips ovale, comprimé, caréné en dessus et comme bossu (d'où le
nom de Kurte); mâchoire inférieure plus courte que la supérieure
; dorsale moins étendue que l'anale et placée plus avant; dents en
velours; les écailles plus fines que dans les genres voisins. Ce
genre est encore peu nombreux, et peut-être même une seule es-
pèce y peut être placée avec certitude; c'est le Kurte blociiien,
Kurtus indicus. , Bloch, pl.

j(5g, magnifique espèce qu'on dirait une lame d'argent poli de
dix pou- .ces à un pied de longueur , avec des Saches d'or sur le
dos, et quatre

KYL

marques d'un beau noir sur la même parlie qui se relève en bosse; les pectorales dorées sont bordées de rouge , les autres nageoires sont d'un bleu céleste éclatant , libérées de jaune ou de blanc. Il n'existe que deux rayons à la membrane biancbioslège; la caudale est fourchue et l'anus rappiochéde la gorge, d. 17, p. i3, V. 6, A. 32, c. 18. Ce n'est qu'avec doute qu'on peut rapportera ce genre le Bodian-OËillère de Lacépède, originaire d'Amboine, qui est le Kurtus palpebrosus de Schneider. Cuvier pense que ce singulier Poisson , mieux observé qu'il ne l'a été jusqu'ici, pourra devenir le type d'un genre nouveau. (b.)

* KYBERIA. bot. phan. Necker {Elem. Bot. , u. 61) a séparé, sous ce nom générique , l'espèce de Bellis , L. , dont la tige est caulescente. Ce genre n'a pas été adopté. F. Paque-

ETTE. (G..N

*KYDIE. Kydia. bot. phan. Genre établi par Roxburgh {Pl. Cor. 3, p.

1 1) et rapproché, par De Candolle, de la famille des Dombéya-cées. Son calice est campanule, à cinq dents, environné par un involucelle de quatre à six folioles soudées avec le calice ; sa corolle formée de cinq pétales étalés obliquement, obcordifo mes , plus longs que le calice; ses élamines réunies par les filets en un tube cylindrique, qui se divise supérieurement en cinq branches portant chacune quatre anthères à leur sommet; l'ovaire est simple , surmonté par un style tritîde que terminent trois stigmates dila-

tés; capsule globuleuse, triloculaire, trivalve, contenant dans chaque loge une graine dressée. Ce genre se compose de deux espèces, *Kydia calycina*, Roxb., /oc. cit., t. 21 5, et *K. fraterna*, ioc. cit., t. 2 1 6. Ce sont deux beaux Arbres originaires de la côte de Coromandel et de l'Inde, poitant des feuilles alternes pétiolées, «à cinq lobes aigus et à cinq nervures, et des fleurs blanches disposées en panicules. (a. b.)

KYLLINGIE. *Kyllingia* ou Kyl-

LAB

LAB

'inga. bot- phan. Genre île la faiiiniJe des Cypéracées, et de la Trianidrie Muuog\nie, L.; qui tient en quelque sorte 1<: milieu entre les genres *Mariscus* et *Cyperus* dont il se distingue à peine. Ses épillets sont néiinis en un ou plusieurs capitules globuleux; ils sont comprimés, alféngés, contenant une ou deux Heurs, ilont une est rudimentaire; les deux [écailles extérieures sont plus petites set roides; les deux intérieures sont carences, renfermant une fleur heriimnphrodite, el quelquefois une -ciconde (leur munie d'une seule écaille imeulre ou mâle. Les étamincs sont au iinombre de trois; l'ovaire est lenlicu- Unire, surmonté d'un style bifide et jli.le deux stigmates filiformes. Le fruit Itsst un akène comprimé:, nu, c'est-àjkiire dénué de soies hypogynes. Les |k'3spcces de ce genre sont des Plantes Ipiuei iiacées, ayant leur ebaume trianjL^ulaire sans nœuds, garni inférieuurement de feuilles engainantes. Lps lluaspèees croissent dans l'Inde, l'Aménrique, etc. L'une des pb.s comtnuéc&és est la *Kyltingia inonocpluila*, I i\o' tb., Grain. îô, t. 4, f. 4, ainsi nmnjiitiée parce

que ses épillets forment I m seul capitule globuleux au somu<!
du chaume, accompagné d'une

ou deux feuilles linéaires formant un involucre. Elle croît dans l'Inde , aux îles de France et de Bourbon , et à Port-Jackson de la Nouvelle-Hollande. C'est cette espèce que Forster {Gen. 65) a indiquée sous le nom de 'J'/nyoceplialon nemoralc. (a. b.)

. KYNODON. bf.pt. orn. Klein, dans son i'enlamcn heipetologie , formait sons ce nom un genre qui répond hiiv véritables Vipères. (b.)

K YP110SE. Kyplivsus. pois- Ce génie douteux, établi par Laccpède sur un dessin de Comineison , se Uou,ve le même que celui sur lequel le continuateur de Buftbu avait déjà établi le genre Dor'suaïie, et qui est reproduit à la planche 8 du tome m de son Ichthyologi". Cuvier , qlïi conserve le genre Kvphosc avec doute, le place dans la famille des Squammipeunes de l'oidie des Acanlboptéry^iens. JT* DoRsuaire. (b.)

KYRSTEN.IÀ. bot. t'iiAS. Genre établi par iNecker {l'.liin. Hut., n.

l46) aux dépens des i'.npatoiium de Linné. Il correspond , scion Cassini , au Ba/scà/a de Mœiicb , genre qu'il ne faut pas confndie avec d autres du même nom établis pfr Ginelin, Tbunberg etVabl. (g..n.)

ILabarla. Moll. Nom donné par

Wdanson (Voyag. au Sénégal. , p. io5 , j1. 7, fig. a) à une très-belle espèce lie Pourpre qui est le Puipuiea coro- :iata de Lamarck. (6..11.)

* LABARRA (petit). bei*t. oph.

Ile Seipent très-venimeux de la Guianc , mentionné sous ce nom de , 'pays , paraît être l'Elaps galonné.

IV . Vipère. (b

LABATIE. Labatia. bot. phan.

TL»MI" IX.

Le genre constitué sous ce nom par Swartz, est le même que le Pouieria établi auparavant par Aublet. V.

POUTÉRIE. (g..n.)

LABBE . ois. Syn. vulgaire de Stercoraire parasite. V. ce mot. (dh..z.)

LABDANUM. bot. phan. V. La-

DANUM.

* LABE. pois. Espèce de Cyprin, r. ce mot. (b.)

i*(3 LAB

LABELLE. Labellum. bot. phan.

On appelle ainsi dans la famille des Orcludées la division interne et inférieure du calice, qui offre en général une forme et un aspect tout-à-fait différens des autres parties de la fleur. Ou la désigne aussi quelquefois sous le nom de Tablier. y. Orchidées.

* LABEN. bot. phan. L'Arbre de Madagascar que Rochon désigne sous ce nom paraît appartenir au genre Calophylle. F", ce mot. (b.)

* LABEO. rois. L'espèce désignée par Aristote sous ce nom paraît être la même chose que le Chalu ou Chalue de Rondelet. F. Yergadelle et Labéon. (b.)

LABEON. Labeo. pois. Sous-genre de Cyprins. V. ce mot. (b.)

LABER. bot. phan. L'un des synonymes d'Aloës dans Sérapion , selon quelques-uns de ses traducteurs.

LABERDAN. pois. L'un des noms vulgaires de la Morue. V. Gade. (b.)

* LABERIS. rept. oph. Espèce du genre Couleuvre. V. ce mot. (b.)

* LABETJM. bot. crypt. {Champignons.) Fries a ainsi nommé la seconde division du genre Polypurzes , dont les espèces ont le chapeau fixé par le côté à un pédicule allongé. V. Polypore. (o..N.)

* LABIATIFLORES. Labiatifloræ.

bot. phan. Ce nom a été donné par De Candolle (Annales du Muséum d'Hist. Natur. T. xix) à un groupe de la famille des Synanthérées , que Lagasca (Amenidades Natur. de las Espanas) a publié de son côté sous le nom AeChœnanthophoræ. C'est en 1808 que le botaniste français a fait connaître à l'Institut le résultat' de ses travaux , mais il ne l'imprima qu'en 181a. Lagasca avait rédigé ses observations dès 1805, mais il les avait conservées en manuscrit jusqu'en 1811. Quoi qu'il en soit de la

{>riorité du nom donné à ce groupe , es deux botanistes sus-
mentionnés sont assez d'accord sur sa composi-

LAB

lion. L'un et l'autre y réunissent les Synanthérées dont le caractère essentiel consiste dans le limbe de la corolle divisé en deux lèvres , l'extérieure plus large que l'intérieure.

Le pi ofesseur De Candolle place ses Labiatiflores entre les Chicoracées et les Cinarocéphales de Jussieu ; il y distingue trois sortes de corolles : i° celles à lèvre extérieure quadridentée, l'intérieure réduite à un seul filet; 2° celles à lèvre extérieure tridentée , l'intérieure profondément divisée en deux filets; 3° celles à lèvre extérieure tridentée , l'intérieure bidentée. Cependant quelques calathides de Labiatiflores ont leurs corolles centrales régulières , et les marginales n'ont point de lèvre intérieure. Ces diversités dans la structure des corolles de ce groupe, ont paru assez importantes à l'auteur pour que, d'après leur considération , il ait partagé les Labiatiflores en quatre sections. La première se compose des genres *Barnadesia* et *Bacasia* , dont les corolles offrent la première sorte de structure ci-dessus désignée. La seconde section , caractérisée par ses corolles à lèvre intérieure partagée en deux lanières filiformes, est subdivisée d'après la considération de l'aigrette. Les genres à aigrette plumeuse et sessile, sont au nombre de trois, savoir : *Mutisia* , *Dumerilia* , *Chabroea*. Les *Choetanthera* , *Homoianthus* , *Plazia* , *Onoseris* , *Clariunea* , *Leucgeria* et *Chaptalia* , composent la subdivision dont l'aigrette est poilue et sessile. Celle-ci est stipitée et poilue dans le *Dolichlasium*. C'est encore d'après la considération de l'aigrette qu'est subdivisée la- troisième section , celle dont les corolles offrent la troisième sorte de structure ci -dessus mentionnée. Les

genres *Ferdicium*, *Trixis*, *Proustia* et *Nassauvia*, possèdent une aigrette poilue; clic est plumeuse dans les *Sphærocephalus*, *Panagyrus*, *Triptilium* et *Jungia*; enfin, elle n'existe pas dans le *Pamphalea*. Les Labiatiflores douteuses sont les genres *Denekia*, *Disparago*, *Polyachurus*, *Lena*. Tous

LAB

^n;s genres sont indigènes du INou- Meau-Monde, et même de l'Amérique juiéridionale, excepté le (*Triptalia*. Sc. • ou H. Cassini, le groupe des Labiatiflores fait partie (sauf quelques genres dont la Structure de la coïlle a ité mentionnée) des deux tribus qu'il i établies sous les noms de Mutisiées :tt de Nassauviées. V. ces mots. Mais Homme plusieurs Mutisiées croissent in Afiq, il s'ensuit que les Labialiflores ne sont pas des Plantes dont es limites géographiques soient aussi marquées que le professeur De Caui'iollc l'a préteudu.

Les Onoséridées (*Onoserulæ*) de viunth (JS'ov. Gen. et Sp. Fiant, tequin. T. IV, p. 4) qui font partie loe la section qu'il nomme *Carduaées*, contiennent, d'après leur aueeàr, la plupart des Labialillores.

Onoséridées. (o..n.)

LABIDE. *Labidus*. ins. Genre de i ordre des Hyménoptères, section os Porte- Aiguillons, famille des Hétérogynes, tribu des Mutillaires, étali par J urine et adopté par La treill e wee ces caractères : mandibules trèsirquées ; palpes maxillaires aussi 'ong-sau moins que les labiaux | composés de quatre articles; antennes insérées près de la* bouche. Les Laiides diffèrent des Doryles, dont ils ont cependant très-voisins, par les îandibules qui sout plus grêles et dus longues dans ceux-ci ; par les alpes maxil-

lares qui sont très courts et composés de deux articles chez les Doryles, et par les cellules cubitales qui sont le plus petit nombré dans ces dernières. Ces Hyméoptères sont propres à l'Amérique, tandis que les Doryles n'habitent que l'Inde et l'ancien continent. La cellule radiale des ailes supérieures des élues est ovale et allongée; elles ont en outre trois cellules cubitales, dont la première est presque carrée, la seconde plus petite et recevant la première nervure récurrente, et la troisième grande, atteignant le bout de l'aile et ne recevant point de nervure récurrente. Le premier segment

de l'abdomen a ses côtés relevés, et il a la forme d'une selle à Cheval. Les jambes vont en s'élargissant vers leur extrémité, et les épines qui sont placées au bout des quatre dernières, ainsi que le premier article des tarses postérieurs, sont dilatés et plus épais à leur base. On ne connaît pas les habitudes et les métamorphoses de ces Insectes. La seule espèce connue jusqu'à présent est :

La Lauide de Latreille, *L. Latreillei*, Jurine. Elle a huit lignes de long, son corps est rougeâtre, pubescent; la tête est transverse, petite et noirâtre; les mandibules et les antennes sont de la couleur du corps; les trois yeux lisses sont grands comparativement à ceux des autres Hyménoptères; ils sont jaunâtres, luisants et disposés en triangle. Les ailes ont une teinte d'un noirâtre clair avec les nervures brunes; l'abdomen est allongé et courbé en dessous à son extrémité. On la trouve à Cayenne. (g.)

LABIDOURES ou FORFICULES.

ins. Nom donné par Duméril à une famille qui ne renferme que le genre Forficule. f. ce mot. (g.)

* LABIÉ, LABIÉE. Labiatus , Labiata. bot. niAN. On dit d'un calice ou d'une corolle qu'ils sont labiés ou mieux bilabiés quand leur limbe est partagé en deux lèvres, l'une supérieure et l'autre inférieure; quelque- Ibis la lèvre supérieure manque ou est très-courte ; dans ce cas , la corolle est ùnilabiée comme dans les genres Jjuga, Tèucrivm , etc.

La corolle labiée proprement dite se distingue de la coiolle persounéc qui offre également deux lèvres, en ce que ses deux lèvres sont écartées l'une de l'autre , tandis qu'elles sont rapprochées dans la corolle personné.

f. Corolle et Calice, (a. h'.)

LABIEES. Labiatœ. bot. piian.

L'une des familles les plus naturelles du règne végétal, appartenant aux Pla nies dicotylédones monopétales hypogynes , et don! Linné a dispersé

i48 LAB

les genres dans la deuxième et la quatorzième classes de son système. Les Labiées sont des Plantes herbacées, annuelles ou vivaces , plus rarement des Arbustes ou des Arbrisseaux.

Leur tige est quadiangulaire , rameuse, à rameaux opposés; les feuilles sont simples, également opposées; les fleurs sont généralement placées à l'aisselle des feuilles supérieures, et forment par leur réunion des épis, des grappes, des panicles ou des capitules accompagnés de bractées qui manquent quelquefois. Le calice est monosépale , tubtileux ou campaniforme , à cinq ou à dix divisions plus ou moins profondes , égales ou inégales, quelquefois disposées en deux lèvres. La corolle est monopétale , tubuleuse ,

le plus souvent bilabiée , rarement à une seule lèvre, ou même régulière; la lèvre supérieure généralement bilobée embrasse et recouvre la lèvre inférieure avant l'épanouissement de la fleur. La lèvre inférieure présente trois lobes généralement inégaux, celui du milieu étant plus grand que les deux lobes latéraux. Les étamines, au nombre de quatre, didynames , c'est-à-dire deux plus grandes et deux plus petites, sont ordinairement rapprochées par paires et placées sous la lèvre supérieure ; quelquefois elles sont, au contraire déclinées vers la partie inférieure de la fleur, ou même écartées les unes des autres et presque égales entre elles. Dans quelques genres, les deux étamines les plus courtes avortent ou sont réduites à l'état rudimentaire. Les anthères sont à deux loges distinctes ou même quelquefois écartées l'une de l'autre par un connectif plus ou moins long.

L'ovaire est appliqué sur un disque hypogyné ou gynobase épais et plus large que l'ovaire lui-même, autour duquel il forme un rebord plus ou moins saillant. Cet ovaire est profondément partagé en quatre lobes qui sont chacun autant de loges contenant un ovule dressé. Le style naît du centre commun ou de l'axe extrêmement déprimé de l'ovaire ; il est

LAB

long, grêle, simple, terminé par un stigmate à deux divisions allongées et inégales. Le fruit se compose de quatre coques monospermes ou akènes réunis sur le disque et enveloppés par le calice. Quelquefois un ou plusieurs de ces akènes avortent. Chaque akène renferme une graine dressée, dont le tégument propre recouvre un embryon à radicule courte et tournée vers la base de la graine.

Dans quelques genres néanmoins il y a un endosperme très-mince.

Cette famille est tellement naturelle, qu'on pourrait, en quelque sorte, la considérer comme un grand genre. En effet, les différentes coupes génériques qui y ont été établies sont généralement fondées sur des nuances d'organisation extrêmement minutieuses, en sorte que la formation des genres est tout-à-fait artificielle. C'est au reste ce que l'on doit également observer dans toutes les autres familles extrêmement naturelles, comme les Ombellifères, les Graminées, les Légumineuses, etc. Comme ces genres sont fort nombreux, nous y établirons plusieurs divisions, ainsi qu'on le verra par le tableau suivant :

Ve Section. — Deux étamines.

Lycopus, L. ; *Amethystea*, L. ; *Cunila*, L. ; *Ziziphora*, L. ; *filularia*, L. ; *Bosmarinus*, L. ; *Sahia*, L. ; *Coltinsoia*, L. ; *Tristramia*, Smilh ; *Micivcorys*, Brown.

Ile Section. — Quatre étamines.

a. Corolle unilabée.

Ajuga, L. ; *Teucrium*, L.

B. Corolle bilabée.

f Etamines divergentes.

Mentha, L. ; *Hyssopus*, L. ; *Pétilla*, L. ; *Satureia*, L.

ff Etamines réunies sous la lèvre.

supérieure. s a Calice régulier à cinq ou dix dents : o

Nepela , L. ; Lavandula , L. ; Gleclioma, L.; Lamium , L. ; lictotica , > L. ; Marrubium, L. ; Ballola, L. ;

LAB

ILeonurus , L.; Anisorneles , Brown; l'°/ilomi\$, L.; Leucas , Burin.; Leonu- ■ûs, Pors. ; TIemigenia , Brown; Jlerr.niandra , Br. ; Isanihus , Rich. ; Pycuanthemum , Rich. ; Brachyslemum , iÀich. ; Poguslemon , Desf. ; Barbula , L-iOur. ; Bis/rupogun , I Hérít. ; Sidc- Ij ; Galeopsis , L. ; Galeobdullon , Ail.; Stachys, L ; Zicîe/ia, Hilcdit- ; Hlolucella , L. ; Risoa , Cavvan.

(3 Calice bilabié.

Thymus , L. ; Origanum , L.; Thymbbra, L. ; Melissa , L. ; DracoecephalliÛm , L. ; Mclitlis , L. ; Hurminum ; lPrunella, L. ; Lepechinia -, Wirlu'. ; iScutellaria , L. ; Coleus , Lour.; OS/- Uodia, Br. ; Cryphia , Br. ; Prostantthera, Labill. ; C/inopodiurn , L.; (Gar-doquia , Ruiz et Pavon ; Perilounia, Kuhth; Prasivni , L. ; 7-Va-Uostoma , Beauv. ; Trichostemma , Ij. ; LPhryrna , L.

fff Etarnines déclinées.

Ocymum, L.; Plectranthus , l'Ilerrit. ; Hyptis , Jacq.

La famille des Labiées est si nalui relie , et ses caractères sont tellement t tranchés, que nous croyons inutile -d'indiquer comment on la distingue i des Verbénacées et des Borriginées , i entre lesquelles elle doit être placée.

* LABTO. moll. Ocken , dans son ! Système d'bistoire naturelle, a proposé sous ce nom un genre démem- I bré des Turbo de Linné ou des Tro- ■ chus. Ce démembrement n'a pas été adopté. V. Trocuus et Turbo.

*LABIUM INS. Nom sous lequel on désigne la lèvre inférieure des Insectes par opposition au mot Labrum qu'on applique à la lèvre supérieure. La lèvre inférieure ou simplement la lèvre est assez compliquée , et résulte de la jonction plus ou moins intime de deux mâchoires qui font suite aux mâchoires proprement dites. T'. Bouche, (aud.)

LABIUM et LABRUM VENERIS, bot. phan. L'un des synonymes

LABIUM

des anciens du Lapsacus sylvestris.

V. Abreuvoir et Cardéke. (b)

LABLAB. rot. phan. Ce genre, que Linné et Gaertner ont réuni au Uolichos , en- avait été. séparé par Adansou (Fain. des Plantes, a, p.

520). Il a été rétabli par Moench et définitivement adopté, en ces derniers temps , par Savi et par De Candolle (Prodr. Syst. uniu. Feget , a, p. 401) qui en ont distingué six espèces.

Nous avons admis la fusion de ce genre telle que l'ont opérée Linné et Gaertner, et l'espèce principale a été décrite dans ce Dictionnaire sous le nom de Dolich. f'. ce mot. (o..N.)

LABRADOR (Pierre de). min.

Ce nom a été donné au Feldspath opalin , trouvé sur les côtes de ce pays , dans l île de Saint-Paul , et dont plusieurs minéralo-

gistes foui nujouid bui une espèce particulière sous ce même nom , ou sous celui de Labradorite. On a aussi donné le nom de Hornblende du Labiador à une variété d'Ilypersthène qu'on avait méconnue. F'. Feldspath et

ILYPEKSTHÈNE. (G. DEL.)

LABRADORA. ois. Syn. de Macareux Moine, /".ce mot. (dr..z.)

LABRADORISCH E-IIO R N BLEN- DE, min. Syn. d'Uypeislène. V. ce mot. (b.)

LABRADORITE. min. (Delamétlnic.) Syn. de Pierre de Labrador,

LABRAX. pois. Sous ce nom , employé par les anciens pour désigner l'Anarrhique Loup, Klein avait établi un genre qu'il caractérisait par «les écailles en scie, une grande bouche et beaucoup de dents serrées très-fines. Pal las a., depuis ,■ formé pour des Poissons du Kamtschatka un genrenommé de même, et lui a attribué pour caractères : un < orps assez long, garni d'écailles ciliée» , à tête pjetiiie sans armure , à bouche peu fendue, armée de petites dents coniques , inégales, à lèvres charnues ; dorsale régnant tout le long du dos, n'ayant que des épines minces, pré-

lfio

LA.B

LAB

sentant plusieurs séries de pores disposées sérialeinent , de manière à former comme plusieurs lignes latérales. Cuvier admet ce genre avec doute après les Seares, à la fin de la famille des Labroïdes , dans l'ordre des Acanthoptérygiens. (d.)

LABRE. Labrus. rois. Ce genre, l'un des plus nombreux en espèces , s'il n'est pas celui qui en renferme davantage, fut établi par Arléili, adopté par Linné dans son ordre des Thoraciques, et devint, dans la Mélobocde Cuvier, le type de la famille des Labroïdes. Les doubles lèvres charnues des Poissons qui le composent lui méritèrent le nom sous lequel les ichthyologistes l'ont désigné. Ses caractères consistent dans les ouies serrées, à cinq rayons; les dents maxillaires coniques dont les mitoyennes et antérieures plus longues, les pharyngiennes cylindriques et mousses, disposées en forme de pavé , les supérieures sur deux grandes plaques , les inférieures sur une seule qui correspond aux deux autres. L'estomac n'est pas un cul-de-sac , mais se continue avec un intestin sans cecum , qui après deux replis se termine en un gros rectum; la vessie aérienne est simple et robuste ; l'une des deux lèvres tient immédiatement aux 'mâchoires , et l'autre aux sous -orbiculaires. Les Labres sont de taille moyenne , agiles , d'une forme qui est celle qu'on attache le

Ilus naturellement à l'idée de Poisson.

Is vivent de Crustacés et de Mollusques dont l'appareil robuste de leur système dentaire leur permet de broyer jusqu'aux parties dures. Leur chair est savoureuse; cependant on en porte rarement sur nos marchés.

Ils habitent presque toutes les parties du globe depuis le Groenland jusque sous la ligne , mais en plus grand nombre dans

les climats chauds et non loin des rivages de la mer. Tous sont revêtus des plus somptueuses livrées;; leurs écailles resplendent de l'éclat des Métaux polis , du feu des Pierres

Éréciennes Cl des teintes les plus vives, a Méditerranée en nourrit plusieurs

des plus élégans ; la Polynésie en possède d'une incroyable beauté; mais la plupart des espèces, qui se ressemblent beaucoup par la forme , n'ayant été établies sur les couleurs sujettes à varier , ou qui se détériorent par la mort , il y règne une grande confusion ; pour s'y reconnaître, on a dû y former les coupes ou sous-genres suivans :

f Labres proprement dits, qui n'ont ni épines, ni dentelures aux opercules et aux préopercules, avec le corps oblong, la queue sans appendices , les joues et opercules couverts d'écailles , la ligne latérale droite ou à peu près. Ce sont eux que l'on trouve en plus grand nombre dans la Méditerranée, où, plusieurs sont désignés sous le nom vulgaire de Tourds et Tourdous.

La Vieille , *Labrus vetula* , L. , Bloch , pl. 293. La nageoire caudale est arrondie; ce Poisson atteint un peu plus d'un pied de long; ses couleurs sont l'orangé le plus vif et le bleu le plus beau; sa tête est rougeâtre; les pectorales , l'anale et la caudale sont bordées de noir; la dorsale est couverte de petites taches; l'iris est azuré. Cette espèce est des mers de l'Europe boréale; on la trouve depuis les côtes de Norvège jusqu'en Bretagne où on la nomme Crahatle et où l'on en prend suffisamment pour en faire des salaisons.

Le Beegylte , *Labrus maculatus* , Bloch , pl. 293. Sa nageoire caudale est arrondie ; le dernier rayon de l'anale et de la dorsale

est plus long que les autres; sa couleur générale est le brunâtre velouté avec des raies d'un beau brun foncé et de plus disposées alternativement sur la poitrine; les nageoires d'un jaune teinté de violet sont tachetées de brun luisant , l'iris est doré. Cette espèce des mers du Nord atteint jusqu'à quinze pouces; sa chair est grasse et exquise.

Le Cock. , *Labrus Coquus*, L. , *Gmel.*, *Syst. Aaf.*, xii, T i, p. 1297.

Petite espèce extrêmement commune sur la côte de Cornouailles , qui est d'un pourpre obscur , varié de bleu

L.VI

j/oncé , avec le ventre jaunâtre et la queue arrondie.

; Le Paon, *Encycl. Mét.* , *Pois.* , pl.

Bii, f. 137 ; *Labrus Javo* , L., *Gmel.* , *Syst. Nat.*, xii , T. 1, p. 1288, assez commun dans la Méditerranée, depuis nos côtes jusqu'en Syrie, et y atteignant neuf ou dix pouces de longueur. Ce Poisson passe pour être le plus beau de la mer; et pour le reconnaître entre tous les autres , on «l'aura qu'à imaginer le Lapis-Lazuli , Le Rubis, le Saphir, l'Émeraude et l'Améthyste incrustés dans l'or des pécailles polies d'un Poisson élégamment conformé. Sa chair est médiocre.

Le Méro , *Labrus marginalis* , L. , *Gmel.*, loc. cit., p. 1388. Cette espèce à laquelle nous conservons le nom niu'on lui donne en Espagne ou Lœtling la décrit ou plutôt se borna à la men-

tionner, est d'un beau brun veloulé , chatoyant dans toutes ses [parties; uu large liséré jaunâtre autour de toutes ses nageoires la singularise. Nous l'avons vue assez Iréijquemment en 1809 sur la poissonneme de la Corogne en Galice.

Le Cénor , *Labrus trimaculatus* , IL. , Gmel. , loc. cit., iag4. Celle pettile espèce à laquelle nous conservons I Je nom vulgaire qui la désigne dans les îles Baléares , se trouve aussi dans l'Océan et jusque sur les côtes de la Bgçrwège. Sa couleur est le rouge; edeux taches d'un beau noir à la base ede la dorsale et une entre cette na- ^geoir et la caudale la caractérisent.

La Tanche de mer , *Labrus Tinca* , IL. Ce Labre habite les lieux les plus [profonds sur les côtes d'Angleterre [principalement. Sa couleur est d'un rrouge sale foncé, élégamment marquéeede nombreuses lignes de bleu, de irouge vif et de jaune. Toute communie qu'elle est , cette espèce a besoin id'être mieux examinée pour savoir si elle ne convient pas au sous-genre tCrénilabre, le troisième du genre rqui nous occupe.

Le Perroquet , *Labrus Psittacus* , IL., Gmel., loc. cit., p. i«85. Sa cou - Heur est d'un beau vert d'Emeraude, «xcepUi sous le ventre qui est jaunà-

LAB i5i

Ire ; une bande d'un beau bleu règne de chaque côté , de la tête à la queue. Ou trouve ce Labre dans la Méditerranée et dans les mers d'Arabie.

Le Tourd , *Labrus Turdus* , L., Gmel., loc. cit., p. îagi. Cette espèce, l'une des plus communes dans la Méditerranée où l'on en trouve plusieurs variétés , n'atteint guère que neuf pouces de

long. On lui a donné le nom qu'elle porte et qui désigne également la Grive, parce qu'ainsi que cet Oiseau elle est couverte de petites taches blanchâtres , brunes , rouges ou bleues , semées sur les diverses parties du corps et les nageoires, et toujours en opposition avec la couleur du fond.

Les *Labrus punctatus* , Bloch , pl .

agfi ; *Microlepidote*, *Labrus microlepidotia* y Bloch, pl. 39a ; Rayé , *Labrus tessellatus* , Bloch, pl. agi; *Labrus guttatus* , Bloch , p. 387 , f . a ; *Labrus punctatus*, Bloch, p. ag5; Ariste de Lacépède ; Hassek , *Labrus inerrnis* de Forskahl ; *Labrus ferrugineus* ; *Labrus ocell/aris* , L. ; *Labrus Luscus* , L. ; *Labrus Cornubius* , L. ; *Labrus mixtus* , L. ; Echiquier, *Labrus centiquad 'ratus* de Lacép. ; *Labrus Paroticus* , L. ; Beregsuyltre de Lacépède , *Labrus Suillus* , L. ; Double- Tache , *Labrus bimaculalus* , L. ; Ossiphage, *Labrus ossiphagus* , L. ; Onite, *Labrus Onitis*, L. ; Pentacanthé de Lacép. ; *Labrus lunulatus* , Forskahl ; Canude , *Labrus Cydneus* , L. ; Ballau , *Labrus Ballan* de Pennant ; Perruche de Plumier; Keklik, *Labrus Petdica* de Forskahl ; *Labrus Coinber*, L. ; Aurite de Daubanton, *Labrus auritus* , L. ; *Labrus Ojena* , Forskahl; *Labrus Melagaster* , Bloch, pl. 396, fig. 1 ; Cappa, *Lepisme* et *Grison* de Lacépède , etc. , sont quelques-unes des espèces de ce sousgenre plus remarquables encore que le reste par l'éclat de leurs teintes.

■ J-J" Girelxes , Julis, Cuv. , qui ont une seule dorsale , la tête entièrement lisse et sans écailles, non plus que les joues et les opercules, ce qui les distingue surtout du sous-genre précédent; la ligne latérale est forte-

ment coudée vers là fin de la dorsale. On en trouve plusieurs espèces dans nos mers tempérées. Gaimard en a surtout rapporté de la Polynésie et des Philippines dont la beauté surpasse tout ce qu'on eût pu concevoir.

L'élégante richesse de ces Poissons est cause que les ichthyologistes , Bloch entre autres ,, se sont cçnôpbia à en figurer un certain nombre.

La Girei.le, l£ne\cl. , pl. 5a , fig.

199; Labrus Julis, L. , Gmel. , Syst.

Nat., xiii, T. 1, p. 1288; Bloch , pl. 287, f. 1. C'est l'un des plus jolis Poissons qui existent; il se tient par bandes éticcelantes de reflets bi illans parmi les rochers de la Méditerranée, de l'Archipel et de la mer Rouge. Il 11e dépasse guère six pouces de longueur. Sa couleur générale est un violet éclatant, 1 élevé de chaque côté par une bande en zig-zagde l'orangé le plus vif; les nageoires anales et doissales sont peintes de trois bandes, l'une jaune , l'autre rouge, et la dernière bleue. Sa chair est en outre délicate. Il mord aisément à la ligne. Il en existe plusieurs variétés; 011 distingue, dit -on , les mâles des femelles à deux taches noires situées l'une au-dessus de l'autre sur le premier rayon de la nageoire du dos. D.

Les Labrus pk/us rie Schneider, pl.

55; Labrus brasiliensis , L., Bloch, pL 280; Labrus lu/taris , L. , Bloch , pl. 281; Labrus viridis , Bloch , pl.

282 ; Labrus cyanocephalus , L. , Bloch, pl. 286; Labrus kebraieus , Lacép., Pois. T. 111.pl. 29, fig. ô;Labrus chlurapterus , Bloch , p. 288; Labrus Melapterus, Bioch , pl. 286 , f.

a; Malaptéronote , Lac, m, pl.

5i , fig. i; l'aïicre, Lac, 111, pl.

29, fig. 2 ; Ténioûte, Lac, m, pl 29 , fig. 1 ; .*Labrus bifasciatus* , Bloch, pl. 188; *Labrus bivittatus* et *Macrukpulutus* , Bloch , pl. 284, f. 1 et □ ; Sparc hémisphère, Lac. , 111, pl. l5, f. 5, et braeliion , pl. 18, f. 3 , sont le.-, espèces constatées de ce magnifique sous-geni l-.

Les Coris de Licépède , dit Cuvier (Règn. Anini. T. 11, p. 262), d'après les

dessinsde Commerson ,se sont trouvés des Girelles , oii le dessinateur avait négligé d'exprimer la séparation du préopercule et de l'opercule. L'espèce appelée y/ paraît même n'être que le *Labrus melapterus*. Les Hologymnoscs du même auteur ne sont encore que des Girelles.

fff Ckén ilaures , *Crenilabrus* , qui ont le corps ohlong , une seule doïsale soutenue en avant par de fortes épines, garnies le plus soqvent chacune d'un lambeau membraneux ; et les bords des préoperculesdentelés , ce qui les distingue surtout des vrais Labres, dont ils' ont d'ailleurs les joues écaillenses. Ils avaient éié mal à propos et malgré leurs doubles lèvres confondus pour la plupart avec les Lutjans , dont Cuvier a senti la nécessité de les séparer pour les rapporter à leur véritable place.

Le Mélo ps , *Labrus Melops* , L., Gmel., Syst. jWz/. xiii, T. 1, p. 1240. Celle belle espèce , qui n'a guère que six pouces et qui se trouve sur les côtes de la Méditerranée et particulièrement à > Nice où on l'appelle Fuuruié , varie selon les sexes. Le mâle est d'un rouge de Corail , avec drjs ligues bleues qui s'étendent jus-

qu'à la nuque; la tête est traversée en dessous de bandes d'outre-mer ; les lèvres sont blanches ; une tache de la même teinte a sur les yeux la forme d'une paire de lunettes. La femelle porte ces divers prnemens sur un fond noisette.

Le MertLE, Labrus Mailla , L. , Gmel., ŷysl.Aai. xiii , T. 1, p. 1298. Sa ladlc est d'environ un pied; sa couleur, d'un bleu foncé tirant sur le noir, est chatoyante , ce qui eu relève la nuance uniforme, et comme si les Labres devaient nécessairement présenter sur quelque partie de grandes oppositions de teintes, les yeux sont d'un rouge vif avec l'iris d'or. Les anciens ont célébré ce Poisson et chargé son histoire de ces fables ahsurdes qui leur étaient si familières. Us fusaient grand cas de sa chair qui est encore fort estimée dans la Méditerranée.

LAB

I La Lapine, Labrus Lapina, L., jfiwmel. , lac. cit. , p. i 29a ; Luljanus , |i jacép. h'Hassum des Arabes, qu'on jrrrouve clans la mer Rouge, dans la jMétlilerranée et surtout dans la Pro- ILonlide , est le plus grand des Labres Ikt atleint dix - huit pouces. Se-saiêii-cs deviennent veidàlres par la cocpion. La caudale est ai ronaie et bleuàllrre , tachetée de rouge , ainsi que l'analee , la dorsale marbrée de jaune et de ■rouge , piquetée de bleu céleste ; les Initi es nageoire.* sont d'un beau bleu. BLe corps est verdàlre avec trois lignes ■de taches d'un beau lOugc, disposées en zigzag.

Les Luljanus Chrysops , Bloch , pl.

2j48 ; l'rylhropterus et notants , id. , 3î4g ; Linkii , id. , a5a ; virescens , id. , 3354 , et ferres , id. , 2.55 ; rupestris , iid., a50; bi-dens , id. , 2.56; les Labbrus quinquemaculatus , Bloch, p.

^'292, f. 2 ; NuiH'etjivus de Schneider, gcrisus , comubius , gnltatis , viridis , ooccellaris , fuscus , occellalus , olivaceus , unemaculus de Linné; les Poissons de nier de Nice décrits par Riasso sous le nom générique de Luljans; Iles Perça script a et Mediterranea de Linné , sont encore des Crénilabres , | parmi lesquels rentrera peut-être le 1 Labrus Tinca dont il a été question [plus haut.

tttt Sublf.ts , Coricus , Cuv., qui ijoignent aux caractères des Crénila- Ibres, une bouche protractile à peu iprès comme celle des Fdous qui ■sont le sixième sous-genre des Labres.

(Ce sont de fort petits Poissons de la ^Méditerranée , que Rissso a décrits •sous les noms de Lutjan verdâlre et 1 de Lutjan Lamarck.

tttt Cjhéilines , C/icilim/s, qui iont la tête écailleuse , et dont les derrières écailles de la queue s'avan- 'Cent sur les bases de ses rayons. La 'ligne latérale est interrompue vis-à-vis la lin de la dorsale. Lacépède • avait établi cette division comme genre , auquel ou peut rapporter sa 'Chéiline trilobée, T. 111 , pl. 3i, f. 3; les Sparus fasciatus , pl. 2f>7, et Chlorourus , pl. 260, et le Sparus radiatus de Schneider , pl. 56. Le Chéi-

LAB i53

line Scare de Lacépède , qui est le Labrus Scarus, L., Gmel. Syst. Nat.

x 111 , T. 1 , p. 1 280 , n'avait été établi par Arlédi et Linné , dit Cuvier, que sur une description équivoque et sur une figure de Belou , ou l'on ne peut même voir de quel genre est le Poisson dont il veut parler. La figure et la description de Rondelet , lib. vi,

cap. 11, p. 18* , que l'on cite ordinairement avec celle île Belon , appartient à un Poisson tout différent, du genre des Sparcs , et qui l'est très-célèbre dans l'antiquité.

ttttt Filous, Epibulter , Cuv ., qui peuvent donner à leur bouche une extension considérable , et en faire une espèce de tiibc. capable d'atteindre, au loin, les petits Poissons qui passent à proximité, au moyen d'un mouvement de bascule de leur maxillaire , qui s'opère en faisant glisser en avant leur intermaxillaire. On n'en connaît qu'une espèce , originaire des mers des Indes, le Sparus insidiator, L., Gmcl., Syst.

A'at. xiti, T. 1, p. 1273; Encycl.

Pois. , pl. 4g, lig. 789. Ce Poisson acquiert jusqu'à dix pouces de long, son corps a la figure de celui d'un Cyprin , ses écailles sont larges, grandes, d'un vert d'airain , et le dernier rang empiète sur l'anale ainsi que sur la caudale , comme dans les Chéilins ; la ligne latérale est interrompue de même.

tff ttt Gomphoses , Gomphosus , qui sont des Labres à tête entièrement lisse, et dont le museau prend, encore la forme d'un tube par le prolongement des intermaxillaires et des mandibulaires que le* téguum les tient ensemble, jusqu'à la petite ouverture de la bouche. Un en connaît deux espèces de la mer des Indes , les Gomphosus coelestis et variabilis , Lac, Pois., T. 111 , pl. 5, fig. 1 et 2. (B.).

LABRE ou LÈVRE SUPÉRIEURE. Labrum. Ins. On désigne sous ce nom une petite pièce impaire qui entre dans la composition de la bouche des Animaux articulés ; elle en est assez souvent la partie la plus avancée

et s'articule avec le chaperon. On la voit dans les Insectes et on la retrouve avec des formes peu différentes dans les Crustacés et les Arachnides. V.

Bouche. (Aun.)

LABROIDES. pois. Troisième famille de l'ordre" des Acanthoptérygiens dans la méthode de Cuvier : ce sont de beaux Poissons caractérisés par une forme assez semblable, de grandes écailles brillantes , une seule dorsale soutenue en avant par des épines fortes , garnies le plus souvent chacune d'un lambeau membraneux , et les mâchoires couvertes de grosses lèvres charnues'. Cette famille contient les genres Labre, Rason , Chromis , Scare et Labrax. V. ces mots. (b.)

* LABRUS. pois. V. Labre.

LABRUSCA. bot. phan. Ce nom , qui chez les anciens désignait la Vigne sauvage , indigène de l'Europe méridionale, a été scientifiquement, mais improprement, transporté par Linné à une Vigne de l'Amérique septentrionale. V. Vigne. On a quelquefois écrit Lambrusca. " (b.)

LABURNUM. bot. phan. Nom scientifique du Cytise Faux-Ebénier, qui pourrait n'être pas le Laburnum de Pline et des anciens , dont le bois était blanc. (b.)

LABYRINTHE, moll. Espèce du genre Hélice. V. ce mot et Caracolles. (b.)

LABYRINTHE, bot. crypt. Ce nom , qui désigne une espèce exotique du genre Glyphide de Fée, était employé, dans la ba-

roque nomenclature de Paulet , pour désigner- des Champignons du genre Dcedalea où cet auteur mentionne les Labyrinthes Cha-
peau, Etrille et Rocher. V.

DjEDALEA. (b.)

LAC. gÉol. En géographie physique , science qu'on peut regarder comme une branche de la géologie , on entend par ce mot une étendue d'eau située dans l'intérieur des terres , c'est-à-dire le contraire d'île , puisque les îles sont des étend lies de terre environnées d'eau. Il en est d'eau douce et

LAC

d'eau salée ; les premiers sont plus particulièrement appelés Lacs, les autres , pour peu que leur étendue soit considérable , sont des Caspiennes ou mers intérieures ; mais toutes ces distinctions sont en général fort arbitraires. On a recherché quelle est la cause delà salure de ces Caspiennes , et posé en principe que toute étendue d'eau intérieure qui ne s'épanchait pas dans la mer par quelque lleuve ou autre canal, devait être salée : c'est une erreur, il y a des Lacs d'eau douce qui ne communiquent avec aucune mer. Les Lacs, soit salés , soit d'eau douce , présentent évidemment le fond de plus grandes masses d'eaux dont l'évaporation ou l'écoulement enlevèrent une grande partie, et la plupart des grands bassins de fleuves , où l'on trouve des brisures perpendiculaires aux cours d'eaux , furent d'anciens Lacs. V~. Bassins. A mesure que les eaux se retireront par leur diminution progressive , beaucoup de golfes deviendront des Lacs ; tels seront un jour' en Europe, le Zuyderzée , par exemple , dont le Texel et les îles voisines préparent la fermeture; sur les côtes d'Asie les

mers de Chine, de Corée , du Japon et d'Okotsk ; en Amérique le golfe du Mexique et la mer des Antilles.

Ces parages seront d'abord comme des vastes lagunes , communiquant encore avec la mer, et long-temps saumâtres; car les lagunes, ordinairement séparées de la mer par des langues de terre , comme le Frich-Haff et le Curischaff dans la Baltique ou comme les lagunes de nos côtes de Provence , diffèrent seulement des Lacs par la qualité de leurs eaux. Les étangs ne sont que des Lacs plus petits encore , souvent créés artificiellement par la retenue de quelque cours d'eau dont on intercepte la vallée par une digue. Les Dunes , y. ce mot , déterminent la formation d'étangs semblables sur les côtes , dont elles interrompent la communication des pentes avec l'intérieur du pays. C'est ainsi que dans les Luidns aquitaniques on voit une longue

LAC

ainé d'étangs au revers des sables laoncelés; ces étangs et les lagunes itt des Plantes et des Poissons qui uar sont propres. Dans les pays [itertropicaux , ils ont des Coquils> plus solides que celles du reste ss eaux douces. Les Lacs de monsgne , entre lesquels on doit citer iux de Genève et de Constance en laisse, de Halstadt dans la Hauteiwtriche , sont des fonds de vallées aaver-sés par des cours d'eaux, qui JBUrront se vider un jour par le creurment des rivières qui les traversent, niand cela aura lieu pour les Lacs il fleuve Saint-Laurent dans le Nounau-Monde , le bassin de ce fleuve :i:ra comme celui du Danube ou l'on eeut reconnaître encore aujourd'hui nn ancien enchaînement de Lac. Du «ste les Lacs tendent à rompre leurs inrois par infiltration du côté le plus rrofond ou porte le poids des eaux.

Landes. (b.)

* LACARA. bot. phan. Sprengel N'eue End/. 3, p 56) a établi sous ce uom un genre de la famille des Légumineuses , et de la Décandrlé Mono- ;ynie , L. , auquel il a imposé les caractères suivans : calice campanule*, 1 1 cinq dents ; cinq pétales inégaux , onguiculés, marqués de nervures', le lupérieur et l'inférieur concaves ; dix fétamines libres , insérées sur la partie nféi ieure ducalicc , velues à la base, olus longues que les pétales; anthères oscillantes ; capsule velue. Ce :jenre n'a pu être classé à cause de >on fruit inconnu. De Candolle (Pro- Irom. Syst. P'cgct., vol. a, p. 520)le relègue à la fin des Légumineuses parmi les genres non susceptibles d'être classés . Le Lacetra triplineruà, Spreng. (/oc. cit.), est un Arbrisseau Idu Brésil pourvu de feuilles trèsgrandes, alternes, pétiolées, obloncues, très-entières , coriaces, inégales et à triple nervure. Les grappes de fleurs sont axillaires. (g..n.)

LAC AT AINE, mot. riiAN. Variété de Banane fort estimée aux Philippines, (b.)

LACATHA. bot. than. Le non

LAC j55

Lacara. Dans Théophraste , c'est l'Arbrisseau désigné par Pline sous le nom de Vaccinium qui ne convient pas à notre Aïrelle, mais au Malialeb. r. Phunier. (b.)

*LACATHEA. bot. phan. Salisbury, {Farad. Lond. t. 56) a séparé , sous ce nom générique, le Gordonia pubescens. Ce genre n'ayant pas été adopté , De Candolle (Prodr. Syst.

Vegel. univ. T. I, p. 52\$) s'est servi du mot Lacathea , pour désigner la troisième section qu'il a établie parmi les Gordouies. V .

ce mot. (o..N.)

LACCA. ins. et bot. L'un des synonymes de Laque dans l'ancienne droguerie. V. Lacq_U£. Dans l'herbier d'Amboinc , ce nom désigne la Balsamine de nos jardins. (b.)

* LACCOPHILE. Laccophilus. ras.

Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères , famille des Hydrocanthares , établi par Leach et dont nous ne connaissons pas les caractères ; il n'a pas été adopté par Latreille ; son type est le *Dytiscus minutus* de Fabricius , *D. marmareus* d'Olivier , etc. , qui se trouve à Paris. V. Dytique. (o.)

* LACELLIA. bot. piian. Genre de la famille des Synanthérées , nouvellement établi par Viviani (FLor.

Lyb. Spec, Gênes, 1844) qu'il a dédié au docteur Délia Cella, auteur d'un voyage dans la Cyrénaïque pendant lequel il a recueilli un grand nombre de Piaules qui croissent dans cette contrée peu connue. Ce genre appartient à la tribu des Caiduacées , et se rapproche des Centaurées. Voici ses caractères Essentiels : réceptacle paléacé soyeux ; fleurons du disque ré-

ulitrs et à cinq dents; demi-fleurons de la' circonférence tubuleux, filiformes et allongés ; akènes deuticulés , surmontés d'une aigrette plumicuse, et couronnés de plusieurs appendices.

L'espèce unique de ce genre , *Lacellia tibyea* , a les feuilles radicales pinnatifides, celles du sommet entières; les fleurs sont petites et disposées en panicules. (o..N.)

* LACÉPÉDÉE. Lacedæda. bot.

niAîi". Genre de la famille des Hip-

Eocratdacées , établi par noire collaorateur Kuntli (in Hnmb. Nov.

Gêner. 5, p. i42) et auquel il assigne les caractères suivras : calice à cinq divisions profondes , elliptiques , coucaves et inégales} corolle de cinq pétales couriement onguiculés , obovales , allongés; cinq étamines insérées entre le disque sur lequel l'ovaire est appliqué et le calice - leurs filets sont libres, égaux et distincts les uns des autres-; les anthères sont cordi formes , à deux loges s'ouvrant par un sillon longitudinal. L'ovaire, appliqué sur un disque hypogyne dont le bord annulaire est à dix lobes, offre trois loges contenant chacune huit ovules insérés sur deux rangs à l'angle interne. Le style est dressé , à trois stries , terminé rjar un stigmate trilobé. Le fruit est une baie ovoïde , trifide au sommet , à trois loges dans chacune desquelles on trouve de deux à trois graines réniformes.

Ce genre a beaucoup de rapports avec le Trigonia , mais il s'en- distingue par le nombre de ses étamines , ses filets libres et son fruit charnu.

La seule espèce qui le compose , Lai cepedea insignis, Kunth, loc. cit., lab. 444 , est un Arbre portant des feuilles opposées , dentées en scie , accompagnées de deux stipules pétiolaires. Les fleurs sont blanches, pédicellées , disposées en panicules terminales et rameuses , et dont les rameaux sont opposes, accompagnés de bractées. Il croît auprès de Xalapa , dans le Mexique. (a. r.J

* LACÉPÉDIEN. pois. Espèce du genre Gymnètrc. V. ce mot. (b.)

LACERON. noT. piian. L'un des noms vulgaires du Laitron commun.

y. Laitron. (b.)

LACERT. rois. Syu. de Callionyme lisse. P. Callionyme. (b.)

LACERTA. rept. ' saur. V. Lezaud. I

LACERTIENS. rept. saur. Seconde famille de l'ordre des Sauriens

LAC

{V. notre tableau erpétologique , T., Vi , p. 282), caractérisée par une langue mince, extensible et terminée en deux longs filets comme celle des Couleuvres et des Vipères; le corps des Animaux qui la composent est allongé. Tous les Lacertiens ont cinq doigts munis d'ongles séparés, inégaux , surtout ceux de derrière. Leurs mouvemens sont agiles ; leurs écailles sont disposées , sous le ventre et autour de la queue , par bandes transveisfil.es et parallèles ;leur tympan est à Heur de tête et membraneux; une production de la peau fendue longitudinalement , qui fer-, me par un sphincter, protège l'œil.

Soiis l'angle antérieur est un vestige de troisième paupière ; leurs fausses côtesne foi mentpointdecercleentier ; les mâles ont une double verge , l'anus est une fente transversale. Deux genres composent cette famille trèsnombreuse en espèces , les Monitors ou Tupinambis , et les Lézards. V • ces mots. ("■) L ACER TO IDES. kept. saur.

(Blainville.) Syn. de Lacertiens. P~. ce mot.

* LACET, rois. L'un des noms vulgaires des Rémores. /". ce moti

LACET DE MER. bot. crypt. V.

Boyaux de mer.

LACHE, pois. Même chose que Callique. K. ce mot. (B.)

LACHÉNALIE. Lachcnalia. bot.

PHAN. Ce genre de la famille des Asphodélées, et de l'Hexandrie Monogynie, L. , offre pour caractères : un périanthe tubuleux , coloré, pétaloïde, double , l'extérieur moitié plus court à trois divisions égales, l'intérieur, également à trois divisions très-profondes. Les. étamines , au nombre de six, sont insérées chacune sur une des divisions du calice. Leurs filets sont longs et grêles, leurs anthères à deux loges. L'ovaire est à trois côtes très-saillantes et à trois loges polyspermes. Le style de la longueur des étamines est terminé par un stigmate épais et trilobé. Le fruit est une cap-

ule à trois loges et à trois valves, mais les graines sont planes et membraneuses. Toutes les espèces de ce

genre assez nombreux sont originaux -> «lu cap 'le bonne- Espérance. Ce Lot des Plantes bulbeuses, dont le Liliacées! fait partie de (unique» emboîtées; les feuilles sont toutes radiales ->»; la hampe nue se termine par un vil de fleurs pédicellées et souvent indivises. Les cultivateurs font ces espèces cultiver dans les Jardins , mais ne généralement leurs fleurs sont d'une couleur agréable. L'analyse -> Ippées ou distingue les suivantes :

Linacanthalia liliculor, Jacq., Se. Nat.

„, t. 61. De son bulbe qui est blanchâtre naissent deux feuilles engainantes, étroites», pointillées pour le sommet. La bampé lialu rie très» «l'un pied, 1: ^ .1 i ciien t lâchée de

• ourpre, se termine par- un épi de fleurs jaunes mélangées de vert et de •oui pie. Celle e-pèce leuril en avril. ' 'ti cultive encore les espèces suivan- Mi Lalicnalia lu/cola, L. quadri-

olor, L. pendilla, !<• puipureo-cii- ■ ulea, //. liliicœfulid. 1 ouïes M cul- ■ivent à peu près coin me les Jacinthes ni pois., mais elles doivent être entrées l'hiver dans l'orangerie. On les multiplie par le moyen des lajeux. (a. n.;

LACHESIS. hkpt. ont. Le genre nommé par Daudin, sous ce nom IVune des Parques, n'a pas été adopté et 1 entre dans le genre Scylac. P. ce "not. (d.)

* LACHNÉA bot: chtët. 'Chamoignonê.) Nom de la seconde section

• imposée par Fries [Syxt. Mycolog. T. II, p. 77) dans le genre l'eize. V.

ce mot. (o..N.)

LACHNÉE. Pachnea. BOT. بواس.

Genre de la famille des Thymelées, et de l'Octandrie Monogynie, L., ayant un calice tubuleux grêle, évasé dans sa partie supérieure où il se termine par un limbe à quatre divisions inégales..

Les étamines au nombre de huit sont saillantes au-dessus du tube; le style est long, grêle, terminé par un stigmate simple composé de glandes très-

sa i i la n : es. Le fruit est ovoïde allongé, sec, mono-penne et indéhiscent.

I>cs c-ipèccs de ce genre au nombre de quatre sont originaires du cap de lionne- Espérance. (Je sont de petits Arbuste» à feuilles alternes, éparses ou imbriquées, à fleurs petites et réunies en tête à l'extrémité des ramifications de la tige. On voit assez souvent fleurir dans les séries le *Lathnea eriucephala*, L., Bol. Mag., t. i-2qr>. C'est un fort joli | elil Arbuste, d'environ un pied de hauteur, ayant ses feuilles linéaires (inpoStéel SIS quatre rangs, ses fleurs blanches) réunies au nombre de vingt à trente au sommet des rameaux. Il fleurit en mars et avril. On le multiplie de boutures et de marcotte», (a. b.)

L A Ci 1 > OS W ; 1 1 M L Laihnospèrinum. jjet. piian Genre de la famille des S, narilbées, Cinarocéphales

deJiissieu, et de la syngénésie égale L, établi par VV Willdenow i.Sp. Plant., T. 111, p. 1787) qui lui a donné le nom de «caraelées suivan» : involucre cylindrique, composé de folioles imbriquées appliquées, ovales, lisses, surmonté d'un appendice étalé, subulé ; réceptacle garni de poils très longs, capitule composé de plusieurs fleurs nombreux, égaux, hermaphrodites ; akènes velus, dépour-

vus d'aigrette. L'espèce *laithium ericifolium*, Willd., a été originairement décrit sous le nom de *Stacteina fasciculata*, par Thunberg (P.O.R.).

Plant. (a/ie/m) qui l'a rapporté du Cap de lionne- Espérance, l'Encycl. Méth.) en a fait une espèce de *Serratula*.

Les affinités de ce genre sont indéterminée- , quoique Jussieu l'ait placé entre le *Xeranthemum* et le *Tessaria*. Cassini est indécis s'il doit le ranger dans la tribu des Carlinées ou dans celle des Inulées. Cependant il est probable, ajoute-t-il , qu'il appartient à la première. (o..N.)

* *LACHNUM* OSTOM. *Lachnostoma*.

bot. I^u an. Genre de la famille des Asclepiadées de K. Thown., et de la Eulandrie Digynie, L., établi par Kunth (*Flora* Gen. et Sp. Plant.

158 LAC

œquin. 5, p. 199, t. 23a) qui l'a ainsi caractérisé : calice à cinq divisions profondes ; corolle presque hypocratéiforme , dont le tube est court et le limbe à cinq divisions étalées , l'entrée barbue; couronne insérée à l'entrée de la corolle , composée de cinq folioles à deux lobes charnus et en forme de croissant ; akènes terminés par une membrane; masses polliniques comprimées, pendantes et attachées latéralement par leur sommet rétréci ; stigmates mutiques; follicules inconnus. Ce genre qui se rapproche du *Cynanchum* , se compose d'une seule espèce, *Lachnostoma Tigris*, Kunth , loc. cit., Plante à tige volubile , à feuilles opposées, oblongues , elliptiques et acuminées. Ses fleurs , parsemées de taches en réseau , sont disposées en grappes ombelliformes et longuement pédonculées. Elle croît près de Santa-Fé de Bogota. (o..N.)

* *LACHNUM*. bot. crypt. {Champignons.) Le *Peziza virginea*, Batsch, a été séparé sous ce nom générique , par Retz , dans la seconde édition de sa *Flora Scandinavica* , p. 32g. Fries et Persoon n'ont pas entièrement adopté cette séparation. Le premier de ces

auteurs {System. Myco/og. T. 11, p; 77) a donné le nom de Lach-
nea dérivé de Lachnum , à une section du genre Pczize. V, ce mot.
(o..N.)

LACI1TAK. mam. Le Phoque du Kamschatka indiqué sous ce
nom par Rrascheuinnikow parnîl être le P/10ca barbata selon
Erxleben. (b.)

* LàCIANA. mole. (Humphrey.) Pr. Came.

LACIS, bot. phan. (Schreber.) Syn. de Mouréra d'Aublet. P' .
ce mot. (B.)

LACISTEMME. Lacislemma. bot.

phan. Ce genre, décrit par Swarlz {FI. Ind.^ûccid. 2, p. 1091),
est le même que le Nematosperma , publié auparavant par le pro-
fesseur Richard dans les Actes de la Société d'Histoire Naturelle
de Paris. P'. Nématosper-

ME. (A. H

LAC

LACQUE. bot. pn.YN. Pour Lique.

P'. ce mot. (g. .»{.).

* L ACRYM ARIA. dot. phan.

(Heister.) Syn. de Coix. V . ce mot.

(iî.)

* LACRYMATOIRE. Lacrymaloria. inp. Genre de Microscopiques de l'ordre des Gymnodés , dans lequel il termine la famille des Moléculaires, comme pour faire par l'allongement du corps cylindracé des espèces qui le composent le passage aux Vibrionides. Ses caractères consistent dans l'allongement, en forme de cou, de la partie antérieure que termine un renflement sensible en manière de tête ou en forme de spatule ou de bouton. Le *Vibrio Oloræ* Millier, que nous avons rapporté au genre Amibe {P'. ce mot), sous le nom d'Amibe à long cou , et que nous ayons eu occasion d'observer depuis, doit rentrer dans le genre dont il est ici question et dont la forme des espèces, quandelles prennent leur entier développement, rappelle celle de ces petits vases en verre, connus des antiquaires sous le nom de Lacrymatoires, et que nous retrouvons fréquemment dans les tombeaux des anciens. Nous en connaissons environ sept espèces qui, dans leurs habitudes et leur manière de nager, présentent quelques rapports avec les Planaires. Les *Pibrio jdcus* [^] Muill., Inf., pl. 8, f. g, 10; Encycf. Vers., pl. 4, f. 8; *Sagitta*, Mu.II., pl. 8, f. 11-12, Encycl., pl. 4, f. g, ainsi que les *Enchelis rétrograda* , Miill., pl. 5, f. 4, 5, Encycl., pl. 2, f. 19, et *Epistomium*, Miill., pl. 5, f.

1-2, Encycl., pl. 2, f. 17, qui est le Flacon d.e Gleichen , Dis., pl. 18, f.

C. 111 , appartiennent au genre Lacrymatoire. (b

LACTARIA et LACTARIS. bot.

PHAN. Les Plantes à qui les anciens donnaient ces noms , paraissent être nos Tithymales. P'. Euphorbe, (b.)

* LACTARIA. bot. crypt. {Champignons.) Quelques auteurs ont donné ce nom aux Champignons remplis d'un suc blanc, épais, ordinairement vénéneux et à slype central

LAC

r u. Persoon et De Candolle ont l'ait in sous-genre des Agavici lactarii, Jdopté par Fries {Systema. Mycologivum) sous le nom grec de Gallorhei ; cet auteur en fait connaître quaranteune espèces dont la plupart sont européennes. Ce sous- genre est lui-même subdivisé en GalLorhei , Tri- Jiolomoulci , L'unacini , Kiyulares , 'roprii. Cette dernière section rentzrme les Poivrés laiteux de Paulct.

77~, Laiteux. (a. f.)

LACTÉ, rept. ofh. Espèce du l'en rc Couleuvre. V. ce mot. (b.)

LACTERON. bot. phan. Ce nom U'ou pourrait bien être dérivé celui Ue Laitron est employé par Pline nour désigner probablement la mêmie Plante. (B.)

* LACTIQUE, min. r. Acide.

* LACTIYORE. mam. Geoffroy viaint-HQaire nomme ainsi [f. art.

Marsupiaux du Dict. des Se. Nat.) aa période de développement cjui succède , chez le Mammifère, a celle iiite foétale. Comme le nom même lie Lactivore l'indique , celte période .:om

prend le temps durant lequel le jeune Mammifère est allaité par sa

mère. Elle commence souvent, comme chez les Ruminants, à l'époque même de la naissance; mais il se peut bien qu'il en soit toujours de même : les jeunes Marsupiaux, par exemple, naissent, non-seulement Avant d'être Lactaires, mais même avant d'être parvenus à la période «lactaire. F. Mammifères et Marsu-

LACT. (IS.G. ST.-II.)

LACTICA. bot. pu an. K. Laitue.

LACTUCÉES. Lactuceæ. MOT.

LACT. La tribu de Synanthérées ainsi nommée par H. Cassini, est la même que celle que nous avons appelée Cnicoracées avec tous les autres botanistes. V. Cnicoracées.

* LACUNES. Lacunes, bot. pu an.

On trouve fréquemment dans le tissu cellulaire de certaines Plantes, et en particulier dans celles qui vivent sous l'eau, des espaces vides plus ou

LAC. if > 0

moins considérables, et qu'on avait jusqu'à présent attribués à la rupture des cellules du tissu aréolaire. Ce sont ces espaces auxquels on donne le nom de Lacunes. Le professeur A. de Modène, auquel on doit d'excellentes observations sur l'organisation des parties élémentaires des Végétaux, pense que les Lacunes ne proviennent pas du déchirement du tissu cellulaire. Ce sont, selon lui, des espaces plus ou moins réguliers, contenant de

l'air. Quelquefois elles offrent sur leur paroi interne des poils d'une nature particulière, en forme de bouppe ou de pinceau , qui ont été vus par Mirbel et Amici. On peut distinguer deux espèces de Lacunes; les unes ont pour orifice extérieur, un des pores corticaux , et communiquent avec l'air extérieur.

Les autres n'ont aucune communication externe. Il est probable que ces dernières qui existent surtout dans les Plantes qui manquent de tubes poreux , sont dues au déchirement du tissu cellulaire. (a. r.)

* LACUNES, géol. Pour Lagunes.

V. ce motet Lac. (b)

* LACUTURRIS. bot. pbdanî C'est, dans Dodocns , la variété de Chaux comestible que l'ou désigne ordinairement sous le nom de Chaux de Milan, (b.)

LADANUM. bot. phan. Pline nommait ainsi une Plante commune dans les champs, et qui appartient au genre Galéopside [Galeopsis Ladtmmim , L.). V. Galéopside. On a réservé ce nom à une substance gomme-résineuse extraite des Cistus/adaniferus , Creticus, laurifolius , etc. Quant à l'extraction de cette gommerésine , nous ne reproduirons pas ce qui a été dit à l'article Ciste. K . ce mot. Le Lactarium, ou Lahdanum existe très-rarement à l'état de pureté dans le commerce de la droguerie.

On en distingue deux sortes : l'une est le Ladanum en pain qui se présente sous la forme de masses d'un brun noirâtre, poisseuses et enveloppées dans des vessies. L'autre est en

morceaux roulés et tordus, plus secs, durs et cassans ; c'est le Ladanuni in tords. Lorsque le Ladanum est pur, il exhale une odeur balsamique et très-agréable; sa saveur est amère et aromatique ; insoluble dans l'eau , il se dissout presque en totalité dans l'Alcoliol. Projeté sur les charbons ardents,il répand une fumée blanche et d'une odeur agréable. Les pharmaciens le font entrer dans quelquesunes de leurs préparations officinales ; mais la médecine a presque entièrement abandonné cette substance dont les propriétés sont d'ailleurs très-faibles. (g..n.)

* LAD AN Y. bot. piian. Dans l'île de Chypre on nomme ainsi le Cistus creticus , L. , dont on extrait le Ladanum. V. ce mot. (g..n.)

* LADEN, bot. i'han. V. Jadkn.

LAEGAM ou L \EGAN. mam.

Éyn. vulgaires de Glouton. T[^]. ce mot. (b) LiELIA. «or. ni an. Adanson (Famille des riantes, 2, p. 435) avait formé, sous ce nom , un genre adopté depuis par Desvaux (Journ. de Botan.

T. iti, p. 160), et qui avait pour type le Bunias orientalis , L. Le même nom a été employé par Persoon (En- ■ckirid. 2, p. 1 85) pour désigner un genre de Crucifères qui diffère de celui d'Adanson. Il y rapportaitle Bunias piostrata de Desfontaines, le B.

coc/i/earioides , Willd. , et le Mjagrum iberioides de Brotero. De Candolle(6>s/ T'eget. Nat. 2 , p. 647) a distribué ces Plantes dans les deux genres Muricaria et Calepina. V. ces mots. Quant au Lœlia d'Adanson et de Uesvaux , il forme la seconde section du genre Bunias. (c.N.)

LiEMODIFOUES. Lœmodipoda.

ctitJST. Nom donné par Lalreïlc à ini ordre de Crustacés qu'il a converti (Règn. Anim. de Cuv.)cn une section de l'ordre des Iso-podessous le nom de Cyslibrauches. ï'. ce mot. (g.)

* LiENE. Lœna. ins. Genre de l'ordre.des Coléoptères, section des Héléromèrcs, famille des Mélasomcs ,

tribu des Pirnéliaires , établi parMegcrle, et adopté par Lal-reille (Fam.

Nat. du Règn. Anim.) qui ne donne pas ses caractères. La seule espèce qui forme ce genre est le Lœna pimelia, Meg. , Hclops pimelia , Fabr. , Scauî'iis p'ivnnensis, Sturm. ; elle se trouve en Autriche. (g.)

* LAENSNÉCIE. Laennecia. bot.

J'H an. H. Cassini (Dictionn. des Se.

Natur. T. xxv) a proposé sous ce nom un genre de la famille des Svnanthérées et de la Syngénésie superflue, L. Il l'a constitué sur le Conyza gnaphaliuides de Kunth {Nov. Gêner, et Spea. Plant, œquinuct. T. îv, p.

7?>, tab. 127). Les caractères -que l'auteur de ce genre lui attribue sont empruntés à la description de K.unlh et aux détails d'analyse qui accompagnent la figure delà Plante; il en a même admis quelques-uns dont il a supposé l'existence malgré l'opinion contraire de Kunth. Ainsi , parmi ces caractères que nous ne reproduirons pas ici , Cassini assigne des fleurs mâles au disque des calathides, tandis que Kunth les décrit comme hermaphiodi-lés. L'existence d'une petite aigrette extérieure est à la vérité bien exprimée dans la figure, mais l'auteur n'en a pas fait mention dans le texte. Le genre Laennecie , fondé seulement sur des ca-

ractères probables , ne peut être admis définitivement. Son auteur le place entre les genres *Diniorphantes* et *Diplopappus*, il diffère du premier par son aigrette double, et du second par sa calathide discoïde. (G..N.)

LtETIE. *Loetia*. bot. phan. Genre établi par Lœfling , placé d'abord dans la famille des ïiliacées , mais porié par Kunth dans sa nouvelle famille des Bixinécs. Voici les caractères de ce genre: calice coloré à quatre ou cinq sépales'; corolle de cinq pétales ou nulle; étamines très-nombreuses et hypogynes , ayant leurs filets libres, leurs anthères elliptiques biloculaires s'ouvrant par une fente longitudinale. L'ovaire est libre , sessile , à une seule loge , con-

LAF

iténant un très-grand nombre d'oru- 1 les attachés à trois trophospermesparriétaux. Le style est coin t' teiminé rpar un stigmate capitulé. Le fruit est uune capsule légèrement charnue , uunilocuiare , polysperme , s'ouvrant een trois, quatre ou rarement cinq walve.s. Les graines sont inembialaieuses recouvertes d'un arille charnnu. Ce genre se compose d'environ ssix espèces. Ce sont des Arbrisseaux htous originaires de l'Amérique méridionale. Leurs feuilles sont alternes Urès-enlièi'cs , parsemées de points (translucides , et accompagnées de ildeux stipules. Les Heurs sont blanches, pédonculces, placées au nombre (ide deux ou trois, quelquefois en grand liiombre , à l'aisselle des feuilles. Luirais n'en a connu que deux espèces qqu'il a décrites sous les noms de *Lœuia apatala* et *L. compléta*. Swartz cen a décrit deux autres qu'il a nommnées *L- guidonia* et *X. T/tam/ia*. Enfilin Runlh [in Hwnb. Nov. (ien. v, pp. 555-366) en a fait connaître

deux imouvelles espèces , savoir : Lœlia hir- .Jella et L guazumœ-foUa. (a.R.)

LAET.TI. bot. phan. (Osbeck.) SSyn. du Litchi c/iine/isis y Sonnerai, >ou Eup/ioria punicea, Lamk. V. EurpfloRiA. (c>..n.)

* LAFFA. bot. phan. L'Arbre de Madagascar ajnsi nommé au rapcpoi t de Flaçourt, et dont les naturels tirent un lîl propre à faire des lignes de pêche , n'est pas un Agave , nmais l'un des Fiquiers qu'on. retr ouve Idaus les forêts inférieures de Mascarcigne. (h.)

* LAFOEE. Lafœa. polyp. Genre ide l'ordre des Cellariées, dans la di-

I vision des Polypiers (lexibles , établi par Lamouroux , dans son exposition ides genres des Polypiers, et dont les caractères sont: Polypier phytoïde , xameux; lige fistuleuse, cylindrique ; cellules éparses , allongées en forme Ide cornet à bouquin. Ce genre placé entre les Eucialécs et les Aétécs, n'est composé que d'une seule espèce à tige un peu rameuse, creuse intérieurement et de la grosseur d'un

TOME IX

LAG i6t

gros crin> de Cheval ; les cellules sont très-rameuses, éparses, visibles à l'œil nu , plus étroites à leur origine qu'à leur extrémité libre oii l'on voit une ouverture circulaire sans aucune dentelure; la substance de ce Polypier est tout-à-fait cornée et flexible , Sa

couleur est olivâtre. L'espèce unique a été nommée par Lamouroux le banc comula; elle a été trouvée sur Lafoea de Terre-Neuve. (r.. D..L.)

LAFOENSIA. pot. i'ian. Geure proposé par Vandelli cl qui doit être réuni au Munciausia de Linné, ou Calyplectus de Ruiz et Pavon , malgré quelque différence dans le nombre des parties de la fleur. V. Munciausik et C a l y PL ect e au Supplément. _ ' (O..N.)

LAGANITE. ross. V. Végétaux

FOSSILES

* LAGA1NSA. bot. phax. Même chose que Calagansa. V. ce mot. (b)

LAGANUM. ech in . Nom donné par Gualliéri à une espèce d'Echinile fossile très-déprimé , discoïde , et sansiloute appartenant au genre Clypéastre ou au genre Scuteilc. P. ces . mots. (aud.)

LAGAR. Mor.i,. Dénomination imposée par Adanson(Yoy. au-Séné., pl. i3) à une espèce de Mérité dont Gmelin, dans la treizième édition de Linné , a fait sa Nerita promonforii.

Celte Coquille pourrait bien n'être qu'une des nombreuses variétés de la A' cri ta poli ta. (d.h.)

LAGASCA. Lagasca. bot. tiian.

Genre établi par Cavanilles , dédié au premier des botanistes espagnols, et auquel on doit , selon H. Cassini, réunir le *Noccaa* du même auteur. Ce genre qui l'aïl partie de la famille des Syuantheràcs , nous paraît devoir être placé dans la tribu des Echinopsidécs. Cassini le range dans sa tribu des Vernoniécs. Ses caractères sont:

fleurs formant un capitule hémisphérique environné d'un involucre commun composé de plusieurs folioles unisériées ; réceplac Irès-étroit et nu; chaque fleuron hermaphrodite,

16a LAG

fertile , eoulenu dans un involuccllc monophylle tubuleux, à cinq divisions; corolle infundibuliforme à tube Irès-court , à cinq divisions égales et régulières ; tube staminal surmonté de cinq petites dents membraneuses; style renflé dans si\ partie supérieure, terminé par deux stigmates allonges et roulés en dehors; akène allongé , couronné par une aigrette sessile membraneuse, très -courte et fimbriée. Les espèces de ce genre, au nombre de cinq, sont des Plantes herbacées ou sous-frulescentes , à feuilles opposées, le plus souvent roïdes et coriaces ; les fleurs sont blanches ou rouges , formant des capitules terminaux. Toutes ces espèces sont originaires de l'Amérique méridionale. La plus commune et celle que l'on cultivequelquefois dans les jardins, est la *Lagasca mollis*, Cavan., Aun Se. Nat. 6, p. 333, t. 44. C est une Plante herbacée, vivace , originaire de l'île de Cuba. Ses feuilles inférieures sont opposées , les supérieures alternes, péliolées , ovalesaiguës, à peine dentées , et poilues; les capitules sont longuement pédonculés et terminaux. On doit à notre collaborateur Kunth la description de trois espèces nouvelles de ce genre , sa-

voir : *Lagasca rubra* , Kunth, Jfou. Geh. 4, p. 24, t. 3ii,jL. *heliant-liifolia* , loc. cit., p. a5 , et *L. suaveolens*, lue. cit., p. a5. (a. r.)

. * LAGÉCIE. bot. ru an . Pour Lagoécie. V. ce mot. (b.)

* LAGENA. moll. Genre proposé par Klein (Te/it. Meth. Ostrac. , p. 4g) pour des Coquilles du genre Buccin , principalement pourcelles qui , selon lui , ont la forme d'une bouteille. On rie doit pas être étonné qu'un genre pareil n'ait été adopté de personne.

LAGENAGA. bot. phan. (Avicenne.) Syn. de Bourrache. V. ce mol. , , (b.)

LAGEN¹FERE. bot. phan. Pour Lagéno[^]hore. V. ce mot. (b.)

LAGÉNITE. polyp. ross. Ce nom désigne dans les anciens oryetogra-

LAG

phes des Alcyons fossiles qui ont effectivement quelque chose de la forme de petites bouteilles. On l'élendait aussi à des concrétions ou agglutinations arénacées de la même figure.

LAGENOPHORE. *Lagenopliora*.

bot. phan. Genre de la famille des Synanthérées , Corymbifères de Jussieu , proposé par H. Cassini (Bull.

de la Société l'philom., décembre 1816) sous le nom de *Lagenifera* qu'il a changé depuis en celui de *Lagenophora*. Voici ses principaux caractères :

iuvolucre irrégulier dont les folioles sont un peu inégales, disposées sur deux rangs , oblongues, aiguës , appliquées et coriaces

dans leur partie inférieure, étalées, membraneuses et colorées à leur sommet; réceptacle plane et dépourvu de paillettes; calathidie radiée; fleurons du centre en petit nombre, réguliers et mâles; fleurons de la circonférence sur un seul rang, en languettes et femelles; ovaires de la circonférence très-grands, comprimés des deux côtés, obovales, prolongés en un col court, terminés par un bourrelet sans aigrette. Ce dernier caractère, qui donne aux fruits l'apparence de petites bouteilles à goulots, et qui a fait imaginer le nom générique, est un de ceux qui distinguent le *Lagenophora* du *Bellis*, de l'*ester* et du *Valendula*. Cassini le place dans la tribu des *Astérées*, non loin du *Bellis*. Il se compose des deux espèces suivantes : 1° *Lagenophora Commersonii* ou *Calendula Magellanica*, Willd. Cette petite espèce a été découverte au détroit de Magellan par Commerson qui lui donnait, dans ses manuscrits, le nom de *Slister nudicaulis*. Du Petit-Thouars l'a retrouvée dans l'île de Tristan d'Acugna, et l'a nommée *Calendula pusilla*. 2° *Lagenophora Billardieri*, Plante recueillie à la terre de Van-Diemen par Labillardière qui l'a décrite (Nov.-Holland. Plant. spec.) sous le nom de *Bellis stipitata*. (g.n.)

LAGÉNULE. *Lagenula*. moll.?

Monfort a proposé de former ce genre

LAG

{Conchyl. Syst. T. i, p. Sij pour utfn petit corps fort singulier, figuré depuis long-temps dans le bel ouvrage de Soldani (Test, microsc., lab.

ilao, vas. a48). Il ressemble à un petit œuf supporté par un pied composé de plusieurs petits calices ajustés les uns aux autres. Il est fort douteux que ce corps, qui se trouve dans les

>sables de la mer Adriatique , doive têtre conservé parmi les Mollusques.

[Néanmoins Montfort le caractérise de la manière suivante : coquille libre , univalve, cloisonnée, droite, interjunctée, pyriforme ; sommet aigu ; base ■ aplatie; bouche ronde; cloisons inégales, unies; siphon inconnu. La .•seule espèce de ce genre est la Lagé- : ni/le fleurie , *Lagenula flosculosa* , IMontf. (d..h.)

* LAGÉNULE. ikf. Espèce du ; genre Enchélide. V. ce mot. (b.)

LAGÉNULE. *Lagenula*. bot.

ifii.vn. Genre de la Tétrandrie Mono- :gvnie, L. , établi par Loureiro {F/or. iCocàinc, édit. Willd.,p. 3) qui l'a

ainsi caractérisé : calice infèie , persistant, à quatre folioles ovales, • oblongues , réfléchies ; coiole nulle ; r nectaire à quatre lobes charnus,

dressés et conniveus ; quatre étamines dont les filets sont subulés et les

anhères ovées , incombantes; ovaîre caché par le nectaire, surmonté i d'un style épais, plus court que les famines, et d'un sligmaie simple; Ibaie petite , en forme de bouteille ■ dont le col est resserré, biloculaire ict disperme. Ce genre présente quelque affinité , selon VVilldenow , avec lie Sircam de Linné; il s'en éloigne (cependant par son ovaïresupère , tani dis qu'il est infère dans le Sirium i tnyrtifolium qui , d'ailleurs, a été î réuni au San la lu m.

Le *Lagenula perfata* , Lour. , est un

Arbrisse-u de médiocre grandeur fqui croît dans les mon-
tagnes de la tCochiuchinc. Sa tige est grimpante , i rameuse et
munie de vrilles. Ses feuil- ' les sont pédalées, composées de cinq
: folioles ovales , créneés et cotonneu- ■ses. Les fleurs , disposées
en grappes

LAG 16=5

lâches , ont une couleur verte blanchâtre. • (G..N.)

LAGERSTROMIE. Lagerstroemia.

bot. pnAN. Ce genre, de la famille des Salicariées et de la Poly-
andrie Monogynie , a été établi par Linné , et présente les carac-
tères essentiels suivans : calice campanule à six divisions ; corolle
composée de six pétales ondulés et pourvus d'un onglet filifo:
me; étamines nombreuses, dont six extérieures plus longues , à
anthères orbiculées; fruit capsulaire à six loges polyspermes. En
adoptant ces caractères, à l'exception de ceux du fruit , qui
n'étaient pas connus alors, Jussieu {Gêner. Plant., p. 55 1) indi-
qua l'affinité de ce genre avec le Munchausia , f. ce mot, et
quelques auteurs les ont réunis. On a aussi proposé de 1 ui ad-
joind re le Calyplectus de la Flore du Pérou, qui ucanmoins a été
conservé par Kunth.'Les Lagerstromies sont des Arbrisseaux ,
pour la plupart indigènes des Indes-Orientales ; leurs feuilles
sont simples, ayant la forme de celles du Grenadier ; les infé-
rieures sont opposées; les supérieures alternes , et dans leurs ais-
selles s'élèvent des pédoncules portant plusieurs fleurs disposées
en paucules.

La Lagerstromie des Indes, Lagerstroemia indica , L. ; Lamk.,
Illustr.

Gen., lab. 470 , fig. 1 , est l'espèce la plus remarquable. C'est le Tsjinkin de Rumph {Herb. Jmboin. 7 , p. 61, tab. 28), et le Sibi de Kœmpfer {/Jmœn. exot. 855). Ce bel Arbrisseau croît principalement à la Chine et au Japon. Ses tiges sont hautes d'environ deux mètres; ses rameaux anguleux portent des feuilles alternes , presque scssiles , ovales, entières et rudts sur les bords. Les fleurs sont remarquables par la beauté de leurs corolles dont les onglets sont uès-longes et le limbe d'un pourpre éclatant. Une autre espèce non moins belle croit sur les bords des rivières , dans les terrains sablonneux et pierreux de la côte de Malabar. C'est le Lagerstroemia Reginœ , Roxburgh

i64 LAG

{Co'romancf. 1 , p. 46, tab. 65). La-, marck (Diclionn. Encyclopéd.) en avait fait sotfjgenre Arfamboa , nom dérivé de ce! ni <X.4dambue sous lequel Rhéecte\Malab. \\ lab. 20 et 21) l'avait décrit et figuré. Les Heurs de cette espèce sont grandes , purpurines et semblables à des Roses. On cultive quelques Lageistroemia , et surtout le Lag. indien, dans les jardins de botanique. Ils se multiplient par rejets , par marcottes et par boutures. On les tient d'abord sur concile et sous châssis ; on les pince ensuite dans une terre substantielle et dans la serre chaude pendant l'hiver.

LAGETTO. La gel ta. bot. piian.

Genre de la famille des Thy mêlées et de l'Octandrie ÎVIonogynie /L., établi par Jits'sleû et très-voisin des Dap/irie dont il diffère parles caractères suivans : calice tubulcux, épais, coriace, rétréci vers Sa gorge ou il présente quatre glandes ; limbe à quatre divisions; huit étamines presque sessiles, attachées au tube du

calice et incluses ; ovaire surmonté d'un style et d'un stigmate simple. Le fruit est globuleux , pisiforme , velu en dehors, mono-sperme et recouvert par la base du calice qui est persistante.

Deux espèces forment ce genre :

l'une , Lagetto Bois-dentelle , Lagetta linteuria , Lamk. , 111. , t. 289, a été réunie au genre Daphné par Swartz sous le nom de Daphne Lagella. C'est un Arbrisseau de douze à quinze pieds d'élévation, à tige rameuse, portant des feuilles alternes, ovales , allongées, aiguës, glabres sur leurs deux faces , longues d'environ trois pouces. Les fleurs forment des grappes ou panicules rameuses et terminales. 11 croît communément sur les montagnes à Saint-Domingue et à la Jamaïque. Le nom de Bois-dentelle sous lequel cet Arbrisseau est communément désigné, vient de l'organisation particulière de son écorce. Lorsqu'on a enlevé la partie externe composée de l'épiderme et de l'enveloppe mucilagineuse , on trouve les couches corticales formées d'un grand nombre

LAG

de feuillets superposés qui se composent de fibres entrelacées et anastomosées ensemble de manière à former un réseau ou une sorte de tissu qu'on a comparé à celui d'une dentelle. Ce tissu offre assez de solidité pour qu'on puisse en faire dans le pays des ornemens de toilette, des chaus, des garnitures , etc. (A.B.)

* LAGGION ou SCHEUGGIO.

vois. Syu. de Labre dans le golfe de Gènes. (n.)

* LAGOCÉPHALE. pois. Espèce du genre Gohie. V. ce mot. (b.)

LAGOECIE. Lagœcia. bot. piian.

Genre de la famille des Ombellifères et de la Pentandrie Monogynie , établi par Linné, et ainsi caractérisé :

calice à cinq découpures multifides et capillaires ; cinq pétales bicornes et plus courts que le calice ; cinq étamines de la longueur de la corolle ; ovaire inférieur surmonté d'un seul style et d'un stigmate simple; akène unique couronné parles découpures calicinales; ombelle simple ; involucre général formé de huit à neuf rayons peclinés , pinnatifideset réfléchis ; involucres partiels à quatre folioles ca— pillacées, ciliées et enveloppant les petites fleurs. L'unité d'ovaire , de style et de stigmate est une structure tellement exceptionnelle à celle qui caractérise les Ombellifères , que Jussieu n'a placé le genre'Z.ff^œcàzqu'à la (in decetle famille. Ilserailintéressant de rechercher les causes physiologiques qui altèrent ainsi dans ce genre la symétrie de la famille , ou , en d'autres termes , de s'assurer si le Lagœcia a un seul fruit par l'effet d'un avortement o11 d'une soudure naturelle.

Le Lagœcia cttminoides, L. , est une assez jolie Plante herbacée , dont les feuilles sont piunées, glabres et péliolées. Les fleurs sont disposes en.

ombelle pédonculée, solitaire et formant une lêle abondamment velue et munie à sa base d'un involucre rayonné très-remarquable. Elle croît dans les îles de l'archipel Grec et dans l'Orient. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (g..N.)

LA.G

LAGOMYS. mam. V. Lièvue.

* LAGONDI. bot. pu an. Rumph (Herb. Amb. , vol. 4, p. 48 et 50) a (désigné sous le nom générique de ILacondium , (irédu mot malais Laigondi, deux Piaules des Indes-Orienttalesque Linné et Bwmann ont l'apjporlées au genre Vitex. Le Lagoudium vu I gare et le Lag. litlorcum de IRumph appartiennent, selon Linné, U'un au P'itex /rifo/ia, qui a pour s\ nomyme le Gara Nosi de Rhéede (Hort.

-Malab. , deuxième partie, p. i5, i". 1 1), ll'autre au V. Ncgu/ido, qui est le iBcrn Nosi\"e Rhéede [/oc. cit., p. i5, If. 12). Lamarck (Encycl. NLéth.) a [prouvé depuis que le ('ara Nosi et le iBem Nosi de Rhéede ne sont que des wariétés de la même Plante , et cette copinion a été partagée récemment fpar Hai-nillon (Transact. of Linn.

:Soc. T. xiv, p. 186). Il a réuni le Witzx Negundo de Linné au V~ . Irifollia , dont le Lagondiu m vulgare de IRumpli est un synonyme , et il a éta- Ibli le Kitek pauculata , auquel il a irappor-léle Lagoiidium littoreum. K.

1 Vitex. (g..n.)

LAGOM. céoi.. Plusieurs localillës célèbres des environs de Voitéra , ide Sienne en Toscane, présentent un [phénomène géologique remarqualole , que l'on désigne, dans le pays, ssous le nom particulier de Lagoni.

(On voit des vapeurs très-chaudes, lblanchâires et qui ré-pandent une Iforte odeur de Soufre , d'Hydrogène ssull'uré et de

Bitume, s'élever continuellement et souvent avec beaucoup de force et de bruit , du sein de ces amas plus ou moins considérables d'eaux noires et bourbeuses; quelquefois, mais rarement, les vapeurs sortent immédiatement des fentes des rochers, qui sont alors peu éloignés des amas vaseux; tout porte à faire croire que les vapeurs qui, en traversant l'eau , la font paraître en ébullition, sont produites par une cause qui agit profondément dans le sein de la terre, et dont le foyer est placé dans des couches au moins inférieures aux terrains secondaires; celle

LAG 165

cause, sans doute analogue à celle qui produit les volcans , n'en diffère peut-être que parce que la chaleur souterraine ne s'élève pas assez pour fondre les substances minérales et les rejeter en dehors à l'état liquide.

L'analyse des eaux provenant des vapeurs condensées, a fait reconnaître dans celles-ci la présence de sulfates de Fer, de Chaux, de Magnésie, d'Ammoniaque, et notamment celle de l'Acide boiacique, quoique les terrains dont paraissent sortir les vapeurs ne contiennent pas tous les éléments de ces substances. Ces terrains sont principalement composés d'une espèce de Psammite calcaire connu sous le nom de Macigno, de Calcaire compacte, brun, coupé par des lits interrompus de Silex corne et d'Argile schisteuse , qui ne paraissent renfermer aucuns vestiges de corps organisés. Suivant Alex. Biongniart qui a visité quelques Lagoni de la Toscane , l'eau et l'humidité qui se rencontrent dans les mêmes lieux est plutôt le résultat de la condensation des vapeurs sorties du sein de la terre, qu'elle n'est une des causes du phénomène. Le même observateur a fait remarquer que les parois des fissures , par lesquelles les vapeurs se dégagent , sont

corrodées et altérées , de manière a donner l'idée de la formation des Pierres réniformes des cuivrons de Florence.

Il paraît aussi que contre l'assertion contraire de Patrin , les Lagoni ne sont pas dans des terrains volcaniques , ni anciens ni modernes , et non loin des lieux ou on les rencontre, ou voit en même temps des amas boueux , plus ou moins considérables, qui fout remonter l'existence du même phénomène à une époque très-ancienne. (c.P.)

* LAGONYCHnJM. bot. i-ijan.

Genre de la famille des Légumineuses et de la Décandi ie Monogynie , L. , proposé par Marschall de Bieberstein (FL Taur.-Caucas. Suppl.

288, et adopté par De Candolle 'JJrodr. Syst. Kcget. 2, p. 448) avec

i;66 LÂ»

las caractères suivans : fleurs hermaphrodites, avortées pour la plu-

fiarl ; Calice à cinq dents ; pétales ibres; dix étamines h^pogynes , à filets non soudés et à anthères dépourvues de glandes ; style tordu au sommet; légume stipité, indéhiscant , ové-cylindracé , presque didyirle , rempli de pulpe, un peu courbé , obtus, uni et ne pouvant se diviser en aucune manière.' Ce genre a été réuni par Kunth avec le Prosopis.

Son fruit ayant beaucoup de ressemblance avec celui de l'acacia Famesiana , Steven le regarde comme congénère de celui-ci. Une seule espèce le constitue ; elle a été nommée Lagonychiuni

Slephanianum , et elle croît dans les plaines arides entre le Caucase et la mer Caspienne. Michaux l'a trouvée aussi en Perse entre Mossul et Bagdad. (c.N.)

LAGOPÈDE. Lagopus. ois. Espèce du genre Tétrás , dont Vieillot a fait le type d'un genre particulier.

V. TÉTRAS. (DR..Z

• LAGOPODA. ins. Linné donne ce nom spécifique à la femelle de la Mégachile du Rosier (Jpis centuncularis, ii.). V. Mégachile. (g.)

LAGOPDS. ois. r. Lagopède.

Lagopus. bot. phan. Ce qui

signifie Pied de Lièvre. Nom scientifique d'un Plantain , donné par les anciens botanistes à plusieurs autres Plantes, telles qu'un Lotier, l'Anthyllide vulnéraire, le Trèûdes champs et le Gnaphale dioïque. Cette dernière Plante est le Lagopyrum (Blé de Lièvre; d'Hippocrate. (b.)

* LAGOSERIS. bot. phan. Genre de la famille des Synanthérées , Chicoracées de Jussieu, et de la Syngénésie égale, L. , établi par Marschall de Bieberstein (Centur. Plant, far. Ross.) et caractérisé , dans le troisième volume de sa Flora Taurico-Caucasica , d'une manière aussi brève que la suivante : réceptacle couvert de paillettes capillaires ; involucre ceint d'un calicule; aigrette poilue, sessile. L'auteur de ce genre

LAG

l'a composé du *Crépis Nemausensis* de Gouan et de *YHieracium purpureum* | réuni de Willdenow. Ces deux Plan- I tes , d'après l'opinion de Cassini , for- Il ment deux genres distincts quoique 1 très-rapprochés ; dans l'un , les fruits I sont uniformes, aigrettes et non ai- I lés; dans l'autre, les fruits marginaux sont dépourvus d'aigrettes, I munis d'ailes longitudinales, et ne ressemblent point aux fruits du centre qui sont aigrettés. En conséquence, et avant qu'il eût connaissance de l'établissement du *Lagoseris* de Marschall , il en avait formé deux genres : l'un , *Pterotheca* , pour le *Crépis Nemausensis* , et l'autre, *Intybellia* , pour *YHieracium purpureum*.

Si la distinction de ces genres est prise en considération par les botanistes , il sera peut-être convenable de substituer le nom de *Lagoseris* à celui à *Intybellia* qui lui est postérieur de plusieurs années. (G..N.)

LAG O TU RICHE. *Lagolhrix*.

mam. Genre rie *Quadrumanes* établi par Geoffroy Saint-Hilaire dans la division dçs Singes *Platyrrhinins* ou *Sapajous*. V. *Sapajou*, (is. g.st.-h.)

LAGOT1S. bot. phan. Ce genre , établi par Gaertner {Act. Petrop. i4 , p. 533, t. 18), est le même que le *Gymnandra* de Pallas, fondé sur le *Rhinanthus Dia/idra*, L. Selon Jussieu , on doit le réunir au *Bartsia*; il diffère particulièrement du *R/iinanl/ius*, en ce qu'il a deux étamines au lieu de quatre. V. *Babtsie* et *Rhinanthe*. (g..n.)

LAGOUAN. bot. phan. On ne sait à quel genre appartient l'Arbre des Philippines ainsi nommé , et qui fournit un très-beau bois rouge, employé dans les constructions. (b.)

*LAGRI AIRES. Lagriariœ. ins.

Tribu de l'ordre des Coléoptères , section des Hétéromères , famille des Trachélides , établie par Lalreille (Fum. Natur. du Règn. Anim.), et ayant pour caractères : le pénultième article des tarsi bilobé ; corps allongé , plus étroit en devant, avec le

1 corscel cylindracé ou carré; palpes i maxillaires terminés par un article 1 plus grand, triangulaire; antennes

- simples, filiformes, ou grossissant i insensiblement vers le bout, le plus

- souvent et du moins en partie gremucs, ci terminées, dans les mâles ;au moins, par un article plus long < que les précédons. Les mœurs de ces 1 Insectes nous sont entièrement inconnues. La treille dit que Svaudoiner a observe les métamorphosa i d'une espèce du genre Lagrie , mais iil n'a pas publié cette observation.

'Celle l'a mille se compose des genres i L igrie et Satyre, ces mots, (g.)

LAGRIE. Lagria. ins. Genre de I l'ordre des Coléoptères, section des . Héléi omères , famille des Trachéjii des , tribu des Lagriairs, établi par Fabricîus , et ayant pour caractères :

pénultième aiticle des tarsi bilobé; mandibules bidentées à leur extrémité ; mâchoires membraneuses , à ■ deux divisions presque égales ; palpes maxillaires terminés par un article en forme de hache; les labiaux beau-

- coup plus petits , gros à leur extrémité; labre échancré; menton foit

' court , transversal ; antenne» presque 1 grenues, grossissant vers leur extrémité et insérées à nu, près d'une échancrure à l'extrémité. Ces Insectes ont été confondus avec divers genres,

• dont ils se distinguent cependant beaucoup, par Linné qui en avait placé une (*Lagriæ lûrta*) avec les Chrysomèles. Geoffroy l'avait placée avec les Cantharides, et Degéer avec les Ténébrions. Ce genre se compose d'un nombre d'espèces assez limité ; le corps de ces Insectes est oblong, avec la tête et le corselet plus étroits que l'abdomen ; leurs élytres sont très-étroites même tout le reste du corps est ordinairement mou, flexible et souvent pubescent ; les antennes sont composées de onze articles ordinairement assez courts; dans les mâles, le onzième est plus long; les yeux sont échancrés ; le corselet est quelquefois carré comme dans une espèce exotique(*Lagriæ tuberculata* -

, *Lagriæ tuberculata* , Fabr.), mais le plus

LAG 167

Il est cylindrique , plus étroit que l'abdomen et sans rebords; les élytres sont assez convexes , plus larges postérieurement ; l'écusson est très-petit ; leurs jambes sont assez allongées, grêles, sans épines bien distinctes à leur extrémité; l'avant-dernier article des tarses s'élargit en forme de cœur, et les deux crochets du dernier sont simples. Ces Insectes se distinguent des Mélandryes , par les palpes maxillaires qui sont très-grands et en forme de triangle renversé dans ceux-ci ; ils s'éloignent des Isoihus et des Calypus , par la lèvre qui est profondément échancrée dans ces deux genres. Dejean(Cat. des Col., pag. 72; mentionne huit espèces de ce genre ; la plus commune en France et celle qui se trouve de type est : La Lagrie hérissée, L. Air/a, Fabr., Oliv., t. 3, n. 49,

pl. 1, lig. 2, a,b,C; *Chrysomela hit ta* , L.; la *Cantharide* noire à étuis jaunes , Geoff. , Ins. , t. 1, p. 344 ; 'iénébrion velu , Geoff. Cette espèce se liouve aux enviions de Paris. Fabricius a formé avec la femelle une e-pèce qu'il nomme *L. pubescens*. L'Afrique, l'Amérique et la Nouvelle-Hollande présentent plusieurs espèces de ce genre.

NÉE. (G..N

^ LAGUNCULARIA. bot. phan.

Genre établi par Gaei tuer fils(Carp. , p. 209, t. 217; pour le *Conocarpus racemosa* de Swarlz, et appartenant à la famille des Combrétatées et à la Décandi le Monogj nie, L. On peut caractériser ce genre de la manière suivante : calice adhérent avec l'ovaitte infère, dont le limbe est court et à cinq dents; corolle formée de cinq

i6S LAG

pétales très-petits , insérés à la base des incisions du calice; étamines au nombre de dix, libres et dressées.

Ovaire infère un peu comprimé , surmonté d'un style de la même hauteur que les étamines , et d'un stigmate simple. Le fruit est comprimé , strié , couronné par le limbe du calice; ii est indéhiscent, uniloculaire et rao- ' nosperme. La graine est oblongue , formée d'un épisperme mince et membraneux , recouvrant un embryon dont les cotylédons sont roulés en spirale autour de la radicule.

Le Lagune u lu ri a ra cemos, Ga er t n . , '/oc. cit. , est un Arbuste rameux , diffus, de six à neuf pieds d'élévation.

Ses feuilles sont opposées, pétiolées , ovales, très -entières , obtuses, très glabres. Les fleurs sont petites , tomentueuses , formant des grappes rameuses à rameaux allongés , grêles et disposés à l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux. Cet Arbruste croît aux Antilles et à Cayenne sur le bord de la mer. Dans cette dernière colonie , il est connu sous le nom vulgaire de Palétuvier soldat, (a. r.)

LAGUNÉE. *Lagunœa* ou *Lagumea*.

bot. pu an. Genre de la famille des Malvacées et de la IVlonadelphie Polyandrie, L. , établi par Cavanilles {Dissert. , 3 , p. 4-jt]) sous le nom de *Laguua* dont la désinence a été modifiée par Schreber et Willdenow. Il est ainsi caractérisé : calice nu à cinq dents; anthères placées au sommet et à la superficie du tube staminal; cinq stigmates; capsule à cinq loges et à cinq valves portant les cloisons sur leur milieu, séparables et laissant au centre un axe central filiforme. De Candoille (Prodrom. Syst. Regu. Veget. T. i , p 7*) place ce genre à la fin de la famille, et il fait remarquer qu'il offre les mêmes rapports avec l'*Hibiscus* que le *Sida* avec le *Maha*.

Le *Solandra* de Murray et le *Triguera* de G» vanilles en sont congénères.

On connaît quatre espèces de *Lagunœa*, savoir: 1° *L. lobata* , Willd., *Hibiscus Solandra* , L'ér. , Stirp.

Nou. , 1 , 4 9 5 2° *L. sinuala* ,

LAG

Hornem. ; 3° *L. ternata* , Cav. ; 4° et *L. aculeata* , Cav. , sur laquelle le genre a été constitué. La première et probablement la seconde sont indigènes de l'île de Mascareignes, la troisième du Sénégal et la quatrième de Poitou. Quant au *Lagunea salicifolia* , Yenten. , Malm., t. 42 , il a été remplacé par *De Candollea* dans le genre *Hibiscus* sous le nom d'*H. Patersonii* , et y forme le type de la 2e section sous le nom de *Lagunaria*. V.

Ketmie.

Un autre genre *Lagunœa*, établi par Loureiro, doit rentrer dans le genre *Renouée*, f. ce mot.' (g..N.)

LAGUNES. GÉOLOGIE. Les graviers , les sables et les limons, charriés par les cours d'eau qui viennent déboucher dans le fond du golfe Adriatique, et notamment par la Biadene , l'Adige et le Pô , s'accumulent à l'embouchure de ces fleuves par l'effet de la résistance qu'oppose à leur marche l'action en sens opposés des vagues de la mer; sur plusieurs points de la côte cette accumulation de matériaux a reculé les rivages, et elle a produit de nombreux bancs et fonds sablonneux qui ne sont plus séparés que par des canaux sinueux et peu profonds : ce sont ces flaques d'eau marine entourant des terres basses et formées d'un sol d'attérissement , que l'on désigne spécialement aux environs de Venise, sous le nom de Lagunes ; cette ville célèbre, qui semble s'élever du sein de la mer, est construite sur un terrain de cette nature.

La formation des Lagunes est comme celle des attérissements un phénomène géologique qui n'a pas cessé de se produire ; on possède beaucoup de documents historiques qui attestent que des lieux qui sont aujourd'hui plus ou moins éloignés de la mer, étaient autrefois baignés par ses eaux. Le port de Venise , mainte-

nant Adria, se trouve, par exemple, à 25,000 mètres de la côte , suivant Prony dont le beau travail met à même de suivre siècle par siècle la marche des attérissemens sur ce

LAG

[point., Beaucoup de faits de ce genre t ont été cités à tort en preuve dè la i diminution des eaux de la mer. -F\ :M*:n. (c;P.)

On peut surtout donner comme un i indice certain de cette diminution et : sans arguer delà citation banale d'Ai- ; gués-Mortes oùs'embarqua leroisaint I Louis , la côte méridionale delà pénint suie ibérique où se voient encore dss , Lagunes , connues sous le nom d'Al- I buteras , et qui l'iuent jadis bien plus nombreuses qu'elles ne le sotil maintenant. Au temps de Strabon , si rapproché de nous , en comparaison de l'époque où les continens commencèrent à prendre la ligure qu'ils conservent aujourd'hui , diverses Lagunes de ce genre se voyaient surtout vers la baie de Cadix , dont l'île était beaucoup plus distante de la côte ferme qu'elle ne l'est actuellement : le Guadalète a métamorphosé tous ces lieux en attérissemens, et Cadix n'est plus séparé du conli- uent que par un simple chenal , appelé de Santi-Pétri. lien est de même de l'embouchure du llio-Tinto , où la baie d'Huèlva ne présentera bientôt plus que. des Lagunes , et où le port de Palos , célèbre par rembarquement de Christophe Colomb , est aujourd'hui assez loin du rivage. Le reste des côtes de l'Europe présente les mêmes phénomènes eu beaucoup d'endroits. Un trouve des Lagunes en dedans des dunes , Pr. ce mot , le long des Landes aquitaniques où le bassin d'Arcachon, qui se ferme, deviendra bientôt une Lagune pareille. Le Zuiderzée eu Hollande doit éprouver le même sort, ainsi que le FrischaU' et le Curichaff dans la Baltique, mer qui doit à son tour devenir uil lac ou plutôt une Caspienne.

On appelle encore Lagunes , les amas d'eaux intérieures , plus grands que des étangs et plus petits que des lacs.

C'est surtout lorsqu'ils n'ont pas de dégorgeoir qu'on leur donne ce nom. (b.)

LAGUÏEZIA. bot. PHAN. Nom substitué par Scopoli à celui de Ra-

LAG 169

coubea qu'Aublet avait donné à un genre réuni depuis à *Uolaliuin*. F~.

ce mot. (g..n.)

LAGUNOA ou mieux LLA- GUNOA. bot. pu an. (Ruiz et Pavon.) Genre de la famille des Sapiudacées , section des Dodonéacées de Kunth, nommé plus tard *Ilmirola* par Persoon et qui se distingue par les caractères suivans: (leurs monoïques; les mâles ont un calice quinquéfide , l'incision inférieure étant plus profonde; point de corolle ; huit étamines insérées au centre de la fleur, saillantes par l'incision intérieure; leurs filets sont libres, attachés sur un disque hypogyne et orbiculaire. L'ovaire est à l'état rudimentaire. Dans les fleurs femelles , on trouve un calice persistant, semblable à celui des fleurs mâles ; des vestiges d'étamines, pas de disque , un ovaire libre à trois angles et à trois loges dispermès. Le style est subulé, marqué de trois sillons longitudinaux, terminé par un stigmate obtus. Le fruit est une capsule presque globuleuse, h à trois angles et comme formée de trois coques, chacune uniloculaire , monosperme par avortement, s'ouvrant par une fente longitudinale. Les graines sont globuleuses , dures, luisantes, composées d'un tégument propre qui ic-

couvre immédiatement un embryon roule en spirale et dont la radicule est tournée vers le bile.

Ce genre se compose de trois espèces qui croissent dans l'Amérique méridionale. L'une a été décrite par Ruiz et Pavon sous le nom de *Lagunoa nitida*; les deux autres sont décrites dans les *Nova Généra* de Humboldt et Kunth sous les noms de *Lagtitwa prunifolia* et *L. mollis*. Ce sont des Arbres à feuilles alternes, simples ou ternées, dentées en scie et membraneuses. Leurs fleurs sont portées sur des pédoncules axillaires; les mâles et les femelles sont souvent réunis sur un même pédoncule.

LAGURE. *Lagurus*. bot. piian.

'7° LAI

Genre de la famille des Graminées et delà rmandric Digynie, L., que l'on reconnaît à ses fleurs disposées en une panicule cylindrique et spiciforme; épillets unidores; lépicène à deux valves très-longues, étroites, velues sur leurs bords; glume à deux valves? l'extérieure terminée par deux soies à son sommet et portant un peu au-dessus de son dos une arête tordue à sa base; la supérieure entière et muie. Etamines au nombre de trois; glumelle composée de deux paléoles entières, glabres, un peu renflées à leur base. Fruit allongé, nu, non marqué d'un sillon.

Le *Lagurus ovalis*, L., est une espèce fort commune dans les provinces méridionales de la France. Son chaume est grêle, d'environ un pied à dix-huit pouces de hauteur aux lieux humides; ses feuilles sont velues; sa panicule est très-resserrée et forme une sorte d'épi ovoïde, blanchâtre et très-velu. Bory de Saint-Vincent en a découvert, dans les lieux arides des côtes maritimes de toute la France, une jolie variété, dont l'épi, qui ne laisse pas

d'ère assez gros , est soutenu par un chaume qui n'excède jamais dix-huit lignes ou deux pouces de hauteur. (a. r.)

LAGDRIER. bot. fiian. Même chose que Lagure. V. ce mol. (b.)

LAGDRUS. mah. et bot. Comme qui dirait Queue de Lièvre. V. Campagnol a couni'i queue et Lagure.

LAKAUJUNG. ois. Espèce du genre Héron. V. ce mot. (dr..z.)

* LAHAYA. bot. phan. Le genre Hagea de Ventenat a été désigné par Schultes, sous cette dénomination qui , en effet , est plus conforme au nom du Jardinier Labaye auquel la Plante a été dédiée. Mais ce changement n'étant pas absolument indispensable , on est généralement convenu de ne pas l'adopter. Tr. Hagee. (g..n.)

LAICHE. Carex. bot. phan. L'un des genres les plus considérables de

LAI

la famille des Cypéracées et de la ; Moucecie Triandrie , L. , très-facile à reconnaître par ses fleurs unisexuées , d'où d'habitude monoïques, tantôt dioïques , disposées en chatons globuleux , ovoïdes ou cylindriques et allongés , tantôt unisexués , tantôt mâles ou femelles, tantôt androgynes, si c'est-à-dire composés de fleurs mâles à leur sommet et de fleurs femelles à la base ; plus rarement les chatons mâles et les chatons femelles sont portés sur deux individus. Les fleurs mâles se composent de deux ou trois étamines placées à l'aisselle d'une écaille. Les fleurs femelles sont formées d'une écaille à l'aisselle de laquelle on trouve un pistil triangulaire ou comprimé , renfermé dans un utricule tronqué et bidenté à son sommet.

Le style est court , terminé par deux ou trois stigmates filiformes ou velus. Le fruit est un akène tri— gone ou lenticulaire , entièrement renfermé dans l'utricule. Les Laiches sont des Plantes herbacées, généralement vivaces et souvent munies d'un rhizome ou souche horizontale rameuse, pouvant s'étendre à de trèsgrandes distances. Leur chaume est simple , presque constamment à trois angles très-aigus; leurs feuilles sont alternes, engainantes, munies d'une gaine enlière. Dans les espèces monoïques, les chatons mâles occupent la partie supérieure du chaume et les chatons femelles sont placés au-dessous. Le nombre des espèces de ce genre est extrêmement considérable.

Elles se plaisent dans les lieux marécageux, sur le bord des étangs et des ruisseaux ; quelques-unes viennent dans les lieux secs et sablonneux , d'autres s'élèvent à une hauteur assez considérable. Presque toutes sont originaires de l'hémisphère boréal et surtout de l'Europe septentrionale.

Parmi ces espèces , une seule mérite quelque attention ; c'est la Laiche des sables , *Carex arenaria*, L. , Rich., Bot. méd., 1, p. 56. Cette espèce est remarquable par la longueur de sa racine qui est une souche horizontale rampante , grosse comme une

LAI

plume de Cygne, noueuse et euvelloppée de gâues des feuilles dessécbêes el devenues brunâtres. Ses raitme;uix sont redressés , triangulaires, lihauis de six à dix pouces, rudes sur les angles; les feuilles sontl engainnnantes, étroites, aiguës, très-rudes au toucher. Les fleurs sont ronssâttres, disposées en une grappe formée de cinq à six c'pilletts ovoïdes allongés; les épilletts inférieurs sont I formés de fleurs femelles, les supérieurs de

fleurs nulles et femelles entremêlés. Les écailles sont ovales, lancéolées, très-aiguës, plus longues (que les fruits qui ont triangulaires (et terminés par deux petites pointes. Cette espèce croît communément dans les lieux sablonneux. On la sème souvent sur les bords de la mer (et dans les dunes où ses longues racines rampantes, qui s'étendent rapidement et en tous sens, servent à fixer librement les sables. Ses racines ont une saveur légèrement aromatique, qui a quelque analogie avec celle de : la Salsepareille. Aussi l'a-t-on proposée comme succédanée indigène de cette racine, et est-elle désignée sous le nom de Salsepareille d'Allemagne.

' On l'emploie en décoction dans le traitement de la maladie syphilitique.

Les feuilles de la plupart des grandes espèces de Laiches si communes au bord des marais, coupent souvent par leur tranchant comme des couteaux, étant très-finement et très-dureté dentées. Les botanistes ne doivent pas s'y prendre inconsidérément pour se pencher à la surface des eaux dans lesquelles ils voudraient atteindre quelque Plante éloignée du bord. Dans certains marais des Landes aquilaniques, ces Laiches coupent au point que les boîtes des chasseurs de Canards en sont promptement mises hors d'usage.

LAIE. M v m . La femelle du Sanglier. V. COCHON. (B.)

LAINÉ. rr. Poil.

LAINÉ DE FER. min. Nom donné par quelques naturalistes à des flo-

cous blancs et laineux d'oxide de Zinc, qui se subliment pendant la fusion de certains mineraux de Fer , entre autres ceux des miues d'Aui iac et de Cascatel en Languedoc, (g.del.)

LAINETTE. bot crypt. {Mousses.) Nom français proposé par Bridel pour le genre Lasia. P~. ce mot. (a. f.">

LAIT. Lac. MAM. bot. et ciim.

Nous ne considérerons ici ce fluide dont la nature a gratifié toutes les femelles des Mammifères pour la nourriture première de leurs petils , que sous le rapport de sa composition chimique et de ses propriélés. En conséquence nous renvoyons nos lecteurs aux mois Mammifères, Mamelles et Sécrétions pour le reste de l'histoire naturelle du Lait , c'est-à-dire pour tout ce qui concerne l'organisation animale qui préside à sa formation , et sou utilité dans l'économie vivante. La composition et les propriéiés soit physiques soit chimiques du Lait des difleicns Mammifères, sont tellement variables, que l'on ne peut exprimer avec exactitude d'une manière générale sa pesanteurspécifique, sa coideur , sa saveur, etc. Tout ce que nous pouvons dire de ce liquide eu général, c'est qu'il est toujours opaque, d'un blanc plus ou moins pur , plus dense que l'eau , d'une saveur douce et d'une odeur qui varie suivant les Animaux et les substances dont ils se nourrissent. Le Lait de la Vache, celui dont l'Homme fait la plus grande consommation , va principalement fixer notre aitement , et nous ferons connaître succinctement les diver-ités que cé liquide offre dans les femelles de quelques autres Animaux , comme dans la Femme ,1a Jument, l'Auesse , la Brebis et la Chèvre.

Lait de Vache. Sa couleur est d'un blanc légèrement bleuâtre. Sa densité varie d'après les quantités de beurre et de f. oinage qu

il contient, et ces quantités ne sont pas constamment les mêmes sur le même individu , quand on retire son Lait

173 LAI

à des intervalles de temps entre lesquels les rapports de l'Animal avec les corps extérieurs subissent de nombreux changements. En général il est formé: 1^o de Beurre; 2^o de matière caséuse ou fromage pur; 3^o d'Eau en très-grande proportion ; 4^o d'un Acide libre (lactique , suivant Schéele et Berzélius ; acétique, selon Fourcroy , Vauquelin et Thénard); 5^o de Sucre de Lait; 6^o de

Ilusieurs Sels neutres , tels que le actate de Fer, l'acétate et le phosphate de Potasse , les phosphates de Chaux et de Magnésie et le chlorure de Potassium.

Si on l'abandonne à lui-même et à une température de dix à douze degrés , il se sépare en deux parties. La crème, qui y était tenue seulement en suspension , vient occuper la partie supérieure où elle forme une couche plus ou moins épaisse. Le Lait écrémé ne tarde pas à s'aigrir , surtout si la température est augmentée, et il se divise de nouveau en deux portions dont l'une est un coagulant assez consistant, et l'autre un liquide légèrement jaune verdâtre, auquel on a donné les noms de sérum et de petit-Lait. C'est de la crème que l'on obtient la plus grande quantité de la matière grasse ou du Beurre. V. ce mot. Lorsque par l'agitation on en a séparé celui-ci , il ne reste que le Lait de Beurre qui se compose de sérum et de fromage. Ce dernier peut facilement en être extrait, soit spontanément par l'acescence du liquide, soit par l'action des Acides , de l'Alcool et de l'Ether qui coagulent le Lait , les premiers en se combinant avec la matière caséuse, les

autres en exerçant sur elle une légère action , ou plutôt en s'emparant de l'eau qui la tenait en solution. Les Alcalis , au contraire, ne le coagulent point; ils redissolvent même le fromage qui a été séparé par les Acides. Une chaleur élevée graduellement jusqu'à l'ébullition du Lait, ne produit sur lui, s'il est récent , qu'un boursofflement qui résulte de la formation de plusieurs pellicules à sa surface ;

LAI

mais si ce liquide est extrait depuis quelque temps , l'élévation de la température atmosphérique suffit pour le coaguler. Ce phénomène s'observe fréquemment pendant les chaleurs de l'été. Il faut toutefois prendre en considération l'état électrique de l'atmosphère qui paraît aussi exercer une influence très-marquée sur la coagulation du Lait.

La saveur du sérum ou petit- Lait dépend de l'Acide lactique libre et des Sels neutres qu'il tient en dissolution. Sa transparence est altérée par une portion de fromage que l'on enlève en y mêlant du blanc d'œuf et en faisant bouillir le liquide, puis le passant à travers une feuille de papier.

Lait de Femme. Moins épais , moins casseux que celui de la Vache; il ne coagule , suivant Parmentier et Deyeux, que par les Acides concentrés. Il a une saveur très-douce, et il est visqueux, mais non gélatineux ni tremblant.

1 Lait d'Anesse. De même que le précédent, il ne contient que très-peu de fromage. Sa crème, d'une faible consistance, donne un beurre blanc, mou et fade.

Lait de Jument. Il est moins fluide que les Laits de Femme et d'Anesse. On n'y trouve néanmoins que de faibles proportions de fromage et de beurre, et il contient de plus du sulfate de Chaux, d'après Parmentier et Deyeii*. On sait que certaines hordes tartares en font un grand usage non-seulement comme aliment , mais encore par la liqueur alcoolique qu'ils en obtiennent et qui leur tient lieu d'eau-de-vie.

Lait de Biiebis. Sa densité est, eu général, un peu plus grande que celle du Lait de Vache. Le beurre qu'il contient est plus abondant et plus fusible , et son fromage plus gras. Il a en outre une odeur particulière qui le fait aisément reconnaître.

Lait de Chèvre. Le beurre qu'il fournit est ferme , blanc et moins abondant que dans les Laits de Vache et de Brebis. Son fromage est gélati-

LAI

eux et a plus de consistance que cciii Je ces derniers Animaux. L'odeur ee Chèvre qui le caractérise est due,

•lou Chevreul, aux Acides caproï-

ue et caprique, que ce chimiste y a i ecouvei ts en assez fortes proportions. Il ajoute qu'en général les Laits tés divers Animaux sont odorans en laison du développement de ces Acik'es contenus dans leurs heurres.

D'autres Quadrupèdes donnent un ■naît d'assez bonne qualité pour que FHomnieen ail fait son profil. Le plus remarquable est le Lait de la femelle Va Chameau qui forme la hase principale de la nourriture des Arabes et ies aulics tribus errantes des déserts (d'Afrique. (g..N.)

Lait végétal. Un grand nombre de Végétaux ont un suc propre , dont l'aspect est absolument semblable au

- Lait des Animaux, mais qui le plus souvent
- est doué de qualités amères et dorantes qui décèlent des principes

essences et délétères. Tel est principalement le Lait des Euphorbiacées , des Escalloniadées , des Sapotées, des Urticées , des Papavéracées , etc. L'existence de ce Lait dans toutes les Plantes d'une même famille , l'a fait employer comme caractère essentiel par les botanistes; il est en effet l'indice d'une structure particulière d'organes qui détermine toujours la nature de leur suc propre. Il arrive quelquefois que ce Lait est coloré de diverses manières; par exemple, il est orangé dans les Chélidoines.

Le Lait de quelques Euphorbiacées et Apocynées s'épaissit à l'air et se change en une matière particulière à laquelle on a donné le nom de Caoutchouc. Pr. ce mot.

De tous les Laites végétaux le plus célèbre

est celui de l'Arbre ou Bois de la Wache , Palo de l'Acacia , sur lequel Humboldt a donné les premiers renseignements dans les Annales du Muséum , t. 180. L'Arbre qui le produit ! lui a donné un nom nouveau qui a été nommé Galactodendron par Kunth (in Humb. et Bonpl. T. 163) et placé dans la famille des Urticées. K.

I.G-alactodendrum au Supplément

LAI 173

Goussiugault et Rivero ont publié un Mémoire sur la composition chimique de ce Lait. Voici le résultat de leurs expériences : 1° Cire en très-grande quantité ; 2° Fibrine; 3° un peu de Sucre ; 4° un Sel à base de Magnésie , mais qui n'est pas un acétate ; 5° une matière colorante. Il ne renferme ni Albumine ni substance caséuse. V. pour plus de renseignements, le Mémoire original imprimé à Santa-Fé de Bogota en 1823 , et la traduction qui en a été faite dans les Annales de Chimie et de Physique, T. xxii, p. 319. (g..n.) :

Plusieurs Plantes ont, à cause de la blancheur de quelques-unes de leurs parties ou du suc qu'elles donnaient, reçu du vulgaire le nom de Lait. Ainsi l'on l'a appelé :

Lait d'Ane , le Lailron commun;

Lait battu, la Fumeterre officinale.

Lait de Cochon, YHyoseris radical a.

Lait de Couleuvre , Y Euphorbia Cyparissias.

Lait d'Oiseau , l'Ornithogale blanc.

Lait doué, Y A ga ri eus deliciosus

Lait de Sainte-Marie, le Carduus marianits , etc.

On a aussi étendu le même nom à des substances minérales, et appelé :

Lait de Chaux, de l'Eau dans laquelle on a fait dissoudre une certaine quantité de Chaux.

Lait de montagne, la même chose qu'Agaric minéral.

Lait de Soufre, le liquide opaque et blanc que l'on obtient en versant un Acide dans une dissolution aqueuse d'hydro-sulfate de Potasse, de Soude ou d'Ammoniaque, assez étendue pour tenir quelque temps le Soufre en suspension. (u.)

Lait de lune. Nom donné par les anciens minéralogistes à une variété pulvéruleuse de Chaux carbonatée, appelée Bergmilch par les Allemands. 1°. Chaux carbonatée.

(g. del.)

LAIT DE TIGRE, bot. cryi-t.

(Champignons.) Jacques breyn ,

n<* LAI

botaniste de Dantzick, donne ce nom à un Champignon qu'on appelle To-Emik\à Chine. Cette Plante a été nommée Lac-Tigridis à cause du préjugé qui veut qu'elle soit produite par l'urine du Tigre qui se coagule sur le sable. On croit, mais sans fondement, que ce Champignon est voisin de la Truffe à Champignon d'Italie. V. Truffe, (a. f.)

LAITANCE ou LAITE, pois. Organe qui représente, dans la quatrième classe des Vertébrés, les testicules; proprement l'attribut du mâle dans le Poisson. V. ce mot. (b.)

LAITE RON. bot. phan. V. Lai-

TRON

LAITEUX, bot. crypt. Famille établie par Paulet pour tous les Champignons qui laissent échapper une humeur laiteuse, de quelque genre qu'ils soient. Il mentionne des Laiteux biiquetés, poivrés, cerclés, Moulons, zones, Chevilles, pointus, etc. Il faut remarquer que le Mouton, loin d'être doux, est précisément l'Agaric meurtrier de buliard. (b.)

LAITIER, bot. phan. L'un des noms vulgaires des Polygales, que des botanistes français ont proposé pour désigner ce genre dont aucune espèce n'est cependant laiteuse, (b.)

LAITIER, min. On donne ce nom, dans les forges, à une matière vitreuse, opaque et brunâtre, plus fusible et moins pesante que la fonte, et qui recouvre celle-ci dans le creuset, à mesure que la fusion s'opère.

Elle est formée de Chaux, de Silice, d'Alumine; d'un peu d'oxide de Fer, et quelquefois d'un peu d'oxide de Manganèse. Par analogie, les minéralogistes ont donné le nom de Laitier des volcans aux Obsidiennes, et à ces laves vitreuses de couleur noire ou brunâtre, qui avaient l'apparence des Laitiers de forge. (g. dee.)

LAITON, min. V. Cuivre.

LAITRON. Sondais, bot. than.

Genre de la famille des Synanthérées, Chicoracées de Jussieu, et de la Syngénésie égale, L., établi par Tour-

LAI

nefort qui y réunissait des Plantes séparées ensuite par Vaillant sous des noms génériques que l'on a cru devoir remplacer par ceux de *Ficridium* et d' *Urospernum*. Jr. ces mois.

Cependant Linné, n'adoptant point les distinctions opérées par Vaillant, plaça d'abord le *Picridium* parmi les *Sonchus* , mais plus tard il l'en éloigna , et commit une erreur plus grave en unissant ce *Picridium* au *Scorzonera*. Le, genre *Sondais* , très-voisin du *Lactuca* , puisqu'il n'en diffère que par ses fruits dépourvus de col, est ainsi caractérisé par Cassini : involucre campanulé, composé de folioles imbriquées, appliquées, oblongues-lancéolées , obuses, un peu membraneuses sur les bords ; réceptacle légèrement concave , tantôt absolument nu , tantôt alvéolé ou garni de papilles; calathide dont les fleurons sont nombreux, en languette et hermaphrodites; ovaires obovales , comprimés , toujours dépourvus de col , quelquefois munis d'une bordure sur chacune des deux arêtes , surmontés d'une aigrette légèrement plumeuse.

Ce genre se compose d'une trentaine d'espèces , en général très-lactescentes , pour la plupart indigènes du bassin de la Méditerranée. Quelques-unes sont répandues et communes dans toute l'Europe ; tels sont les *Sonchus arvensis* et *oleraceus*, L. On trouve dans les Alpes , les Pyrénées et les Vosges , deux belles espèces remarquables par leurs calathides de fleurs bleues ou lilas. Cefontles *Sondais alpinus* et *Pumieri* , L. Lesîles Canaries en nourrissent une espèce {*Sondais fruticosus*, Willd.) dont la tige est ligneuse et les (leurs d'un jaune doré , grandes et disposées en larges corymbes au sommet des Rameaux. On la cultive en Europe ou il faut avoir la précaution de la tenir d;ms les serres d'orangerie pendant l'hiver. (g..n.)

LAITUE, moee. Nom vulgaire et marchand du Murex saxali/is , espèce du genre Rocher. F", ce mot. (b.)

LAITUE. Lactuca. bot. phan.

LAI

Gcuic de la famille des Synanthéi rées , Chicoracées de Jussicu , et de lia Syngénésie égale, L. , aiusi cairactérisé par II. Caseini : involucre j presque cylindracé, composé de fol lioles imbriquées, appliquées, les i extérieures ovales, les intérieures feblougues; réceptacle plane et sans ; appendices ; calathide composée île i demi-fleurons nombreux et hermaphrodites; ovaïies comprimés, orbiiculaires ou elliptiques, quelquefois munis d'une bordure sur les deux

- arêtes , toujours pourvus d'un col
- articulé par sa base, d'abord court et gros, terminé par un bourrelet, puis long et grêle , surmonté d'une aigrette légèrement plumeuse. Vaillant a le premier fait connaître le caractère essentiel de ce génie , lequel ré-

: side dans le fruit piolongé supérieurement en un col , caractère qui le disitingue principalement du Sunckus i dont il est très-voisin.

Les Laitues sont au nombre d'une vingtaine d'espèces, indigènes des i climats tempérés de l'hémisphère boi réal. Une d'entre elles est employée à ■ des usages assez importants pour que : nous devions en donner ici une hisi toirc a bi égée.

La Laitue cultivée, Lacluca sa- . /ii'a , L. , est une Plante herbacée, anrrrtielle, ayant la lige dressée, cylindrique, épaisse, Simple

intérieurement , ramifiée supérieurement.

Ses feuilles inférieures sont sessiles , embrassantes, obovales, oblongues, arrondies au sommet , ondulées sur les bords; les supérieures sont graduellement plus petites , cordiformes et denticulées. Les fleurs sont d'un jaune pâle, petites, nombreuses et disposées en corymbes. Cette espèce n'a encore été rencontrée nulle part à l'état sauvage.. Quelques botanistes pensent qu'elle est le résultat de la culture de certaines espèces de *Lactuca quercina* ou *Lactuca virgata*) qui, de vénéneuses et narcotiques, sont devenues , à la longue , douces et salubres, surtout dans leurs parties qui ne contiennent point de suc laiteux où semble résider le prin-

LAI 13

cipe virgatus. Cette opinion est vraisemblable, car les variétés que la culture a fait naître sont extrêmement nombreuses , et prouvent combien cette Plante est sujette aux dégénérescences , et comme il est difficile de reconnaître son véritable type.

Les cent cinquante variétés de Laitue cultivée peuvent être rapportées à trois races principales qui se perpétuent par leurs graines.

Laitue pommée , *Lactuca scariola* var. *capitata*. Ses feuilles inférieures sont très-nombreuses , pressées les unes contre les autres et formant une tête arrondie comme dans le Chou; celles qui occupent l'intérieur étant étiolées , sont blanches ou légèrement jaunâtres, tendres et très-aqueuses.

Laitue frisée , *Lactuca scariola* var. *crispa*. Elle a des feuilles découpées , crépues sur les bords, et ne formant pas une tête arrondie

comme dans les variétés de la première race.

On regarde comme une variété de la Laitue frisée la Plante cultivée ■ aux enviions du Mans, sous le nom de Lailue-Epinard ou Lai:ue-Chicorée, qui est appelée par quelques botanistes , Lactucla /aciuiata ou patmata.

Laitue romaine, *Lactuca saliva longifolia*. Elle se reconnaît facilement à ses II. s allongées , non bosselées ni ondulées , dressées, et formant un assemblage oblong peu compacte.

Les usages culinaires des Laitues sont si vulgaires qu'il serait oiseux de les indiquer. C'est un aliment Irèsra fraîchissant qui convient surtout aux tempéramens robus'es. Quoique étiolée e'. remplie de sucs aqueux et innocens , la Laitue jouit cependant de propriétés narcotiques assez marquées. L'eau distillée de Laitue est souvent prescrite par les médecins dans les potions anodines et calmantes. La culture des Laitues demande quelques soins. Elles craignent le froid el veulent une terre meuble , chaude et amendée avec du terreau de couches. Afin de retarder le développement de la lige , et pour favoriser l'étiolcmeut des feuilles inté-

LAK

rieures , les jardiniers les serrent avec un lien de paille.

Parmi les autres espèces de Laitues qui croissent en France , on remarque le *Lactuca sylvestris* , De Caud. , Flor. Franc. , Plante qui vient dans les lieux incultes ainsi que le *Lactuca virosa* , et qui jouit comme celles-ci de propriétés narcotiques assez dangereuses. Le *Lactuca perennis*, L. , est une belle espèce à fleurs bleues ou violettes que l'on trouve dans les champs cultivés.

On a étendu le nom de Laitue, à des Plhnlcs qui n'en sont pas; ainsi l'on appelle quelquefois vulgairement :

Laitue d'Ane , les Cardères et divers Chardons.

Laitue d'Anguixes , les Ulves à exp'a'n'si dûs linéa iras , .1 in tçsiinalispar^ liculièremment dans certains étangs saumâlnes des salines de France.

Laitue de Brebis , les Mâches ou Valérianelles.

Laitue de Chèvre, les petites espèces d'Euphorbes ou Tithymales.

Laitue de Chien , le Chiendent ou le Pissenlit vulgaire.

Laitue de Cochon ou de Porc , l'Hypochéride fétide.

Laitue de Grenouilles, le Potamot crépu.

Laitue de Lièvké , le Lailron commun.

Laitue marine , les Ulves à expansions larges, et quelquefois les Euphorbes des rivages, ou la Criste, Crithmum.

Laitue de muraille , le Sisymbrium Irio , des Prenanthes et des Laitrons. (b)

* LAITUES, bot. piian. Adanson, dans ses Familles des Plantes , nommait ainsi la première des dix sections qu'il a établies dans les Synanthérées. Cette section correspond aux Chicoracées de Vaillant et de Jussieu. V. ce mot. (g..n.J

* LAK. bois. V. Elope.

* LAKHBY. bot. phan. V. Dattier.

LAM

* LAKINIA. bot. phan. Même chose que Babela au Bengale. V. Babela. (b.)

LAKTAK. mam. On ne sait quel est le Phoque du Kamtschatka , qui ne se pêche pas au-dessous du 56e degré , qui a plus de douze pieds de long , quipèse au moins huit cents livres, et que Kraschenninikow a mentionné sous ce nom. (b.)

* LALAN. bot. phan. (Rumph.j Marsden écrit Lallang. Syn. malais de *Saccliarum spicatum* et de *Rap/tis triuialis* , Lour. Espèce du genre Sucre, (b.)

LALÉ. bot. phan. Le *Fritillaria imperialis* , L., quand il fut introduit en Europe, était désigné chez les fleuristes flamands , suivant Daléchamp , par ce nom turc qui signifie aussi la Tulipe, (b.)

*LALE-VIBSIT.bot. phan. (Fiacourt.) Paraît être le Poivre blanc, fort commun à Madagascar. (b.)

* LALTA. bot. phan. (Rumph.) L'un des noms de pays du *Terminalia Catalpa*. (b.)

* LALLANG. bot. phan. (Marsden.) V. Lalan.

LALO. bot. phan. V. Baobab.

C'est aussi la même chose que V *Hibiscus esculentus* et que Calalou. V.

ce mot et Ketmie. (b.)

* LALONDA. bot. phan. (Flacourt.) Jasminée indéterminée de Madagascar, (b.)

LAMA. mam. Pour Llama. V. ce mot et Chameau.

" LAMA. rot. phan. La Plante épineuse de l'Inde et de l'Arabie qui produit du Mastic, mentionnée par Pline sous ce nom, ne peut être reconnue, (b.)

LAMAN. bot. phan. V. Brèdes.

*LAMANDA. rept. opu. Le grand Serpent de Java , brillant des plus riches couleurs , mentionné sous ce nom par Séba , paraît devoir être un Python. (b.)

LAM

LAMANTIN. Manatus. mam. Geuïre de Cétacés herbivores , caractérise [par l'existence de chaque côté et à chaque mâchoire de neuf molaires.

Les supérieures sont à peu près carrées , les inférieures un peu plus allongées; mais toutes ont leur couronne formée de deux collines transversales qui présentent trois mamelons ; en outre chaque dent a deux) petits talons, qui sont , à la mâchoire 'Supérieure , de grandeur à peu près égale , tandis qu'à l'inférieure, l'un d'eux, le postérieur, est très-considérable, le second venant au contraire à disparaître presque entièrement. Il n'y a ni incisives ni canines. Il reste, ce système de dentition varie beaucoup avec l'âge. Ainsi les mamelons, et ensuite les collines elles-mêmes , s'usent par la mastication , et il n'en existe plus de traces chez les individus avancés en âge. Les molaires antérieures viennent même à (Omber, et c'est, suivant Cuvier, à mesure que les postérieures acquièrent du développement. Ainsi beaucoup d'individus ont seulement deux molaires, ce qui explique le vu d'accord des zoologistes sur le nombre des dents

du Lamantin , et concilie très-bien beaucoup d'observations qui paraissaient contradictoires.

Test ainsi que Cuvier avait lui-même, dans son Règne Animal , caractérisé ce genre par l'existence de treize dents seulement. Un autre l'a dit

très-remarquable, et que l'analogie pouvait faire soupçonner, c'est que le Lamantin n'est pas, à toutes les périodes de sa vie, privé d'incisives. Suivant les observations de Blainville et de Cuvier, on en trouve deux petites l'une et à l'autre mâchoire. Les mémoires antérieurs , véritables nageoires , sa l'on découvre néanmoins sans peine

ce sous la peau qui les enveloppe , les cinq doigts composés chacun de trois phalanges, sont terminés par quelques ongles plats et arrondis, et qui ont ainsi une ressemblance grossière avec ceux de l'Homme. Ces ongles sont ordinairement au nombre de quatre , le pouce n'étant pas onguiculé.; mais

TOME IX

LAM 177

on en trouve fréquemment trois et même deux seulement, tandis que sur quelques individus il en existerait, au contraire, jusqu'à cinq. Les membres postérieurs du bassin paraissent manquer entièrement. C'est en vain que Daubenton en a cherché les vestiges dans un fœtus qu'il a disséqué; et aucun squelette ne le présente non plus, quoique l'analogie dut porter à croire qu'on les trouverait de même que chez le Dugong. Le corps, de forme oblongue, et qu'on a plusieurs fois comparé à une outre, est terminé par une queue plate , large, comme tronquée, et dont la forme

rappelle celle d'un éventail. La tête est terminée par un museau charnu, où l'on voit vers la partie supérieure, les narines très petites et dirigées en avant. La lèvre supérieure, ébancée à sa partie médiane, est garnie de poils roides et assez abondants. L'œil est très-petit; il n'y a point de conque auditive, et le trou auriculaire ne s'aperçoit que difficilement; la langue est étroite et assez petite. Les mamelles sont pectorales, et d'ordinairement peu visibles:

elles deviennent, au contraire, très-proéminentes au temps de la gestation et de l'allaitement. Buffon avait «lit, on ne sait trop sur quel fondement, que la vulve n'est pas située:

comme dans les autres Animaux au-dessous, mais au-dessus de l'anus.

Mais Cuvier a constaté qu'il n'y a à cet égard aucune anomalie. Quant à l'organisation intérieure, tout l'appareil digestif est bien celui d'un Herbivore; les intestins sont boursoufflés, et l'estomac est divisé en deux parties et en deux petites poches aveugles.

Enfin les dents sont, comme on a pu le voir par notre description, tout-à-fait appropriées au régime végétal, et tellement, qu'elles sont presque entièrement semblables à celles de certains Pachydermes. Le col n'a que six vertèbres, comme l'a dit Uaubenton, et encore ces vertèbres sont-elles très-courtes. Il y a seize paires de côtes; mais deux seulement s'unissent au sternum.

i?8 LA. M

Les mœurs des Lamantins ne sont pas moins curieuses que leur organisation. Ces êtres mitoyens, placés au-delà des limites de chaque classe, suivant l'expression de Buffon, ne sont point

encore, comme les Dauphins et les Baleines, des Animaux véritablement marins. On ne les trouve pas dans la haute mer, mais seulement au voisinage des îles et des côtes, et vers l'embouchure des fleuves, où ils remontent même quelquefois jusqu'à des distances considérables. La plupart des voyageurs affirment qu'ils restent constamment dans l'eau : il paraît cependant qu'ils viennent à bout de se traîner à terre. Ils vont ordinairement en troupes , serrés les uns contre les autres, les jeunes étant placés au milieu. Ils n'ont aucune défiance , du moins dans les contrées où ils n'ont point encore appris à redouter la puissance de l'Homme. Ils se laissent approcher, toucher même sans aucune crainte, levant la tête hors de l'eau , et il faut , dit-ott , les frapper très-rudement pour qu'ils prennent le parti de s'éloigner. La chair de ces Animaux ressemble, suivant plusieurs voyageurs , à celle du Bœuf, suivant d'autres à celle du Veau; leur graisse est pareillement très-bonne. Aussi la pêche du Lamantin se fait-elle très-fréquemment.

« Pour le prendre , dit un voyageur qui a vu cette pêche sur les côtes de Saint-Domingue , on tâche de s'en approcher sur une nacelle ou un radeau , et on lui lance une grosse flèche attachée à un très-long coi'deau ; dès qu'il se sent frappé, il s'enfuit, et emporte avec lui la flèche et le cordeau à l'extrémité duquel on a soin d'attacher un gros morceau de lic'ge ou de bois léger pour servir de bouée et de renseignement. Lorsque l'Animal a perdu par cette blessure son sang et ses forces, il gagne la terre; alors on reprend l'extrémité du cordeau ; on le roule jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques brasses; et à l'aide de la vague on tire peu à peu l'Animal vers le bord , ou bien on achève de le tuer dans

l'eau à coups de lance. » L'attachement de ces Animaux pour leurs compagnons fournit alors un spectacle touchant; ils cherchent à délivrer le blessé du harpon , et on en a vu souvent suivre constamment le cadavre de leur mère ou de leur femelle , pendant qu'on le traînait vers le rivage.

On conçoit combien la pêche de ces Animaux est rendue facile par leur peu de défiance. Aussi les pêcheurs exerces peuvent-ils en un jour se procurer un très-grand nombre d'individus.

L'intelligence du Lamantin , son instinct social et doux , font avec ses formes grossières un contraste véritablement bien remarquable, et qui a frappé tous ceux qui lui ont donné quelque attention. «Ces Animaux, a dit Buflbn , quoique informes à l'extérieur , sont à l'intérieur très-bien organisés , et si l'on peut juger de la perfection d'organisation par le résultat du sentiment ,cfs Animaux seront peut-être plus parfaits que les autres à l'intérieur. » Au reste les voyageurs , toujours amis du merveilleux, ont encore exagéré l'intelligence déjà si étonnante du Lamantin , sans doute pour avoir cru trop facilement à de faux récits ; mais d'autres ont encore été plus loin. En se rappelant tout ce qu'on a débité sur l'existence des Hommes marins , en songeant au nombre de ceux qui ont dit avoir vu de ces êtres merveilleux ,à la manière pleine d'assurance, au ton de vérité dont ils le soutiennent, il est difficile de se persuader que le seul désir de tromper ait donné naissance à toutes leurs assertions.

Demaillet, dans le but de prouver l'origine aquatique de l'espèce humaine , a particulièrement dans son ouvrage intitulé Tel-Liamed , rassemblé un grand nombre de témoignages attestant la vérité de semblables récits. Il est bien prouvé maintenant que ces fables ont leur source, quelques-unes dans de coupables super-

cheries, mais la plupart dans quelques ressemblances grossières de l'Homme avec les Lamantins et avec

LAM

.certaines espèces voisines , comme le Dugong. Les longs poils de la lèvre supérieure, qui de loin pouvaient être pris pour des cheveux; la forme des ongles; surtout les mamelles situées sur la poitrine , et à peu près arrondies comme chez la Femme ; l'habitude qu'ont ces Animaux d'élever hors de l'eau la partie antérieure de leur corps; sans doute aussi leur peu de défiance, leur douceur , leur intelligence, ont suffi pour faire attribuer les formes humaines à des Animaux si peu semblables à l'Homme; confusion qui peut paraître bien étonnante , mais qui n'en est pas moins certaine (V. Cuvier , Oss. Foss. T.

iv). Qu'on lise la description d'un de ces Hommes marins, quelle que soit la manière dont on ail exagéré les ressemblances , on retrouvera

f>resque toujours, avec de l'attention, es caractères d'un Lamantin ou d'un Dugong. Au reste, et nous faisons cette remarque sans chercher à excuser une erreur aussi grossière , prenant ces Animaux pour de véritables Poissons à cause de leur séjour habituel dans la mer, on ne pouvait manquer d'être vivement surpris de leur voir des poils , des ongles , des mamelles ; et si l'Homme les éleva jusqu'à lui, c'est surtout parce qu'il les voyait sortir ainsi des limites de leur classe. Le nom de Poisson-Femme, donné en plusieurs lieux au Lamantin , prouve la vérité de cette remarque. Le nom de Lamantin lui-même tire peut-être sa source de la même origine : ce mot est dérivé par corruption , comme l'a montré liuffon , I du nom de Manati ou Manatc que les

■ Galibis et les Caraïbes, habitants de la Guiane et des Antilles, donnaient dans leur langue au Lamantin d'Amérique. De ce nom, en y réunissant l'article, les îles

françaises d'Amérique ont fait Larnas-

■ nati, puis Lamanti. Quant au nom de Manali lui-même, il paraît avoir été emprunté des Espagnols, et d'origine né au Lamantin, à cause de ses ouïsses qui donnent à la terminaison de ses nageoires quelque ressemblance

LAM 17g

avec une main, ressemblance qui a dû nécessairement paraître fort singulière chez un Animal que l'on considérerait comme un Poisson. Les noms de Bœuf, de Vache et de Veau marins ont aussi été donnés en divers lieux au Lamantin, de même qu'au Dugong.

Nous pensons que ces dénominations doivent tenir à la remarque qu'on aura faite de quelques ressemblances grossières dans les formes plutôt qu'à la similitude du régime entre ces Kuminans et le Lamantin. En effet, à moins que le genre de nourriture d'un Animal ne présente quelque singularité, le vulgaire le remarque à peine, et, au contraire, tout ce qui frappe ses yeux ne manque pas de fixer son attention. Il est bien certain d'ailleurs que quelques peuples ont trouvé de la ressemblance entre la tête du Bœuf et celle du Lamantin, et même au point d'avoir attribué à l'un des cornes semblables à celles de l'autre. On sait enfin, d'un autre côté, que les Phoques, Animaux carnassiers, ont aussi, et même beaucoup plus généralement, reçu les mêmes noms.

On a beaucoup hésité sur la place

que doivent occuper les Lamantins dans la série animale. Presque tous les zoologistes sont seulement tombés d'accord sur un point, sur la nécessité de la réunion du Lamantin et du Morse , quoique celui-ci soit quadrupède et carnassier. Ce rapprochement , contraire à tous les rapports naturels , semblait si heureux , et on était tellement persuadé de sa justesse, que Rai, plaçant le Morse parmi les Carnassiers , à la suite des Chiens , crut devoir y placer aussi le Lamantin; que Klein alla jusqu'à affirmer qu'on devait s'être trompé en refusant à ce Cétacé des pieds de derrière ; et que tous les auteurs systématiques, et Linné lui-même, dans quelques-unes des éditions de son *Systema Naturæ*. placèrent ensemble, dans un même genre , le Lamantin, le Dugong et le Morse. Lacépède fut le premier qui sépara enfin ces trois Animaux , dont il fit avec juste raison

i80 LAM

des genres particuliers, et Cuvier, adoptant les trois genres Morse , Dugong et Lamantin de Lacépède , en établit en outre , sous le nom de *Stellère*, un quatrième comprenant l'Animal de Steller d'abord confondu aussi avec les Lamantins. De cette manière, le genre Lamantin reste composé de deux espèces seulement dont l'une habite l'Amérique méridionale , et la seconde l'Afrique.

Le Lamantin d' Amérique, Cuv., *Manatus americanus* , Desnar. ; le grand Lamantin des Antilles, Buff.; le Manate de quelques auteurs. Cuvier a fait connaître avec détail l'ostéologie de cette espèce dans son grand ouvrage sur les Ossements Fossiles. Elle se trouve répandue dans une partie du littoral de l'Amérique méridionale ; elle a quelquefois plus de vingt pieds de

longueur, et pèse huit, milliers. Il y a un peu moins du quart de la longueur totale entre l'insertion des nageoires et le museau.

Toute la peau est grise, légèrement chagrinée ; quelques poils isolés se voient en divers points, et surtout vers la commissure des lèvres et à la face palmaire des nageoires où ils sont un peu plus abondans.

Le Lamantin du Sénégal, Adans., *Manatus Scnegalensis* , Desmar. Cette espèce se trouve dans presque toutes les rivières de la côte occidentale d'Afrique. La plupart des caractères qui lui ont été attribués appartiennent également au Lamantin. d'Amérique , ou sont erronés. Adanson seul nous a donné une description exacte dont nous extrairons les détails suivans : la longueur du Lamantin du Sénégal n'excède pas huit pieds , et son poids huit cents livres ; sa couleur est cendrée-noire; l'iris est d'un bleu foncé , et la prunelle noire. Les femelles ont deux mamelles plutôt elliptiques que rondes , placées pires de l'aisselle; la peau est un cuir épais de six lignes sous le ventre , de neuf sur le dos et d'un pouce et demi sur la tête. Les nègres Oualofcs ou Yolofofs appellent cet Animal Lereou.

Cuvier a trouvé d'autres caractères

LAM

dans la tête osseuse moins allongée à proportion de sa largeur que dans le Lamantin d'Amérique, dans la fosse nasale plus large; les orbites plus écartées ; les fosses temporales plus larges et plus courtes; les apophyses zygomatiques du temporal beaucoup plus renflées ; enfin dans la partie antérieure de la mâchoire, courbée, et non droite comme dans l'autre espèce.

On n'a point encore bien distingué d'autres espèces de Lamantins. Cependant deux crânes récemment trouvés sur les côtes de la Floride orientale , et décrits (Journ. Ac. Sc. Nat.

Philadelphie , vol. 5 ; et Fauv. Améric.) par Harlan , sembleraient indiquer une nouvelle espèce , que ce zoologiste propose de nommer *Manatus latirostris* , dans le cas où son existence se trouverait confirmée ultérieurement. Quant au grand Lamantin de la mer des Indes , de Buffon , il n'est autre que le Dugong ; son Lamantin du Kamlschanka est le Stellère; et, suivant Cuvier, son petit Lamantin d'Amérique ne serait qu'un double emploi du grand Lamantin des Antilles.

Lamantins fossiles. Des ossements fossiles de Lamantins se trouvent répandus en assez grande abondance sur divers points de la France.

Renou , professeur d'histoire naturelle à Angers , en a particulièrement découvert un grand nombre dans le département de Maine-et-Loire, dans les couches de Calcaire coquillier situées près de la rivière de Layon. Ordinairement mutilés, et quelquefois même un peu roulés , ces ossements ont été trouvés avec d'autres débris d'Animaux marins, de Phoques et de Cétacés. Ils consistent en des fragmens de membres, de vertèbres, de côtes et de tête. Cuvier, qui les a décrits et figurés dans son ouvrage sur les Ossements Fossiles, ou il démontre qu'ils appartiennent à un Lamantin différent des espèces aujourd'hui connues , a fait connaître aussi plusieurs autres fragmens trouvés aux environs de Bordeaux ,

d'Étampes , de Mantes , à l'île d'Aix i et dans quelques autres localités :

I lui-même en a découvert quelquesuns à 1 .1 m v. juin eau « 11 est doue bien certain, dit Cuvier en terminant l'important Mémoire auquel nous avons emprunté ces détails sur les Lamantins fossiles, qu'un Animal du genre des Lamantins, genre aujourd'hui propre à la zone lorrarde , habitait l'ancienne mer qui a couvert l'Europe de ses coquillages à une époque postérieure à la formation de la craie, mais antérieure à celle où se sont déposés nos Gypses, et oii vivaient sur notre sol les Paléothéi iums elles génies leurs contemporains.»

(is. o. st. -H.) LAMARCKEA. dot. ni an. Le professeur Richard , dans les Actes de la Société d'Histoire Naturelle de Paris, lit en l'honneur du célèbre auteur de la Flore Française, de l'Histoire des Animaux sans vei tères , etc., un genre de Solanées qu'il nomma Marckea. C'est le même genre que Persoon et Poirer appellent Lamaixkea. y. Makckea. D'un autre côté, le professeur Kceker, séparant te Cynosurus aureus des autres espèces du même genre , en a fait un genre nouveau sous le nom de La/narckea ; mais ce genre a été nommé (.hrysurus purPersoon. (a. h.)

LAMARKIA. bot.ciiypt. {Hydrophytes.) Le génie formé sous ce nom par Olivi, est devenu le Spungudiurn de Lamouroux. V. ce mot. (jj.)

LAM BARDE, rois. (Risso.) Le Squalé Roussette à Nice. (b.)

LAMBDA, ins. Ce nom d'une lettre grecque a été imposé à une Noctuelle sur les ailes de laquelle on en reconnaît la ligure dans deux taches noires. (n.)

L A M B E R T I E. *Lambertia*. bot.

khan. Genre de la famille des Protéacées et de la Tétrandrie Monogynic , L. , établi par Smi'li et aujourd'hui adopté par tous les botanistes modernes. 11 se compose de jolis Arbustes à rameaux verticillés , portant

LAM 181

des feuilles alternes , le plus souvent très - entières ; des fleurs réunies' en capitules terminaux solitaires , composés de sept fleurs , environnés d'un involucre dont les folioles sont colorées. Chaque fleur est composée d'un calice tubuleux , à quatre divisions recourbées et tordues en spirale, portant chacune une étamine. L'ovaire est environné de quatre écailles hypogynes, distinctes ou soudées en une petite gaine. Cet ovaire est à une seule loge et contient deux ovules ; le stigmate est allongé , subulé. Le fruit est un follicule uniloculaire, coriace et presque ligneux , cunéiforme et quelquefois terminé par deux pointes à son sommet ; il contient deux graines membraneuses sur les bords. Toutes les espèces de *Lambertia* croissent à la Nouvelle-Hollande. Plusieurs sont cultivées dans les jardins; telle est surtout la suivante :

Lambertia élégante, *Lambertia* ' *elegans* , Smith, Lin, Traus. , 4, p.

ai4, t. 30. Cette jolie espèce est originaire de la côte orientale de la Nouvelle-Hollande; elle croît aux environs de Port-Jackson , dans les lieux découverts et rocailleux. Elle peut s'élever à la hauteur de cinq à six pieds; ses rameaux sont courts, ordinairement ternés , ainsi que ses feuilles qui sont étroites , allongées , cuspidées au sommet, coriaces, persistantes, très- entières ,

glabres et luisantes à leur face supérieure , tomenteuses et ferrugineuses inférieuremeut , à bords rélléchis. Les fleurs sont rouges , réunies au nombre de sept dans un involucre écailleux et imbriqué. Le fruit est cunéiforme et terminé par deux cornes écartées l'une de l'autre. Cette espèce fleurit en général au mois d'avril. On la cultive en terre de Bruyère ; elle doit être abritée dans 1 orangerie.

Elle se multiplie facilement de boutures.

Une autre espèce de ce genre est remarquable par ses involucre constamment unilobes. Rob. Brown l'a nommée pour cette raison *Lamberti a utijlora*. (a. h.)

isj LAM

LAMBICHE. ois. Syn. vulgaire de la Guignette dans les Vosges et sur les bords de la Moselle. V. Chevalier. (dr..z.)

LAMBIN. MAM. L'un des noms vulgaires du Paresseux. V. Bradype.

LAMBIS. moll. Nom sous lequel les marchands désignent particulièrement une espèce de Ptérocère , *Plerocera Lambis* de Lamarckj ils donnent aussi le nom de Lambis de la grande espèce au *Strombus latissirrus* , Lin., de Lambis ailé de la moyenne espèce au *Strombus Gigas* , Lin., de Lambis marbré au *Strombus lentiginosus* , L. , et enfin de Lambis NON AIEÉ DE EA GRANDE ESPECE

au *St/ombus lucifer*, L. (d..h.)

LAMBRUS et LAM BRUSQUES .

bot PHAN. De Lambrusca, par corruption de Labrusca. Noms vulgaires , dans certains cantons du Midi, de la Yigne sauvage. • (b.)

* LAME PROLIGÈRE. *Lamina proligera*. bot. crypt. (Lichens.) Acharius, en donnant le nom de *Lame proligère* à un organe mince , coloré, caduc par vétuséj lisse, que l'on observe dans les apothécions scu- (elloïdes, dont il forme le disque, a semblé croire qu'il remplissait dans les Lichens le rôle que le placenta remplit dans les Phanérogames. Quoiqu'il ne soit pas prouvé que la *Lame proligère* renferme exclusivement les gongyles reproducteurs, il est certain néanmoins que la nature a pris un soin extrême de sa conservation. Nos observations particulières nous ont prouvé, contre l'opinion d' Acharius, que la *Lame proligère* n'était pas seulement dans les fruits scutcllés , mais qu'elle pouvait s'observer aussi dans les apothécions de tous les genres de Lichens sous des formes trèsvariées. Elle est nue dans les Lécidées, les Opégraphes et les Gyrophores , entourée et défendue des chocs extérieurs par un périthécion dans les Verrucariées , et par une marge dans les Lécanores , les Parmélics , etc.

LAM

Elle constitue quelquefois l'apothécion tout entier comme dans les Entographes, les Hélié ographes , les Opégrnphes et les Lécidées , mais elle n'en fait qu'une partie dans la plupart des autres genres. Cet organe serait, suivant nous, une sorte d'ovaire stérile , la nature n'ayant pu atteindre son but entièrement, et les hommes qui étudient les êtres organisés savent très-bien que la nature a ses ébauches. Ce qui fortifie cette assertion, c'est que les autres parties de la Plante paraissent en être dépendantes et avoir pour fonction principale, celle de concourir à sa conserva-

tion. Le thalle la reçoit dans la jeunesse et la préserve de tout frottement ; la marge des sculelles , le périthécion des Verrucaires, ne paraissent pas avoir d'autre rôle que celui d'empêcher les chocs extérieurs , et l'on remarque que cet organe , renfermé quelquefois dans une double enveloppe, va toujours chercher la lumière en déterminant dans l'apothécion une dilatation plus ou moins complète. Acharius ne reconnaît de *Lame* proligère que quand cette dilatation est complète , comme cela a lieu dans les fruits sculellés ou patellulés; tel n'est point notre avis.

On peut regarder l'apothécion d'une *Pyrénule*, par exemple, comme une scutelle non déhiscente, et en effet, supposez que la nature en dilate le sommet, alors le périthécion devient le corps de la scutelle et le *nucleum* de la *Lame* proligère; il en est de même pour tous les genres à apothécion globuleux , et cette théorie peut aussi s'appliquer aux fructifications linéaires. On conçoit, d'après cette explication, que le nom de *Lame* proligère n'est plus convenable; nous attendons pour le changer que de nouvelles observations aient confirmé et fortifié notre opinion. La *Lame* proligère existe dans tous les apothécions scutelloïdes verruculeux , et dans notre genre *Plectocarpon* qui appartient à notre groupe des *Parmélies*, ordre des *Sliclées*. V. *Nucleum* et *Plectocarpon*. («A» F.)

LA M

LAMELLE. *Lamella.* bot. On donne particulièrement ce nom aux appendices pétaloïdes qui naissent sur certaines corolles : par exemple , dans le *Laurier-Rose* , les *Lychuides*, plusieurs *Boraginées* , etc. .

Le mot à&Lamulla est aussi employé par les auteurs de Mycologie , pour designer la partie des Champignons qu'on a nommée en fiançais feuillet, parce qu'elle y est disposée comme les feuillets d'un livre. F. Feuillet et Agaric. (g..n.)

LAMELLIBRANCHES. moll.

C'est à Blainville que l'on doit la création de cette nouvelle dénomination pour rassembler en une seule division tous les Animaux mollusques, dont les branchies par patres trèslarges et en lnmcs aplaties , sont placées entre le corps et le manteau; presque tous les Concbifères ou Coquilles bivalves doivent rentrer dans cette division dont nous reparlerons à l'article Mollusque auquel nous renvoyons. (B..H.)

LAMELLICORNES. Lamellicôïnes. INS. Dernière famille de l'ordre des Coléoptères, section des l'en tanières. C est une de celles qui renferment les Insectes lesplus nombreux et les plus grands , et le trait eutomologiqlie le plus saillant qui la distingue des autres est d'avoir les antennes terminées en une massue , soit feuilletée , c'est-à-dire composée d'articles en forme de lames disposées en éventail ou à la manière des feuillets d'un livre, s'ouvrant et se fermant de même; soit eu peigne et dont les feuillets sont perpendiculaires à l'axe, ou bien composées d'articles cupulaires et emboîtés ; le premier ou l'inférieur de la massue étant en forme d'entonnoir, tronqué obliquement et renfermant conceutriquement les autres.

La tête des Lamellicornes se prolonge en avant, cl cette partie avancée est ce qu'on appelle Chaperon ; plusieurs des Insectes que cette famille comprend sont remarquables parleur taille, les éminenecs en forme de cornes, de tubercules, que pré-

LAM

sentent, dans les mâles, la tête, le corselet, ou ces deux parties simultanément; leur corps est, en général, ovale ou ovoïde; les antennes s'ordinairement composées de neuf à dix articles, et insérées dans une cavité sous les bords de la tête ; les yeux s'étendent plus en dessous qu'en dessus, ils sont peu saillans; la bouche varie , mais la lèvre est le plus souvent couverte par le menton qui est grand et corné; les deux premières jambes , et souvent d'autres , sont dentées au côté extérieur et propres à fouir; les articles des tarsi sont toujours entiers. Les Lamellicornes se nourrissent , soit de matières végétales décomposées , comme les fientes, le fumier, le tan, etc., soit de feuilles et de racines des Végétaux , soit même du miel des fleurs ou des liqueurs exsudées par les Arbres; ceux qui vivent de matières végétales altérées ont presque tous une teinte noire ou brune ; quelques-uns sont même nocturnes; les autres recherchent la lumière; ils sont ornés de couleurs métalliques ou variées, et très-agréables. Leur démarche est en général lourde et leur vol souvent étourdi comme celui des Hanneçons.

Le canal alimentaire des Lamellicornes se compose en général d'un œsophage très-court qui se dilate aussitôt en un jabot de formes très-variées suivant les genres ; d'un ventricule cœlif plus ou moins long, ayant quelquefois sur toute sa surface des papilles conoïdes ou claviformes, ou des traces de plis, et étant toujours replié sur lui-même un nombre de fois plus ou moins grand , suivant sa longueur relativement à celle de l'Animal entier. 11 donne toujours attache à quatre vaisseaux hépatiques de longueur très-variables, et il finit par un intestin grêle, filiforme et terminé par un coecum plus ou moins distinct. Les larves des

Lamellicornes ont un es- Jomac cylindrique, entouré de trois rangées de petits cœcums; un intestin grêle très-court; un colon énormément gros , boursoutHé, et un ree-

i34 LÂM

tum médiocre. Les trachées de l'Insecte parfait sont presque vésiculaires.

Les larves des Insectes de cette famille se ressemblent presque toutes.

Leur corps est long , prer-quo demicylindrique, ch'afn'u j mou et ride; il est blanchâtre , divisé en douze anneaux , et l i tête est écailleuse et munie de foi les mandibules. Ces larves ont six pieds écailleux bruns ou ronssâtres : de chaque coté du corps on voit neuf stigmates^ l'extrémilé postérieure du corps de ces larves est courbée en dessous , plus épaisse , et de couleur bleuâtre ; elles se tiennent cachées dans la terre ou dans le tan des Arbres; et ces dernières se nourrissent de cette matière ou du terreau ; d'autres vivent d'ex crâniens-et. de fumier; un grand nombre se nourrit des racines de divers "Végétaux , et nous est quelquefois très-nuisible en attaquant ceux que nous cultivons et employons, ou en les déracinant. Ces larves se font toutes, dans leur séjour, une coque ovoïde avec la terre ou les débris des matières qui leur ont servi de nourriture , et qu'elles lient ensemble avec une matière glutineuse qu'elles font sortir de leur corps. Quelques-unes de ces larves ne se changent en nymphes qu'au bout de trois ou quatre ans.

Dans le Généra Crtist. et Ins. de La treille , ces Insectes formaient plusieurs familles ; dans ses Familles Naturelles du Règne Animal , ce savant auteur a divisé les Lamellicornes en deux tri-

bus. Ce sont, les Scarabéides qui répondent aux Lamellicornes ou Pétaloceres de Duméril, et les Lucaïdes ou Serricornes Priocères du même. /""". Scarabéides et Lucanides. (G.)

* LAMELLINE. Lamellina. inf.

Nous proposerons sous ce nom significatif de sa figure un genre de Microscopiques, dans l'ordre des Gymnorlés ; il se compose d'Animaux invisibles à l'œil nu, dont les caractères consistent' dans l'aplatissement

LA M

dn corps qui est homogène, plus ou moins approchant de la forme d'un cari é long,' tronqué aux deux extrémités , de manière à présenter quatre angles droits. Ce seraient de véritables Bacillaires, s'ils n'étaient pas beaucoup plus larges et membraneux, et si des mouvemens sinueux sur la longueur n'y indiquaient une reptation sensible. Le Monas Lamellula, Miill., Inf., p. 7, tab. 1 , f: ib, 17, Ericycl. Vers Œil: , pl. 1 , fig. 8, fait partie de ce genre, ainsi que les deux êtres singuliers représentés par Johlot, part, a, p. 55, f. 2, M. etc., p. 18, pl. 5, fig. 11. 1,. Tous vivent dans les infusions végétales; ou dirait de petites lair.es de verre vivantes; la première se trouve aussi dans l'eau de mer gardée. Le Gamium pulvinatum de Miiller appartient aussi à ce genre. (b.)

LAMELLIROSTRES.ois.(Cuvier.) Famille d'Oiseaux qui renferme la plupart des Palmipèdes , et dont le caractère principal consiste en un bec épais, revêtu d'une peau molle plutôt que d'une corne. (DR..Z.)

LAMELLOSODENTATI. ois. (Illiger.)Syn. de Lamellirostres. V. ce mot. ■ (b.)

LAMENTIN. mam. Pour Lamantin. F~. ce mot. (B.)

LAMEO. pots. (Risso.) Le Requin à Nice. y. Squalé, (b.)

* LAMIAIRES. Lamiariœ. ins.

Tribu de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères , famille des Longicornes , établie par Latreille (Fam.

Natur. du Règn. Anim.), et ayant pour caractères : dernier article des palpes ovalaire et rétréci en pointe vers le bout; tête verticale.

Cette tribu renferme les genres Acrocinc , Acanthocine , Lamie , Pogonochère , Monochance, Tétraope, Parmène, Dorcadion et Saperde. F*\ ces mots et Lamie. Le genre Gnoma de Fabricius est une réuunion de Lamies , de Saperdes et de Callidies à corselet plus long et cylindrique.

LAM

LAMIASTRUM. bot. phan. (Heisler.) Syn. de Galeopsis Galeobdolon , L. V. Galéopside. (b.)

LAMIE. Lamia. pois. Espèce du genre Squalé , devenue lype de l'un des sous-geures établis par Guvier.

/^.Squalé. (b.)

LAMIE. Lamia. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères , famille des Longicornes, tribu des Lamiaries, établi par Fabricius aux dépens du grand genre Cerambyx de Linné. Ce genre a été partagé depuis Fabricius en plusieurs sous-genres basés sur des caractères très-secondaires et tirés pour la plupart de la forme et des proportions du corps. Latreille , dans tous

ses ouvrages , s'était servi de ces genres pour établir des divisions dans les *La mi es* de Fabricius. Ce n'est que dans ces derniers temps (*Familles Natur.*, du Règn. Aniin.) qu'il a adopté quelques-uns des nombreux genres formés par Thunberg, Megerle et Schonherr; mais comme son ouvrage (*loc. cit.*) ne présente que les caractères des familles , qu'il ne fait u'énumérer les genres qui entrent ans chacune d'elles, et que la plupart des auteurs qui les oui établis ne l'ont fait que dans leurs collections , nous les considérerons comme n'étant point encore publiés et nous ne les présenterons que comme divisions du genre *Lamie*.' Les caractères essentiels du genre *Lamie* , dans toute l'extension que nous lui donnons ici, sont : labre très-apparent, s'avancant entre les mandibules; palpes filiformes, terminés par un article ovalaire ou presque cylindrique; antennes quelquefois sélacées, quelquefois compo-ées d'articles très-courts , presque grenus , avec la base environnée par les yeux qui sont allongés en forme de reins; tête verticale; corselet épineux ou rugueux, plus ou moins long; corps cylindrique dans quelquesuns , aplati dans d'autres. Ces Insectes se distinguent des *Prioues* par la forme du labre qui est très-petit

LAM i85

et peu apparent dans ceux-ci ; ils s'éloignent des *Callichromes* et des *Cerambyx* par leur tête qui est verticale tandis qu'elle est penchée en avant dans ceux-ci , et que le dernier article de leurs palpes est plus grand et en forme de cône renversé.

Ces Insectes avaient été placés par Linné avec les *Cerambyx*; les caractères que Fabricius leur a assignés en lesenséparant, neles distinguent presque pas du genre précédent .ainsi que de ceux des *Saperdes* et des *Gnomes* qu'il a aussi établis. Tous ces

Coléoptères ont la languette en forme de cœur, avec une échancrure plus ou moins profonde au milieu du bord supérieur. Les mâchoires sont pareillement terminées par deux lobes dont l'intérieur plus petit, en forme de dent. Le tube digestif des Lamies a bien plus d'étendue que dans les autres Longicornes. Léon Dufour (Ann. des Scienc. Natur. T. iv, p.

112, pl. 6, fig. 3) dit qu'il a quatre fois la longueur de l'Insecte (*Lamia Textor*) ; il n'a pas trouvé de jabot distinct de l'œsophage qui atteint à peine le commencement du corselet ; le ventricule chylifique en est séparé par un bourrelet prononcé, siège d'une valvule ; il égale en longueur la moitié de tout le tube alimentaire ; il est cylindroïde et se replie en deux grandes circonvolutions maintenues par des brides trachéennes excessivement multipliées ; sa surface externe est couverte de points papilliformes que la loupe rend à peine sensibles et dont la saillie varie suivant le degré de contraction de l'organe ; l'intestin grêle est filiforme ; il se renfle en un cœcum allongé ; le rectum, distinct de ce dernier par une contracture valvulaire, est long dans la femelle et renfermé dans un étui qui lui est commun avec l'oviducte ; il est coudé à son origine, et ce coude est maintenu par deux brides musculaires distinctes, destinées sans doute à faciliter ou à régler ses mouvemens lorsque l'oviducte s'allonge pour la ponte.

Les Lamies font entendre, comme tous les Longicornes, un bruit aigu

» 86 LAM produit par le frottement des parois intérieures du corselet contre la base du mésolhorax. Les larves de la plupart des espèces vivent dans le bois à la manière de celles des autres Longicornes ; c'est là, et surtout dans les chantiers, que l'on trouve l'Insecte parfait. Quelques espèces, qui composent le

genre Dorcadion , se tiennent constamment à terre, et Latreille pense que leurs larves vivent dans les racines de divers Végétaux.

Ce genre est très-nombreux en espèces; elles sont répandues dans toutes les parties du monde , et surtout dans les pays boisés , entre les tropiques.

L'Amérique méridionale en fournit beaucoup à corps aplati; ceux qui ont le corps plus ou moins cylindrique appartiennent à l'ancien continent.

I. Corselet ayant de chaque côté un gros tubercule mobile, enfoncé et terminé par une épine; corps toujours très-aplati , avec les antennes très-greles , fort longues , et les deux pieds antérieurs ordinairement très-allongés.

Genre : Acrocine. V. ce mot.

II. Corselet sans tubercules mo

biles.

f Corps très-aplati , deux fois au moins plus large que haut.

Genre : AcanthociNe.

Lamie Charpentier , Lamia (Edilis , Fabr.; jl canthocinus (Edilis, Oliv. , ibid., pl. 9, fig. 5g, A, B, c , d. Cette espèce a le corps d'un gris cendré , avec des points et deux bandes transverses brunes sur les étuis , et quatre petites taches jaunes disposées en une ligne transverse sur le corselet. Il est commun dans le nord de l'Europe, et se trouve rarement en France.

ff Corps non déprimé , à peu près aussi haut que large; longueur totale ne surpassait point trois fois la largeur; élytres beaucoup plus larges à leur base que le corselet et diminuant vers leur extrémité; pâtes for-

LAM

tes ; antennes au moins aussi longues que le corps.

Genre : La.mie , Lamia , Fabr.,

Lamie triste , /,. tristis, C. tristis, Oliv., ibid. , pl. 9 , f. 62. Elle a un peu plus d'un pouce de long ; son corps est noir , avec une légère leiule cendrée ; les élytres sont grises, cliariuées , avec deux taches très-granes , noires sur chaque. On la trouve dans le midi de la f rance et en Autriche sur le Cypprès. Le genre Pogonochère (Pogonoc/iert/s , Meg.) ne se distingue pas des Lamies par des caractères assez tranchés ; l'espèce qui lui sert de type est la Lamia àispida, Cerambys hispidus, Fabr . , Vogonocherus hispidus , Meg.

fff Corps non déprimé; longueur totale ayant au moins quatre fois la largeur du corps ; élytres presque aussi larges à leur extrémité qu'à leur base; pales grêles, beaucoup plus minces que celles des Lamies.

Genre : MoitoCHA.yLE(JHonoc/iamus, Meg.).

Lamie Cordonnier , L. Su/or, Oliv. , ibid. , pl. 3 , fig. 20 , a , b , c ; Monochamits S//tor,Meg. Longue de près d'un pouce ; élytres parsemées d'un grand nombre de petites taches d'un gris jaunâtre formées par un duvet. Elle se trouve communément, en Suisse.

f fff Corps de même que dans la division précédente ; cliaque-
ceil divisé en deux par la base des antennes ,de sorte que l'Insecte
semble en avoir quatre.

Genre : Tétraope (*Tetraopes* , Sch.).

Lamie Tornator , L. Tomator, Fabr. ; *Tetraopes Tornator*, Sch.
; *Ceramb. Tornator* , Oliv. , *Entom.*, 4, 67, p. 100, 158, t. 8 , f. 5a;
Cer. tetropthalmus, Forst. Elle est longue de quatre lignes, rouge
avec quatre points noirs sur le corselet et autant sur chaque
élytre , les pâtes et les antennes sont noires. Elle se trouve dans
l'Amérique du nord.

f f-j-ff Abdomen ovale; antennes plus courtes que le corps.

LAM

Genres : *V. n. MÉKE*(*Parmcna*, Meg.) (et *Dorcadion* (*Dorca-*
clion , Sch.).

Nous ne connaissons pas les caractères qui distinguent le
genre *Parmcna* élu genre *Dorcadion*. L'espèce (qui sert de type
au premier est la *Lal mia fasciata* de Villers, et parmi les *i Dorca-*
dions , celui qui est le plus (Commun en France est :

La Lamie fuligineuse, *Lfuligi- I nator* ,Fabr., Latr. ; *Cer.fuli-*
guator , 1 Oliv. , *ibid.* , pl. 4 , f. 21 , a , b , c, d ; . *Dorcadion fuligi-*
nator, Sch. — Noir ;avec la tête et le corselet chagrinés et les
cintres cendrées. Cette dernière i couleur passe au brun dans une
variété qui habite les lieux élevés ; alors «chaque élytre offre
deux lignes blanches longitudinales. Cette espèce i est com-
mune aux environs de Paris.

Quoique le genre *Saperde* ne soit pas très-bien caractérisé, on l'a conservé. V. ce mot. (g.)

LAMIER. *Lamium*. bot. puant.

Genre de la famille des Labiées et de la Didynamic Gymnospermie , établi par Linné et ainsi caractérisé : calice tubuleux à dix stries, à cinq dents inégales et très-aiguës; corolle dont le tube est long , évasé à son orifice , la lèvre supérieure entière , en forme de voûte , et recouvrant les étamines , la lèvre inférieure à trois lobes , deux latéraux plus petits et comme appendiculés , celui du milieu plus grand , un peu concave et échancré;

quatre étamines didynames, à anthers velues; ovaire quadrilobé , surmonté d'un style bifide à son sommet.

Une quinzaine d'espèces de Lamiers ont été décrites par les auteurs. Elles se trouvent toutes dans l'hémisphère boréal : une croît dans l'Amérique septentrionale, et les autres en Europe et dans l'Orient. Parmi celles qui sont très-communes en France , dans les champs, les haies et les lieux ombragés, la plus remarquable est le *Lamium album* , vulgairement nommé Ortie blanche, que l'on employait autrefois en médecine contre les scrophules, la

LAM 187

leucorrhée, etc. Les Abeilles se plaisent particulièrement à butiner sur ses fleurs. Les autres espèces françaises , *Lamium amplexicaule* , *L. maculatum*, sont des Herbes à petites fleurs rouges et presque sans agrément.

LAMINAIRE. *Laminaria*. bot.

cuypt. {Hydrophytes.} Ce genre , type de notre famille des Laminariées, fut d'abord distingué sous le nom de *Laminarius* par Lioussel dans sa Flore du Calvados , mais si mal caractérisé qu'on pouvait le considérer comme douteux. Stackhouse l'adopta sans le mieux définir , en lui donnant le nom de *Giganea* qui ne pouvait être admis. C'est Lamouroux qui le constitua définitivement en lui assignant d'abord pour caractères : racines fibreuses , rameuses. Cette définition n'étant pas suffisante, Agardh la reforma de la sorte : fronde fibreuse , munie de racines et stipitée, membraneuse ou coriace; fructification en graines pyriformes, disposée dans les lames de la fronde. Nous adopterons de tels caractères en y ajoutant que les frondes sont dépourvues de côtes , ce qui éloignera des Laminaires proprement dites les *Laminaria jilgarum* , *esculeu/a* et *costata* des auteurs, outre plusieurs autres que nous possédons et dont nous formerons le genre *Jilgarum*. V. ce mot à l'article Laminaires. Le *Fucussaccharinus* des auteurs est le type de ce genre, dans lequel se rangent beaucoup des plus considérables Hydrophytes de la mer dont nous connaissons un grand nombre d'espèces qui seront incessamment décrites et figurées dans un travail auquel nous mettons la dernière main en ce moment, et qu'avait projeté feu notre ami et collaborateur Lamouroux. Les Laminaires peuvent être réparties provisoirement en trois sous-genres qui devraient peut-être constituer par la suite autant de genres différents et dont presque toutes les espèces sont

Propres aux mers septentrionales de hémisphère boréal ; plusieurs y sont communes aux côtes du nouveau et

de l'ancien continent. Ce sont des Plantes coriaces , d'un vert foncé ou roussâtre, muqueuses à leur surface et remplies d'un principe gélatineux et sucré qui se manifeste en efflorescences farineuses et blanchâtres à la surface de la fronde quand on les dessèche sans avoir la précaution de les laver dans l'eau douce avant de les préparer. Toutes demeurent long-temps hygrométriques après la dessiccation.

f Fistulaires. Racines fibreuses; stipe fistuleux , entièrement vide. Ce sous-genre forme le passage aux Macrocystes ou les pétioles de Chaque feuille, qui ne sont que des frondes partielles , peuvent être également considérés comme des stipes fistuleux , et de même absolument vides.

Laminaire Trompette, *Laminaria buccinalis* , Lamx. , *Fucus buccinalis* , L., Turn., /' #6 \ , pl. 139, dont le stipe énorme , fistuleux , vide , acquiert souvent plusieurs toises de longueur , et plusieurs pouces de diamètre; aminci vers sa base, il se renfle en s'allongeant. La fronde ou lame qui s'y insère est allongée, pinnée ou pinnatifide, épaisse , coriace, noirâtre, avec ses divisions ou pinnules , aiguës. Nous possédons cependant un échantillon où ces pinnules élargies vers l'extrémité y sont obtuses.

Jetés à la côte, les stipes , en s'y desséchant , sont quelquefois comme de gros tubes cornés qui imitent la forme de trompettes ou plutôt de cornets à bouquins. Cette Plante, qui se trouve sur les côtes de la pointe méridionale de l'Afrique, y fut remarquée par les navigateurs dès l'époque où l'on doubla le cap de Bonne - Espérance ; et les anciens botanistes l'appelaient Trombœ marinas , J. B. H. , 3 , p. 88 , ou *Arundo indien fluitans* , C. B. P. 19.

Laminaire Ophiure , L . Ophiura, N. , espèce des plus remarquables, rapportée de Terre-Neuve par des bateaux de pêcheurs et que Lapylaie a appelée longicuris , nom qui nous paraît inadmissible , parce que le stipe de ce Laminaire ne saurait être comparé à une cuisse. Sa lame ou

LAM

fronde serait à peu près celle de la Sucrière , si elle n'était beaucoup moins ondulée et plus mince , étant comme du parchemin; elle acquiert jusqu'à six ou huit pieds de long sur quatre à huit pouces de large. Son stipe fistuleux, absolument vide, de six lignes à dix-huit de diamètre , est cylindrique , ridé , noirâtre, souvent long de quatre pieds, et ressemblant à une Couleuvre.

-ff Saccharines. Racines fibreuses, rameuses; stipe solide, corné , devenant comme ligneux.

* Fronde constamment simple et entière.

La Laminaire Sucrière, *Laminaria saccharina* , Lamx., *Fucus saccharinus* , L. On a confondu sous ce nom plusieurs espèces fort distinctes , et généralement toutes celles de la section qui nous occupe. Mais quand on examine ces Végétaux avec attention , les différences deviennent frappantes. La véritable Laminaire Su[^] crière est la plus commune sur nos côtes atlantiques où nous l'avons observée depuis le cap Finistère , en Galice, la baie de Saint- Jean-de-Luz et Biaritz, au rocher de Cordouan , Belle-Ile et les côtes de Bretagne , enfin jusqu'à celles du Calvados et de Picardie. On la retrouve sur les côtes d'Angleterre et jusqu'en Norvège.

Son stipe arrondi, de la grosseur du doigt, court parallèlement à la longueur de la lame, qui est membraneuse, un peu coriace, d'un roux verdâtre, ovoïde, oblongue ou sublinéaire, atteignant jusqu'à six et neuf pieds de long, lancéolée, aiguë, fort ondulée, même frisée sur les bords, arrondie ou même subcordée au point d'insertion sur ce stipe. Nous en connaissons trois variétés principales : a. La Laminaire Sucrière à fronde obronde, très-large par rapport à sa longueur. /S. Celle qui est oblongue, mais non absolument linéaire, y - Celle qui est linéaire et fort étroite. Il en existe encore une variété à. monstrueuse et qui présente sur l'une de ses pages vers le côté et

LAM

1 longitudinalement une surface ondulée, crépue, implantée sur l'une des faces de la lame.

Laminaire longipède, L. longipes, N. Confondue avec la précédente, elle a son stipe bien plus long sur lequel la lame s'implante et s'allonge géant de manière à être aussi aiguë par en bas que par son extrémité supérieure. Sa substance est d'ailleurs (beaucoup plus mince, et comme un fragile parchemin. Elle acquiert la même longueur, demeure toujours plus étroite et se trouve, mais beaucoup plus rarement, sur nos côtes atlantiques. Nous en devons au savant Merlens des échantillons recueillis dans les mers du Kamtschatka. Laminaire cornée, J. Laminaria

■ cornea, N. Toujours confondue avec la Sucrière, n'est jamais aussi large,

■ dépasse fort rarement plus de deux

■ pieds de longueur, a sa fronde arrondi die vers sou insertion sur le stipe , et . Sa substance est très-épaisse , dure et

comme delà corne quand elle est desséchée ; elle est aussi moins mucilagineusc, plus verte , très-dure , à peine ou point ondulée, et sa solidité fait que des Flustres se fixent plus volontiers à sa surface. Nous en connaissons trois variétés : a. entière, plus petite et la plus commune; /S.

plus longue, plus verte, moins dure et ayant sa fronde comme étranglée aux deux tiers de sa longueur. Turner a Gguré cette variété comme l'un des deux états de son Laminaria saccharina. y. La Monstrueuse, qui porte une superfélation crépue, mais peu distincte et ordinairement sur l'un des côtés de la fronde.

Laminaire de Lamouroux , L.

Lamvuruuxii , N. Au premier coup'd'œil facile à confondre avec les espèces î et 3, mais bien plus petite, ne dépassant guère dix -huit pouces àdeux pieds, ayantson slipeallongé , sa fronde lancéolée , elliptique , également atténuée vers son insertion et vers sa pointe. Elle n'est que legèdr ment crépue sur ses bords. Elle nous a été communiquée par Lamouroux, qui l'avait fort bien distinguée sans

LAM 189

lui donner de nom particulier, et par Chauvin , botaniste fort distingué de Cacu , qui l'avait reçue de Terre-' Neuve.

Nous connaissons encore dans cette section les Laminaria latifolia et fascia d'Agardh. ; Lurea , N. , P/iytlitis , Turn. ; S/aci/tou-sii , N. [P/iylicis , Stack.) , Dermatudea , Lapyl. , viridissima , N. , vittata , N. , Sarniensis , N. , etc.

'* Frondes simples dans leur jeunesse, se divisant et se palmant dans l'état adulte.

Laminaire papyrine, *Laminaria papyrina*, N., à fronde entière, ovoïde , oblongue, aiguë, d'un beau vert, se partageant[^] sou extrémité en deux, trois ou quatre divisions aiguës, peu profondes , ayant son stipe un peu comprimé , très-court et d'un beau vert pâle. Cette espèce, fort mince et transparente, paraît être le L.

debilis d'Agardh, nom inadmissible, car cette Plante n'est pas plus débile qu'une autre ; sa longueur est de trois à huit et dix pouces , sa largeur d'un à cinq ou six. La figure 4 de la Laminaire g de ûiilen paraît convenir à son état de jeunesse. Nous l'avons trouvée dans la baie de Cadix , et reçue de Corse où la recueillit Souleïrol, officier du génie, botaniste trèshabile.

Laminaire digitée, *L. digitata*, Lamx. , *fucus digitattis* , L. , Turn. , Fuc. , pl. i52. Sa fronde est d'abord cordée, très-entière et d'une consistance cornée , épaisse, brunâtre. Elle se divise très-profondément par son extrémité. Son stipe est court. File devient généralement brune ou noire en se desséchant. Cette espèce est commune sur nos côtes. Lapylaie nous en a communiqué des échantillons recueillis à Terre-Neuve.

Laminaire palmée , *L. palmata* , N. . confondue avec la précédente et habitant avec elle nos côtes. Elle devient beaucoup plus grande , sa couleur est plus verte , son stipe est toujours très-long, souvent de la grosseur du pouce et égal à la fronde qui

190 LAM se divise en une multitude de lanières , et qui se réfléchit des deux côtés vers l'insertion de manière à présenter une dilatation considérable et à se réfléchir par les côtés sur le stipe.

Nous en possédons un échantillon venu de Valparaiso sur la côte de l'Amérique méridionale.

Laminaire conique, *L. conica*, confondue encore avec la *L. digitata*; elle a sa fronde conique et rétrécie vers l'insertion sur le stipe qui est plus long que chez cette Plante , mais plus court que dans la précédente.

Ses divisions sont des lanières minces et très-profondes. La figure de cette espèce est à peu près celle d'un éventail ouvert dont les branches seraient séparées. Elle est moins fréquente que les autres sur nos côtes.

Nous possédons encore dans cette section les *Laminaria flabelliformis* , grande espèce rapportée des Malouines par Lesson ; *bi/idans* et *trijidans* , [N., de Terre-Nenve ; *Delisei* , N. , du même pays, espèce fort belle et dont nous devons la connaissance au savant et modeste lichénographe de Yire, etc., etc.

*** Frondes constamment divisées.

Laminaire bironcinée , *L. biruncinata* , N. Cette belle espèce, découverte récemment par Durville sur les côtes du Chili, à la Conception, a son stipe plein , court , de la grosseur d'une plume d'Oie; sa laine est cornée, épaisse , oblongue , obtuse, et produit sur les bords des pinnules nombreuses, roncînées, inégalement dentées.

Laminaire des buveurs, *Laminaria potatorum*, Lamx. , *Fucus polatorum*, Lab. , Nov.-Hol. T. n , pl.

257 , Tum., Fuc. , pl. a4a (ligure excellente). Cette espèce, dont nous devons un échantillon magnifique à la générosité du savant Labillardière , est d'une consistance cornée; ses frondes sont ex-

trêmement épaisses, divisées irrégulièrement jusqu'à leur base. Ses expansions solides deviennent assez larges et sont assez solides pour que les sauvages de la Nouvelle-

LAM

Hollande en fassent des vases pour y conserver et transporter de l'eau. Elle a été observée au cap de Van-Diemen.

Les autres espèces de cette section qui nous sont connues sont les *Laminaria Corium* , N., de Valparaiso; *Laminaria radiata* , Agardh, *Fucus radiatus* , Jurn. , Fuc, pl. 154 ; *Laminaria reniformis* , Lamx. , Ess. , pl. 22 , t. 1 , f. 3. Du cap de Bonne- Espérance , etc.

fff Cépoides. Racines bulbeuses.

La plupart des espèces de ce sousgenre avaient été confondues sous le nom de *Fucus bulbosus*.

Laminaire bulbeuse , *Laminaria bulbosa*, Lamx. ; *Fucus bulbosus* , L. , à stipe comprimé, épais , fort allongé, simple, paissant d'un bulbe creux, souvent énorme, se dilatant en une fronde conique , fl. tubelliforme, profondément divisé en lanières fort longues, linéaires. Cette espèce ne commence guère à se trouver qu'à partir du golfe de Gascogne pour s'élever vers le nord. Elle devient fort grande. Son stipe, très-allongé et uni, outre son énonnité, la dislingue suffisamment de la suivante. Nous en connaissons deux variétés : a. à lanières larges d'un pouce au moins; fi. à lanières plus nombreuses , fort étroites , larges d'une à trois lignes au plus , et moins coriaces.

Laminaire de Turner , *Laminaria Turneri*, N. ; *Fucus bulbosus* , Turner, Fuc-, pl. 1 55 . Confondue avec la précédente , elle en di-

fl'ère cependant beaucoup par son bulbe bien plus gros et déformé , son stipe court, trèsdilaté, ailé ou lobé marginalement au point d'en être entièrement difforme, et par sa fronde en éventail irès-ouvert , se réfléchissant latéralement des deux côtés et plus large que longue. Elle est rare; on ne la trouve guère en France qu'aux environs de Cherbourg ; mais elle devient plus abondante sur les bords des îles con-- Tenues dans l'angle formé par la Normandie et la Bretagne , ainsi que sur les côtes d'Angleterre.

Laminaire ponctuée , L. punc/a-

LAM

•ta, N., ou b'revipes? Agardh. Nous aivons découvert cette espèce sur les LCÔles de Belle-Ile, au sud de la Breta- .gne, dans lelé de 1800. Bonnemaison I paraît l'avoir retrouvée sur celles de iQuimper flans le Finislère. Sa racine test un petit bulbe semblable à une (Ciboule ; sou stipe est fort court , déjpassanl rarement une à trois lignes (de longueur. La fronde est d'abord i ovoïde , plus ou moins large et amini cic aux deux extrémités ; elle se divise avec l'âge en deux ou trois lanières.

Sa consistance à demi-pap\ racée et membraneuse la rend remarquable , ainsi que sa couleur jaunâtre , sa transparence et l'aspect ponctué qvic lui donnent les fructifications éparses sur toute sa surlace. Elle ne dépasse guère dix à quinze pouces de long, sur deux à cinq de large.

La Laminaria- Belvisii d'Agardb , Ulva balbosa, Beauv.,Oware et Ben., pl. iâ, appartient à cette section. (E.)

* LAMINARIÉES. BOT. CRYTT.

[Hydropliites.) Nous proposons ici l'établissement de cette nouvelle famille parmi les Hydrophytes , aux dépens des Fucaées où elle avait été comprise , et dont elle diffère beaucoup par l'organisation des Plantes que nous proposons d'y comprendre. Leur contexture place les Laminariées entre les Fucacées et les Ulvacées , elle est bien plus simple que dans les premières et fort semblable à celle des secondes; elle consiste en des corpuscules infiniment petits , intercalés dans un réseau librillaire qui les contient , et parmi lesquels déplus gros se développent en propagules ou gongyles épais, jamais, comme dans les Fucacées, réunis en tubercules distincts , groupés en quelque partie que ce soit de l'expansion , et surtout aux extrémités.

Toutes sont caulescentes , et se fixent contre les rochers aux lieux les plus battus des vagues par des racines bien caractérisées, enlaçantes, souvent très-fortes et comparables , pour l'aspect et la consistance, à celles de beaucoup de Phaeogames. Les liges , ordinairement très- solides, présentent

LAM 191

dans certains genres une complication fort digne d'examen ; on y reconnaît une substance corticale bien distincte, une substance cornée qui en se desséchant acquiert une dureté considérable et qui très-flexible durant l'état de vie est évidemment formée, comme le bois , de couches concentriques, enfin au centre, une substance médullaire dont la couleur et la consistance est très-différente de celle du reste de la tige. Nous avons examiné ces parties soigneusement avec le microscope , elles sont cependant encore vasculaires et nous n'y avons pu distinguer de trachées.

La fructification paraît consister en corpuscules généralement très -petits, dispersés dans le réseau ponctué des frondes, lesquelles, disposées en forme de lames, deviennent dures ou cor-nées par la dessiccation.

C'est parmi les Laminariées qu'on rencontre toutes les espèces dont quelques peuplades maritimes tirent ne grossiers alimens. Elles sont plus ou moins mucilagineuses et sucrées , et re-prennent l'apparence de la vie après une longue dessiccation ; quelques-unes remouillées répandent une odeur de Violette et de Thé fort sensible ; la plupart se dissolvent en gelée, lorsqu'on les laisse tremper trop longtemps. Elles sont transparentes, et ac-quièreent en général les plus grandes proportions parmi les Végé-taux de la mer. Il est des espèces qui atteignent à dix , à vingt , et même à plusieurs centaines de pieds de longueur. Nous n'en connaissons aucune qui se trouve entre les tropiques.

Les espèces simples que nous avons observées sont toutes de l'hémisphère boréal où elles croissent depuis le 30

à 11 1 cri 11 •» 11 nr\° n r* r/l . Io j , . . ■ 1 . . ■ . > •

] usqu a 11 700 nord; les espèces rameuses son 1 propres à l'hémisphère austral , oii elles se rapprochent davantage du tro-pique, pour s'étendre jusqu'aux pointes les plus méridionales des trois conlinens du sud. On a peine à concevoir comment les La-minaires qui forment le type de cette famille, ont pu être placées, par Agardh , entre les Furcellaires et les Zomires qui sont

lesPadines de Lamouroux ; ce6 deux genres en sont peut-être les plus éloignés de tous ceux dont se compose la classe des

Hydrophytes.

Les genres qui composent cette belle famille sont au nombre de six qui peuvent être répartis , ainsi qu'il suit, en deux sections:

f Supportées par des tiges ramifiées.

Durvillée, *Durvillaea*; Lessonie, *Lessonia*, N.; Macrocyste, *Macrocystis*, Agardh.

•ff Supportées par des stipes simples.

Agare , *Jagarum*, N.; Laminaihe, *Laminaria* , Lamx. ; Iridée , lui— *Idaea* , N.

Les genres Durvillée et Agare n'ayant pas été décrits dans ce Dictionnaire où nous ne traitons pas des Hydrophytes inarticulées du premier ordre quand notre savant confrère Lamouroux s'y occupait de cette partie de la science , nous allons y suppléer maintenant.

i°. Durvillée, *Durvillaea*. Ce genre véritablement extraordinaire et dont l'espèce unique est fort importante à connaître puisqu'elle fournit un excellent aliment aux habitants des côtes occidentales de l'Amérique du sud , sera dédié à Durville, officier de marine très-distingué et naturaliste fort instruit, qui réunissant , comme par une sorte de miracle , les connaissances nécessaires pour faire plus utilement que ne l'ont jamais pu faire d'autres marins, un voyage de découverte , mérite que son nom ne soit pas attaché à quelque "Végétal vulgaire, démembré, peut-être à tort, de quelque autre genre.

Nous le caractérisons : expansion coriace, se divisant en lanières subulées, tubuleuses , recouvertes d'un épiderme distinct ,

et remplies par une moelle cellulcuse de nature particulière fort différente de la substance de la Plante , et assez semblable à celle de certains gros Scirpes des malais. Nous n'en connaissons qu'une seule espèce, *Durvillœa utilis* , N.

(V. planches de ce Dictionnaire),

LAM

Fucus antarcticus de Cbamisso; elle est gigantesque. Le Gentil , dans la relation de son voyage , l'avait déjà mentionnée(T. n, pl. 3), el nous avait appiis que les marins espagnols qui la nomment l'orro , reconnaissent les approches des côtes du Chili , à ses masses flottantes. Léman , dans l'excellent Dictionnaire de Lervraull, en avait fait une Laminaire (T. xxv, p. 189), ayant avec beaucoup de sagacité discerné l'analogie qu'elle présentait avec ces Plantes. La racine ne nous est pas suffisamment connue, elle retient la Durvillée à de grandes profondeurs dans la mer. Une expansion épaisse, aplatie mais très-forte , en part pour se diviser en lanières cylindriques , qui atteignent plusieurs brasses de longueur, se fourchent plusieurs fois de manière à rappeler la figure en très-grand du *Fucus Loreus* de nos côtes , ont jusqu'à deux et trois pouces de diamètre à leur base , ou se voient aussi quelques petites expansions aplalies, s'amincissent vers leur extrémité qui est pointue. En les voyant flotter on dirait des Serpens ou les bras de quelque énorme Céphalopode. Leur couleur est d'un olivâtre tirant sur le brun , et devient noire pour peu qu'on ne les des- sèche pas avec précaution. Leur épiderme , qui paraît fort poli , se recouvre avec i âge d'un, réseau particulier noii âlre qui j'en détache, etpreseute alors tellement l'aspect d'une Hydrodictie , que préparé à part, un botaniste exercé y pourrait être trompé. Sous cet épiderme est la substance même de la Plante formée de glo-

bules pressés dans une mucosité coïn pacte , lesquels son l con
 ten us dans une multitude de fibres confervoïdes, transparentes,
 entrecroisées, qu'un grossissement de cinq cents fois rend seul
 bien visibles au microscope; cette substance a d'une à trois lignes
 d'épaisseur, selon le dianiëre des rameaux. La moelle centrale
 blanchit à mesure qu'elle se dessèche , mais les alvéoles qui la
 forment, pénétrées d'eau , sont alors à peine visibles, tandis
 qu'elles le deviennent beau-

LAM

• :oup dans la dessiccation. En consiidéranl la coupe, soit
 transversale , iioit horizontale, du Durvilleoa utilis, un dirait, à la
 couleur près , celle de Ua tige du Scirpus lactistris de nos
 contrées. On vend sur tous les marchés , depuis Lima au Pérou ,
 jusüijil'à la Conception au Chili, les ranneaux ou lanières de cette
 singulière l.-iaminariée ; les habitons la viennent acheter, comme
 un légume, afin Me s'en nourrir. Lesson , digne compagnon de
 Durville, nous en a communiqué ries échantillons recueillis uux
 Malouiues. Quand elle est bien préparée pour l'herbier, elle y
 prend une couleur de noisette foncée, fort agréable et un peu lui-
 sante; replongée dans l'eau elle y reprend l'apparence de la vie ,
 au point de pouvoir , •Être parfaitement étudiée en tout .'cmps ,
 mais elle ne tarde pas à s'y ilissoudrc en une gelée d'un goût un
 «en fade, cependant assez agréable , •et qu'on sent devoirêtre
 nourrissante.

2°. Agaue, Agarum. Le caractère Lie ce genre consiste dans
 une ou plusieurs nervures très- saillantes , qui 'oarcourent la
 fronde ou lame dans "oute sa longueur , tandis que les •ja-
 miiiiaires proprement dites sont [totalement énervées, et consé-
 quem- •ment plus rapprochées des Dlvacées iJont elles ne dif-

fèrent réellement | [ue par leur tige ou stipe souvent ^orné? et par leurs racines si renia rnuables. De telles nervures, qu'on ne retrouve aussi caractérisées que Haus certains l''ucus proprement dits , Idénotent une organisation qui tend |i i se compliquer, mais la fiuctilipation n'en devient guère plus dis— Jiincte. Le nom d' 'Agarum, que nous l'vons conservé à ce genre , était «■ celui d'une de ses espèces , chez les llgologues qui l'avaient emprunté de If-nelque langue du Nord ou il désigne les Algues marines mangeables.

ITous les Agares sont des Plantes ooréales; ou n'en a trouvé encore aucune au-dessous du cinquantième ilcgré de latitude nord , si ce n'est quelques échantillons épars de l'esculentum qui ont été découverts par le

LAM i93

respectable colonel Dudresnay, explorateur zélé des Hydrophytes de la côte de Saint-Paul-de-Léon en Bretagne. Deux sous-genres doivent être établis pourrépartir six ou huit espèces qui peuvent exister dans ce genre.

f Stipe nu entre l'insertion de la fronde et de la racine.

* Lame entière munie de plus d'une nervure.

Agaue a cinq côtes , Aga'rum (jitinquecostatum , N. ; Lamina-ria costata , Agardh ; /•i/ci/s costatus , Tue— ner, Fuc, pl. 226. Nous ne connaissons celte élégante espèce que par la planche de Tu rner qui lui donne un stipe comprimé, s'ésiendant en une lame linéaire à peu près de la forme de notre Laminaire cornée , mais parcourue dans toute sa longueur par cinq nervures très-prononcées. Un seul échantillon en a été rapporté en Europe par Men-

zics qui le recueillit sur les côtes occidentales de l'Amérique du Nord, On n'en saurait trop recommander la recherche aux voyageurs qui visiteront les mêmes lieux.

****** *Lame criblée de trous , munie d'une seule nervure.*

Agaiie cbibrelse , *Agarum cribrosum* , N. ; *Laminaria Agarum*, Lanix. ; *Jucus Agarum*, Turri., Fuc, pl. 75; Ilor. Dan., tab. 154a. 11 existe peut-être deux espèces sous ce nom, du moins nous possédons dans notre collection des échantillons qui , avec les caractères communs donnés à l'espèce qui nous occupe, ont un faciès fort différent. Les uns ont leur fronde ou lame ronde, très-ondulee ou crêpée sur les bords , avec la consistance plus épaisse, et les trous qui la criblent inégaux et anguleux. Les autres ont leur fronde oblongue , moins coriace, proportionnellement plus allongée, plus verte, et sont percés de trous londs tellement réguliers , quoique inégaux en grandeur, qu'on dirait ceux de ces gros cribles de parchemin dont on se sert dans certains pays pour tamiser des graines nourricières. L'une et l'autre variétés

TOME IX

19ⁱ LAM

nous ont été communiquées par Delise, Chauvin, Lamouroux et Lapilaye comme venant de Terre-Neuve.

On les retrouve en Norwège et jusqu'au Kamtschatka.

■ **ff** *Stipe muni de pinnules entre l'insertion de la lame et de la racine.*

Agare mangeable , *Agarum esculentum* , N . ; *Laminaria esculenta* , Lamx. ; *Fucus esculentus* , L.; Turn., Fuç., pl. 117. Il doit exister encore plusieurs espèces confondues sous ce nom. Il est difficile de croire que les individus longs d'un à deux pieds que l'on trouve sur nos côtes, et celui qu'a figuré Turner, appartiennent à la même espèce que le *Laminaria esculenta* de l'Ecosse et des mers du Nord , qu'on dit iitteindre dix aunes de long. On assure d'ailleurs qu'il en existe à stipe rond , à stipe comprimé, à stipe carré, ce qui, certes, présente d'excellens caractères. Quoiqu'il en soit , nous en possédons deux variétés fort distinctes., Tune et l'ail? tre des côtes de Bretagne. Toutes deux ont leur fronde d'un vert tendre et linéaire, longue d'un à trois pieds , et des petites expansions disposées en faisceaux sur les deux côtés du stipe vers le milieu ; mais la variété a a.ces petites expansions ou pinnules épaisses et subulées vers leur extrémité : /S les a planes, larges, dilatées et arrondies.

Agare de Delise , *Agarum Delisei*, N. Nous devons la connaissance de celle espèce à Delise qui nous a sacrifié le seul échantillon qu'il possédait et qu'il avait reçu de Terre-Neuve. Cet échantillon précieux présente des pinnules lancéolées , stipitées , en forme de feuilles de Laurier , éparses sur les deux côtés du stipe dans presque toute sa longueur.

Agar.ede Lapylaie , *Agarum Pylaii*, N- Cette espèce, découverte à Terre-Neuve par Lapylaie, a sa fronde ovoïde, très-ondu- lée, et non linéaire comme les précédentes. Les pinnules du stipe sont aussi bien plus grandes, ondulées , cunéiformes, fort, élar- gies vers leur extrémité oh elles

ont souvent plusieurs pouces de largeur. (B.y

LAMINCOUART. bot. phan. L'un des noms de pays du Minuartia. V . ce mot. (B.)

LAMIODONTES. rois, foss.

C'est-à-dire dents de Lamie. V.

Clossopètres. (b.)

* LAMIOLA. pois. (Risso.) C'est-à-dire petite Lamie. Le Milandre à Nice. V. Squalé. (b.)

LAMIDM. bot. phan. ^.Lamier.

* LAMOUREUXELLE. bot.

crypt. [Confervées.) Nous proposons l'établissement de ce sous-geure dans le genre Conferve. V- ce mot. (b.)

* LAMOUREUXIA. bot. crypt.

(Hydropliètes.) On ne voit pas pourquoi Agardh avait changé le nom de (Jlaudea, genre dédié par Lamouroux à son respectable père, pour celui du fils , et on ne s'explique pas davantage pourquoi depuis, au lieu de le restituer, il a nommé le même genre Onclia. V. Claudel. (b.)

* LAMOUREUXIE. Lamourouxia. bot. phan. Genre dédié par Kunth (in Humboldt Nov. Gen. 2, p.

335) à notre collabora leur Lamouroux, dont la science déplore en ce moment la mort récente et prématurée. Ce genre faisant partie de la famille des Rhinaulhacées , et de la Didynamie Angiospermie , L. , offre les caractères suivans : calice campanule

à peu près égal , à deux divisions latérales et bifides. Corolle monopélale à tube court , à gorge très-allongée , renflée et comprimée; limbe à deux lèvres , la supérieure entière et en forme de casque , l'inférieure plus étroite et à trois lobes presque égaux : quatre étamines didynames, dont les deux plus courtes sont parfois rudimentaires; anthères réniformes; capsule ovoïde, comprimée, à deux loges contenant des graines membraneuses , recouvertes d'un réseau celluleux. Ce genre se compose de sept espèces originaires de l'Amérique méridionale, et qui toutes y ont été ob-

LA M

; servées et recueillies par Humboldt et Bonpland. Ce sont des Plantes herbacées , dressées et rameuses , dont les feuilles sont opposées, dentées en scie ou même pinnatifides. Leurs fleurs sont rouges, grandes, axillaires et solitaires. Sur les sept espèces décrites par Kunth dans l'ouvrage cité précédemment, trois ont été figurées.

(Ce sont les *Lamourouxia virgata* , Kunth, loc. cit., a, p. 536, t. 167; , *Lamourouxia serratifolia* , Kunth, loc. cit., t. 168, et *Lamourouxia rhinanthifolia* , Kunth, loc. cit., t.

LAMPADIE. Lampas. moix. Genre établi par Monfort (Cochinchine). Syst.

T. 11, pag. 24a) pour une petite Coquille microscopique , très-voisine des Cristallines de Lamarck. Férussac , dans ses Tableaux systématiques , ne l'a point admise comme genre ; il l'a (placée dans son genre Lenticuline, dans la sous-division des Cristallées. If. Lenticuline et Nummulite.

LAMPAS. moll. Nom vulgaire (flue l'on donne à plusieurs espèces ilde Slrombes. V. ce mot. (D..11.)

LAMPAS. bot. PHAN. D'oii Lam- : pette , qui désigne encore dans le MVlid î V sîgrostemma Githago , L. , nom jipar lequel les anciens désignaient les Inverses espèces du genre Lyc/uiisc\u\ .ornent les champs. (11.)

LAMPE ou LAMPE ANTIQUE.

mou,. Espèce du genre Hélice. P~.

:a mot et Carocolle. (b.)

* LAMPER. vois. La Lamproie (tii porte ce nom à Surinam, selon s5!admann, pourrait bien être une espèce particulière, et non la nôtre, tomme le dit ce voyageur. (b.)

LAMPÉRY. bot. piiAN. Rumpb Herb. yîmb.) a décrit , sous ce iôm vulgaire dans les îles de la Monde, une drupe que l'on suppose Appartenir à une Plante de la famille les Rosacées , et de la tribu des Wmygdalées. (g..n.)

LAMPEITE. bot. riiAN. PÇ. Lam- .'as. On élend aussi ce nom, et par la

LAM igf.

même raison , au Lychnis T/os-Cucu/i.h. (b.)

LAMPILLON. pois. Pour Lamproyon. V". ce mot. (b.)

LAMPOCARYE./nw/7ocfl/ja. bot.

phan. Genre de la famille des Cypéracées , établi par R. brown {Vrodr.

F/. Nov.-Holl. 1, p. 58) qui lui assigne pour caractères : des épillets uniflores, composés d'écaillés imbriquées en tous sens, dont les extérieures sont vides : les étamines varient de trois à six, et leurs filets sont persistans; l'ovaire est dépourvu de soies hypogynes, surmonté d'un style trifide et de trois stigmates indivis. Le fruit est une noix osseuse, lisse, mucronée à son sommet par le style qui est persistante. Ce genre établit le passage entre les genres *Cladium* et *Gahnia*, et diffère du premier par ses filets staminaux persistans, et par son style formant une pointe sur le fruit; et du second par son fruit constamment lisse. A ce genre R. Brown rapporte deux espèces : l'une, *Lampocarya aspera*, est tout-à-fait nouvelle; l'autre, *L. /texandra*, est le *Gahnia trifida* de Labillardière. Ces deux espèces croissent à la Nouvelle-Hollande. (a. H.)

LAMPOTTE. moll. Les petites Patelles que les pêcheurs mangent sur nos côtes, ou dont ils emploient la chair comme ap-pât. (b.)

LAMPODRDE. Xanthiurn. bot.

phan. Genre d'une organisation singulière, formant avec *'ylmbrosia*, *Yiva* et le *Fransera* une petite famille voisine, quoique suffisamment distincte des *Synanthérées*. Ce genre présente les caractères suivans : les fleurs sont unisexuées et monoïques; les mâles forment des capitules globuleux, placés vers la partie supérieure des rameaux; leur involucre est composé d'écaillés imbriquées sur plusieurs rangs; le réceptacle est ovoïde; chaque fleur est accompagnée d'une écaille de forme variable; son calice manque: sa corolle est tubuleuse, évasée de la base au sommet,

à cinq dents et à cinq nervures longitudinales qui se bifurquent à leur sommet pour suivre chacun des bords des dents. Les étamines au nombre de cinq sont monadelphes , et leurs filets réunis forment un tube cylindrique inséré tout-à-fait à la base de la corolle; les anthères sont généralement saillantes au-dessus de la corolle , rapprochées les unes contre les autres, mais libres. Les fleurs femelles sont géminées, très-rarement solitaires , placées à l'aisselle des feuilles clans un involuerc ovoïde , qui paraît formé de la soudure de deux involucres renfermant chacun une fleur. Cet involuerc se rétrécit supérieurement ou il se termine par deux petits cols à travers lesquels on voit sortir et saillir les stigmates. La face externe de cet involucie, qui est persistant, est toute hérissée de poils, dont quelques-uns , beaucoup plus grands , deviennent épineux. Chaque fleur femelle se compose d'un ovaire infère , ovoïde, allongé, dont le limbe est nul ou formé de trois divisions étroites et rapprochées contre le style. La corolle manque entièrement. Le style est d'une longueur variable , très-simple , continu avec le sommet de l'ovaire et terminé par deux stigmates linéaires divergeas , glanduleux- sur leur face interne. Le truit est un véritable akène , allonge , terminé en pointe à son sommet , ordinairement marqué de dix lignes ou stries longitudinales. Ces akènes sont entièrement renfermés deux à deux dans les involucres qui se sont accrus et dont, une partie des poils sont devenus épineux. Chaque akène contient une graine dressée, pontée sur un f'uucule assez long. Elle se compose du tégument propre qui est mince et membraneux , et d'un embryon homolrope dont la radicule est conique,!

Ce genre renferme cinq espèces ; ce sont des Plantes herbacées annuelles ou vivaces à liges rameuses, quelquefois épineuses, à feuilles alternes, plus ou moins profondément incisées. De ces cinq espèces, trois croissent en

LA. M

France, dans les lieux incultes ou dans les vignes, savoir : *Xanthoxylum spinosum* et *X. orientale*. Ces deux dernières se rencontrent surtout dans les provinces méridionales de la France; des deux autres l'une, *Xanthoxylum echinatum*, Murray, est encore peu connue; on ignore sa patrie; l'autre, *Xanthoxylum catartiacum*, Kunth [in Humb.) , a été trouvée au Pérou dans les environs de Quito. V.- Xanthoxylacées. (a r.)

LAMPRIE. Lamprias. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, division des Troncalipennes, établi par Bonelli et ayant pour caractères : palpes extérieurs finissant par un article dont la forme se rapproche de celle d'un cône renversé ou d'un cylindre, et qui est tantôt un peu plus gros que le précédent, tantôt de la même épaisseur; crochets des taises pectines en dessous; pénultième article, de tous les tarses simple ou point divisé en deux lobes; corselet plus large que long.

Les Cimindes diffèrent des Lampries par des caractères tirés des articles des palpes. Les Lébies s'en distinguent par les tarses. Enfin les Dromiès et les Démélries s'en éloignent par la forme de leur corselet. Ces Insectes vivent en général sous les écorces des arbres, quelquefois ils viennent courir sur les feuilles et sur les tiges, et alors, si on en approche, ils se laissent tomber à terre et ont bientôt disparu aux yeux du chasseur qui ne peut les prendre

qu'eu dépouillant tout le sol de ses herbes et des petites pierres sous lesquelles ils se cachent. L'espèce qui sert de type à ce genre est :

La Lamphie cyanocéphale , L.

cy anocephala , Bonell. ; Lebia cyanocephala, Latr. ; Câràbus', Fabr. , Panz. , Faun. 1ns. Germ, , i.xxv, 5.

Elle est longue de près de deux lignes et demie; son corps et sa tête sont bleus , son corselet est rouge ainsi que les pales qui n'ont que les ge-

LAM

noux de bleus. Elle se trouve à Paris sous les écorces des Arbres. On en trouve une espèce très-voisine en Suède que Duf-smidt a nommée Chlorocephala; elle ne diffère de La précédente que par les pales qui n'ont pas les genoux noirs. Elle se trouve également aux environs de Lille. T'. Lébie.

* LAMPRIILLON. rois. Même chose que Lamproyon. P. ce mot.

L AMP RIME. Lamprirna. ins.

Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Pentamères, famille des Lamellicornes, tribu des Lucanides, i établi par Latreille et ayant pour caractères : antennes coudées, composées de dix articles ; point de labre . apparent; languette divisée en deux pièces allongées et soyeuses ; mâchoires découvertes en dessous jusqu'à leur base ; mandibules grandes et i comprimées dans les mâles ; corps i convexe , surtout dans les mâles.

Ces Insectes diffèrent des Lucanes et des Platycères par leur menton qui est très-petit et ne recouvre pas les ; mâchoires , tandis qu'il est grand et : ne les laisse pas apercevoir dans ces • deux genres ; ils s'éloignent des Sinoï dendres et des OEsales par des caractères de la même valeur et par la forme du corps. Fabricius a placé la seule espèce qu'il a connue de ce genre lajyec les Lelhrus (Lct/irus tenais).

I Schreber a donné (Trans. de la Soc.

Linn. de Londres , T. vi, p. V8b) une > description complète du même Insecte et l'a rangé avec les Lucanes. C'est, en effet, de tous les genres de la famille des Lamellicornes, celui avec lequel ces Coléoptères ont le plus de : rapports. Les Lamprimes ont une ; tête bien découverte, armée de deux mandibules comprimées , droites , dirigées en avant , dentées à leur partie antérieure et supérieure, et très-velues en dedans. Leurs mâchoires sont insérées en dessous; leur lobe terminal «est petit et pointu, et elles portent (chacune un palpe filiforme. Les antennes sont composées de dix articles , les quatre derniers forment la massue;

LAM 197

mais le premier article de cette massue est beaucoup plus petit et en forme de dent; elles sont insérées au-dessus des mandibules, en avant des yeux et sous une petite éminence du devant de la tête. Les yeux sont assez grands et se prolongent un peu au-dessous. Le corselet est très- grand, deux fois plus large que long , convexe , légèrement rebordé et dilaté de chaque côté vers son milieu. L'écusson est arrondi postérieurement; les élytres sont moins longues que le corselet , convexes , et vont en se rétrécis-

sant jusqu'à l'extrémité. Le sternum du niésolhorax est avancé en pointe dirigée vers le prothorax. Les jambes antérieures sont courtes et larges, et offrent au côté intérieur près de l'épine souvent élargie qui les termine, un petit pinceau de poils réunis, pointu et semblable lui-même à une autre épine; les autres pattes sont moins fortes, à peu près de la même longueur. Ces Insectes sont très brillants et paraissent jusqu'à présent propres à la Nouvelle-Hollande et à l'île de Norfolk, de la mer Pacifique. Leurs mœurs nous sont inconnues, mais elles doivent être les mêmes que celles des Passales. L'espèce qui sert de type à ce genre est :

La *Lamprina* bhonzée, L. œnea, Lill. ; *Lutidus* œneus, Fabr.; *L. canus* œneus, Schreb. [Trans. o/ Linn. Societ. T. vi, pl. 10, fig. 1). Cette espèce est longue de près d'un pouce; ses mandibules sont beaucoup plus longues que la tête, très-velues intérieurement, obliquement tronquées et simplement bidentées à leur extrémité, avec une troisième dent sans échancrure remarquable au bord interne; le corps est velu; les élytres sont de la même couleur, plus brillantes, un peu ridées. Les jambes antérieures sont armées de huit dents au côté extérieur; l'épine est en demicroissant-, pointue au bout, avec des dentelures extérieures; le sternum est moins avancé que dans la *Lamprina* aurata ou *L. canus* œneus, var., Scireb. La *Lamprina* cuprea a les mandibules beaucoup plus courtes et

i^S LA. M

pijsuep glabres. Ces trois espèces ont le bord antérieur de la tête transversal, un peu échancré ou concave. Son vertex offre une dépression triangulaire.

Ces Insectes étaient très-rares dans les collections en France; ils commencent à devenir plus communs, et les voyageurs de l'expédition autour du monde de la corvette la Coquille , en ont rapporté quelques-uns. (g.)

* LAMPRIS. pois. (Retzius.) K

CLIRYSOTOSE.

LAMPROIE, pois. Espèce du genre Pétromyzon. P~. ce mot. On a aussi appelé Lamproie aveugle, la Myxine. V. ce mot. (u.)

* LAMPROSOME. Larnprosuma.

ins. Genre de l'ordre des Coléoptères , section des tétramères , famille des Cycliques, tribu des Chrysomélines , établi par Kirby [Trans. of Lin. Soc.] et adopté par Latreille (Fam. Naturelles du Règne Anim.).

Les caractères de ce genre sont : antennes courtes, pectinées et en scie, insérées au devant des yeux et distantes les unes des autres.

Ces Insectes se distinguent des Chlamys et des Clytres par des caractères tirés de la forme du corps , des pâtes et des antennes ; ils sont en général de petite taille , globuleux ; leur tête est entièrement cachée sous le corselet qui est très-bossu et penché en avant; celui-ci est beaucoup plus large postérieurement et finit en pointe joignant l'écusson qui est très-petit. Les élytres sont courtes, extrêmement bombées ; elles ont de légères stries de points enfoncés.

On ne connaît pas les habitudes de ces Insectes qui habitent tous les contrées chaudes de l'Amérique méridionale. Ils sont Or-

nés des couleurs les plus brillantes. Dejean (Cat. des Col., p. 125) en mentionne cinq espèces ; la plus belle est le *Lamprosorna fulgida* , Dej. Cette espèce est longue de près de deux lignes et large d'une ligne et demie au moins; elle est , en dessus , d'un beau rouge métallique extrêmement luisant ,

LA M

changeant en jaune , bleu , violet et rouge vif, suivant les angles sous lesquels on présente l'Animal aux rayons lumineux ; le dessous est bleu. Kirby décrit une autre espèce sous le nom de *L. bicolor*. (g.)

* LAMPROTORNIS. ois. (Temminck.j Syn. de Stourne. V. ce mot.

(DR. .Z

LAMPROYON. pois. On appelle ainsi, à peu près indifféremment, les petites espèces du genre *Pétromyzon* , ainsi que les jeunes Lamproies. V.

PÉTROMYZON. (b.)

L AMPS ANE. *Lampsana*. bot. phan.

Genre de la famille des Synanthérées , Chicoracées de Jussieu , et de la Syugénésie égale, L., établi par Tournefort, et adopté par Linné qui a modifié arbitrairement sa dénomination en celle de *Lapsana*. Voici ses caractères : involucre formé de huit folioles oblongues appliquées , accompagnées à la base de quelques écailles surnuméraires , appliquées et ovales; réceptacle nu et plane ; calathide composée de demi-fleurons nombreux et hermaphrodites ; ovaires obovoïdes , oblongs , un peu comprimés ,

glabres , lisses , striés et dépourvus d'aigrettes. En constituant ce genre , Tournefort n'y comprenait qu'une seule espèce , le *Lampsana communis*. Linné y réunit, mais à tort, les Plantes qui font partie des genres *Hedypnois* , *Rhagadiolus* et *Zacintha*. D'un autre côté il en avait séparé le *Lampsana foetida* , qu'il avait placé, d'après Vaillant , parmi les *Hyoseris*. Haller , Lamarck et De Candolle , ont réuni aux *Lampsana* , *YHyoseris minima* de Linné , qui est devenu le type du genre *Amoseris* de Gaertner. Les genres *Rhagadiolus* , *Zacintha* et *Amoseris*, détachés du *Lampsana*, ont été admis par Cassini qui a placé celui-ci, malgré ses akènes dépourvus d'aigrettes , dans la section des *Crépideés* de la tribu des *Lactucées*. Il l'a composé des quatre espèces suivantes : i° *Lampsana communis*, L.; a° *L. glandulifera* , Cass., ou *L. lyrata*, Willd.; 5° *L. virgata* ,

LAM

LDesfont. ; 4° *L. foetida* , le type du *ITaraxaconastrum* de Vaillant , ou *ILeoniodunloides* de Micheli. Ce sont des Plantes herbacées indigènes de l'Europe, des bords de la Méditerranée et de la mer Caspienne. La première est très-commune dans les lieux incultes et cultivés de toute l'Europe, où elle fleurit pendant tout l'été. Les habitants de Constantinople la connaissaient autrefois, au rapport de Belon , sous le nom générique aujourd'hui adopté, et ils en faisaient usage comme aliment. On lui a donné le nom vulgaire d'Herbe aux mamelles , parce que son suc était , dit-on , efficace contre les gerçures qui surviennent au sein des nourrices.

Plinie et Dioscoride donnaient le nom de *Lampsana* , au *Kaphanus Rap/ianislrum* ; quelques auteurs des premiers âges de la botanique, Cæsalpin et Ualéchnmp, l'appliquaient aussi à des

Crucifères , comme , par exemple, à la Moutarde sauvage , *Sinapis aiensis*. Enfin Lobel et Dodœns l'ont réservé à la Plante de l'ordre des Chicoracées , qui forme le type du genre dont il est question dans cet article. (G..N.)

LA MPT ov LANT. mam. (Dapper.) Cet Animal africain paraît être le Zébu selon buflon. (b.)

LAMPUGA. pois. Lampugo selon Rondelet. Nom donné sur les côtes d'Espagne , et particulièrement dans la Biscaye , au *Corypliœna Hippurus* , L. , dont on fait , à certaines époques, des pêches considérables pour alimenter des salaisons qui se consomment en carême. A Nice, selon d'autres , c'est la Fiatole. (b.)

v LAMPUGE et LAMPUGNE. fois.

Syn. vulgaires de Liche, espèce de Gaslérostée , V. ce mot , et du Pom-

pile. V. COBYPHOENE. (B.)

LAMPYRE. Lampyris. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Pentamères , famille des Serricornes , division des Malacodermes , tribu des Lampyrides , établi par Linné et adopté par tous les cutomo-

LAM ic)ri

logisles , avec ces caractères : corselet en demi-cercle et cachant entièrement la tête , ou en carré transversal; bouche très-petite; palpes maxillaires terminés par un article finissant en pointe; extrémité postérieure de l'abdomen phosphorique ; yeux très-gros , dans les mâles surtout.

Ces Insectes se distinguent des *Lycus* , avec lesquels ils ont beaucoup d'affinité , par la tête qui est rétrécie et prolongée en bec dans ceux-ci ; ils s'éloignent des *Omalisus* en ce que leurs palpes finissent en pointe , tandis qu'ils sont terminés par un article tronqué dans ces derniers ; enfin les *Téléphores* et les *Mathlines* en sont séparés par des caractères tires des palpes. Le nom de *Lampyris* a été donné par les Grecs à tous les Insectes qui répandent , pendant la nuit, une lumière phosphorique; les Latins donnaient à ces Insectes les noms de *Cicindcla* , *Noctiluca* , *Lucio* , *Luciola* , *Luccrnutu* , *Irioendula*. Avant que *Fabricius* eût bien distingué ce genre et lui eût assigné les caractères qui lui sont propres , on l'avait long-temps confondu avec ceux de *Téléptiores* et de *Malachies*, sous le nom de *Canlbaris*. *Geoffroy* , en lei séparant des *Téléphores* , les a néanmoins associés avec les *Lycus*, et *Linné* les a encore confondus avec les *Lycus* et les *Pyrochroa*. Ces Insectes, dont quelques femelles sont connues sous le nom de Vers luisans , et que les voyageurs appellent Mouches lumineuses, Mouchesà feu, etc., ont le corps très-mou , particulièrement l'abdomen qui est comme plissé ; il est oblong , ovale, déprimé; la tête est enfoncée et comme enchâssée dans le corselet; les antennes sont très- rapprochées à leur base, filiformes, pectinées, plumeuses ou en scie dans plusieurs mâles , avec le troisième article de la longueur du suivant; la bouche est petite et sans saillie; les palpes maxillaires sont sensiblement plus grands que les labiaux , avec le dernier article ovoïde et pointu ; les yeux sont globuleux , arrondis, assez grands; le corselet

200 LA M

forme une plaque très-grande , plate , demi-circulaire , rebordée , qui cache entièrement la tête, et qui est à peu près aussi

large que les élytres; l'abdomen est composé d'anneaux qui forment autant de plis et qui sont terminés latéralement en angles aigus ; les élytres sont coriaces , un peu flexibles; quelques-uns les ont très-courtes, les femelles de quelques autres en sont tout-à-fait dépourvues ainsi que d'ailes, et telles sont les espèces du nord de l'Europe.

D'après Dufour(Ann.des Scienc. Nat., t. 3 , p. 225) , le Ver luisant , qui est la femelle aptère d'un Lampyre d'Europe , a un canal alimentaire dont l'étendue a environ deux fois celle de tout le corps. L'œsophage est d'une brièveté qui le rend imperceptible ; il se dilate aussitôt en un jabot court. Le ventricule chylique est séparé du jabot par un étranglement valvulaire; il est fort long, lisse, c'est-à-dire dépourvu de papilles , mais boursoufflé et cylindroïque dans ses deux tiers antérieurs, intestiniforme dans le reste de l'organe. L'intestin grêle est fort court; celui qui est destiné au séjour des matières fécales en est brusquement distinct ; il est tlexueux et offre un renflement, peut-être inconstant, qui représente le cœcum et qui dégénère en un rectum allongé.

On a fait, sur la matière lumineuse de ces Insectes , plusieurs expériences qu'il serait trop long de rapporter ici. Beckerhiem en a publié dans les Annales de Chimie (t. 4, p. i g) ; Carradoti a fait des expériences sur le Lampyre italique , et Tréviranus a observé plusieurs espèces de ce genre.

Il résulte de toutes ces observations que les Lampyres vivent très-longtemps dans le vide et dans différents Gaz , excepté dans les Gaz acides nitreux, muriatique et sulfureux, dans lesquels ils meurent en peu de minutes. Leur séjour dans le Gaz Hydrogène le rend, du moins quelquefois , détonnant. Privés, par mutilation

, de cette partie lumineuse du corps , Us continuent encore de vivre , et la

LAM

même partie, ainsi détachée, con-i serve pendant quelque temps sa propriété lumineuse , soit qu'on la soumette à l'action des différens Gaz, soit dans le vide ou à l'air libre. La phosphorescence dépend plutôt de l'état de mollesse de la matière que de la vie de l'Insecte ; on peut la faire renaître eu ramollissant celte matière dans l'eau. Les Lampyres luisent avec vivacité dans l'eau tiède et s'éteignent dans l'eau froide , il paraît que ce liquide est le seul agent dissolvant de la matière phosphorique. .Toutes les espèces de Lampyres brillent pendant la nuit. La partie lumineuse est placée au-dessous des deux ou trois derniers anneaux de l'abdomen, qui sont ordinairement d'une couleur plus pâle que les autres , et y forment une tache jaunâtre ou blanchâtre. La lumière qu'ils répandent est plus ou moins vive , d'un blanc verdâtre ou bleuâtre , comme celle des différens Phosphores : il paraît qu'ils peuvent varier à volonté son action , ce qui a lieu surtout lorsqu'on les saisit. Ces Insectes sont nocturnes; on voit souvent les mâles voler , ainsi que des Phalènes , autour des lumières, ce qui peut porter à conclure que la lumière les attire et que la nature a doué leurs femelles de cette propriété, afin que les mâles puissent les apercevoir dans la nuit et se livrer à l'acte de l'accouplement. Pendant le jour, ces Insectes restent cachés sous l'herbe; mais si l'on se promène en été après le coucher du soleil , ou les aperçoit au pied des buissons , répandant une lumière plus ou moins vivequi , dans des temps où l'ignorance régnait à un haut degré en France , a causé de grandes frayeurs à des voya-

geurs qui prenaient ces petits Animaux pour des revenants, des feux follets, etc.

En Amérique, et même en Italie, les Lampyres produisent un spectacle d'autant plus curieux, que les deux sexes sont ailés; on voit alors l'air sillonné en mille sens divers par des lumières qui vont tantôt s'arrêter sur des Arbres, tantôt se joindre ou bien

LAMPYRIDES

■ Ils se perdent dans des buissons ou dans l'herbe.

La larve des Lampyres ressemble beaucoup à la femelle de l'Insecte boarfaite; elle est munie de six pâtes lécaillueuses placées sur les trois premiers anneaux; la tête est de forme urvale, très-petite et munie de deux ténacules coniques, assez grosses, pectinées et divisées en trois articles.

La bouche porte deux longues dents lécailleuses, minces, courbées et très-sensibles. Le corps est composé de douze anneaux; il est plus large dans son milieu qu'aux extrémités, et sa partie postérieure est tronquée transversalement. La nourriture de cette larve se compose d'herbes et de l'euil-Ides de différentes Plantes; elle marche fort lentement en s'aidant de la partie postérieure de son corps, retire sa tête, et reste immobile dès qu'on la touche. Quand cette larve veut se transformer en nymphe, sa peau se fend de chaque côté du corps, et dans toute l'étendue des trois premiers anneaux; leur partie supérieure se détache tout-à-fait de dessous, et la larve tire sa tête hors de la peau qui la couvre, à peu près comme on tire une main hors d'une bourse; les deux fentes latérales donnant à l'Insecte un espace très-grand pour sortir de sa vieille peau, il en vient aisément à bout dans peu de minutes. La nymphe a le corps cour-

bé en arc ou en demi-cercle ; on lui voit encore remuer et allonger la tête, de même que les antennes et les pâtes.

\\Suivant Degér , les larves et les nymphes des Lampyres de notre pays jouissent de la propriété d'être lumineuses; ou a dit que quelques mantes n'avaient pas cette propriété ; mais ils en jouissent encore, quoique faiblement. Les femelles des Lampyres d'Europe, observées par Degér, pondent, sur le gazon ou sur l'herbe où elles vivent, un très-grand nombre d'œufs assez gros, de forme ronde et d'un jaune citrin, enduits d'une matière visqueuse qui sert à les attacher sur les Plantes.

Le nombre d'espèces de Lampyres

LAMANT

connus se monte à peu près à soixante. Dejean (Cat. des Col., p. 56) en mentionne trente-huit espèces. Celles qu'on peut considérer comme les types du genre sont :

Le Lampyre luisant, *L. noctiluca*, Lin., Panz., Faun. 1ns. Germ., xli, 7. Mâle long de quatre lignes, noirâtre ; antennes simples; corselet demi-circulaire, recevant entièrement la tête, avec deux taches transparentes en croissant ; ventre noir; derniers anneaux d'un jaune pâle. C'est la femelle de cet Insecte qui est vulgairement désignée par les campagnards sous le nom de Ver luisant; elle se trouve d'une extrémité de l'Europe à l'autre.

Lampyre d'Italie, *L. italica*, Lin., Oliv., Col. 11. 28, 12. Nommé dans le pays Lucciola. Corselet ne recouvrant pas toute la tête, transversal, rougeâtre, ainsi que l'écusson, la poitrine et une partie des pieds; tête, étuis et abdomen noirs, les deux derniers anneaux du corps jaunâtres. Les femelles sont ailées.

y. , pour les autres espèces, Fabricius et Olivier, Col. II , n° 28.

LAMPYIODES. Lampyrides. ins.

Tribu de l'ordre des Coléoptères , section des Pentamères, famille des Ser-

ricornes , division des Malacodermes, établie par Latreille qui lui donne pour caractères (Familles Naturelles, du règne Animal) : corps droit, mou, avec le corselet plat, tantôt demi-circulaire, tantôt carré ou trapézoïde , avancé sur la tête qu'il recouvre totalement ou postérieurement. Les palpes maxillaires au moins sont plus gros vers leur extrémité.

Les mandibules sont généralement petites, déprimées, pointues et entières au bout dans la plupart, unidentées au côté interne dans les autres. Le pénultième article des tarses est bilobé ; les crochets du dernier ne sont ni dentés ni appendiculés. Les femelles de quelques-uns sont aptères, ou n'ont que des élytres très-courtes.

+ Antennes très-rapprochées à leur

202 LAM

base ; bouche petite ; tête des uns avancée en museau , celle des autres cachée entièrement ou en majeure partie par le corselet , avec les yeux très-grands dans les mâles; extrémité postérieure de l'abdomen phosphorescente dans plusieurs.

Genres : Lycus, Omalius > Phengodes , Amydette et Lampyre.
fr. ces mots.

Antennes séparées à leur base par un écart notable ; tête point avancée en manière de museau, obtuse ou arrondie en devant , simplement recouverte à sa base avec la bouche et les yeux de grandeur ordinaire.

Genres : Dhile , Téléphore et Matlhine. V. ces mots. (g.)

LAMUTA. bot. phan. (Rumph.) Syn. de Cynomètre. y. ce mot. (b.)

* LAMYRE. Lamyra. bot. phan.

Dans le bulletin de la Société Philomatique de novembre 1818 , H. Cassini a proposé , sous ce nom , l'établissement d'un genre de la famille des Syiianthérées , qu'il a formé aux dépens du *Cirsium*. A.yant ensuite constitué plusieurs autres genres avec des espèces rapportées à juste titre à celui-ci , il ne l'a plus considéré que comme un sous-genre ; néanmoins il a continué à lui assigner des caractères distinctifs et à donner à ses espèces le nom générique de *Lamyra*. Nous ne reproduirons point ici tous les détails de l'organisation de ce sous-genre tels qu'ils ont été exposés par l'auteur; ils sont les mêmes que dans le *Cirsium*; mais nous en mentionnerons les caractères essentiels. Les folioles extérieures et intermédiaires de l'involucre Sont munies d'un appendice qui offre à sa base interne une protubérance calleuse, tubéreuse, charnue ou fongueuse ; les akènes sont lisses , arrondis , sans bourrelet ;picilaire , et pourvus d'un péricarpe très-épais et dur après la maturité ; Jour aréole basilaire large, m-biculaire , n'est point oblique ; l'aigrette est blanche et formée de poils plumeux à peu près égaux ; les corolles

sont presque régulières. Cassini place dans ce sous-genre huit espèces indigènes des régions méditerranéenne et orientale : 1° *Lamyra triacantha* , Cass., ou *Carduus Casabonœ*, L. Cette belle Plante croît dans l'Europe australe, et notamment aux îles d'Hyères; 2° *L. undulata* , Cass. , ou *Carduus hispanicus* , Lamk. , *Encycl. Méth.* ; 3° *L. diacantha*, Cass., ou *Carduus diacanthus* , Labillardière (*Ico/i. Pl.*

Syriac. rar., àùc. 2, p. 7, t. 3); *Cnicus afer* , Willd.; 4° *L. angustifolia* , Cass.; *Cnicus ec/rinocephalus* , Willd.

Cette espèce croît sur le Caucase ; 5° *L. pinnatifida* , Cass., ou *Cirsium horridum* , Lagasca , *Gen. et Sp. Pl.*, p. 24. Cette Plante que Lagasca a trouvée en Espagne dans le royaume de Grenade , n'est rapportée qu'avec doute au groupe des *Lamyra* ; 6° *L.*

stipulacea , Cass., ou *Carduus stellatus* , L. ; 7° *L. alata*, H. Cass.; 8° *L. glabella* , Cass. Ces deux dernières espèces sont originaires du royaume de Naples. (g..n.)

* LAMYXIS. bot. crypt. {Champignons.) *Rufiuesque-Schmaltz* a proposé ce genre dans les *Annales de la Nature* (1820}, pour un Champignon qui se trouve sur les Hêtres dans les monts Catskill aux Etats-Unis; il le dit intermédiaire entre le *Sistotrema* et le bolet , dont il diffère par ses pores inégaux, polygènes et lacérés ; son stipe est latéral, très-court; son chapeau est globuleux, blanc en dessus avec des taches d'un brun rouge briqueté en dessous , et muni vers son bord d'un sillon concentrique. *Rafinesque* , en donnant à cette Plante le nom de *Sistotrema globularis*, fait douter de la validité de ce genre. (•*■•

LANARIA. bot. phan. Plusieurs Plantes ont reçu cette dénomination, soit à cause du duvet laineux qui les couvre, soit en raison

de l'emploi qu'on en fait pour dégraisser les étoffes de laine. Ainsi dans le premier cas, le bouillon blanc {Verbascum Thapsus, L.}, et dans le second , le Gypsoplùla Struthium, L. , ainsi

i^ue la Saponaire, ont été nommés Laliarïa par les anciens.

Le genre Argolasia a été nommé lLanaria par Aiton (Hort. Kew.). V ■ ^Abgolasie. (g..n.)

LANCE DE CHRIST, bot. L'un ddes noms vulgaires de l'Ophioglotse vulgaire et du Lycope commun, (b.)

* LANCEOLARIA. bot. phan.

(De Candolle.) V- Héliophile.

LANCÉOLÉ, LANCÉOLÉE

lLanceulalus, Lanceolata. zool. bot.

•On emploie cet adjectif, soit en zoo- Uogie , soit en botanique, pour désigner toute partie de Plante ou d'Aniimal qui présente la forme d'un fer ikie lance. (j;.

LANCERON ou LANÇON, pois.

ffifcm vulgaire des jeunes Brochets.

If. Ésock. (b.)

LANCETTE, pois. Espèce du genrre Gobie, V. ce mot, et nom vulgaire edes Mourines en quelques lieux, (b.) '

LANCISIA. bot. phan. Genre de la famille des Synanthérées , établi, en 1719, par Pontédéra sur une plante assez mal décrite pour que les auteurs qui ont adopté postérieurement le nom proposé par Pontédéra , ne se soient pas accordés relativement à l'espèce de *Cotula* qui lui a servi de type. Adanson a cru que c'était le *Cotula coronopifolia* , L. , et cette opinion est aussi celle ■ qui résulte, selon Cassini , de l'obscure description du botaniste italien. Gaertner a donné pour type au *Lancisia* le *Cotula turbinata* , L. , dont on a fait le genre *Ceisia*. Persoon a composé son *Lancisia* , de Plantes qui appartiennent au *Lidbechia* de Bergius. Au milieu de ces changements et de ces fausses applications du mot ancien à des choses qui sont d'ailleurs assez convenablement nommées , le meilleur parti est de le rayer des registres de l'histoire naturelle. En conséquence nous renvoyons pour la connaissance des objets, à lons les mots génériques cités dans cet article. (u.n.)

LAN 2u5

LANCISTÈME. bot. phan. Pour *Lacistème*. V. ce mot. (b.)

LANÇON, fois. L'un des noms vulgaires de l'Équille. ce mot. On l'élend aussi au jeune Brochet, (b.)

LANCRÉTIE.. *Lancretia*. bot.

phan. Genre de la famille des Dipsacées et de la Décandrie Polygynie, L., établi par Delile (Fl. d'Egypte , p. 69 , t. a5) qui l'a ainsi caractérisé : calice à quatre ou cinq sépales égaux entre eux; quatre ou cinq pétales ; dix étamines libres , dont cinq plus courtes et opposées aux pétales; quatre à cinq styles. Le *Lancretia strobilifera* , Delile (/tic. c't. j, est l'unique espèce de ce genre : c'est un sous-Arbrisseau à feuilles simples, dentées ou crenées ,

et à fleurs terminales. 11 avait été trouvé autrefois en Egypte par Lippi qui, dans ses manuscrits que possède le professeur de Jus-sieu , l'avait nommé *^ic/roides africanutn*. Lors de l'Expédition d'Egypte, Delile retrouva cette Plante dans les mêmes lieux , et on crut alors qu'elle était particulière aux contrées arrosées par le Nil. Il n'en est pourtant pas ainsi : l'Egypte est la dernière limite du *Lancretia*, qui a pour véritable patrie tout intérieur de l'Afrique compris entre la mer Rouge et les côtes occidentales de l'Océan. Cette Plante, peu répandue dans l'Egypte, est au contraire très commune au Sénégal , d'où J . Gay en a reçu plusieurs échantillons. (G..N.)

* LAN DARIUS, ois. (Frisch.) Syn.

du Busard Saint-Martin. V. Faucon.

(dr..z.)

LANDES. *Ericeti*. geol. Etendues de terrain généralement unies, dont le sol arénacé est rendu noirâtre par un peu de détritus végétal que n'emportent point les eaux pluviales, ordinairement stagnantes à leur surface et ne se dissipant guère que par l'évaporation ; elles sont stériles ou revêtues seulement de quelques Plantes courtes qui en forment la sombre et misérable verdure. L'ingratitude de la terre, qui ne paierait par aucune récolte abondante les soins que l'Homme so

04 LAN

donnerait pour leur culture, fait ordinairement des pays de Landes des solitudes , mais non ce qu'en géologie ainsi qu'en géographie physique on appelle Désert. V. ce mot. Dans les Landes, le sol n'est point composé d'une arène mobile que soulèvent les

vents comme ils le font des vagues de la mer, et qui ne présente plus , quand le sable a disparu , qu'une surface dépouillée, formée de pierres et de rochers. Le terrain des Landes est plus consistant, et s'il n'est pas propre à toutes sortes de Végétaux , c'est peut-être moins à sa stérilité qu'à son peu de profondeur qu'il le doit ; erra-fet , à quelques pieds au-dessous de sa surface , à quelques pouces même , on trouve une couche dure et compacte, brunâtre, foncée, épaisse de plusieurs pouces à plusieurs pieds , formée d'arène quarzueuse , liée par un ciment ou le Fer est souvent en si grande quantité qu'il peut en être extrait avec avantage, et fournir aux besoins de fonderies qui se trouvent en quelques pays de Landes.

Cette couche dure , dont on tire parfois une assez bonne pierre à bâtir, est nommée Alios dans l'Aquitanique. Elle devient plus dure et une véritable brèche quand des cailloux roulés de toutes les grosseurs, antiques galets, s'y mêlent au point d'y dominer.

Les eaux pluviales n'ayant guère d'écoulement sur les Landes , qui , presque partout , sont exactement horizontales, pénétrant le sol après avoir d'abord stagné à sa surface , sont retenues par l'Alios, et lui portent peut-être par les principes dont elles se sont chargées comme dissolvant , les matériaux du ciment qui en aide l'augmentation ; car on croit avoir remarqué en plusieurs endroits que l'Alios se répare quand on en a extrait quelques parties. C'est même un préjugé parmi les habitants que les Bruyères brûlent , dans cette circonstance, la matière ferrugineuse délayée par l'eau , et qui colorant en rouge , en jaune ou en brun la couche dure, y superpose le métal qu'on en extrait. Par l'obstacle qu'oppose

l'Alios aux infiltrations , il suffit I de creuser la terre à un , deux ou I trois pieds , pour trouver ordinaire- | ment l'eau , et c'est la fraîcheur qui I en résulte qui nourrit les racines d'u- I ne végétation dont la nature est I sans doute déterminée par la longueur qu'il esf permis aux racines d'atteindre, puisque des Arbres qui auraient besoin de beaucoup de fond , ainsi que les Végétaux pivotans, n'y sauraient croître , l'Alios s'opposantà l'enfoncement, à une profondeur suffisante, de racines considérables. Cependant, en quelques cantons des pays de Landes où l'Alios est plus profond , ou bien oh quelque accident le brisa , on trouve de beaux Arbres , entre autres le Pin maritime et de superbes Roures. Dans une baronnie de Saint-Magne qui appartient à la famille de l'auteur de cet article, on voyait encore , en 1790, au hameau nommé Brau, l'un de ces vénérables Chênes dont le diamètre n'avait pas moins de douze pieds , el sous lequel le bon Henri , quand il tenait sa cour à Nérac , s'était, dil-on , reposé pour dîner dans une partie de chasse. Cet obstacle à l'infiltration des eaux qu'oppose l'Alios , est encore la cause qu'on trouve dans les Landes beau-?

coup de lagunes sans issues, formées par les eaux pluviales, toutes peu profondes, niais remarquables par la pureté de leurs eaux reposant sur un fonds de sable blanc. Les Poissons, qui n'y sentent conséquemment jamais la vase, sont réputés délicieux. La plupart sont des Cyprins, l'Anguille et lefirochet; c'est dans l'une de ces lagunes de la baronnie de Saint-Magne, appeléeLahuco, réputée très-profonde, que nous avons vu prendre un Congre de trois pieds de long, qui causa un grand effroi à tous les paysans de corvée aidant à celte pêche et qui l'appelèrent un Serpent d'eau. Un Poisson éminemment marin , trouvé dans une lagune d'eau douce , à vingt lieues environ des côtes de l'Océan et sans

qu'on puisse supposer qu'il y ait eu communication depuis sa naissance , entre Lahuco et le golfe de

LAN

Gascogne, est un fait très-remar- [quable en histoire naturelle. Il est [probable qu'il existe encore plus

l'un Congre clans la lagune oii le seicond coup de filet ramena celui que nnous y avons vu.

On trouve des- Landes plus ou iimoins étendues en Ecosse, aux pays <Ue Galles et de Cornouailles ,en Westpphalie , en Flandre, eu Bretagne, osn Sologne et surtout vers les côtes die Gascogne entre la Garonne et l'Adipur, oii elles ont donné leur nom à inn département dont Ses Landes les mfieux caractérisées occupent presque [•toute la surface. Les parties de la Ponnéranie, du Brandebourg et delà IPologne, q\ie nous avons visitées,sont aaussi , en beaucoup d'endroits , couvvertes de Landes , qui partout indiquent l'antique présence de la mer ■ou le fond mis à sec de quelque grand .ïamas d'eau. La végétation de ces solitudes est ordinairement formée par les lErica cinerea , scoparia , letralix et ccUiaris , avec des Ulex si communs qu'ils en ont pris le nom de Lanxïicr. Dans le Midi, quelques Cistes 19 y mêlent déjà ; des Graminées courûtes et rigides , le Festuca ovina , entre autres, y fournissent une maigre ^nourriture à des Moutons chétifs. Les lLicbens scyphipbores et coralloïdes vy sont fort communs aux lieux tour- Ujcux fréquens dans ces Laudes. On yy trouve encore la végétation propre aaux tourbières, et sur les bords des Ua-giïnes , quelques Plantes particulières, telles que le Lobe/ia Dort-manna, regardé jusqu'ici comme exclusivement du Nord, et que

nous avons rencontré dans les Landes d'Anvers, • et dans l'étang de Cazau au revers des dunes aquitaines.

La surface des grandes Landes est sujette à un mirage qui ne le cède point par ses effets Ici plus extraordinaires à celui des déserts de l'Égypte et de l'Arabie, sur lequel Monge a donné un excellent Mémoire. En Languedoc, en Provence, dans le Dauphiné, en Espagne, il existe aussi des Landes, mais les Bruyères y disparaissent peu à peu; des Cistes, des Mufliers», des

LAN 205

Astragales, et surtout des Labiées aromatiques les remplacent; cependant les Ulex y persistent long-temps vers le sud. Ce sont ces Landes qu'on nomme Garrigues dans quelques cantons de la France méditerranéenne. Il est probable que les Steppes de l'Asie centrale, à la nature de la végétation près, sont, comme les Parméras de la péninsule Ibérique, d'immenses Landes plus élevées au-dessus du niveau de la mer que celles de la France et de la Germanie. (u.)

LANDIA. uot. pu an. Commerson nommait ainsi un genre de Rubiacées qui ne diffère du Mussœnda, que parce que toutes les divisions du calice sont égales entre elles. Cette légère différence ne paraît pas suffire pour distinguer un genre; elle exige seulement qu'on en modifie le caractère générique. V. Mussœnda.

LANDIER. bot. ru an. (Lamarck.) Syn. d'Ajonc {Ulex}. V. ce mot. (b.)

LANDOLPHIE. Landolphia. bot.

piian. Genre de la famille des Apocynées, et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par Palisot-Beauvois (Flore d'Oware et de

Bénin, t. j, p. 54, t. 55), dédié au capitaine Laudolphc , commandant le vaisseau qui porta Beauvois en Afrique. Ce genre est ainsi caractérisé : calice persistant, composé de cinq à six folioles coriaces , écailleuses , imbriquées , les intérieures plus petites ; corolle monopétale , tubuléc , le limbe à cinq divisions égales, obliques, le tube velu à son orifice ; cinq étamines alternes avec les divisions de la corolle , insérées à l'orifice du tube , à filets courts et à anthères oblongues; style filiforme; stigmate presque divisé; ovaire presque globuleux , comprimé , marqué sur son pourtour, de dix stries; baie charnue , presque globuleuse , déprimée , uniloculaire , renfermant plusieurs graines aplaties, aliachées à un axe central. Ce genre oll're, selon Beauvois, des ressemblances avec le Gynopoçun de Fors-

io6

LAN

LAN

ter, mais il en est suffisamment distingué par le fruit.

La Landolphie d'Oware, Lcindi?l~ p/ia Owariensis , Beauv., loc. cit., est un Arbrisseau qui croît dans l'intérieur des terres du royaume d'Oware.

Ses feuilles sont opposées , ovalessoblongues, entières, lisses et aiguës.

Ses fleurs sont terminales , disposées sur une panicule en forme de corymbe. (g..n.)

LANFARON. ins. L'un des noms vulgaires de l'Attélabe delà Vigne dans quelques provinces du Midi.

LANG. mam. L'Animal delà Chine, mentionné par le P. Navarrete, comme ayant les jambes de devant très-longues et celles de derrière fort courtes, serait-il une espèce de Giraf'e ou un Musc? (b.)

* LANGADIS. bjept. saur. Barbot dit qu'on nomme ainsi en Afrique une espèce de Crocodile qui ne vit jamais dans l'eau. (b.)

LANGAIIA. rept. oPH. Genre de la famille des vrais Serpens munis de crochets à venin , dans l'ordre des Ophidiens, établi par Lacépède 'sur un Serpent découvert à Madagascar par Bruguière qui le fit connaître dans le Journal de Physique, en 1784. Ses caractères sont : des plaques en forme d'anneaux et faisant le tour delà queue derrière l'anus; de petites écailles seulement vers l'extrémité de la queue; tête et ventre garnis de grandes plaques; anus simple, transversal et sans ergot; dents aiguës; des crochets venimeux; naseau long et pointu. On n'en connaît qu'une espèce qui n'existe , à ce qu'il paraît, dans aucune des collections de l'Europe. C'eslle Langaha Madagascariensis , Lacép. ; Jmphisboena Langaha , Schneid. Ce Serpent, rougeâtre sur le dos, et qu'on dit être fort à craindre , acquiert trois pieds de long. (H.)

LANGÉOLE. bot. puant. L'un des noms vulgaires de l'Kuphrais officinale. ("•)

LANGIT. bot. pu an. Nom vulgaire de pays proposé dans le Dictionnaire de Détéville, pour désigner le I genre Aylanthé. V. ce mot. (b.)

LANGLEIA. bot. phan. (Scopoli.) | Syn. de Casearia. V. ce mot. (b.)

LANGODIUM. bot. phan.

(Rumph.) Pour Lagondium. V. ce mot. (b.)

LANGOU. bot. cuypt. {Champignons.) L'un des noms vulgaires du Boleûs Juglandis , L. , qu'on mange en plusieurs cantons de la France.

LANGOUSTE. Palinurus. crust. Genre de l'ordre des Décapodes , famille des Macroures , tribu des Langoustines (Latr. , Fam. Natur. du Règn. Anim.) , établi par Fabricius , et ayant pour caractères : queue terminée par une nageoire composée de feuillets presque membraneux , à l'exception de leur base, et disposée en éventail; pédoncule des antennes intermédiaires beaucoup plus long que les deux filets articulés de leur extrémité ; tous les pieds presque semblables , terminés simplement ^ en pointe ou sans pince didactyle; thorax cylindrique; antennes latérales sétacées, fort longues, hérissées de piquans; yeux grands , presque sphériques , situés à l'extrémité antérieure du thorax; leurs pédicules insérés aux extrémités latérales d'un support commun, fixe et transversal.

Les Langoustes diffèrent des Scillares par les antennes et par les yeux; elles s'éloignent des Ecrevisses par des caractères de la même valeur.

Les antennes extérieures des Langoustes sont ,. proportions gardées, beaucoup plus grosses que les correspondantes des autres Macroures : elles sont portées sur un grand pédoncule, très-hérissées de poils et de piquans, et fort longues. Les intermédiaires ont essentiellement la figure des an-1 tenues analogues des Brachyures , et n'en diffèrent que parce qu'elles sont plus grandes,; elles sont placées un peu au-dessus des précédentes.

Les pieds- mâchoires extérieurs ou

les derniers ressemblent à de petits pieds avancés et dont les articles inférieurs sont dentelés et velus au côté interne. Le thorax ou le corselet est soyeux, parsemé d'un grand nombre d'épines très-aiguës et d'aspérités. Les épines sont beaucoup (plus fortes antérieurement, elles sont l'enfourme de dents, comprimées) et 1 très-acérées, surtout les deux qui sont placées derrière les yeux. La 1^{re} poitrine forme une espèce de plastron triangulaire, négligé ou tuberculé, sur les côtés duquel sont insérées les pâtes qui, à raison de la ligature triangulaire de cette pièce, s'écartent graduellement de devant en arrière. Ces pâtes sont courtes, assez 1^{res} Torsions, et se terminent toutes par un doigt simple, crochu, garni de petites épines ou de poils. Elles n'ont [point de pinces : les antérieures sont (plus courtes que les quatre suivantes tel que celles surtout de la troisième [paire. Les segments de la queue sont 1^{er} ordinairement traversés par un sillon (dans leur largeur; ils se terminent latéralement en manière d'angle dirigé en arrière et souvent dentelé ou cépéux; en dessous, les anneaux sont unis les uns aux autres par une membrane. Ce qui distingue les femelles des mâles, c'est que ceux-ci ont, aux quatre anneaux du milieu de la queue, deux filets membraneux (Ovale, auxquels les œufs s'attachent «après la ponte. Suivant Aristote, la 1^{re} Langouste (Carabus) femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le premier [pied fendu. Comme d'après la manière de compter de ce naturaliste, la première paire de pieds est celle qui est la plus voisine de la queue, son observation est exacte, et effectivement, les femelles ont, vers la base du doigt de ces pieds, une sorte d'ergot qui manque dans le mâle.

Les Grecs ont donné le nom de Carabos, à l'espèce de Langouste la plus commune de nos mers; c'est celle que les Latins nomment Locusta.

Belon , Rondelet et Gesner l'ont mentionnée sous ce dernier nom. De-

LAN 207

là , l'origine du mot de Langouste par lequel on désigne dans notre langue cette espèce. La treille a préféré employer ce mot pour désigner ce genre, que celui de Palinure qui n'est que la traduction littérale du nom assez impropre que Fabricius a donné à ce genre. Les Temelles de Langoustes que l'on trouve dans nos mers, portent depuis le mois de mai jusqu'en août; leurs œufs , que l'on nomme corail, sont disposés dans l'intérieur de leur corps en deux masses allongées, de la grosseur d'un tuyau de plume et d'un très-beau rouge; ils se dirigent, eu divergeant, vers deux ou vei tures situées, une de chaque côté, vers la base des pâtes intermédiaires; ces œufs sont très-petits en sortant du corps de la mère , mais ils croissent insensiblement pendant une vingtaine de jours qu'ils : -tuent, ni attachés aux feuillets du dessous de la queue ; ce temps écoulé, elle les détache tous ensemble leur enveloppa , et on les trouve souvent fixés contre des rochers , ou errans et abandonnés aux courans ou aux vagues. Ce n'est qu'une quinzaine de jours après que ces œufs éclosent. Sui- vant Aristote, la femelle replie la partie large de la queue pour comprimer ses œufs au moment où ils sortent de son corps , et elle allonge les feuillets inférieurs afin qu'ils puissent les recevoir et les retenir. Après cette dernière ponte , elles en font une seconde en se débarrassant totalement de leurs œufs; alors elles sont maigres et peu estimées , et l'on ne recherche que les mâles. L'accouplement a lieu au commencement du printemps. Aristote décrit aussi les mues qu'il avait très-bien observées, et il dit qu'elles se Tont au printemps et quelquefois eu automne.

Les Langoustes abandonnent nos côtes vers la fin de l'automne ou au commencement de l'hiver, et alors elles gagnent la haute mer et vont se cacher dans les fentes des rochers à de très-grandes profondeurs. Elles vivent de Poissons et de divers Animaux marins, et parviennent, au

ûo8 LAN

bout de quelques années, à la 'longueur d'un pied. Ces Crustacés peuvent vivre très-long-temps, et s'ils parviennent à se réfugier dans quelques lieux peu favorables à la pêche , ils atteignent une grosseur très-considérable. D'après Risso , les mâles vont à la recherche de leurs femelles en avril et en août ; dans l'accouplement , les deux sexes sont face à l'ace, et se pressent si fortement, qu'on a de la peine à les séparer , même hors de l'eau. Sur les côtes de INice on pêche ce Crustacé avec des nasses. On met dans des paniers , des pâtes de Poulpes brûlées , des petits Poissons , des Crabes , etc. , on les descend pendant la nuit dans des endroits rocailleux oii les Langouslcs se plaisent beaucoup, et on prend, le lendemain matin, celles qui sont dedans. On fait une grande consommation de ces Crustacés sur nos tables, el on les envoie dans l'intérieur et à Paris où. ils sont très-recherchés. Pour les faire voyager, on les fait cuire , sans quoi ils se gâteraient en route. En i8oi , Latreille a débrouillé (Annal, du Mus. d'Hist. Nalur. de Paris, 17e cahier) le chaos qu'offraient à l'égard des espèces les ouvrages antérieurs.

Olivier (Encyclopédie Méthodique, art. Palinurb) a encore jeté quelque lumière sur ce genre qui se compose de huit à neuf espèces : la principale et celle qui est la plus commune en France , est :

- La Langouste commune, *Palinurus vulgaris*, Latr. ; Pal. *Locusta* , Oliv. ; Pal. *quadricornis* , Fabr. , Leach {Malac. Brit., ôo); Langouste , Belon ; Pal. Langouste , Bosc. Elle est grande , rougeâtre , avec le test hérissé de piquans , garni de duvet , et armé, à sa partie antérieure, audessus des yeux , de deux dents très-fortes , avancées , comprimées et dentelées en dessous ; la queue est tachetée ou ponctuée de blanc jaunâtre; les segmens ont un sillon transversal et interrompu. Les pieds sont entrecoupés de jaunâtre et de rougeâtre.

K-, pour les autres espèces, Latreille et Olivier [loc. cit.) (g.)

LAN

LANGOUSTINES. *Palinuri*.

cnusT. Tribu de l'ordre des Décapodes, famille des Macroures, établie par Latreille (Fam. Natur. du Piègn. Anim.) qui eu avait fait une famille dans ses autres ouvrages.

Cette tribu, telle qu'il l'adopte (loc.

cit.), a pour caractères : tous les pieds presque semblables , à tarsi coniques ; aucun d'eux ne se terminant par une main parfaitement didactyle; les antennes latérales sont sétacées, longues* t épiueuses. Cette tribu ne renferme que le genre Langouste.- V. ce mot. (g.)

LANGOUZE. bot. fhan. Nom vulgaire , à Mascareigne, du Cardamome de Madagascar , qui croît aussi dans cette île. (b.)

LANGRAYEN. *Ocypterus*. ois.

(Cuvier.) Genre de l'ordre des Insectivores. Caractères : bec court , conique , arrondi , comprimé à la pointe , un peu élargi à la base; mandibule supérieure inclinée vers l'extrémité qui est un peu échancrée ; base du bec entourée de soies fortes et longues ; narines placées assez près de la base du bec, ovoïdes , ouvertes ; pieds courts ; quatre doigts , trois en avant, l'intermédiaire plus long que le tarse, les latéraux inégaux, l'externe uni à l'intermédiaire jusqu'à la première articulation; l'interne seulement à l'origine; ailes assez longues , dépassant quelquefois l'extrémité de la queue; les trois premières rémiges étagées , les quatrième, cinquième et sixième les plus longues.

L'histoire particulière de ces Oiseaux est encore fort obscure; aucun des voyageurs qui eût pu nous la procurer ne s'en est occupé, et tout ce que nous en savons se borne à des faits qui sont communs aux Oiseaux de plusieurs autres genres, et particulièrement aux Hirondelles. Sonnerat dit qu'elles se rapprochent aussi des Pies-Grièches par le courage et même la témérité qu'elles mettent dans l'attaque et la défense contre des Oiseaux d'une taille d'une force bien disproportionnée à la leur. Les

LAiN

...aigres sont habitants de l'Inde et de l'Océanique.

Langrayen a ventre blanc ,)Cyprinus leucogaster, Valenciennes, Mém. du Mus. T. vi, pl. 7, fig. 9; Urianus leucorhynchus , Gmel.; Lanius Dominicanus , Gmel. ; Lanius de Manille, Buffon , pl. enl. 9 , fig. 1. Parties supérieures brunes ; tête et cou ardoisés? rémiges et rectrices d'un gris ardoisé en dessus, >Haut-clair en dessous; parties inférieures blanches; queue faiblement fourchue ; bec bleu; pieds noirs.

ICaille , six pouces. De Timor et Manille.

Langrayen jmuN , Artainus fusrus, Vieil. Front bordé de noir; blumage généralement d'un gris remiDTUni, plus clair sur la poitrine et .es parties inférieures, à l'exception des rémiges qui sont noires; queue ;gris en dessous et tel minée île blanc ,iale sur les rectrices latérales; bec îblcuâtre, noir à la pointe; pieds uruns. Taille, six pouces et demi.

ZcUe espèce pourrait bien être la même que la suivante.

Langrayen enfumé , Ocypitrus l'uscatus , Valenc. , Mém. du Mus. IT.vi,pl. 9, (ig. 1. Plumage d'un <>run enfumé ; joues noiïâles; rémi- [05 et rectrices d'un bleu ardoisé ; ectrices caudales noires; extrémité lues barbes internes des deuxième, troisièmeeel quatrième lectrices, blan-

hc , ce qui tonne eu dessus une jaudeletle blanchâtre; bec bleu; lieds noirs. Taille, six pouces trois -gnes. DesMoluques.

Langiiayen gkis , Ocypierus ci/ieceus , Valenc. , Mém. du Mus. T. vi, lll. g, lig. 2; jirlamus cinereus , Vieil. Parties supérieures d'un gris llcuâlrc; tête grise; joues noires; lémiges ardoisées , d'un blanc grisàvc en dessous , n'altcignant pas l'exrrémité de la queue qui est arrondie;

ectrices noires , terminées de blanc à ^exception des deux intermédiaires ; Parties inférieures d'un brun tiès-

lair ; bec bleu , noir à la pointe ;

lieds bruns. Taille , sept pouces trois ~gnes. De Timor.

TOME IX

LAN 'jog

Lanorayen a lignes ulanciies , *Ocypterus albu-villatus* , Cuv. , Règu.

Aniiu. T. iv, pl. 3, fig. 6; Valenc, Mém du Mus. T. vi, pl. 8, (ig. 1.

Parties supérieures d'un brun noirâtre; tête et parties inférieures d'un brun plus clair; rémiges d'un bleu ardoisé , avec les barbes externes des seconde , troisième et quatrième rémiges blanches; rectrices noires , les latérales plus longues, de manière que la queue est fourchue, marquées, à l'exception des intermédiaires , d'une tache blanche à l'extrémité ; bec bleu ; pieds noirs. Taille , six pouces et demi. Les jeunes ont la majeure partie du plumage roussâtre , tacheté de blanc; les petites tectrices alaires terminées par une tache noirâtre, avec un point blanc; la tache blanche des rectrices lisérée de noir; le bec blanc , avec la pointe brune. De Timor.

Langiiayen petit, *Artamus mirior*, Vieil. Plumage d'un brun roux foncé , avec les joues et le imnton noirâtres; rémiges et rectrices noires, ces dernières terminées de blanc; bec bleuâtre; pieds noirs. Taille, cinq pouces. Des terres Australes.

Langiiayen Tciia-Ciier , *l.anius viriitis* , Ij. ; ylr/la/nus viridis, Vieil., liuff. , pl. cnlum. no, fig. 2. Parties supérieures d'un vert sombre: tête olivâtre; rémiges noirâtres, bordées de vert; lectrices intermédiaires d'un vert sombre, les latérales noirâtres à la base ; parties inférieures bbmehes ; bec d'un bleu foncé ; pieds noirs.

Taille, six pouces. De Madagascar.

Langiiyen a ventre roux , *Ocypterus rufi* e/i/er, Valenc, Mém. du Mus. T. vi, pl. 7, fig. 1. Parties supérieures d'un brun lavé de grisâtre; tête cendrée; rémiges aussi longues que les rectrices , ardoisées; lectrices alaires terminées de blanc ; queue arrondie; rectrices d'un bleu noirâtre, terminées de blanc grisâtre; parties intérieures roussâtres; bec bleu; pieds noirs. Taille, six pouces. Du Bengale. (dr..z.)

* LANGSDORFFIE. *Langsdorffia*.

210 LAN

uot. piian. Genre de la Monœcic *Triaudii* c , L., établi par Martius (*Esc/iweg*: Journ. von Brasilieit) et adopté par Richard père , qui l'a placé dans la nouvelle famille des Balanophorées, et l'a ainsi caractérise :

fleurs monoïques sur des capitules séparés. La phoranthé des maies est ovoïde-conique , revêtu de folioles charnues; les (leurs sont portées suides pédicclles plus longs que les folioles du phoranthé ; elles ont un calice à trois divisions profondes, étalées , ovales, tronquées et concaves; trois étamines dont le tube anthérifère (*Synème*) est très-court, et les anthères soudées et extrorsées. Les fleurs femelles sont setiformes et très-serrées sur un phoranthé globuleux nu inférieurement; leur ovaire est infère , grêle et presque fusiforme ; le limbe du calice est couvert de verrucosités qui existent sur son bord ; le style est simple, de moitié plus court que l'ovaire, et portant à son sommet des stigmates globuleux. Une seule espèce constitue ce genre curieux. Richard père (loc cit.) l'a nommé *Langsdorffia janeirensis* , et en a publié une très-belle figure accompagnée des détails les plus intéres-

sant. Marlius lui avait donné le nom spécifique à l'aypogea. C'est une Plante herbacée, dont la racine est épaisse, horizontale, rameuse, les pédoncules couverts d'écaillés lancéolées, imbriquées et serrées les unes contre les autres. Elle a été découverte dans les forêts ombragées, près de Rio de Janeiro, par Langsdorff et Marlius. (G..N.)

LANGUARD. ois. Syn. vulgaire du Toi col. y. ce mot. (dr..z.)

LA1NGUAS. bot. phan. (Koenig.) y. Heeeénie.

LAJSGUE. zooli*.. Généralement l'organe du goût, la Langue peut encore, par l'effet de la complication de structure qu'elle vient alors à acquérir, et principalement par le grand développement des muscles qui entrent dans sa composition, remplir d'autres fonctions plus ou

LAN

moins importantes : ainsi chez l'Homme, par exemple, elle contribue à la formation de la parole, à la déglutition et à la mastication. Sa structure devenant au contraire plus simple chez les Animaux inférieurs, elle perd son volume, sa mobilité, se réduit presque à une simple membrane, et les fonctions dont elle s'acquittait secondairement, ou sont transmises à d'autres organes, ou même ne s'exécutent plus.

La Langue est une des parties qui fournissent les meilleurs caractères au zoologiste, soit à cause de son importance physiologique, soit à cause des variations sans nombre qu'elle présente souvent d'un genre à l'autre, sous le rapport de son volume, de sa forme, de sa structure, du degré de liberté dont elle jouit, du nombre et de la disposition de ses papilles; soit enfin parce que

sa position, presque externe, la rend un des organes les plus facilement accessibles à l'observation. Aussi, diverses particularités plus ou moins remarquables de son organisation ont-elles servi à caractériser une multitude de genres, et même valu à plusieurs des noms, tels que ceux de *Pteroglossus*, de *Glossophage* et de *Microglosse*. Il est à regretter, pour la justesse comme pour la précision de nos systèmes et de nos méthodes, que, souvent molle et charnue, comme chez la plupart des Mammifères, elle ne puisse être toujours conservée par les voyageurs, et manque ainsi très-fréquemment dans les collections zoologiques.

Nous renvoyons, pour la description des muscles qui composent la Langue, aux Mémoires assez récemment publiés (1822 et 1825) de Baur, de Blandin et de Gerdy. Le nombre de ces muscles, la manière dont ils se confondent en plusieurs points, ont long-temps arrêté les anatomistes :

on n'avait pu ni bien indiquer leur disposition, ni même déterminer exactement leurs limites, et on avait déclaré le tissu de la Langue véritablement inextricable. Au reste, les ré-

LAN

liaments où sont parvenus les anatomistes que nous venons de citer, Montrent on ne peut mieux la difficulté du sujet. Gerdy a en effet trouvé : nombre de ces muscles ou faisceaux musculaires plus considérable qu'on ne l'imaginait : ainsi, il (distingué un muscle lingual superficiel, deux linguaux profonds, des linguaux transverses, des linguaux sublinguaux, qui forment les muscles intrinsèques; les extrinsèques sont les téno-axo-stylo-glosses, les deux hyoglosses, les deux génioglosses, les eux

glosso-staphylins , sans parler pjs faisceaux hyo-glosso-épiglot-tiujes qui ne sont pas coustans.

La membrane du dos ou de la face inférieure de la Langue , ou la membrane gustative , est une continuation de la muqueuse qui tapisse toute la cavité orale , et elle n'en diffère guère que par le développement plus considérable des papilles. Ces papilles sont de plusieurs sortes : les Coniques , ainsi nommées à cause de leur forme , couvrent toute la face supérieure de la Langue ; il y a même deux sortes de papilles coniques , les unes toujours molles, flexibles, très-fines, filiformes, et , selon Blainville, probablement nerveuses; elles occupent surtout la pointe et le bord de la langue : les autres , plus fermes , plus épaisses; c'est au milieu qu'elles se trouvent le plus souvent. Les Fongiformes , ainsi nommées à cause de leur forme qui rappelle celle d'un champignon, sont plus grandes que les coniques , mais peu nombreuses :

«t vers le bout qu'elles se trouvent plus grand nombre. Enfin les papilles Caliciformes ou à calice, dont le nom indique suffisamment la forme, sont encore en bien moindre nombre, et ne se voient qu'à la partie postérieure de la Langue , où elles disposent, sur deux lignes opposées , d'une manière ordinairement imétrique. D'autres anatomistes ont aussi divisé les papilles en Filiformes, mûgiformes ou Couquies, et Lenticulaires.

I-La plupart des Mammifères res

semblent beaucoup à l'Homme pour la structure de la Langue : seulement, les papilles sont de forme et quelquefois de nature différentes. C'est ainsi qu'on trouve chez les Chats , et dans

quelques autres genres, des papilles revêtues d'étuis cornés assez semblables à de petits ongles : ce sont ces papilles cornées qui donnent à la Langue du Chat la dureté que chacun lui connaît, et qui, lorsque l'Animal vient à lécher, lui fait produire sur la peau l'effet d'une râpe.

La Langue du Porc-Epic a, sur les côtés, de larges écailles terminées par plusieurs pointes ; dans d'autres genres, chez plusieurs Cétacés, par exemple, les papilles sont peu ou ne sont point distinctes ; mais les Fourmiliers et les Echidnés ont une Langue véritablement bien différente, mince, allongée, et susceptible d'une extension considérable ; elle ressemble ainsi à celle de plusieurs Oiseaux et de beaucoup de Reptiles ; mais le mécanisme de son extension est tout autre, et la ressemblance est plutôt apparente que réelle.

Le caractère classique de la Langue, chez les Oiseaux, est d'être soutenue par un ou par deux os qui en traversent l'axe, os que les anatomistes ont généralement regardés comme des éléments nouveaux d'organisation, mais dont Geoffroy Saint-Hilaire a trouvé les analogues dans les cornes postérieures de l'hyoïde. Ces os de la Langue, ou, suivant la nomenclature de cet anatomiste, les g/osso- /ijau.v, ne manquent réellement dans aucune classe : on voit toujours en effet une ou deux pièces en rapport avec la Langue, et en même temps appuyées sur le basi-hyal ou le corps de l'os hyoïde ; ces pièces ne sont autres que les glossohyaux, qui conservent ainsi constamment les mêmes connexions. Les Mammifères ont deux glossohyaux ; mais, chez beaucoup d'Oiseaux et chez les Poissons, rien ne s'interposant plus entre ces deux pièces, à cause de l'état rudimentaire des muscles linguaux, elles se rapprochent et se confondent sur la li-

gne médiane; et il n'y a plus qu'un seul glossohyal. La disposition particulière du glossohyal des Oiseaux tient à l'allongement du col de toutes les parties cervicales dans cette classe : on conçoit en effet comment la longueur considérable du basiUyal et du glossohyal, oblige cette dernière pièce à s'avancer profondément dans la Langue.

La Langue des Oiseaux est d'ailleurs très-rudimentaire et très-peu épaisse. Le glossohyal, quoique très-grêle lui-même, en forme une grande partie, et n'est recouvert que de quelques muscles très-minces et des tegumens; et même si dans quelques genres, comme chez les Perroquets et les Phénicoplères, elle est volumineuse, et paraît un peu plus semblable à celle des Mammifères, c'est encore une simple apparence tenant à la présence d'un amas de tissu cellulaire et de graisse. La Langue du Flammant passe même, à cause de cette structure grasseuse, pour un mets très-recherché. On sait que l'empereur Héliogabale entretenait constamment des tioupes chargées de lui procurer en abondance des Langues de Flammants; et aujourd'hui même, il paraît que ces Langues sont encore, en plusieurs lieux, recherchées avec une égale avidité,

Suoit-Jue dans un autre but. Ainsi Geoffroy Saint-Hilaire a souvent vu en Egypte le lac Menzaleh (à l'ouest de Dainiette) couvert d'une multitude de baïques pleines de Flammants:

les chasseurs se procurent ainsi, en arrachant et en pressant les Langues, une substance grasseuse qui remplace pour eux le beurre avec avantage.

lia Langue est pareillement assez épaisse chez les Perroquets, ou du moins chez une partie d'entre eux :

car, dans cette famille, généralement caractérisée par le volume plus considérable de cet organe, il est un petit genre qui en est presque entièrement privé : je veux parler de la section des Microglosses de Geoffroy Saint-Hilaire, ou Aras à trompe de

LAN

Levaillant. Ce voyageur, saisissant un rapport qui n'avait véritablement rien de réel, leur avait donné ce nom, parce que, disait-il, leur Langue est une espèce de trompe avec laquelle ils prennent leur nourriture à l'instar de l'éléphant. Mais Geoffroy ayant eu l'occasion de voir vivant un de ces Aras, a reconnu que cet organe, considéré par Levaillant comme la Langue, était formé de l'appareil hyoïdien et de ses dépendances; la véritable Langue ne consistant plus que dans une petite lubérolité de forme ovale et d'apparence cornée (Mém. du Mus., t. x). L'Australorhynchus n'a pareillement qu'une Langue très-courte, et si tellement même qu'on a douté de son existence; il n'y a d'ailleurs aucune papille, de même que chez le plus grand nombre des Passeriformes et des Gallinacés; mais l'ordre des Grimpeurs est sans contredit celui qui présente les modifications les plus remarquables. Nous avons déjà parlé des Perroquets: nous ajouterons seulement qu'ils ont des papilles assez semblables aux papilles!

fungiformes des Mammifères. Les Toucans ont la Langue étroite et garnie de chaque côté de longue:

soies, qui lui donnent l'apparence d'une véritable plume, d'où le nom de *Pteroglossus*, qu'on a donné au sous-genre *Aiacari*.

Celle des Pic; t n'est pas moins singulière, soit par la présence de plusieurs épines placées sur les bords, soit par une disposition toute particulière de l'hyoïde, dont les cornes antérieures ont acquis un développement prodigieux, par un mécanisme qu'on ne connaît ailleurs, la possibilité dont jouit le Pic, de faire sortir de son bec sa Langue tout entière.

Nous trouvons chez les Reptiles autant de variations que chez les Oiseaux. Elle est le plus souvent entièrement nue, soit en grande partie, soit même dans son entier. Elle manque, dit Hérodote, chez le Crocodile, et le Quadrupède est le seul qui présente cette particularité; depuis, l'observation a été faite également par

LAN

LAN 3

Uristote et par tous les voyageurs.

Les anatomistes de l'ancienne Académie des sciences ont cependant monqué qu'elle existe réellement, mais qu'elle est attachée au palais sur toute sa circonférence, et ils ont accusé l'inexactitude de l'historien grec. Son observation est cependant très-juste, comme Geoffroy Saint-Hilaire l'a constaté : la Langue n'est nullement apparente à l'extérieur sur le vivant, et n'existe véritablement que pour l'anatomiste. « Toute la peau, dit Geoffroy Saint-Hilaire (Ann. du Mus., I.

elle), comprise entre les branches de la mâchoire inférieure se trouve recouverte dedans d'une chair spongieuse, épaisse et molle, qui y est inséparablement attachée dans toute son étendue; mais; ce muscle ou celt (Langue est en quelque sorte masqué u

l'extérieur par une continuation des enveloppes générales ; c'est une peau jaunâtre , chagrinée, et entièrement semblable à celle du palais.»

Cet état rudimentaire de la Langue du Crocodile est même précisément ce qui lui rend nécessaires et ce qui explique les services qu'il reçoit ici un petit Oiseau , qui , dit Hérodote , entre dans sa gueule qu'il tient couverte , et mange les Insectes qui lui sucent le sang : fait véritablement surprenant , et souvent révoqué en doute , mais dont Geoffroy Saint-Hilaire a eu en Egypte plusieurs fois l'occasion de vérifier l'exactitude. Il a constaté que cet Oiseau, qu'Hérodote désigne sous le nom de Trochilus , n'est autre que le Charadrius ægyptii d'Illasqu Coast , et que les petits Animaux dont il délivre les (Crocodiles sont des Insectes suceurs, et non pas des Sangsues , comme on avait généralement traduit par erreur.

Chez les Salamandres, la Langue est adhérente comme chez le Crocodile, mais seulement par sa pointe (et non par ses bords. On sait qu'elle est libre, très-extensible et bifurquée vers sa pointe dans la plupart des Sauriens et des Ophidiens. Les Crapauds et les Grenouilles ont la Langue en partie fixée à la mâchoire

inférieure, et sa portion libre est du moins, dans l'état ordinaire, repliée dans la bouche.

Chez beaucoup de Poissons , la Langue ne consiste plus que dans une simple saillie à la partie inférieure de la bouche, et sa membrane dorsale ne diffère pas ordinairement de la muqueuse qui tapisse tout le reste de la cavité orale • enfin chez d'autres,

comme les Cartilagineux, la Langue semble manquer entièrement.

C'est sur les bords, et surtout vers la poipite de la Langue, que réside le sens du goût. Ce sens n'a point, comme les autres sens spéciaux, la vue, l'odorat et l'ouïe, un nerf Sensitif particulier. Celui qui transmet à l'encéphale les sensations du goût, le nerf Lingual, n'est en effet qu'une branche de la cinquième paire; et l'on sait que ce nerf envoie également un rameau à chacun des autres sens : rameau dont la destruction, suivant les expériences de Magendie et les observations pathologiques de Serres, entraîne même celle du sens auquel il appartient.

(1S. Cr. ST.-II.)

En raison de la figure plusoumoins ressemblante de certains êtres des lègues organiques, ou de quelquesunes de leurs parties avec la Langue, on a vulgairement, appelé :

Langue d'Agneau. (Uot.) Le IJia/itago média, L.

* Langue d'Anolis. (Bot.; Le Melastoma ciliata aux Antilles.

Langue de Boeuf. (Bot.) La Buglosse officinale, le Potamogeton cordata et la Fistuline, genre de Champignons.

Langue de Cheval. Lingua Cervina.

(Bot.) La Scolopendre et la plupart des Fougères à frondes entières, même le Botrychium Lunaria.

Langue de Chat. (Zool.) Une Telline, Tellina Lingua-Telis. (Bot.) Le Bidens tripartita et un Eupatoire de Saint-Domingue.

* Langue de Châtaignier ou de Chêne. (Bot.) La Fistuline
Langue de Bœuf.

Langue de Cheval. (Bot.) Le

aiVÎ LAN

Jiusciïs îlyppoglossain , espèce du genre Fragon.

Langue de Chien. (Bol.) La Cynoglosse officinale et d'aulres
Borraginées, (elles que le Myosotis Lappitla.

Langée de Noyer el Langue de Pommieu. (Bot.) Divers Agarics
parasites à pédicule latéral.

Langue d'Oie. (Bot.) Le Fùiguicula uulgaris, L.

Langue d'Oiseau ou Ornitiioolosse des vîeïuves pharmacies.

(Bot.) Le fruit du Frêne et le Steltaria holostea.

Langue d'Or. (Zool.) La ïelline foliacée.

Langue de Passereau. (Bot.) Le Stella fa pàsseri/ia et le Poly-
goniim aviculare.

Langue de Serpent. (Bot) L'Ophioglosse vulgaire et les Cla-
vaires de Linné , dont on a composé le genre Geoglossum , ce qui
signifie Langue de terre.

Langue de Serpent. (Foss.) De petites Glossopètres.

Langue de Tigre. (Zool.) Une espèce du genre Vénus, Venus
tigrina.

* Langue de ter iie. (Bol.) Langue de Serpent.

Langue de Vache. (Bot.) La Scabieuse des clumps, la grande Consoude en quelques parties de la Frajice , ' et le Talinitm polyatidrum au Pérou. (b.)

LANGUETTE, pois. Espèce du genre Pleuronecte. V. ce mot. On a aussi donné ce nom aux Manches de couteau ou Solens. (.]•)

LANGUETTE. Ligula. ins. On désigne sous ce nom une partie de la lèvre inférieure; elle fait suite au support ou menton, et donne insertion aux palpes , aux paraglosses , etc. V. Bouche. (aud.)

LANGUETTE. LigiUa. bot. Plusieurs organes des Végétaux ont été nommés ainsi par les botanistes. On appelle Languettes ou fleurons ligules les demi'-fleurons des Synntithé-

LAN

rées dont le $b^{\wedge}$ est court et épanoui en un limbe obloug, unilatéral, ordinairement terminé par quelques petites dents. Jacquin a donné le nom' j de Languettes {Ligulœ) aux appendi- J ces qui , dans les Stapelia, partent du bas du capuchon , alternent avec les cornes el sont étalés sur la corolle.

Dans les Graminées, l'appendice membraneux qui couronne la gaîne de la feuille est nommé Languette {Ligula, Col lare).

Le genre slizoon est quelquefois appelé vulgairement Languette.

L ANGDRIE. Laugttria. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Télramères , làmille.des Cla-r vipalpes, établi par La- treille aux dépens du genre Tro'gossite dans lequel Fabricius

l'avait placé , el ayant pour caractères : dernier article des palpes maxillaires allongé, et plus ou moins ovalaire; massue des antennes de cinq articles; corps linéaire. Ces Insectes se distinguent des Clypeâtres et des Agal Iridiés par les tarses et par d'autres caractères; ce qui a déterminé La treille à pincer ces derniers dans la famille des Xylophages, quoiqu'ils se rapprochent , sous bien des rapports, du genre Phalacre qui appartient à la famille des Clavipalpes. Les Erotyles , les Triplax et les Trilomes s'en distinguent par leurs palpes maxillaires en hache et par la forme de leur corps; (enfin les Phalacres ont la massue des antennes de trois articles et le corps globuleux. Les Languries ont les antennes plus courtes que le corps , insérées devant les yeux , et composées de onze articles dont les cinq derniers forment une massue allongée , comprimée et perfoliée. Leur labre est corné, peu avancé et presque échancré. Les mandibules sont cornées , avancées et terminées par deux denticles aigus. Les mâchoires sont cornées , bitides , avec le lobe extérieur coriacé, un peu velu à sa partie supérieure, et le lobe intérieur plus court et bifide; elles portent chacune un palpe filiforme composé de quatre •

articles; le premier est très-petit , les suivants égaux et le dernier un peu plus long, plus épais , de forme ovale. Les palpes labiaux sont composés de trois articles petits et le dernier est un peu plus long et un peu moins massue. La lèvre est presque cornée, entière; le menton est en carré transversal, beaucoup plus large que la lèvre , un peu rétréci et arrondi supérieurement. Le corps des Langurics est linéaire ; leur corcelet est arqué et convexe; l'écusson arrondi postérieurement, et les élytres longues, recouvrant les ailes et l'abdomen. Les pâtes sont grêles, assez longues; leurs tarses ont leurs • Ueux

premiers articles allongés , triangulaires ; le troisième est plus aigé, bifide, et le dernier est allongé , un peu arqué et terminé par deux crochets. Les mœurs des Languries mous sont entièrement inconnues; il est fort probable qu'ils vivent dans les Bolets et dans le bois pourri , gommé les Triplax , les seuls Insectes de cette famille qui se trouvent en France et dont on connaît les métamorphoses. Ce sont des Insectes assez rares dans les collections , et le genre ne se compose que de cinq ou six espèces. Dejean (Catal. des Col. , pp. 139) en mentionne deux ; la principale, celle qui sert de type au genre , est :

La Langurik bicolore , *L. bicolor*, Latr. , Oliv. , Col. T. v, n. 88 , pl. 1 , fig. r. Elle est noire , avec le corselet fauve , à l'exception de son dos qui est noir. Cette espèce se trouve à Cayenne. V. , pour les autres, Olivier (loc. cit.) et Latreille (Diener. Oust, et Ins.) (g.)

* LANIAIRES. mam. r. Canines 1 et Dents.

LANIER. ois. Espèce du genre 1 Faucon. V. ce mot. (»R..z.)

LANIFERA. bot. phan. (Pline.) Le Cotonnier selon Adanson. (b.)

LANIO. ois. y. Lanion,

LANIOGÈRE. Laniogerus. moll.

1 C'est à Blainville que l'on doit la

création de ce nouveau genre. Dès 1816 il fut connu par l'extrait qui en a été publié dans le Bulletin de la Société Philomatique pour cette année. Férussac , dans ses Tableaux systématiques des Animaux mollus-

gues , a adopté ce genre et l'a placé ans les rapports indiqués par sou créateur, cesl-à-dirc qu'il l'a rangé dans les Gastéropodes, dans la famille des Polybranchies à côté des Eolides et des Glauques, entie lesquels il sert de passage. Blainville a repioduit ce genre dans le Dictionnaire des Sciences , dans l'atlas duquel il est figuré; il en a montré les rapports à l'article Mollusque du même ouvrage en le rangeant tout près des Glauques et des Cavolines. Voici les caractères que Blainville assigne à ce genre :

corps nu, allongé, convexe en dessus, plane en dessous, terminé par une sorte de queue , la tête assez distincte ; quatre tentacule» fort petits; les branebics eu forma de longues lanières molles, llexibles, disposées en un seul rang de chaque côté du corps ; l'anus et les organes de la génération à droite dans un tubercule commun ; si on veut comparer ces caractères à ceux du genre Glauque, on verra que les Laniogères s'en distinguent très-bien , quoique très-voisines. On n'en connaît encore qu'une seule espèce que Blanville a vue dans le Muséum britannique; il la nomme :

Laniogèhe d'Elfoht , Laniogerus Elfortianus , Blainville , Dict. des Se. Nat. T. xxv, pag. a43, planches du même ouvrage , douzième cabier, fig.

4 à 6 ; an Laniogerus Blaiwillii , Férus's. , Tab. syst. ? (d..h.)

LANION. Lanio. ois. Genre établi par Vieillot , et dont les deux espèces font partie de notre genre Batara. V.

«e mot. (du. .z.)

LANISTE. Lanistes. moll. Genre proposé p;ir Montfort {Conclut. Syst.

T. 11 , pag. 120) pour une Coquille du genre Ampullaire. V. ce mot. (d..iO(

LANIUS. ctfa. (Linné.) r. P11-

GLUÈCHE.

216 LAN

LANNERET. ois. Le Laniermâle.

r. Faucon. (b.)

L\NSA. bot. pu an. Dans les îles de IVrchibe) Indien, on donne ce nom au Lansïdm de Rumph , que plusieurs auteurs donnent comme synonyme du Cookia de Sonnerat. V.

Lansium et Cookie. (g..n.)

LANSAC. dot. pu an. Petite et jolie variété de Poire d'automne, (u.)

LANSIUM. bot. piian. Rumph [Tierb. Jmb. 1, p. i5i , t. 54 et 55) a décrit et figuré sous ce nom plusieurs Arbres de l'archipel Indien, qui ont été rapportés au genre Cookia de Sonnerat. V. ce mot. Cette détermination paraît n'avoir pas été connue du docteur Jack, puisqu'il a publié dans le quatorzième volume des Transactions de la Société Linnéenne de Londres , une notice sur le genre Lansium, sans mentionner comme synonyme le genre Cookia; il l'a placé dans la famille"des Méliacées , et lui a attribué des caractères un peu différons de ceux assignes au Cookia par 1rs auteu/sVCes caractères sont : un calice à cinq divisions profondes ; une corolle à cinq pétales arrondis; le tube stamiuifère urcéolé, ayant l'orifice entier; dix anthères incluses; ovaire à cinq

loges, surmonté d'un style court , en colonne , et d'un stigmate plane à cinq rayons; baie coriace extérieurement , à cinq loges et à cinq graines qui avortent dans presque toutes les loges , excepté dans une ou deux seulement ; semences enveloppées d'un tégument pulpeux et sapide; albumen nul* cotylédons inégaux et pelvés. Le *Lansium domesticum* , figuré par Rumph (foc. cit., t. 54), Plante des îles Malaises , est la seule espèce que le docteur Jack admette, quoiqu'il semble disposé à lui joindre encore le *Lansium montanum* de Rumph (/oc. cit., t. 56). Cependant celui-ci oil're quelques différences dans les parties de ta fleur , et paraît être congénère du *Milnea* de Roxburgh. (g..n.)

LAJST. M a m. V. Lampt.

LANTANIER . *Lantana*. bot. piian.

Ce genre de la famille des Verbénacées et de la Didymie Angiospermie , L. ^ établi par Plumier, sous le nom *derama/a*, est ainsi caractérisé : calice li èscourt, liibulceux , à quatre dents peu marquées; corolle dont le tube oblique , renflé au milieu , est beaucoup plus long que le Calice, et dont le limbe est horizontal, à quatre lobes inégaux ; quatre élamines didynames , non saillantes; style indivis; drupe bacciforme , à un seul noyau ; celui-ci partagé en deux loges dontcbaciincest monosperme. Le *Carache/a viburnoides* de Forskahl a été réuni par Yahl au *Lanla/ia*. Adanson en avait détaché une espèce sous le nom générique d'*Oftia* qui a été changé par Médicus en celui de *Spidmannia*. Jr. ce mot.

Les *Lantana* sont des Arbustes, rarement des Herbes, à rameaux anguleux, quelquefois munis d'aiguillons. Leurs feuilles sont simples , opposées ou le plus ordinairement ternées, créne-

lées, rugueuses et âpres au toucher. Les fleurs forment des capitules axillaires, pédonculés, accompagnés de bractées; leurs corolles sont colorées de plusieurs nuances, tantôt violettes, tantôt orangées, jaunes ou blanches. On en connaît à peu près trente espèces presque toutes indigènes des pays chauds de l'Amérique. Plusieurs sont cultivées en Europe où elles produisent un effet très-agréable à cause de leur feuillage toujours vert et de leurs charmantes capitules de fleurs. Nous nous bornerons à la description succincte des espèces suivantes qui se passent en beauté leurs congénères.

Le LANTANIER A FLEURS VARIÉES,

Lantana Camara, L. ; *Camara flore non. spinosa*, Pl. umbr., Gen. 52, le. 71, f. 1, est un Arbrisseau d'environ un mètre de hauteur, dont le tronc tortueux se divise en rameaux dépourvus d'aiguillons. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, aiguës, un peu velues et ridées. Ses fleurs sont d'abord jaunes, mais elles passent ensuite au rouge écarlate. Les feuilles de cet Arbrisseau sont aromatiques,

LAN

Si l'on s'en sert, en Amérique, aux mêmes usages auxquels nous employons celles de la Mélisse dont elles imitent la forme, la saveur et l'odeur.

Le Lantanier piquant, *Lantana aculeata*, L., figuré dans les Planches de ce Dictionnaire, est un peu plus élevé que le précédent, mais il se distingue surtout par les aiguillons crochus qui couvrent ses branches.

?ôes feuilles sont opposées , pétiolées , maies presque en cœur, aiguës , exénelées, ridées et rudes an toucher.

ILes fleurs sont semblables à celles du ILaniana Camara. Cet Arbrisseau iJst , ainsi quç lo précédent , originaiire de l'Amérique méridionale.

D'autres espèces de Lanterna se font rremarquer par l'odeur agréable et la jijolie couleur des fleurs. Telles sont centre aulres les L. odorata et invotutzrata. Ces Plantes exigent en Europe La serre chaude ou tempérée. Quoique 'd'une texture fibreuse, peu succulente et par conséquent peu délicate, rilles ne peuvent supporter le moindre air de gelée. Cependant le Lan- Hana aculeata n'est pas aussi sensible nux effets du froid que les autr es cspèces. Une terre bonne et consistante, et des arrosements fréquens leur sont i nécessaires. On a soin de les dépoter deux l'ois par an , à cause de la gran- Ue quantité des racines dont l'accroissement est très-rapide Lorsqju'on les met à l'air, pendant l'été, il Gant leur donner une exposition omloragéc. Leur multiplication est facile , soit par le moyen des graines seirnées en pots sur couche, soit par les iboutures qui reprennent aisément lorsqu'on les fait dans une terre peu ltégèie, et dans des pots placés dans ujne couche tempérée et ombragée.

* LANTEBU. bot. phan. Syn.

macassar A' dira arundinacea , espèce du genre Canche. (u.)

LANTERNE, conçu. Nom vulgaire et marchand de la Mye tronquée et des Anatincs. (b.)

* LANTERNE. Laternea. bot.

Djkypt. [Champignuns.) Ce genre éta-

bli par Poiteau et Turpin , pour une Plante qu'Us ont observée à l'île de la Tortue, a reçu de ces naturalistes les caractères suivants : volva de forme ovoïde, se déchirant en deux ou trois lubes; trois branches ou peiites colonnes cylindr iques , réunies par leur sommet ; conceptacle en forme de cul de lampe , située au-dessous de la voûte produite par la rencontre de la partie supérieure des branches , servant de placenta aux corps reproducteurs. Ce genre se compose d'une seule espèce nommée par les auteurs *Lanternea triscapa*; il a des rapports d'organisation avecles *Clathres* et notamment avec le genre *Colonnaria* ,.

établi par Rafinesque-Schmallz. La grandeur de ce singulier Champignon est de deux pouces et demi sur deux de diamètre ; il a la forme d'un' trépied sacré; les branches , blanches à leur base , se teignent dans leur partie supérieure, ainsi que le cul de lampe qui en dépend , d'un beau rouge vermillon, semblable à celui qu'on remarque sur les *Clathres*. Cette Plante , d'une substance sèche et spongieuse , se trouve à l'ombre des grancL Arbres sur les débris de Végétaux. Plusieurs mycologues n'ont pas admis ce genre qu'ils rangent parmi les *Clathres*. (a f.;

LANTERNE 110UGE. bot.crypt.

L'un des noms vulgaires du Clalhre caucellé. (b.)

LANTOR. bot. phaw. Pour Lontar , dans les anciens voyageurs , d'où J. Bnuhin avait emprunté ce nom.

LAOMEDEE. *Laomedea*. poi.yi».

Genre de l'ordre des Sertulariées , de la division des Polypiers flexibles , quL a pour caractères : Polypier phytoïde , rameux; cel-

lules stipitées ou substi-pilées , éparses sur les tiges et les rameaux. Il renferme unedixained'espè-.

ces dont les formes générales n'ont pas: toujours beaucoup d'analogie entre elles; le serrl caractère e fondamental consiste dans le peu de longueur du pédoncule qui supporte les cellules; plusieurs même ont ce pédoncule assez

2i8 LAP

allongé, ce qui les rapproche des Clylies dont quelques Laomédées diffèrent à peine. Les unes ont des liges roides, brandi ues, se fixant aux rochers par des radicules filiformes; d'autres sont volubiles, grimpantes et parasites sur les Thalassiophytes et autres productions marines ; il y en a d'articulées , d'autres qui ne le sont pas. La forme des cellules varie suivant les espèces ; elles sont en général campaniformes , à' ouverture entière ou dentée ; deux ou trois espèces ont leurs cellules presque tubuleuses. Les pédoncules sont sim-

Eles , annelés ou contournés en vis.

es ovaires sont gros, vésiculeux et presque toujours axillaires. La substance des Laomédées est membranocornée, quelquefois légèrement crétacée ; leur grandeur varie beaucoup; leur couleur est fauve ou brunâtre.

Elles se trouvent dans toutes les mers. Les espèces rapportées à ce, genre , sont .- Laomedeia antipalhes , Sauvagii, simplex ,Lai> ii, dichotoma, spitiosa , geniculata , gelatinosa , muricata e t repians . (e . d . .l.)

LAPAGERIE. Lapageria. bot.

i'han. Genre de la famille des Asparaginées , et de l'Hexandrie Monogynie , L. , dédié par Ruiz et Pavou {Flor. Peruf. 3 , p. 64) à l'épouse de Napoléon , née Joséphine Lapagerie , qui encouragea par son exemple la culture des Végétaux exotiques , dans ses beaux jardins de Malmaison. Ce genre oïre un calice coloré , pétaloïde, campanifonne , formé de six sépales égaux; six étamines attachées à la base des sépales ayant les filets subulés ; les anthères dressées , oblongues , aiguës ; l'ovaire libre , allongé , à trois côtes, à une seul élogé, contenant un grand nombre d'ovules attachés à trois trophospermes longitudinaux et disposés sur deux rangées; le style est allongé, peu distinct du sommet de l'ovaire , terminé par un stigmate rerfflé et légèrement trilobé.

Le fruit est une baie ovoïde , allongée, triangulaire, marquée de trois sillons longitudinaux qui corres-

LAP

poudenl aux trois trophospermes.

- Ce genre ne renferme qu'une seule espèce , *Lapageria rosea* , Ruiz et Pavon , loc. cit. , p. 6f> , tab. 297. C'est une Plante sarmenteuse et grimpante dont la lige est rameuse, cvlindrique, noueuse, nue vers sa partie inférieure, portant supérieurement des feuilles alternes, cordiformes , aiguës, très-entières, marquées de trois ou cinq nervures longitudinales. Les fleurs sont très-grand*- , d'une belle couleur rose, axillaires et portées sur un pédoncule assez long et tout couvert d'écaillés.

- Cette belle Hante croît dans les forêts du' Chili, aux environs de la Conception. Les habitants mangent ses fruits dont la pulpe est douce et agréable. Ses racines, fibreuses et fasciculées, sont

employées aux mêmes usages que la Salsepareille, c'est-à-dire qu'elles sont sudorifiques et diurétiques, (a. r.)

LAPATHON et LAPATHUM.

bot. PU an. Les anciens donnaient ce nom à plusieurs Plantes potagères ou à d'autres qui jouissaient de propriétés laxatives. Telles étaient plusieurs espèces que les botanistes modernes ont rapportées au genre Kuniex ; ils | nommaient encore ainsi l'Epinard „ et le Bon-Henri [Chenupodium Pu- \ \ nus-Henricus). Le genre Lapathum g de Tournefort a été réuni par Linné au Rumex. Dans la Monographie de ce dernier genre publiée en 1819 par Campdéra , le Lapalhifm de \ Tournefort est considéré comme un j sous-genre caractérisé par le calicule „ naissant de l'articulation du pédon- \ cule et n'ayant jamais ses divisions réfléchies. F. Patienck et Rumex.

LAPEREAU, mam. Le petit du o

Lapin , et non du Lièvre, comme il ^

est dit dans le Dictionnaire de Le- h yi'àùlt. (B)

LAPEIROUSIA. bot. phan.

Thunberg (Prodr. Flor. Cape/is.) a ainsi altéré le nom du Lapeyrousia, genre établi en l'honneur de Picot de Lapcyrouse. K.-Lai'EYkousie. (<;..n.)

LAI'

L A P E Y R O U S I E. Lapeyrousia.

i;iOT. rii\N. Deux genres de Plantes kint reçu ce nom. Le premier a été joirmé "par l'abbé Pourret {Act. To- \l)OS.) sur des

Plantes de la famille des fridées et dont le *Gladiolus denticulatus* et *G. corymbosa*, L., sont les types. Ce genre, auquel on avait assigné pour caractères essentiels : une corolle hypocratérisée, le limbe à six divisions plus courtes que le tube, trois stigmates bifides, une capsule imbricée et polysperme, n'a pas été généralement adopté. En conséquence ses espèces doivent rentrer dans les genres *Gladiolus* et *Ixia*. P'.

es mots.

En 1800, Thunberg publia dans « la seconde partie de son *Prodromus Plantarum Capensium*, un genre de la famille des Synanthérées et de la Syngénésie frustrée, L., auquel il donna le nom de *Lapeyrousia*.

Adoptant ce genre, Gassini en a tracé les caractères d'après les descriptions imparfaites de Ximenes et de Thunberg : involucre formé de six sillons disposés sur plusieurs rangs, imbriqués, scarieuses supérieurement; les intérieures surmontées d'un grand appendice étalé, lancéolé et scarieux; réceptacle plane et nu de pupilles; calathide dont les fleurs du centre sont nombreuses, régulières • hermaphrodites; celles de la circonférence en languettes et neutres; akènes surmontés d'une aigrette très-courte, mince et annulaire.

Gassini place avec doute ce genre dans la tribu des Inulées, près des genres *Rosenia* et *Leysera*. Il a pour type une Plante découverte au cap de Bonne-Espérance par Thunberg, laquelle ayant été communiquée à Linné fils, fut nommée par celui-ci *Isomites calycina*. L'Héritier (Sert.

tangl.) l'a décrite de nouveau en la rapportant au genre *Helianthus*. (oi.W.)

* LAPHI. mam. V. Cerf commun.

LAPHIATI.rept.opij. Mêraechok<se qu'Aulique, espèce du genre Coueuvre. V. ce mot. (b.).

LAP ai 9

LAPHRIE. Laphria. ins. Gcmc de l'ordre des Diptères , famille des Tanystomes, tribu des Asiliques, établi par Meigen , et ayant pour caractères : épistome barbu ; tête point globuleuse , ni entièrement occupée par les yeux , même dans les mâles ; tarses terminés par deux pelotes et deux crochets; dernier article des antennes presque ovale, sans stylet saillant. Ces Insectes diffèrent des Asyles et des autres genres de la même famille, en ce que ceux-ci ont tous le dernier article des antennes terminé par un stylet ou par une soie. Les Lapfriesont la tête transversale ; on voit entre 1rs yeux et au-dessus de la trompe, qui est dirigée en avant et en haut, un paquet de poils rendes!

Lesantenncs sont plus longues que la tête, en massue composée de trois articles dont le premier plus long que le second , et le dernier presque ovale , en forme de palette; les yeux sont grands , saillans. Le corselet est trèsgrand, convexe, presque toujours velu ; il se rétrécit en avant et forme un cou qui supporte la tête. Les ailes sont grandes ; l'Insecte las porte couchées horizontalement sur l'abdomen; dans le repos , elles le dépassent. Les pâtes sont tiès -fortes, surtout les cuisses qui sont quelquefois dentées intérieurement; les iambes sont arquées, elles supportent un tarse composé de cinq articles dont le premier est grand , les trois suivans beaucoup plus petits, et le dernier profondément bilobé est terminé par deux crochets et deux pelotes. Tous ces organes sont très-velus. L'abdomen est moins large que lecorselelettès-velu

dans quelques espèces. Les mœurs de ces Insectes ne sont pas connues; il est probable que leurs larves ressemblent à celles des Asyles et qu'elles vivent comme elles dans la terre ; ce genre se compose de sept à huit espèces ; la principale est :

La Lafhrie dorée , *L. aurea* , Fabr. , Coqueb. , Illustr. Icon. Ins.

De&Z, tab. -':">, fig. 9. Cette belle espèce a dix lignes de long; sa tête est couverte de longs poils d'un jaune doré ;

220 LAP

le corsolet est noir , avec des poils bruns; l'abdomen est brun, avec 1 extrémité des anneaux bordée en dessus de poils d'un jaune doré. Les ailes sont d'un brun jaunâtre le long du bord extérieur. -Les pâtes sont grandes, velues; les cuisse» sont noires ou brunes ; les jambes et les taises sont jaunes, excepté le dernier article qui est brun. Celte espèce se trouve en Europe et aux environs de Paris. (g.)

LAPIA. bot. piian. Nom malais d'un Arbre d'Amboine employé pour la construction des toits. C'est le *Lignum muscosum* de Ilumph. Le même auteur désigne aussi sous le même nom le Sagoutier. J>'. ce mot.

LAPIN, mam. Espèce du genre Lièvre. V. ce mot. On a étendu ce nom à des Animaux fort différens.

Ainsi l'on a appelé :

Lapin, le Stri.v *Cunicularia* , Oiseau du genre Cbouette; un Poisson de l'île de Tabago , selon Lachesnaye-des-Bois , et une Coquille du genre Porcelaine, *Cyprœa stercoraria*.

Lapin d'Allemagne , le Souslik.

Lapin d'Amérique , l'Agouti.

Lapin d'Aroe, le Kangaroo Philandre.

Lapin de Bahama , le Monax.

Lapin du Brésil , le Cobaie Aperça ou Cochon d'Inde.

Lapin Chinois et des Indes, le même Rongeur, le Gerbo , et l'Utias qui est le Capromys de Desmarest et de ce Dictionnaire.

Lapin de Java, l'Agouti, fort mal à propos , puisque c'est un Animal américain.

Lapin a longue queue , le Toi aï , espèce de Lièvre.

Lapin de Nor-wège, le Lemming.

* LAPIS-LAZULI. min. V. La-

ZULITE.

LAPLACÉE. Laplacea. bot. piian.

Genre nouveau de la famille des

LAP

Trnslroemiacees , et de la Polyan- I diie Monogynie , établi par Kunth I {iiiHumb. JSou. Gêner. 5 , p. 208) qui lui a donné pour caractères : un ca- « lice persistant, composé de quatre sépales orbiculaires et imbriqués , dé- , pourvu de bractées; nue corolle de neuf pétales hypogynes et presque 11 égaux; des élamines en très-grand nombre, disposées sur trois raugées, C insérées à la base des pétales et ayant leurs filets libres et distincts ; un ovai- j

re sessile et supérieur à cinq loges j contenant chacune trois ovules ; les styles , au nombre de cinq , sont réunis entre eux; la capsule est à cinq loges , s'ouvrant en cinq valves sep- ' tifères sur le milieu de leur face in- ' terne; chaque loge contient trois 1 graines pendantes et atlacées à l'axe 1 central ; ces graines sont surmoulées d'une aile allongée.

Ce genre est très- voisin des *Temstroemia* et *Freziera* , dont il se distingue surtout par son calice de quatre sépales , sa corolle de neuf pétales et ses graines ailées.

Laseuleespèce qui le compose, *Laplacea speciosa* , Kunth , loc. cit. 5 , p. 209 , tab. 46i , est un grand et bel Arbre qui croît au Pérou , dans les forêts , entre Gonzanama et Loxa.

Ses rameaux sont terminés chacun par un bourgeon roulé; ses feuilles sont éparses , très-entières , coriaces et nou ponctuées. Ses lleuis sont blanches , très-grandes , odorantes, pédonenlées et solitaires à l'aisselle des feuilles. (a . r .)

* LAP LACÉES. *Laplaceœ*. bot.

piian. De Candolle appelle ainsi sa quatrième tribu dans la famille des *Ternstroëmiacées*, tribu qu'il caractérise ainsi : calice dépourvu de bractées , formé de trois à quatre sépales; pétales surpassant plusieurs fois en nombre celui des sépales; étaimues nombreuses , ayant les fdets libres , les anthères attachées par la base; styles soudés en un seul ; fruit à cinq loges; graines pourvues d'un endosperme charnu ou corné. Cette tribu ne se compose que des deux genres

LAP

Zocklospermum et Loplacea , l'un et l'autre établis par Kuulh.
(a. n.)

LAPLYSIE. moll. r. Aplysie, tt pour Laflysie verte V. Actjeon'.

* LAPON, m a m. S\n. d'Hyper- »)oi éen , espèce du geme
Homme. V.

,ce mot.

* LAPONE, ois. Espèce du genre CChouette. V. ce mot. (B.)

LAPOURDIER. bot. phan. L'un rirles noms vulgaires de la
Bardaue ildans le Midi. (B.)

LAPPA. bot. pu an. Les anciens Ibotanistes , tels que Mathiole,
Daléichamp et C. Bauhin , nommaient

ainsi la Plante que l'on désigne en ll'raiiçais sous kfl nom de
Birdane. P . cce mot. Touruefort admit le nom gétnerique de Lap-
pa eu excluant toute- 1 fois les Plantes que les anciens avaient i
mal à propos associées à la Bardane , (et qui constituent le genre
Xanthium. (Cependant Linné préféra rétablir le

nom d' sl/cliuin. par lequel Dioscoride iet les Grecs dési-
gnaient le Lappa.

(Cette dernière dénomination a été

• adoptée par Jussieu, Lamarck et De (Candolle, parce que
c'est un terme v de comparaison pour les fruits char- . gés d'aspé-
rités ciocliucs, semblables . à celles des folioles de l'involucre de
lia bardane, fruits qu on nomme lap- | pacés [Jüuctus lappacei.).
(g..N.)

LAPPAGO. bot. ru an. Le genre

• He Graminées ainsi nommé par Schreber, a pour type le *Cenclirus uicemus* de Linné, Ilallcr l'avait anlérieurement nommé *Tragus* , nom qui a été adopté par Palisot de Beauvois dans son *Agiostographiie*.

V. Tragxjs. (a. n

LAPPAGUE. bot. i'iiian. Pour Lappago et *Tragus*. V. ces mots. (B.)

LAPPULA. bot. i' Han. Plusieurs Plantes dont les fruits sont hérissés de pointes , cl plus ou moins ressemblai avec les calal-hides de la Bardaue {Lappa) , avaient été nommées Lappula par les anciens. Linné employa ce nom comme spécilique pour diverses espèces, et entre autres pour

LAQ dat

un *Myosotis* dont Mœnch constitua le genre Lappula. Ce genre a été rétabli par Lehmaun et Reichenbach sou» le nom d' *Ec/iinospermum*. y. ce mot. (G..N.)

LAPPULIER. bot. phan. Quelques botanistes français ont employé ce nom pour désigner le genre *Triuiiiifetta*. V. ce mot. (b.)

LAPSANA. bot. phan. (Linné.) F. Lampsane.

LAQUE, bot. Ins. Ou appelle ainsi une substance résineuse qui découle de plusieurs Arbres lactescens originaires de l'Inde, par suite de la piqûre d'un petit Insecte nommé *Coccus Lacca*. Les Arbres sur lesquels on lécolle la Laque sont les *Ficus indica*, *ficus religiosa*, *Croiou iacciferum* et plusieurs autres. C'est aliu d'y déposer ses œufs que le *Coccus Lacca* perce les jeunes branches des

Arbres que nous venons de nommer ; on en voit bientôt sortir un suc résineux qui se concrète en formant une croûte irrégulière. Dans le commerce, on distingue trois sortes de Laque: celle en bâton , celle en grains et celle en plaques ou Laque plate.

La première, ou la Laque en bâton, est celle qui est encore adhérente aux branches de l'Arbre. Elle forme une croûte irrégulière plus ou moins épaisse; lorsqu'on l'en détache, on voit que sa partie interne est garnie d'un grand nombre de petites cellules dans lesquelles il n'est pas rare de trouver encore le petit luscet qui l'a formée. Elle est rouge ,semi-transparente, à cassure très-résineuse , d'une saveur un peu astringente , et répandant une odeur assez agréable quand on la brûle. Selon Hatchett , qui en a fait une analyse , elle se compose : de Résine, 68; matière colorante, 10; Cire, 6; Gluten, 5,5; corps étrangers , 6,5; perte, 4,0.

La seconde variété qu'on nomme Laque en grains est celle que l'on a détachée des branches; elle est généralement en petits fragments d'une couleur moins foncée que la précédente.

On y a trouvé : Résine , 88,5 ; ma-

LAR

tière colorante , 2,5 ; Cire , 4,5 ; Gluten, 2 ; perte, 2,5.

Enfin , la Laque plate est celle que l'on a fondue dans l'eau bouillante et qui a été ensuite coulée sur des pierres lisses et polies. Hatchett y a trouvé : Résine, 90,9; matière colorante, 0,5; Cire, 4; Gluten, 2,8; perte , 1,8.

Cette Résine était autrefois employée en médecine comme tonique et astringente. Mais son usage est depuis long-temps abandonné. Aujourd'hui on s'en sert pour la préparation des poudres

dentifrices, pour la fabrication de la cire à cacheter dont elle est une des parties constituantes, (a. r.)

* LAQUIL. bot. phan. Nom de pnys du *Colletia seiratifolia*. (b.)

LAR. mam. Nom spécifique lin— néen du Gibbon. V. Ohano. (b.)

LAR. ois. Syn. ancien de Mouette.

V. Mauve. (dr..z

LARBRÉE. Larbrea. bot. phan.

Genre de la famille des Paronychiées , établi par Au g. Saint-Hilaire pour la *Stellaria aquatica* de Linné , qui diffère essentiellement du genre *Stellaria* par l'insertion périgynique de ses étamines, caractère qui semblerait l'éloigner de la famille des Caryophyllées. Ce genre peut être ainsi caractérisé : calice tubuleux , isrcéolé à sa base, divisé en cinq lobes; corolle formée de cinq pétales bipartis et périgynes , de même que les étamines qui sont au nombre de cinq; ovaire uniloculaire et polysperme, contenu n: des graines attachées à un trophosperme central ; cupsulcs'ouvrant à son sommet en six valves.

La *Larbrea aquatica* , St.-Hil. , est une petite Plante vivace dont les tiges sont rameuses, les feuilles opposées, les fleurs très-petites, blanches, pédonculées et axillaires. Elle croît dans les lieux tourbeux , aux environs de Paris. (a. b.)

LARD et LARES, mou. Noms vulgaires et marchands du MurcxIle-

LAR

longe/ia , L. , espèce du genre Pyrula de Lamarck. (B.y

LARDÉ RE , LARDERELLE et LARDIER. ois. Noms vulgaires de la petite Mésange bleue, qu'en d'autres cantons on nomme aussi Larderielie, Lardeirc et Lardoire. (b.)

LARDITE. min. Ou Pierredelard; Pierre à magots , synonyme dePagodite. On a aussi donné ce nom à des Pierres d'une autre nature, qui par leur aspect et leurs veines blanches et rouges avaient quelque ressemblance avec le lard. Tels sont certains morceaux de Quartz quel'ou trouve dans les montagnes du Forez, (g.del.)

LARDIZABALE. Lardizabala.

bot. phan. Ce genre de la famille des Ménispermées , et de la Dioecie Monadelphie , L.,a été établi parRuiz et Pavon [Fl. Peruv. Prodr. p. i45, t.

07), et adopté par De Candolle (Syst.

Veget. unit'. T. 1, p. 5n) qui l'a ainsi caractérisé : fleurs dioïques ou polygames ; calice dont les sépales sont disposés sur deux ou trois rangées , alternes , les extérieurs plus grands; six pétales, sur deux rangées, plus petits que le calice, placés sur un réceptacle qui s'élève un peu du fond du calice. Les fleurs mâles ont des étamines dont les filets sont réunis en cylindre, et portent six anthères ovées , distinctes et déhiscentes extérieurement. Les fleurs femelles ont leurs anthères avortées, mais les étamines y

sont cependant distinctes; elles renferment trois à six ovaires distincts , surmontés de stigmates sessiles capités cl persistans ; ces ovaires deviennent des baies charnues , oblongues , à six loges polyspermes. Ce genre se compose de trois espèces indigènes des forêts du Chili et du Pérou. Ce sont des Arbrisseaux grimpan, glabres, dont les feuilles deux ou trois fois ternées , sont portées sur un pétiole articulé dans les ramifications. Les fleurs mâles forment des grappes axillaires , ou des faisceaux rameux ; les pédoncules des fleurs femelles sont uniflores. La pulpe de leurs baies est douce et co-

LAR

ncslibile. Le Lardizabala biternata , ... et Pav-, a été très-bien figuré dans : Voyage de Lapeyrouse , T. vi, p- 665, t. 67, et 8. On peut en dire autant des L. triternata , Ruiz et Pav-, il. trifoliata, dont les figures 91 et 92 du premier volume des Icônes selectæ de Benj. Delessert, sont excellentes. (c;n.)

> LARDIZABALÉES. Lardizaba- <œ. bot. pu an. Dans son Prodromus ligni Vegetabilis , T. 1, p. 85 , De Mandolle a ainsi nommé la première section de la famille des Ménispermées , section caractérisée par les fleurs le plus souvent dioïques, le nombre symétrique des parties des fleurs mâles, les carpelles distincts , nombreux, polyspermes , pluriloculaires , et par les feuilles composées, elle renferme les genres Lardizaba/a , Stauntonia et Bursera. V. ces mots. (g;n.)

LARDOIRE. ois. V. Lardère.

LARE. ois. Traduction du mot La- <Ms. Syn. de Mauve. V. ce mot.

(DR..Z

LARES, moll. V. Lard.

L.\REX. bot. phav. On trouve , tans quelques anciens, ce nom employé pour Lai ix. V. MÉLÈZE, (b.)

* LARGE-RAIE. pois. Espèce de iœnianotc , sous-genre de Scorpœtes. V. ce mot. (b.)

LARGES-DOIGTS, rept. saur.

î»jp. à'Anolis principalis. V~. Anolis.

On étend quelquefois ce nom aux iieckos. (b.)

* LARGDP. ois. Espèce des genres Cormoran et Huppe. V. ces mots.

"LARINUS. ins. Nom donné à un ;<5genre établi aux dépens des Lixes, et , lui n'a pas été adopté. (g.)

V. ce mot. (b

LARME DE LA VIERGE, bot.

phan. Nom vulgaire de Y Ornithogalum arabicum , Plante africaine que nous avons retrouvée dansl' Andalousie méridionale. (b.)

» LARMES DE GÉANTS, polyp.

ross. Ce nom a été donné par d'anciens auteurs à des articulations de la colonne de Crinoïdes ou Encriuc. V.

Crinoïde. (e. D..L.)

LARMES MARINES, annel. Nom sous lequel l'abbé Dicquemare a décrit et figuré dans le Journal de Physique pour l'année 1776 de petites masses gélatineuses de la grosseur d'un grain de raisin , terminées par une longue queue et ressemblant assez bien à des Larmes bataviques.

Ces corps singuliers renfermaient des Animaux filiformes qui paraissaient être des petites Annelides. Bosc a sup-

posé que les Larmes marines étaient le frai de quelque Poisson ou de quelque Mollusque ; l'observation pourra seule éclaircir ce point; mais, à en juger par l'analogie, on pourrait croire que ces vessies glaireuses ne sont autre chose que les cocons de quelque Annelide dans l'intérieur duquel vivaient pendant un assez long temps les jeunes individus , comme cela se remarque dans les Sangsues et les Lombrics {K. Annal, des Se. Nat.

T. iv et v). Ces corps ont été trouvés au Havre; ils adhéraient par leur pédicelle à des Plantes marines.

(atjd.)

* LARMIER, bot. pli an. L'un des noms vulgaires du genre Coix. V. ce mot. (b.)

LARMILLE. bot. phan. On appelle en quelques cantons , Larmille des champs , le Gremil officinal ; et Larmille des Indes , le Coix Larme de Job. (b.)

LAROCHEA. bot. niAN.(DeCandolle et Haworth.) V. CnASSurjs.

LAR ONDE. Larunda. entist. Genre établi par Leach et correspondant à celui de Cyame. F. ce mot. (g.)

LARRATES. Larratœ. ins. Nom donné par La treille à une tribu de l'ordre des Hyménoptères , famille ■ des Fouisseurs , à laquelle il donne pour caractères (Fam. Natur. du Règne Anim.): labre entièrement caché ou peu découvert; abdomen ovoïdconique ou conique ; mandibules ayant une profonde échancre au côté intérieur. Cette tribu (auparavant famille) se distingue de toutes les autres par l'échancre que présente le bord inférieur des mandibules , qui, à raison de la saillie en forme de dent ou de pointe d'un de leurs angles, ont reçu de Jurine le nom d'éperonnés. Leurs antennes ne sont guère plus longues que la tête et sont insérées à la base d'un chaperon court et transversal ; elles sont de treize articles dans les mâles , et de douze dans les femelles ; les mandibules sont fort étroites , allongées, arquées, croisées avec l'extrémité pointue et entière ; les palpes sont filiformes, les maxillaires ont six articles et les labiaux quatre; la languette est évasée en forme de cœur, échancrée ou bifide, et offre souvent de chaque côté une petite division ; la tête est large et aplatie en avant, et les yeux ovales , entiers et souvent convergents , au moins dans les mâles. Tous ont trois yeux lisses trèsdistincts ; le corselet est allongé , tronqué ou très-obtus postérieurement; les ailes supérieures offrent deux ou trois cellules cubitales complètes ; l'abdomen est porté sur un très-court pédicule ; les pieds sont courts, garnis de petites épines et propres à fouir la terre. Les femelles sont armées d'un aiguillon assez fort. Ils sont très vifs et très-agiles , et on les trouve sur le sable et sur les fleurs.

a. Trois cellules cubitales fermées.

Les genres : Paeare, Lauke et Lv-

HOPS

ji. Deux cellules cubitales fennecs.

LAR

Les genres : Miscofue, Dinëte.

lr. ces mots. (g.)

LARRE. Larra. ins. Genre de l'ordre des Hyménoptères , section des Porte-Aiguillons , famille des Fouisseurs, tribu des Larrales, établi par Fabricius. Ses caractères sont : ailes supérieures ayant une cellule radiale petite , légèrement appendicée , et trois cellules cubitales, dont la première plus grande , la seconde recevant les deux nervures récurrentes et la troisième presque demi-lunaire, n'atteignant point le bout de l'aile; anleuncs ayant la même forme dans les deux sexes ; le second article presque eu forme de cône renversé; côté interne des mandibules sans saillie ni dents; languette sans divisions latérales distinctes. Les Larres ressemblent beaucoup aux Pompilles, tant par leurs formes générales et leurs couleurs , que par leurs habitudes; ils s'en distinguent cependant par leur tête qui est plus large, par leurs mandibules et par leurs pâtes qui sont plus courtes; ils se rapprochent encoie plus des Asiates , mais ceux-ci sont beaucoup plus grands et leurs mandibules n'offrent j oint d'éperon. Illiger avail déjà observé que les Larres de Fabricius ne sont point les Insectes que Latreille nomme ainsi, avec la plupart des entomologistes; mais les Hyménoptères qui forment son genre Sli/.e. Jurine a fait aussi la même remarque; Fabricius a séparé des Larres

de Lalreille , quelques espèces très-semblables aux autres quant à la physionomie, mais dont la bouche présente quelques différences; c'est le genre *Lyrops*, Jurine ne l'a pas admis. Ces Hyménoptères se trouvent dans les terres sablonneuses des pays chauds , ils affectionnent les fleurs d'Ombellifères , et surtout celles des Carottes. Les femelles piquent fortement. L'espèce qui se trouve le plus souvent en France et dans le Midi , est :

Le *Lahue Iciineumonifoume* , *L. Ichneumoniformis* , Fabr., Panz.

LAR

{Faiin. Ins. Gern., fasc. 76, lab. 18, unas.); il a près de huit lignes de long; >son corps est d'un noir obscur sans Mâches : son abdomen est d'un noir luisant avec les deux premiers anneaux fauves. Coquebert {*Illilcones ilitsect.*, deuxième décad., pl. 12, bg.

110) en a donné une bonne figure. Le *iJLarra ena/âema* de la même planche m'en est peut être qu'une variété.

LARREA. bot. fran. Genre de la Décandn'e Monogynie , L., appartenant à la première section des Rul lacées de Jussieu ou aux *Z^gopb^llées* de Brown , très-voisin des *l'-a- Ibagclles*. *Il présente les caractères suivants : calice à cinq divisions profondes et inégales ; cinq pétales alternes plus longs et ongiculés ; dix étamines , dont les filets s'insèrent écartés en dehors et à la base d'une bractée bifide; ovaire sur un court support, globuleux , marqué de cinq : sillons peu apparents , à cause du poil qui couvre sa surface , à cinq loges ■ dont chacune renferme cinq ou six

- ovules suspendus à l'angle interne ;

• cinq styles soudés en un seul pentagone et aigu , niais qui finissent par se séparer et se réfléchir au sommet. Le fruit, à cinq angles, se sépare à la maturité en autant de coques indéhiscentes, qui renferment une graine solitaire par avortement, ovoïde-oblongue , lisse et pendante; l'embryon vidâtre est enveloppé d'un péricarpe blanc, plus épais que lui , et offre une radicule tournée en haut. Les espèces de ce genre , au nombre de trois , croissent dans l'Amérique méridionale, dans les Etats de Buenos-Ayres. Ce sont des Arbrisseaux à feuilles opposées et munies à leur base d'une double stipule, tantôt découpées jusqu'au pétiole en plusieurs folioles, tantôt simples et divisées plus ou moins profondément en deux lobes. Leurs fleurs jaunes sont portées sur des pédoncules, qui, solitaires à chaque nœud , naissent entre deux stipules.

On peut les voir toutes trois figurées dans les Icônes de Cavanilles , tab.

55g et 56o. (a. u. J.)

tome IX

LAR aa5

* LARUNDA. cuust. (Lcaci.) V.

Cyame.

LARUS. ois. V. Mauve.

LARVA. 01», r. Macareux.

* LARVAIRE. Laivaria. polyp.

l'oss. Genre appartenant à l'ordre des Milléporées ou peut-être à celui des Escharrées , et dont les caractères sont : Polypier libre , cylindrique , percé dans son centre , diminuant de grosseur aux deux bouts, couvert de pores simples , disposés par rangées circulaires et régulières , et composés d'anneaux qui tendent à se détacher les uns des autres. Uefrance a établi ce genre pour de petits corps cylindriques, poreux, fragiles, percés dans leur centre, que l'on trouve fossiles dans les couches du Calcaire grossier des environs de Paris , à Bracheux et près de Beauvais , au milieu d'un sable quartzeux rempli de Coquilles analogues à celles du Calcaire grossier. Ces corps ne paraissent point avoir été adhérents et semblent être formés d'anneaux qui tendent à se détacher à la manière des pièces articulaires de la colonne des Criuoides.

Leur surface externe est couverte de pores disposés régulièrement par rangées circulaires. Ces pores traversent l'épaisseur du polypier et s'aperçoivent également dans l'intérieur du canal qui le parcourt suivant sa longueur. Ce genre renferme trois espèces décrites par Defrance , dans le Dictionnaire des Sciences Naturelles, tom. -j5 : ce sont les Laivaria reliculata, timbala, incrinula. (E. d..i.,)

LARVLS. Lana. INS. Nom sous lequel on désigne les Insectes dans leur second âge ou à leur sortie de 1 œuf. Les Chenilles el toute espèce de N aï qui deviendra un jour Insecte sont des Larves. L'œuf est le premier degré du développement , la Larve est le second état , la nymphe le troisième el l'Insecte parfait le quatrième ou dernier. Quelque variées que soient les formes dans

ces quatre états, ou reconnaît qu'elles sont dues au développement successif tles par-

226 LAR

lies, comme cela se voit dans tous les Animaux , qu'ils soient ovipares ou vivipares. Il nous a paru nécessaire de présenter dans un seul et unique cadre ces diverses périodes. Nous en traiterons au mot Métamorphoses.

(aud.)

* LARY. mam. Nouvelle espèce du genre Ecureuil. V. ce mot au Supplément, (is. G.ST.-H.)

LARYNX, zool. L'auatomie humaine a défini le Larynx l'appareil de la voix, et cette définition a p.issé dans plusieurs ouvrages d'anatomie comparée , quoiqu'elle ne fût nullement admissible pour une grande partie des Vertébrés eux-mêmes.

Dans la grande classe des Oiseaux la voix ne se produit pas à 1 origine de la trachée-artère , mais à sa terminaison , et cette classe est précisément celle dont la voix a le plus d'étendue , de force et d'éclat. Une autre classe, celle des Poissons , est entièrement muelte. On serait donc conduit, par la définition que nous venons de citer, à supposer que l'appareil laryngien manque chez les Poissons , et se trouve transposé chez les Oiseaux.

Or , il est bien certain que le Larynx existe chez les Oiseaux , comme partout ailleurs , à l'origine de la trachéeartère, quel que soit le lien de la formation de la voix; et Geoffroy Saint-Hilaire est parvenu à démontrer qu'il ne manque nullement chez les Poissons, et que si on l'a méconnu dans cette classe, c'est en partie à cause de son développement plus considérable. Ainsi il s'en

faut bien qu'on puisse regarder l'appareil laryngien comme un organe spécial pour la voix : tout ce qu'on peut dire , c'est qu'il offre dans un grand nombre, mais non dans la totalité des Animaux , une réunion de moyens favorables à la voix.

Nous arrivons ici à la conclusion oh nous mène toujours l'étude d'un organe quelconque. Rien de fixe dans l'organisation , rien de constant hors la connexion : la forme, la fonction même sont toujours fugitives

LAR

d'un Animal à l'autre ; si ce n'est lorsqu'elles viennent à dépendre de la connexion , comme il arrive fréquemment , et comme nous en avons un exemple dans le Larynx lui-même.

Ainsi les rapports fie position de cet organe en font une dépendance de l'appareil respiratoire , et constamment, en effet, on le voit concourir plus ou moins directement à la respiration ; une autre fonction, celle de la production de la voix , venant seulement à s'ajouter à celleci , et devenant même la principale dans certains cas, ceux particulièrement oh les fonctions respiratoires du Larynx sont moins importantes et moins directes. Geoffroy Saint-Hilaire a de même et tout récemment montré qu'une grande partie des organes de l'audition n'étaient que des organes appartenant essentiellement â la respiration, mais tombés hors d'usage; ainsi, les deux fondions de la production et de la perception de la voix, qui s'opèrent par un mécanisme si merveilleux et par des appareils si admirablement combinés, ne sont l'un et l'autre que des fonctions comme surajoutées à la respiration, et exécutées par des portions de l'appareil respiratoire , devenues inutiles, et tombées dans les conditions rudimentaires.

Il nous suffit, dans cet article, d'avoir démontré que le Larynx n'est point proprement l'organe de la voix, et qu'ainsi son existence est possible chez les Animaux même dont la respiration n'est pas aérienne; et nous nous bornerons ici à ces considérations générales. L'histoire anatomique du Larynx chez les Oiseaux et chez les Poissons, se lie trop intimement à celle de la trachée-artère pour que nous puissions les séparer, sans nous exposer ou à faire de nombreuses répétitions, ou à mettre de l'obscurité dans notre exposition. D'ailleurs, comme l'a dit Geoffroy Saint-Hilaire, et comme il suit de ce qui précède :

« En nous dépouillant de tout préjugé pour nous en rapporter au témoignage de nos sens, nous ne pouvons

LAS

• avoir dans cet organe qu'une première couronne de la trachée-artère, à la vérité dans un ordre si régulier et dans un système si bien combiné, que toutes ses parties tendent à devenir au profit de l'appareil respiratoire le vestibule de celui-ci. » P. Trachée-Artère.

IS. G. ST.-H

* LASALLIA. bot. crypt (Lichens.) Ce genre a été consacré à la mémoire de feu Lnsalle, jardinier de Fontainebleau, par le docteur Mérat, dans sa Flore des environs de Paris, où il est ainsi caractérisé : feuille cartilagineuse, entière, lacuueu.^e, attachée iu-férieurement par une espèce de pédicule central, portant des scutelles d'abord concaves, puis planes, à disque uni, pourvues

d'un rebord analogue à la croûte. Le genre *Lasallia* correspond à notre genre *Umbilicaria*. V. Gyropuorées. Une seule espèce croît en France : c'est le *Lasallia pustulata*, Lichen pustulatus, Liun.; *Umbilicaria pustulata* d'Hofl manu. Il abonde sur les rochers de Fontainebleau , et dans plusieurs autres localités de la France. (a. f.)

* **LASCADIUM**. bot. than. Genre de la famille des Euphorbiacées et de la Monœcie Polyandrie, L. , établi par Rafinesque-Schmallz [Flot: Ludou., p. 114] qui l'a ainsi caractérisé : fleurs monoïques; calice dont le limbe est entier; corolle nulle; fleurs mâles offrant environ douze étamines, dont les filets sont courts, les anthères épaisses ; fleurs femelles ayant un ovaire trilobé, surmonté d'un style à trois divisions profondes ; capsule ovée , lisse et à trois graines. Ce genre , adopté par Adrien de Jussieu [*Euphorbiacearum* Généra, p. 62] , demande une description plus complète du fruit et de la graine.

Il ne se compose que d'une seule espèce , *Lascadium lanuginosum* , Haf. , qui croît dans la Louisiane. C'est un Arbrisseau rameux et lanugineux- sur toute sa superficie. Ses feuilles sont alternes , portées sur de longs pétioles ; ses fleurs sont terminales , les

LAS 227

mâles en grand nombre groupées autour d'une feuille qui occupe le centre. (g.n.)

* **LASCENO**. bot. fhan. (Garidel.) Syn. vulgaire de *Majagra* perenne , L. (b.)

LASER. *Laserpitium*. bot. fhan.

Ce genre, de la famille des Ombellifères , et de la Pentandrie Digynic , L. , présente les caractères suivans :

calice à peine perceptible, à cinq petites dents; corolle à cinq pétales presque égaux, ouverts et pliés à leur sommet de manière à paraître échancrés en cœur ; diakène ovale ou oblong , garni de huit ailes membraneuses et longitudinales placées entre les stries ou côtes primaires des fruits. Les fleurs forment une ombelle composée, grande et bien garnie. L'iuvolucre et les involucelles sont polyphylles. Ce genre a beaucoup de rapports a vec les Ligusticum; aussi a-t-on transporté réciproquement et comme promené plusieurs espèces d'un genre à l'autre. Mœnch en a séparé le Laserpitium Si/er, L. , pour former le genre Si/er qt;i n'a pas été admis. Celui que Cran t./ et Gaertner ont constitué sous ce dernier nom a pour type l 'Angelica aquilegifolia , Lamk. , que plusieurs auteurs avaient placé parmi les Laserpitium.

Snrenge {Umbell. Spec, p. 4i) avait d'abord réuni au Cnidium , sous le nom de C. Fonlanesii , les Laserp.

peucedanoides, Desf., et L. atlanticum de Poirer , mais dans la suite (in St huit. System. F'aget. , p. 555) il fit de cette Plante une espèce de Ligusticum. Le genre Aciphylla de Forster (Char. Gen., p. 156, tab. 68) avait été réuni aux Lisers par Linné fils, malgré les différences notables

ue fournissaient ses caractères.

prmgel en a fait encore une espèce de Ligusticum. F~. Livë-chx. Après tous ces changemens et beaucoup d'autres qu'il est inutile d'indiquer ici , le genre Laserpitium se trouve réduit à une quinzaine d'espèces qui croissent presque toutes dans les pays monlueux du midi de l'Europe. Parmi

celles qui sont indigènes de France , on distingue : le *Laserpium latifolium* , L. , que l'on trouve dans la forêt de Fontainebleau, sur le coteau des rives de la Seine; le *Laserpitium Siler* , L. , Ombellifère dont les feuilles, deux ou trois fois ailées, sont remarquables par leur longueur , et qui est fort commune entre les fentes des rochers des Alpes, du Jura et de départements méridionaux. On rencontre aussi dans les Alpes deux autres espèces, *L. hispidum* , L. , et *L. Prutenicum*, L., qui se distinguent par l'élégance de leur feuillage découpé en pinnules extrêmement fines , ovales, trifides ou pinnatifides.

LASIA. bot. néan. Le genre publié sous ce nom par Loureiro (Flor.

Çacfinchiii. , éd. Villd.) doit être réuni au *Pothos*. V. ce mot. (g. n.)

LASIA. BOT. CRYTT. P. Lasie.

* *L. VSANTHli*. *Lasianthus*. bot.

phan. Genre de la famille des Rubiacées , et de la Tétrandrie Monogynie , L., établi par le docteur Jack [Transact. of the Linn. Soc. , vol. 4, p. 12; "i) qui lui a donné pour caractères essentiels: un calice à quatre divisions profondes et linéaires ; une corolle à lobes en funiculi l'orme poilue; quatre étamines; quatre stigmates linéaires , épais ; baie à quatre noyaux. Ce genre se compose de deux sous-Genres à (leurs axillaires , à bractées opposées, et à fruits en baies bleues. Le *Lasianthus cyathicus* , Jack , caractérisé par ses bractées grandes et cordiformes , croît sur la côte ouest de Sumatra. L'autre espèce , *Lasianthus attenuatus* , Jack,

se distingue par ses feuilles glabres en dessus, -et par ses bractées lancéolées.

Cet Arbrisseau est indigène de l'intérieur de Bencoolen.

Le nom de Lasianthus avait été employé par Linné pour désigner un Arbrisseau de l'Amérique septentrionale , dont il fit ensuite une espèce (*Vflypericnm*,, mais qu'il plaça définitivement dans le genre *Gordonia*.

LAS

De Candollç (Prodr. Syst. Univ.

Vegel. 1 , p. 5a8) s'est servi de ce mot pour la première section qu'il a établie dans ce genre. F. Gobjionie.

LASIANTHERE. *Lasianthera*.

pot. phan. Palisot-Beauvois (Flore d'Oware et de Bénin, 1, p. 85, t. 5ij a décrit et figuré, sous le nom de *Lasianthera africana* , une Plante de la Pentaudrie Monogynie , L. , sousfrutescente , sarmentueuse , dont les feuilles sont ovales -oblongues , entières et cuspidées. Les fleurs sont portées sur des pédoncules axillaires, divisés en quatre ou cinq rayons inégaux en ombelle et formant une petite tête globuleuse; elles ont un calice fort petit, à cinq dents , et accompagné d'une ou deux petites bractées subulées; la corolle est un peu plus longue que le calice ; son tube est court, et le limbe à cinq lobes profonds , lancéolés ; cinq étamines insérées à la base de la corolle, dont les filets sont larges et adnates avec les lobes de celles-ci ; les anthères oblongues, couvertes de longs poils blanchâtres ; style court. Le fruit est inconnu. L'auteur de ce genre l'avait rapporté à la famille des Apocynées; mais ce rapprochement n'étant justifié par aucune considération dé-

duite de la structure de la fleur, De Candolle (Pror/r. Syst. utùv. Regn. reg., t. i, p. 656) en a formé le second genre des Léeacées , seconde tribu de la famille des Ampélidées. V .

LÉEACÉES. (G..X.)

LAS1E. Lasii/s. tks. Genre de l'ordre des Hyménoptères, détache par Fabricius du genre Fourmi , niais que Lalreille y réunit en le considérant comme une division de ce dernier genre, f . Fourmi. (g.)

LASIE. Lasia. bot. crypt. [Mousses.) Genre établi par Palisot de Beauvois dans le Prodrome de l'OElhéogamie, p. 2.5. Il est caractérisé par une coiffe velue et hérissée de longs poils; un opercule conique, aigu; seize dents simples , lancéolées , membraneuses ; mie urne droite, ovale,

LAS

li tube médiocre droit;; gâine tuifoerculeuse enveloppée dans un pé- |ii-iclièsc. Le Lasia a été créé aux déipoeus du genre Ptciiy-gynandrum de liiijridel , cpïi est le Pièivgohium de iSSchwaegii-chen. Tel qu'il a été conservé par les auteurs, le Lasia renlV.ei me cinq espèces : le L. acicularis, JMacromiliium aciculare de Bridel , iïqui est devenu le Schlotheimia acitéularis du même auteur, et dont la ■patrie est l'Ile-de-France; le L. marmaata de Bridel, aussi de l'Ile-de- IFrance ; le L, Sinithii de Bridel , cc'est le Leptudon Sinithii de Mohr , lllypnun Sinithii de Dickson. (a. F.)

* LASIOBOTRYS. bot. ckyi't.

[(Ilypoxylées.) Sprengel et Kunze ont ccréé ce genre, il est basé sur le Doithidea Loniccroe de Fries , dont il me semble pas devoir

être séparé , les différences qu'il présente avec : ses congénères ne semblant pas suffrantes. y. Dotiidae. (a. f.)

LASIOCAMPE. Lasiuca. ipa. ins.

ischnus donne ce nom à un genre (de Lépidoptères formé aux dépens des Bombyx. (g.)

* LASIONITE. min. (Fuchs, Journal de Schweigger. T. xvi , p. 286, 1 et T. xxiv, p. 121.) Substance en • cristaux capillaires , trouvée dans les

fissures d'un Fer hydroxide , dans la mine de Saint-Jacob, près d'Amberg (Haut-Palatin). Elle est composée , suivant une analyse de Fuchs : de 56, 56 d'Alumine; 54,72 d'Acide phosphorique et 28 d'Flu. Ce n'est probablement qu'une variété d'hydrophosphate bi-alumineux ou Wavellite. y. ce mot. (g. del.)

* LASIOPE. bot. riian. Genre de la famille des Synanthérées , Corymbifères de Jussieu, et de la Syngénésie su perdue, L., établi par H.

Cassini (Bull. de la Soc. philom. , sept. 1817) qui l'a ainsi caractérisé : involucre formé de folioles lancéolées et irrégulièrement imbriquées; réceptacle ponctué , plane et absolument nu; calathide dont les fleurs du centre sont nombreuses, égales, la-

LAS 229

biées et hermaphrodites : celles de la circonférence sur un double rang, les intérieures non ralliantes , femelles, les extérieures radiantes , à deux languettes et femelles; anthères munies, au sommet et à la base, de longs appendices; ovaires cylindracés, hérissés, surmontés d'une aigrette plumeuse. Ce genre a

été placé, par son auteur , près du (hapir.lia, dans la tribu des Mulisiées. Il est remarquable par la diversité des corolles de la calathide ; celles du milieu du disque soni presque régulières, taudis que les autres du même disque, mais plus excentriques , sont profondément labiées. Les Heurs du rang intérieur delà circonférence sont intermédiaires , par leur strucliilie, entre celles du disque et celles de la rangée extérieure; elles possèdent îles rudimens d'élamins ; celles-ci manquent totalement dans les Heurs extérieures dont les corolles présentent deux languettes, l'une très-longue , à peiné tridentée, l'autre petite et bifide. Le style du Lasiopi/s est celui des autres JVlutisiées , c'est-à-dire divisé au sommet eu deux languettes exti èineiuuut courtes , semi-orbiculaires.

Le *Lasiupus atnbigiius*, Cass. , est l'unique espèce du genre. Cette Plante est remarquable parles poils laineux dont le collet de la racine ainsi que la hampe sont hérissés. Ses l'enilles radicales sont elliptiques, obtuses, légèrement sinuées sur les bords, glabres eu dessus , tomeuteuses .en dessous. Ses fleurs forment une grande calathide terminale , jaune dans le centre et orangée à la circonférence. Sonnerai l'a recueillie au cap de Bonne-Espérance, et l'a nommée avec doute , dans l'Herbier de Jussieu , *Arnica crocea*; mais cette dénomination paraît être erronée.

LASIOPETALE. *Lasiupetalum*.

bot. :>han. Genre établi par Smith {Lin. Suc. Traits., p. 216), d'abord placé dans la famille des Ericinées , puis rapprocl« des Riiannées , mais qui aujourd'hui fait prtie du groupe

• les Lasiopétalées dans la famille des Buttnériacées. Gay , dans son Mémoire sur les Lasiopétalées , a limité les caractères du genre qui nous occupe; et plusieurs espèces qui y avaient été rapportées, sont devenues les types de deux genres nouveaux , sous les noms de Thomasia et de Scringia. Nous allons donc exposer les caractères du genre Lasiopétale , tels qu'ils ont été donnés par cet habile observateur. Ce sont des Arbustes peu élevés, à rameaux effilés. Leurs feuilles, dépourvues de stipules , sont alternes , pétiolées , linéaires , allongées , entières, à bords roulés en dessous , ayant la face supérieure glabre et l'inférieure pubescente. Les fleurs sont disposées en épis ou en grappes opposées aux feuilles. Chacune d'elles porte une bractée à 11 parties et persistante appliquée contre son calice. Le calice est coloré, pétaloïde, persistant, subcampanulé , à cinq divisions. La corolle se compose de cinq pétales très-petits et presque glanduliformes. Les étamines, au nombre de cinq, ont leurs filets libres; leurs anthères ovoïdes, allongées, à deux loges s'ouvrant chacune par une petite fente terminale. L'ovaire est simple , sessile , à trois loges contenant chacune deux ovules redressés, attachés à la partie inférieure de l'angle interne. Le style est court et se termine par un stigmate trilobé. Le fruit est une capsule recouverte par le calice persistant ; elle est à trois loges et à trois valves dont les bords rentrants forment les cloisons.

Ce genre ainsi caractérisé ne renferme plus que deux espèces, l'une et l'autre originaires de la Nouvelle- Hollande , savoir : *Lasiopetalum ferrugineum* , Smith , et *L. parviflorum* , Rudge.

Le *Lasiopetalum ferrugineum* , Smith , Gay , Las., 16 , t. 3, est trèsfréquemment cultivé dans les jardins.

C'est un Arbuste de trois à cinq pieds d'élévation , qui croît dans différentes parties des c tes de la Nouvelle- Hollande. Ses Feuilles sont alternes,

LAS

quelquefois tr s-rapproch es et comme oppos es, lin aires, lanc ol es, aigu es, tr s-enti res,   bords r fl chis , glabres en dessus , tomenteuses et ferrugineuses   leur face inf rieure, longues d'environ trois   quatre pouces , larges de quatre   cinq lignes.

Les fleurs sont blanch tres, dispos es en  pis oppos s aux feuilles. Cette esp ce se cultive dans la terre de Bruy re. Elle doit  tre rentr e dans l'orangerie pendant l'hiver.

Parmi les diverses esp ces d'abord rapport es   ce genre, quatre appartiennent aujourd'hui au genre *Thomasia* de Gay , savoir : *Lasiopetalum purpureum*, Ait.; *Lasiop. solanaceum*, Sims; *Lasiop. tritopkyllum*, Labill., et *Lasiop. quecifolium* , Andrews. Une autre constitue le nouveau genre *Seringia* du m me auteur , c'est le *Lasiopetalum arborescens* d'Aiton. Tr. J neungie et iho-

MA3IE. (A. H

* LASIOP TAL ES. bot. phan.

Section ou tribu  tablie par Gay (M m. Mus. T. vu) dans la famille des Bytln riac es , et qui se compose des genres *Seringia* , *Lasiopetalum* , *Thomasia* , *Guichenotia* et *Keraudrenia*. V. Byttn riac es. (a. n.)

*LASIOPOGON. bot. phan. Genre de la famille des Synanthérées, Corymbifères de Jussieu , et de la Syngénésie superflue, L., établi par Cassini(Bull. de la Soc. philom., mai 1818) qui l'a ainsi caractérisé : involucre formé d'écaillés presque sur un seul rang, appliquées, linéaires, coriaces , membraneuses sur les bords , surmontées d'un appendice étale, très-obtus, scarieux, luisant et coloré ; quelques bractées foliacées, dont le sommet est arrondi ou tronqué , forment une sorte de se- i cond involucre extérieur; réceptacle > plane, nu et fovéolé ; calathide dont C les fleurs centrales sont en petit 5 nombre , régulières et hermaphrodi- l tes, celles de la circonférence sur I plusieurs rangs , nombreuses , tubu- f leuses et femelles ; ovaires ovoïdes I un peu comprimés, très-glabres , >

LAS

surmontés d'une aigrette dont les poils sont excessivement plumeux.

Ce dernier caractère est ce qui distingue surtout le Lasiopogon du Gnaphalium, dont il est très-voisin. La Plante sur laquelle ce genre a été constitué fut décrite et figurée par Desfontaines {Flor. allant. T. II , p.

367, t. 961) j sous le nom de Gnaphalium ruscoides. Cassini l'a nommée Lasiopogon. lanatum. Elle est herbacée , toute couverte de poils laineux ; sa tige est très-courte , grêle , filiforme, rameuse supérieurement , garnie de feuilles alternes , sessiles, linéaires, spathulées et trèsentières; ses fleurs sont solitaires au sommet des ramuscules. Elle a été trouvée dans le royaume de Tunis.

* LASIOPTERA. bot. phan. Les *Thlaspi carnpestre* et *hirtum*, L., ont été séparés, sous ce nom générique, par Andrzejowski. Brown et De Candolle ont placé ces deux Plantes parmi les *Lepichum*. f. ce mot. (g..n.)

LASIOPYGE. *Lasiopyga*. mam.

Division proposée par Illiger dans le genre *Guenon*. Elle était caractérisée

[uniquement] par l'absence des calosités aux fesses, comme l'indique le nom même *Lasiopyge*, et cependant renfermait avec la *Guenon Doue* qui seule mérite ce nom , d'autres es-

èces ; aussi ce genre, fondé d'ailleurs sur un caractère sans importance , n'a-t-il pas été adopté. V. GUE- NON. (IS. G. ST. - II.)

* LASIOSPERME. *Lasiospermum*. bot. phan. Genre de la famille des *Synanthérées* , *Corymbifères* de Jussieu , et de la *Syngénésie superflue*, L. , établi par Lagasca (Gen.

et *Sp. Plant.*, p. 31) et adopté par Cassini avec les caractères suivans : involucre hémisphérique formé d'écailles régulièrement imbriquées , appliquées , ovales ou oblongues , très-obtuses, coriaces, membraneuses sur les bords ; réceptacle légèrement plane , garni de paillettes oblongues , lancéolées ; calathide dont les fleurs centrales sont nombreuses , ré-

LAS 51

gulières, hermaphrodites; celles de la . circonférence non radiantes , sur un seul rang, en languettes, et femelles; akènes subglobuleux, hérissés de longs poils et dépourvus d'aigrette. Cassini

place ce genre dans la tribu des Anthémidées , près de Y Anacyclus dont il diffère par ses fruits hérissés de longues soies. Le Lasiospermum pedunculare , Lagasc, Santolina eriosperma , Pers., est l'unique espèce de ce genre. Cette Plante herbacée a une tige rameuse , haute de trois à quatre décimètres ; ses feuilles sont sessiles, linéaires et bipinnées ; ses calathides sont très-petites, jaunes et solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Elle est originaire de certaines montagnes de l'Italie.

Fischer (Catalogue du jardin de Gorenki, 1812) a indiqué un autre genre de Synanthérées sous le nom de Lasiopermum. C'est le Lasiospora de Cassini. V. Lasiospore. (g.n.)

* LASIOSPORE. Lasiospora. bot.

phan. Ce genre de la famille des Synanthérées, Chicoracées de Jussieu , et de la Syngénésie égale, L., a été indiqué par Fischer (Catalogue du jardin de Gorenki , 181 a) sous le nom de Lasiospeum ; mais comme Lagasca a employé la même dénomination pour un genre dont il a de plus donné les caractères, Cassini a cru convenable de modifier le nom imposé par Fischer en celui de Lasiospora. Voici les caractères qu'il lui a imposés : involucre presque cylindracé ou campanulé, formé d'écaillés appliquées et disposées sur deux rangs, les extérieures courtes, ovales , lancéolées , coriaces , supérieurement appendiculées , les intérieures longues , lancéolées , carénées sur le dos , membraneuses sur les bords; réceptacle plane, fovéolé, absolument nu; calathide dont les demifleurons sont étalés en forme de rayons , nombreux et hermaphrodites ; akènes légèrement stipités , oblongs , cylindracés , non prolongés en un col , inunis de côtes longitu-

dinales , hérissés de très-longes poils laineux, simples et appliqués , sui— montés d'une aigrette plumeuse. Ce genre tient le milieu entre le *Scorzonera* et le *Gelasia*; il a l'aigrette du premier et l'involucre du second ; mais la principale différence réside dans les longs poils qui couvrent ses fruits.

Les *Scorzonera eriosperma* et *ensifolia* de Marshall-Bieb. *cin* , Tl.

Taur.-Cauc, et *Scorzonera hirsuta* , D. C. , Fl. Fr., sont les espèces admises par Fischer dans son genre *Lasiospermum*. Cassini lésa nommées *Lasiospora angustifolia* , *ensifolia* et *hirsuta*; il l'pur a joint le *Scorzonera cretica* de Willdenow, sous le nom de *Lasiospora cretica*. Les deux premières croissent dans le Caucase et dans les régions comprises entre cette chaîne et la mer Caspienne: la troisième habite les lieux pierreux du midi de l'Europe; enfin la quatrième a été trouvée dans l'île de Crète par Tournefort. (»••*•)

* LA.SIOSTÈME. *Lasiostemum*.

BOT. M AN. Génie de la famille des Rutacées , section des Cuspariées, établi par Nées d'Esenbeck et Martius dans leur travail sur le groupe qu'ils nomment *Fraxinellées* (sJct.

Cur. nat. Bonn., 1 1 , p- i^g). Ce genre offre pour caractères : un calice monosépale, à cinq divisions profondes , aiguës et étalées; une corolle campaniforme , formée de cinq pétales libres; cinq étamines hypogynes . alternes avec les apétales , dressées , presque égales, trois seulement étant fertiles et anthéi itères , deux autres stériles et privées d'anthères. Ovaire hémisphérique , à cinq lobes , entoure par un disque hypogyne ; style filiforme, ter-

miné par un stigma très-petit, obtus. Le fruit se compose de cinq carpelles ou coques monosper-

mes. • , .

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, *Lasiostemum sylvestre*, Nées et Mail., loc. cit., t. 26. C'est un Arbre ou un Arbrisseau à feuilles alternes, pétiolées, composées de trois fo-

LAS

lioles digitées, glanduleuses et ponctuées, et à fleurs disposées en grappes simples, longues et pédonculées. Il a été rapporté du Brésil par le

Élie de Newwied. Auguste de Saint-Hilaire, dans son travail sur les Puitacées (Mém. Mus., X, p. 580 et suiv.), ayant examiné avec un grand soin les différents genres mentionnés par Nées et Martius dans leurs Fraxinellées, a prouvé que leur genre *Lasiostema* muni était une véritable espèce de *Galipea* qui devait retenir le nom de *Galipea* *yluestris*, et se placer entre les *G. febrifuga* et *G. heterophylla*. V.

Galipea. (a.r.)

LASIOSTOMA. bot.-phan. Seiner appelle ainsi le genre Rouhamou d'Aublet qui est une véritable espèce du genre *Strychnos*. If., Vomiquier.

LASS. bot. ni an. Le genre *Pavonia* de Cavanilles avait été désigné sous ce nom usité au Sénégal, par Adanson. V. Pavonij. (g..n.)

* LAST RÉE. *Lastroea*. bot. crtpt.

{Fougères.) Nous avons, dans ce Dictionnaire (T. vi, p. 588), proposé l'établissement de ce genre , en le dédiant à Delastre de Châtelleraut , botaniste rempli de sagacité, auquel nous devons des observations microscopiques parfaitement bien faites et de la plus haute importance. Il doit faciliter l'étude de ces nombreux Polypodes entre lesquels il devenait indispensable d'établir des coupes , et dès qu'on en aura saisi les caractères , il paraîtra des plus naturels dans la famille des Polypodiacées, telle que nous la circonscrivons.

Sa fructification consiste en sores parfaitement nues, c'est-à-dire dépourvues d'induse quelconque , et constituées par des paquets arrondis , implantés sur les nervures des pinules, mais jamais à leur extrémité. Dans le genre *Polypodium* , au contraire , de tels paquets sont constamment terminaux, c'est-à-dire qu'ils se développent à l'extrémité d'une nervure fructifère et toute particulière , plus courte que les nervures stériles. De cette différence d'implantation des

LAS

soies qui pourra paraître un caractère bien léger à certains botanistes qui n'y auront pas réfléchi, résulte cependant une organisation totalement différente dans les Végétaux où nous la lisons remarquer. En effet , que l'on considère un Polypode , selon notre détermination , on y trouve des nervures stériles disposées en un réseau particulier, s'anastomosant les unes aux autres, qui présentant conséquemment vers le bord des frondes une limite au parenchyme cellulaire, ne lui permettent guère de s'extérioriser , s'il est permis d'employer cette expression , pour varier à l'infini la forme des frondes. 11 arrive ici ce qui a lieu chez certaines Phanérogames , où les nervures limitent les feuilles comme condam-

nées à demeurer entières ou à se loper tout au plus , ainsi que dans les Passiflores par exemple, ah lorsque le parenchyme tend à se répandre en dehors des nervures , cqlles-ci le contiennent et le gênent au point de produire ces avortemens par lesquels le feuillage de certaines espèces présente des formes si bizarres. Les Polypodes, soumis aux mêmes lois , ont , en général , leurs frondes entières , lobées ou tout au plus pinnatifules ; ils n'en ont guère de tripinuées que lorsque la pinnule slipitée représente la répétition de la fronde entière. Ce reseau de nervures stériles contient, entre certaines de ses mailles , une nervure simple , s'échappant d'un angle des anastomoses et ponant à son extrémité qui n'aboutit à aucune autre, la fructification terminale, ce qui représente un pédoncule axil-laïre. Dans les Lasîiées , au contraire , les nervures sont ou simples, ou alternes , mais libres par leur extrémité, jamais anastomosées, et conséquciimment ne formant nul réseau limitant, qui force le parenchyme cellulaire à se renlèinici dans des circonscriptions déterminantes de la forme.

Aussi peut-il s'étendre librement le long de ces nervures indépendantes et les accompagner, au point que nulle des deux parties constitutives de la

LAS aS3

fronde n'apportant le moindre obstacle à son développement, celle-ci peut varier à L'infini; c'est conséqueminent parmi les Lastréesque nous trouvons presque tous les Polypodes bipinnés , tripinnés et décomposés de nos prédécesseurs. On n'y voit jamais de nervures dont l'extrémité supporte les soies et qui représentent un pédoncule ; on pourrait dire que la fructification est

fixée aux ramules même de la Plante. En effet les sores des Lastrées se trouvent vers le milieu des nervures indifféremment.

Les espèces de Lastrées sont fort nombreuses; celles que produit l'Europe sont 1° *Oreopteris*, le *Tkelipteris*, le *Ptægopteris*, le *Dryopteris* et le *Citfaarea*. Parmi les exotiques, nous citerons celle que, d'après Linné, on nomma *Polypodium uiiilum*, et deux belles espèces dont l'une nous a été communiquée par Poilcau et l'autre par Lialbis. 1°. *haslrma Poiteana*, à *iiftndc* bipinnatifide; pinnules secondaires légèrement recourbées en croissant, libres seulement vers leur extrémité, connées et unies par leur base au point de n'y être distinguées que lorsqu'on regarde la Fougère à travers le jour. Les nervures tertiaires supportent les fruits vers le milieu de leur longueur, elles sont parfaitement simples, opposées et légèrement arquées. Cette espèce, originaire de la Guiane, est une belle Fougère, large, longue, du moins les échantillons que nous avons vus ont de deux à trois pieds; ils sont d'un vert sombre. 2°. *JLastrœa lialbiô'/a/ia*, N., à *slipclong* (de huit à quinze pouces), nu, léragone, sulqué sur une ou deux de ses faces; fronde subquinquangulaire, bipinné; pinnules primaires opposées; pinnules secondaires alternes, les inférieures pinnatifides, les supérieures confluentes ou simplement profondément dentées, à divisions aiguës; nervures tertiaires opposées, les quaternaires alternes, dont la première, et rarement la seconde, supportent un petit paquet desores vers le milieu de leur étendue. Cette espèce élégante et

LAT

d'un beau vert se trouve dans les Antilles ; elle pourrait bien être le *Polypodium portoricense* de Sprengel, qui n'est pas tellement propre à Porlo- Rico que ce nom puisse être adopté.

LASYNÉMA. BOT. PHAN. PoirZ-Jsinema. V. ce mot. (g..n.)

* LA.TA. bot. phan. On ne sait à quoi rapporter le fruit de la Guiaue mentionné sous ce nom par l'Ecluse , et que ce botaniste a fait connaître dans son *Exotica*. (b.)

LATANIER. *Latania*. bot. phan.

Ce genre, de la famille des Palmiers et de la Dioecie Monadelphie , L. , se reconnaît aux caractères suivans : ses fleurs sont dioïques. Les fleurs mâles sont enveloppées dans une spathe formée de plusieurs folioles imbriquées. Le spadice est rameux ; chaque rameau , environné à sa base d'une écaille spathiforme, se divise à son sommet en plusieurs épis ou chatons cylindriques, écailleux. Chaque écaille porte une fleur à son aisselle. Le calice est sessile , à six divisions profondes , dont trois extérieures plus courtes ; les étamines sont au nombre de quinze à seize , ayant leurs filets monadelphes réunis en un tube épais, et leurs anthères oblongues et biloculaires ; le fruit globuleux , un peu charnu, contenant trois noyaux triangulaires. La graine renferme un endosperme corné , plein, contenant nu très-petit embryon placé dans sa partie supérieure. Gaertner a décrit ce genre sous le nom de *Cleophora*.

Mais le nom de *Latania* donné par Commerson et adopté par Jussieu et par Lamarck, doit être préféré comme étant le plus ancien.

Ce genre se compose de deux ou trois espèces originaires des îles de France et de Mascareigne. La première qui ait été connue est le LataNIER de Boubbon , *Latania borbonica*, Lamk., Dict. C'est un Palmier dont le stipe cylindrique droit, assez élevé , se couronne d'une belle touffe de grandes feuilles pétiolées, palmées en forme d'éventail; les folioles sont

LAT

nombreuses , roides , ensiformes , ai- il guës, glauques, pubescentes sur la côte longitudinale et souvent pliées en deux suivant leur largeur. Cette espèce croît aux lieux maritimes et sablonneux de Mascareigne. Il est très probable que le *Latania chinensis* de Jacquin, Frsgm. Bot., 1, p. 16, t. 11, f. 1, est la même espèce. On en connaît encore deux autres, savoir : 1^o *Latania nra* , Jacq. , loc. cit., t. 8 , que Gaertner a décrit et figuré sous le nom de *Clophora lontaroides* (De Fr. et Sem. , 2 , p. 185 , t. 10 , f. 1) ; 2^o et *Latania Commersonii*, Sprengel.

LATA. mam. Syn. de Loutre, (b.)

* LATÉPORE. *Latepora*. polyp.

Foss. Genre de l'ordre des Tubiporées , dans la division des Polypiers entièrement pierreux , établi par Rafinesque dans le Journal de Physique (1819, tom. 88, 429) pour des corps pierreux , composés de tubes cloisonnés; cloisons à plusieurs rangs réguliers de pores latéraux. L'auteur n'en mentionne qu'une espèce , le *Latepora alba*, dont le nom indique la couleur, qui a ses tubes soudés , lisses , à cinq ou six côtés, et qu'il a découverte dans les Etats-Unis d'Amérique.

LATÉRALTSÈTES ou CHÉLO:

TOXES. ins. Duméril nomme ainsi une famille de Diptères dont les caractères sont d'avoir le suçoir nul ou caché, une trompe rétractile dans une cavité du front , des antennes avec un poil isolé , latéral , simple ou barbu. Cette famille comprend une grande partie des Diptères athéricères de Latreille. (G-) LATÉ-RIGRADES. Laterigradoe aiiachn. Tribu de l'ordre des Pulmonaires , famille des Dipneumones , établie par Latreille et ayant pour caractères : les quatre pieds antérieurs toujours plus longs que le :

autres, tantôt la seconde paire surpassant la première , tantôt les deux presque de la même longueur. L'Animal les étend dans toute leur longueur , ainsi que les quatre autres , e

LAT

peut marcher de côté, à reculons ou en avant. Les mandibules de ces Aranéides sont ordinairement petites et leur crochet est replié transversalement. Leurs yeux sont toujours au nombre de huit, souvent très-inégaux et formant , par leur réunion , un segment de cercle ou un croissant; les deux latéraux postérieurs sont plus reculés en arrière ou plus rapprochés des bords latéraux du corselet que les autres. Les mâchoires sont, dans le grand nombre, inclinées sur la lèvre. Le corps est d'ordinaire aplati , en forme de Crabe, avec l'abdomen grand, arrondi ou triangulaire.

Ces Araignées portent le nom d'Araignées Crabes, parce qu'elles marchent souvent à reculons ou de côté comme ces Crustacés ; elles se tiennent tranquilles , les pieds étendus sur les Végétaux; elles ne font point de toiles , et jettent simplement quelques fils solitaires tendant à arrêter leur proie, sur laquelle elles se jettent; elles se forment une habitation entre les feuilles,

dont elles raproebent, contournent 'et fixent fes ords avec de la soie. Leur cocon est orbiculaire et aplati , et elles le gardent assidûment entre quelques feuilles jusqu'à la naissance des petits.

Celte tribu se compose des genres mise , Philodrome , Micro-mate et Sténélope. T . ces mots. (g.)

* LATHAGRIDM. bot. crypt.

[Lichens.) Achariusa donné ce nom au cinquième sous-genre de son genre Collema. Il est ainsi défini : thalle foliacé ; lobes membraneux , larges , lâches , nus , d'une couleur verte noirâtre. Les Collema nigrescens , Jlaccidum, derrnatinum, etc., rentrent dans ce sous-genre. V. Collema. (a. f.)

LATHR7EA. bot. phan. V. Clandestine.

LATHROBIE. Latftrbbiurm ins.

Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Pentamères, famille des Brachélytres , tribu des Fissilabres , établi par Gravenhorst , et ayant

LAT sali

our caractères • tête entièrement éagée et distinguée du corselet par un étranglement en forme de col ; labre profondément éebancré ; palpes filiformes, terminés brusquement par un article beaucoup plus petit que le précédent, pointu, souvent peu distinct, les maxillaires beaucoup plus longs que les labiaux ; antennes insérées au devant des yeux , en dehors du labre et près de la base des mandibules ; tarses antérieurs dilatés.

Ces Insectes , qui ont les plus grands rapports avec les Staphylins

proprement dits, s'en distinguent par insertion des antennes et par la forme du corps; ils s'éloignent des Poédères, auxquels ils semblent réunir les Staphylins, par la forme du labre qui n'est pas échancré dans ceux-ci , et par leurs palpes. Les Lathrobies vivent sous les débris de matières animales et végétales, sous les pierres et dans les lieux frais et humides ; ils se nourrissent de débris de Végétaux et d'Animaux , sont trèsagiles et fuient en relevant leur abdomen comme pour en menacer leur ennemi. Dejean (Cat. des Col., p. a4) mentionne vingt-sept espèces de ce genre; elles sont toutes propres à l'Europe; la plus commune à Paris est :

Le Lathrobie allongé, *L. elongatiss.*, Grav. (Col. Micropt., p. 55), *Latr.* ; *Staphilintus elongatus*, *Lin.* ; *Pcederus elongatus*, *Fabr.*, *Panz.* (*Trait. n. Ins. Germ.* , fasc. 9, Kg. 12). Il est noir, brillant; les élytres sont d'un roux sanguin à leur extrémité ; les pâtes sont d'un roux pâle. *y.* , pour les autres espèces, *Gravenhorst* (loc.

cit.), *Fabricius*, *Olivier*, etc. (*g.*)

LATHYRIS. bot. phan. Nom scientifique de la grande Epurge , espèce du genre Euphorbe. V. ce mot. (*b.*)

* LATIYRUS. bot. phan. *T\ Gesse.*

LATIALITE. min. (*Gismondi.*) Même chose qu'*Haiyne*. F~. ce mot.

236 LAT

LATIRE. *Latirus*. moll. Démembrement des Fuseaux établi à tort en genre par *Monllbrt* (*Conchyl. Sysl.*

T. il, p. 55 1) , sur le simple caractère d'un ombilic infundibuliforme , plus grand qu'il ne l'est ordinairement dans les Fuseaux, r.cemol. (p. .h.)

LATIROSTRES. ois. Famille de la méthode de Vieillot , qui comprend les genres Spatule et Savacou. F~. ces mots. (DK..Z.J

* LATONIE. kept. ovn. Espèce d'Elaps de Daudin. V. Vipère, (b.j

* LATÔSA.TIS. uot. phan, Du Pctit-Thouars (Hisl. des Orchid, des îles australes de l'Afrique.) a nommé ainsi une, espèce de son genre Satorchis, laquelle, dans le langage linnéen, serait nommée SaLyrium lali~ folium. Cette Orchidée est indigène de l'île de Mascareigne , et elle est figurée par l'auteur (/oc cit. , t. 10).

LATRIDIE. Latri'liits. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, famille des Xylophages, tribu des Trogossitaires , établi par Herbst , et dont les caractères sont: palpes très-courts, les maxillaires très-peu saillans ; mandibules petites, point saillantes ; antennes notablement plus longues que la tête , composées de onze articles , dont le second est plus grand que les suivans; massue des antennes de trois articles; articles des tarses entiers; corps étroit et allongé. Ces Insectes sont en général très-petits; leur corps est étroit en devant et— s'élargit jusqu'à la partie postérieure de l'abdomen. Ils diffèrent des Sylvans de Latreille par leurs antennes, par les formes du corps; ils s'éloignent des Méryx du même par les palpes maxillaires qui sont saillans dans ceux-ci.

Ces Insectes vivent sur les vieux bois, sur les murs, dans l'intérieur des maisons. Ils ont été placés, par Payson et Fabricius , parmi les Derinestes, et parmi les Ips par Olivier.

Dejean (Cat. des Col., p. 102) en mentionne douze espèces : la plus

LAU

commune de celles qui se trouvent à Paris est :

Le L.YTIUnIE DES fenètbf.s. , L.

fenestralis. , Latr. ; L. loiigicornis , Herbst (Col. 5 , lab. 44 , (ig. 1). 11 est d'un fauveobscur, pubescent, avecles antennes et les pieds fauves; la poitrine et l'abdomen sont noirâtres; le corselet est plus étroit , arrondi pos-> térieurement , avec une fossette au milieu j les élytres sont striées; les stries sont formées de points enfoncés et alignés. Olivier l'a décrit (Col., t. 2, n° iS,pl. 3,tig. 21) sous le nom d'Ips enfoncé. (g.)

LATRODECTE. Lairodectus.

abachn. Nom donné parWalkenaerà un genre d'Araignée, que Lalreille réunit au Thériidiou. V . ce mot. (g.)

* LATRDNCDLI. ross. Selon Défiance, c'est le nom que Luid a donné à des espèces de vertèbres fossiles qui ont à peu près la forme des daines de trictrac. (a. 11.)

LAD. rois. L'un des noms vulgaires du Zens Faber. V. Zée. (h.)

LADDANDM. bot. phan. Pour Laclaiiurn. V. ce mot. (c)

* LAD GÈLE, pois. La Vandoise , espèce d'Able , porte ce nom dans sa jeunesse en quelques cantons, (p.)

LADGÉRIE. Laugeria. bot. phan.

Ce genre, de la famille des Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie, L., à été établi par Jacquin {4m., 64, t.

177); mais, suivant Schrader, Pevsoon et Kunth, il ne diffère pas sensiblement du Guetlarda et doit y être réuni. En effet, les seules différences qui ont été signalées entre ces deux genres consistent dans le nombre des divisions de la corolle, des étamines et des loges du noyau, caractères d'une faible importance dans la vaste famille des Rubiacées. V. Gi i.ttap.de. (A.n.)

LADMONITE. min. Zéolithe efflorescente, Zéolithe de Bretagne.

Substance minérale d'un blanc légèrement nacré, tendre et fragile, pesant spécifiquement 2,3, et divisible

en prismes rhomboïdaux d'environ $86^{\circ} 50'$, dont la base est inclinée sur l'arête aiguë de $13^{\circ} 50'$. C'est un silicate double d'Alumine et de Chaux, avec Eau; contenant en poids 33 parties d'Alumine, 9 de Silice, 9 de Chaux, et 17 d'Eau. Elle donne de l'Eau par la calcination, et se résout en gelée dans l'Acide nitrique; Ses cristaux sont susceptibles de se décolorer par leur exposition à l'air, et ils finissent même par tomber en poussière. Au chalumeau, ils se boursouflent: ils commencent à fondre, et (donnent un émail blanchâtre qui par un feu prolongé se transforme en un verre demi-transparent. Ses formes les plus ordinaires sont le prisme primitif, et le même termine par des sommets dièdres ou modifié sur les arêtes latérales. Ses variétés de structure sont la bacillaire, la lamellaire et l'aciculaire. Ce Minéral a été observé pour la première fois par Gillet de Laumont, dans la mine de Plomb d'Ille-et-Vilaine, dont le filon traverse un terrain intermédiaire. On la trouve aussi avec la

Chaux phosphatée limpide au Sainl-Gothard , dans la VVackeà Schemnitz en Hongrie et dans les Koches amvgdaloïdes du Yicentin , de Féroé, d'Irlande et d'Ecosse. (g. del.)

* LAUNAYE. *Launœa*. bot. phan.

Genre de la famille des Syanthérées , Chicoracées deJussieu, et de la Syngénésic égale, L., établi par H. Cassini (Otef. des Sciences JNat. , t. S5, p. 3a 1) qui l'a ainsi caractéri- *8é : involncre formé de folioles régulièrement imbriquées , appliquées , ob'uses an sommet, membraneuses sur les bords, les extérieures ovales elles intérieures oblongues; réceptacle |lane et nu; calathide dont les Demi-fleurons sont au nombre de douze environ et hermaphrodites ; akènes (non encore mûrs) ti ès-allon- -gés , non sensiblement amincis vers le haut , pourvus d'un bourrelet apicilaire pubescent , et surmontés d'une longue aigrette composée de poils très-legèrcment plumeux à leur par-

LAD 2Ô

tic supérieure. L'auteur de ce genre l'a placé entre le Picridium et le Sunc/ius, en faisant observer que cette place est encore incertaine , puisque ses caractères essentiels distinctifs ne sont établis que sur des fruits non parvenus à l'état de maturité. Le *Launœa bellidifulia* , H. Cass., est l'unique espèce du genre. Cette Plante a été recueillie à Madagascar, par Commer.-on. Elle est herbacée , entièrement glabre; sa tige, couchée horizontalement, est simple, très-longue , grêle , pourvue d'articulations irès-éloignées les unes des autres , et à chacune desquelles existeul deux petites feuilles en forme d'écaillés , exactement opposées. Daus l'aisselle

de l'une de ces petites feuilles , naît un rudiment de rameau portant une roselle d environ cinq feuilles inégales et analogues à celles du *Bellis perennis* , L. Dans l'aisselle de l'autre petite feuille ou bractée squamiforme , s'élève un rameau pédonculiforme , garni d'écaillés et terminé par la cilathide. (G..N.)

EAUPANKE ou PANKE. bot.

piian. (Fouillée.) Syn. du Francoa de Cavanilles. (b.)

* LAUPE. bot. ru an. Nom de pays du genre Godoya de la Flore du Pérou. (b.)

LAUKÉLIE. Laurcia. bot. phan.

Jussieu a nommé ainsi le genre *Paionia* de Ruiz et Pavon, parce qu'il existait déjà un autre genre dédié à Pavon par Cavanilles. Ce genre *Laurelia* appartient à la famille des Monimiées et à la Monœcie Dodécandrie , L. Les (leurs mâles et les fleurs femelles réunies pêle-mêle son I pédonculées et forment des grappes courtes et axillaires. Elles se composent d'un calice ou plutôt d'un involucre monosépale , campanulé, très-évasé et presque plane dans les fleurs mâles, oii il se divise supérieurement en une dizaine de lobes réguliers et disposés sur deux rangs; dans les fleurs femelles il est plus allongé , ses divisions sont beaucoup plus nombreuses , très- inégales , disposées sur quatre

a38 LAU

ou cinq rangs. Les étamines sont au nombre de quinze, ayant la plus grande analogie avec celles des Lauriers; leurs filets sont courts, épais, munis vers leur base d'une grosse glande sur chacun de leurs côtés; leur anthère est cordiforme, allongée, in-

trorse, à deux loges s'ouvrant chacune par toute leur face interne au moyen d'une valve qui s'enlève de la base vers le sommet. Dans l'involucre femelle on trouve un nombre extrêmement considérable de pistils filiformes qui en garnissent presque entièrement la paroi interne. Ces pistils, recouverts de longs poils soyeux, se composent d'un ovaire très -allongé, à une seule loge contenant un ovule dressé, surmonté d'un très-long style que termine un stigmate glabre. Après la fécondation , les divisions ou lobes externes de l'involucre se détachent, et on le voit se resserrer vers son sommet contre la partie supérieure des styles qui est saillante. Quand les fruits sont tout-à-fait mûrs , cet involucre péricarpoïde se rompt irrégulièrement en quatre ou cinq valves.

Les fruits sont encore filiformes, très -velus, munis du style qui est persistant ; ils sont monospermes et iudéhiscens. Leur graine contient dans un endosperme charnu un très-petit embryon dressé , placé vers sa base.

Ce genre ne se compose que d'une seule espèce , *Lau relia aromatica* , Juss., Ann. Mus., i4, p. 119; *Pavonia sempervirens* , Ruiz et Pavou , Syst. C'est'un grand Arbre originaire du Chili. Ses feuilles sont opposées, •persistantes, coriaces, elliptiques, aiguës, irrégulièrement dentées , glabres et d'un vert clair. Les fleurs sont rougeâtres , disposées en grappes et portées sur des pédoncules tomenteux. Au Chili on se sert du bois de Laurel pour faire des planches et des charpentes. Ses feuilles froissées entre les doigts répandent une odeur très-aromatique, (a. r.)

LAUREL LE. hot. piian. Nom substitué dans le Dictionnaire de Dé-

terville à celui de Cansjère. A'", ce mot. On l'applique en quelques parties de la France méridionale au Nérion. (b.)

LAUREMBERGIA. bot. phan.

(Bergius.) Syn. de Serpicule. (b.)

LAUKENCIE bot. crypt. [Hydrophytes) Genre parfaitement caractérisé , établi par Lamouroux dans son excellent Essai sur les Thalassiphytes, et qu'on reconnaît à sa fructification formée de tubercules globuleux , un peu gigartins , situés à l'extrémité des rameaux ou de leurs divisions, et formant parfois des dilata-tions obtuses et renflées en massues ou en grappes tubercu-leuses. Il arrive souvent , dit Lamouroux , qu'à l'époque de la ma-turité des graines, les enveloppes du tubercule se déchirent, et que les capsules sont mises à nu. Ce genre appartient à la famille des FJoridées , ou il est si naturel et si bien tranché qu'on a peine à concevoir comment Agardh ne l'a point adopté et a pu surtout en placer les espèces dans son genre C/iuiulria formé sur des ca-ractères si vagues et d'espèces tellement disparates , qu'on ne le saurait adopter , du moins tel que nous le présente l'algologue suédois. Les Laurencies ont quelque chose de gélatineux tant qu'elles sont dans l'eau , aussi la plupart adhèrent d'abord au pa-pier quand on les prépare , mais elles acquièrent ensuite quelque chose de corné , reviennent quand on les mouille , se ramol-lissent et se détériorent, mais ne se dissolvent pas aussi facile-ment en gelée que les Iridées, les Gélidies , etc. On prétend en outre qu'elles ont , à certaines époques de l'année, une saveur très-poivrée , même âcre et brûlante, qui les rend pro-l(près, chez certains peuples du Nord ,¹ à remplacer le Piment des paysB_ chauds , dans les grossiers assaison-ii nemens de leurs mets. Sur vingt»espèces environ qui nous sont con-fc nues , trois

ou quatre paraissent être 1' propres à la Méditerranée, autant à nos côtes océaniques, le reste est dis-

LAU

, lilmé dans les mer.s tempérées des li.leux mondes. Nous en possédons une j:-spèce nouvelle de Bahama, comtnui.iique'e par Chauvin, zélé bolanislc litle Caen. Nous la mentionnerons ici particulièrement avec les deux espèces les plus communes de nos bords, ■oar exemple :

1°. Laurenctede Chauvin, Lauren* r.iaC/iauuini ,N., d'un jaunâtre tirant •liur le rose, assez rigide dans l'état ide dessiccation; à expansions de deux 1 1 cinq pouces de long, grêles, munies Ide rameaux alternes, décroissans de congueur vers l'extrémité de la Planwe, comme ailés à leur tour par les ramules également alternes, ordinaï- : ciment simples, de longueur égale, 'Sensiblement renllésà leur extrémité; unième lorsque la IVuciiBcation ne s'y «est pas encore développée; elle a quelque chose d'hypnoïde. La base des I i— c'-jes est ordinairement toute dépouillée ilcle rameaux et produitquelquefois des eexpansions tout-à-fait simples. Elle ccroît sur les coquilles et sur les rochers.

2°. LaURENCIE PINNATIFIDE, Lail-

rtencia pinnatijida, Lamx.; fucus pirinnatifulus, ÿurn., pl. 20, la plus commniine sur nos côtes, et dont le Fucus vosmunilaàe Gmelin n'est pas une varriété comme on l'a cru, cette Plante fêtant une autre Laurencic bien distincte. 3°. Laurencia obtusa, Lamx., IFucusoblusus, parfaitement représentée dans 'fumer, pl. a 1, qui, répandue ssur toutes nos côtes, a été retrouvée iijusqu'à la Nouvelle-Hollande. 4°. Le iFucuscyanospennusAc Delile,daussa rFlore d'Egypte, appartient au genre qqui nous occupe. (b.)

! LAURENTEA. bot. phan. (Ortéïga.) Syn. de Sanvilalia. V. ce mot.

LAURENT! A. bot. phan. La Plant te que Micheli avait décrite et figurée - sous ce nom , a été réunie au genre ILobelia par Lin-né. Adanson , ayant • séparé celui-ci en deux genres , a con-•servé le nom employé par Micheli , "■ pour les espèces dont le fruit est bi- •loculaire. F. Lobélie. (g..n.)

LAU 239

LAUREOLE. Laureola. bot. ph an.

F. Uaphné.

* LAU RE T. mam. Même chose que Caubet. V '. Bourret. (b.)

LAURIER. Laurus. bot. piian.

Très-grand genre , type de la famille des Lam inées , appartenant à l'Ennéandrie Monogycie, L., et dont les espèces nombreuses font l'ornement et souvent la richesse des pays qu'elles habitent. Ces espèces, qui sont des Arbres ou des Arbrisseaux généralement ornés dans toutes les saisons d'un épais et vert feuillage , croissent principalement dans l'archipel Indien , le continent et les îles de l'Amérique équatoriale et les diverses confiées de l'Asie. Il est peu de genres qui offrent autant d'intérêt / que celui des Lauriers, soit à cause de la beauté des espèces qui le composent et dont plusieurs sont cultivées dans les jardins, soit surtout à cause de l'utilité et de l'importance d'un grand nombre d'entre elles, dans 1 économie domestique , les arts cl la thérapeutique. En effet c'est à ce genreque nous sommes redevables du Camphre, de la Cannelle, du Sassafras, des baies de Pichurim , du fruit de l'Avocatier et d'une foule d'autres produits

non moins intéressants. Nous croyons devoir entrer dans des détails assez étendus sur ce genre et en décrire quelques espèces remarquables.

Étudions d'abord les caractères génériques des Lauriers. Leurs fleurs sont hermaphrodites ou incomplètement unisexuées, c'est-à-dire que l'on retrouve toujours les rudimens du sexe qui avorte. Le calice est monosépale, subcampaniforme ou étalé, à quatre ou cinq divisions profondes, généralement concaves. Les étamines sont au nombre de neuf, quelquefois de six seulement ou de douze, insérées à la base des divisions calicinales. Les filets sont libres, planes, offrant à leur base un ou deux appendices irréguliers, d'apparence glandulaire et le plus souvent stipités. Les anthères sont adnées, à deux loges introrsées, s'ouvrant chacune par un

à 40 LAU

ou deux petits panneaux qui se roulent de la partie inférieure vers la supérieure. L'ovaire est libre, ovoïde ou allongé; à une seule loge contenant un ovule pendant. Le style est un peu oblique et recourbé, marqué d'un sillon longitudinal et glanduleux qui vient aboutir à un stigmate latéral, évasé et un peu concave. Le fruit est une drupe sèche ou charnue, souvent accompagnée du calice qui forme à sa base une sorte de cupule. La graine est renversée. Son tégument est mince, son embryon est sans eudosperme, ayant ses deux cotylédons extrêmement épais; sa radicule conique et très-courte, quelquefois recouverte et cachée par deux prolongement de la base des cotylédons, comme on l'observe par exemple dans le Laurier ordinaire.

Les Lauriers , ainsi que nous l'avons dit précédemment , sont ou de grands Arbres ou des Arbrisseaux d'un pori élégant. Leurs feuilles alternes et généralement persistantes sont lisses, et répandent , lorsqu'on les froisse entre les doigts , une odeur très-aromatique. Leurs fleurs sont, en général, verdâtres, petites et de peu d'apparence, tantôt placées à l'aisselle des feuilles, tantôt diversement réunies à l'extrémité des rameaux.

Ce genre est très-polymorphe. On doit lui réunir les genres *Ocolea* , *Aaiba* et *Aiovea* d'Aublet qui sont de véritables espèces de Laurier, ainsi que le genre *Persea* de Plumier comme Linné l'avait déjà fait précédemment. En effet, le caractère principal qui a servi à distinguer les genres *Ocotea* et *Fersca* conservés par plusieurs botanistes modernes, consistait surtout dans l'anthère, que l'on dit être à quatre loges. Mais dans ces deux genres, l'anthère n'est réellement qu'à deux loges, qui s'ouvrant chacune au moyen de deux panneaux superposés ont fait croire à un grand nombre d'observateurs que l'anthère était à quatre loges. Plus récemment le célèbre R. Brown a proposé { l'endrom. Flor. Aoe. - HOLL. , 1) de

LAU

faire un genre particulier du *Laurus* \ *Cinnamomum*, qui fournit la Can- J nelle, sans indiquer toutefois les caractères de ce genre.

Les nombreuses espèces de ce genre , dont nous mentionnerons les plus intéressantes , peuvent être réparties en deux sections , suivant que leurs feuilles sont persistantes ou caduques.

§ I. Feuilles persistantes.

Laurier d'Apollon, *Laurus nobilis*, L., Lamk., 111. , t. 321, f. 1. Cel-I te espèce, la seule qui soit indigène de l'Europe, est un Arbre élégant, toujours vert, acquérant de vingt-cinq à trente pieds de hauteur et même plus dans les contrées méridionales. Ses feuilles sont alternes, elliptiques , lancéolées , aiguës , courtement pétiolées, sinueuses sur les bords, fermes, luisantes, glabres, d'un vert assez vif en dessus , plus ternes à la face inférieure. Les fleurs sont unisexuées et dioïques. Les mâles sont axillaires , disposées par petits faisceaux de deux à quatre , portées sur un pédoncule commun court.

Chaque faisceau offre un involucre composé de quatre bractées squamiformes, concaves, obtuses , brunes et caduques. Le calice est monosépale, à quatre divisions profondes , obtuses , étalées, concaves; douze étamines à peu près de la longueur du calice, disposées sur trois rangées, quatre extérieures opposées aux divisions calicinales, quatre moyennes alternes et enfin quatre plus intérieures. Les fleurs femelles offrent la même disposition que les mâles.

Les fruits sont des drupes ovoïdes , de la grosseur d'une petite Cerise , charnues extérieurement, d'une couleur rouge et presque noire quand ils sont parvenus à leur état parfait de maturité. Le Laurier d'Apollon est surtout très commun en Orient , dans les îles de la Grèce et sur les côtes de Barbarie; des forêts en sont formées aux Canaries. 11 s'est parfaitement naturalisé en Italie et même dans les provinces du midi de la France. Mais

LAD

Là Taris , et à plus forte raison dans le li.uord de la France, il souffre du froid Let ne prend qu'un faible accroisse i;ment. Aussi le place-t-on toujours (Contre des murs bien exposés au midi. Il e=t peu d'Arbres qui ail été auitant célébré par les poètes de l'an-liquilé. Ovide nous peint la nymphe iDaphné changée en Lau-rier pour se .dérober aux transports amoureux tid'Apollon. De-puis ce temps le Laui rier fut consacré au dieu de la poésie cet de la musique. On en ceignait la t tête des .poètes , des triompha-teurs et i des athlètes vainqueurs dans les jeux c olympiques ; et dans le moyen âge, 1 l'usage île ceindre d'une couronne de lLn-mier muni de ses baies la tête des j jeunes docteurs, a fait donner à cett • (.cérémonie le nom' de Baccalauréat (Bacca Lau/i). Le Laurier est utile en nnédecinc. Ses feuilles, froissées enire 1 les doigts , exhalent une odeur agréa- ble , cl lorsqu'on les brûle , elles réf pandent line fumée suave. Maintenant (on ne les em-ploie guère que pour aroimatiser les ragoûts. Quant aux fruits i ou baies de Laurier, leur péricarpe i contient une assez grande quantité I d'Huile volatile très-odorante ; taudis l que leur amande fournit par l'expresfSion une Huile grasse quel'on em-ploie (quelquefois pour pratiquer des embrocations sur diverses parties du i corps. Elle est verddàlre , d'une consistance bulyrcuse,et son odeur offie I faiblement celle des feuilles de Laui rier.

Laiuiuer Cannellier, *Laurus i Cinnamomum* , L. ; Rich.,Bot. Méd., il, p. 181. Le Ironc du Cannellier s s'élève, dans un bon ter-rain , jusqu'à lune hauteur de vingt -cinq à trente | pieds; il a quelquefois dix-huit pou- < ces île diamètre. Son écorec exté-rieure est grisàtic et presque rouge en • dedans. Ses feuilles sont,

opposées, 1 coirtment peliolées , ovales, lau- «céolées, longues de quatre à cinq | pouces , larges d'environ deux pou- ' ces, fermes , coriaces , très-entières , 1 glabres et luisantes! à leur face supé- 1 ricure , cendrées en dessous , mar- 1 quées de trois à cinq nervures longi-

LAU ait

ludinales et parallèles. Les fleurs sont petites , jaunâtres , disposées en une sorte de panicule rameuse et lâche, placée à l'aiselle des feuilles supérieures. Le fruit est une drupe ovoïde, de la grosseur d'une petite noisette, entourée à sa base par le calice persistant, de sorte qu'elle ressemble un peu à un petit gland de Chêne environné de sa cupule. Le Caunellier habite l'île de Ceylan , où on le cultive dans un espace d'environ quatorze lieues, qui s'étend entre Matusa et Negambo et qu'on nomme pour cette raison champ de la Cannelle. Il croit aussi à la Chine pt au Japon. Sa culture s'est également introduite aux îles de France et de Maseareigne, aux Antilles, à Cayenne et dans quelques autres parties du Nouveau-Monde. Le célèbre Poivre assure qu'il existe à la Cochinchine une espèce de Cannelle supérieure même à celle de Ceylan.

Le Cannellier vient d'être introduit en Egypte. Il y a quelques années que Mehemed Ali Pacha , vice-roi iuu pays, fit acheter à Paris , dans le magnifique jardin de Botirsaut, deux très-beaux pieds de Cannellier, qui furent transportés au Caire. Ils s'y sont si bien multipliés, qu'ils y ont formé des plantations considérables, qui bientôt pourront verser leur produit dans le commerce. Le Cannellier ne fournit pas seulement l'écorcc aromatique et excilaule connue sous le nom de Cannelle; ses racines et ses grosses

tiges renferment une trèsgrande quantité de Camphre entièrement semblable à celui qu'on extrait du Laurier Camphrier.

Laurier Camphrier, *Laurus Camphora*, L. ; Eich. , Bol. Méd. , 1 , p. 184. C'est un Arbre assez élevé, ayant à peu près le port d'un Tilleul ; il croît dans les lieux monlueux des régions orientales de l'Inde et particulièrement au Japon et à la Chine.

Ses feuilles sont alternes , pétiolées, ovales , arrondies , acuminées , entières , coriaces , glabres et luisantes en dessus , glauques en dessous. Les fleurs disposées en corymbes longuc-

24a LAU

meut pédoncules, sont d'abord enfermées dans des boutons écailleux, strobilifères , axillaires , ovoïdes, composés d'écaillés sèches, rousses, pubescentes, obtuses, terminées par une petite pointe, et frangées sur les bords. Les fruits ressemblent à ceux du Cannellier , mais ils sont un peu plus petits. Le Camphre , qui est une Huile volatile concisée d'une nature particulière , existe en abondance dans toutes les parties de cet Arbre. Au moment où l'on vient de l'en extraire par la distillation , il est impur, en grains irréguliers, d'une couleur grise et assez semblable au sel marin. C'est dans cet état qu'on le transporte en Europe pour y être purifié. Long-temps la Hollande fut en possession exclusive de raffiner le Camphre ; mais aujourd'hui cette opération se fait également en France, Le procédé consiste à mêler le Camphre avec de la Chaux et à le faire sublimer dans un appareil convenable. Dans son état de pureté , le Camphre est une substance concrète, blanche, hyaline, légère, grasse au toucher , cristallisable en prismes hexaèdres, d'une odeur très-pénétrante et singulière. Semblable aux Huiles volatiles dans sa composition , il

jouit aussi des mêmes propriétés chimiques. Ainsi il se volatilise à l'air et finit par disparaître sans laisser aucun résidu. Soumis à l'action du » feu , il se fond , puis se change en une vapeur dont la tension et la densité sont peu considérables; il se dissout facilement dans l'Alcool , les Huiles et les Gaz acides. L'Eau le précipite de sa solution alcoolique , mais en relie elle-même une petite portion en suspension. Par l'action de l'Acide nitrique , le Camphre se transforme en un Acide particulier que Bouillon-Lagrange a nommé Acide camphorique. Le Camphre entre souvent dans les préparations officinales dont l'Eau est le véhicule; mais comme il n'y est que très-peu soluble, on l'y rend miscible par l'intermède d'un jaune d'œuf ou d'un mucilage. Le Camphre est un médicament très-précieux.

LAU

moment précieux et très-énergique. Il est à la fois excitant et sédatif. On l'emploie surtout dans les affections spasmodiques et nerveuses , dans les fièvres putrides, etc. Il s'administre tantôt en poudre , tantôt en suspension dans un liquide quelconque. Sa dose varie suivant l'âge du malade et les effets qu'on se propose de produire.

Laurier rouge , *Laurus borbonica*, L. Cette espèce est originaire de l'Amérique septentrionale , où elle ne forme qu'un Arbre de petite taille, dont les feuilles sont alternes, elliptiques, lancéolées, aiguës, vertes et glabres supérieurement, d'une teinte glauque à leur face inférieure. Les fleurs sont petites, formant des grappes ou panicules axillaires , dont les pédoncules sont rouges. Les drupes sont d'une teinte bleuâtre, enveloppées en partie par le calice qui est rouge, épais et cupuliforme. On cultive quelquefois cette espèce dans les jardins. Elle demande à être rentrée

dans l'orangerie pendant l'hiver. Son bois est dur et susceptible d'un beau poli ; on l'emploie à la fabrication des meubles.

Laurier Avocatier, *Laurus Persea*, L.; *Persea gralissima* , Gaertner fils, de Fruct. 3, p. 222. Cette espèce est connue sous le nom vulgaire d'Avocatier ou de Poirier Avocat.

Elle est originaire du continent de l'Amérique méridionale, et elle a été transportée successivement aux Antilles, à l'Ile-de-France , etc. C'est un Arbre qui peut atteindre une élévation considérable et dont les branches et les rameaux forment une vasle cime. Ses feuilles sont alternes , pétiolées, rapprochées les unes des autres à la partie supérieure des jeunes rameaux , ovales, acuminées, un peu sinueuses , vertes et lisses en dessus, glauques et blanchâtres en dessous, longues de quatre à six pouces et larges de deux à trois. L,*s fleurs sont petites, verdâtres, formant à l'aisselle des feuilles, des grappes plus courtes que les feuilles. Ces Heurs sont hermaphrodites. Il leur succède des fruits charnus longuement pc-

LAU

i donculés , ayant la forme et la gros- : seur d'une poire de 'beurré , mais I plus allongés. Leur noyau est ovoïde i et très-gros. Ces fruillssont Irès reeher-

- chés. Leur écorcc est assez épaisse , 1 leur chair fondante, absolument : semblable au beurre pour la consisi lance, d'une saveur toute particulière, i qui, dit-on., approche à La fois de celle

- de l'arlichaut et de la noisette. On : sert en général ces fruits en même

temps que le bouilli ; on les coupe ; par tranches ou quartiers. Quelque- I fois on les assaisonne avec du jus de c citron , des épices ou des aromates , i d'autres fois avec du sucre.

A celte première section appartiens ineut encore plusieurs autres espèces i non moins iniéi essanles , mais que i nous nous contenterons seulement i d'indiquer. Telles sont les suivanles : Laurier Casse, Laurus C'assia, IL., qui croît aux Indes-Orientales , et •.que pendant long-temps on n'a con- S sidéré que comme une simple variété (du Cannellier. Son écorce est coninue eu Europe, sous les noms de (Cassia lignea, do Xylocassia ou de l Cannelle: du Malabar. Elle est moins laronialique , moins agréable et moins ceslimée que la Cinnelle de Ceylan.

PNéanmoins elle fait partie de plusieurs prépara! ions pharmaceutiques I très- compliquées.

La.uju.er a LONGUES FEUILLES OU VM a l a. b vtii n u .M , Laurus Malaba- Uthmin, Lamk. Egalemeut originaire >'de l'Inde, ce Laurier avait aussi élé 'Confondu avec le vrai Cannellier; mais lil en dillère surtout par ses feuilles ^extrêmement longues et plus étroites qqe celles du Cannellier. Ce sont .ces feuilles que l'on trouve mentionunées dans les anciennes pharmaco- 1 i pées sous les noms de Malabathrum 1 et de folium Indicum. Elles sont aroi rma tiques et excitantes, 'i Laurier CuljlawaN , Laurus Culi- lauan, L. 11 croît aux Moluqu.es, à "IVAmboinc et dans quelques autres f L parties de l'Inde, bon écorce dési- "Uguée par Rum- phius sous le nom de •; ' Cortex caryopky Hoiries , est connue |£ dans le commerce sous celui de Cau-

nelle Giroflée. Elle est moins estimée que la Cannelle de Ceylan.

Laurier Pichurim , *Laurus Piëhurim* , Rich. Pendant fort longtemps on n'a su à quel Arbre rapporter les fruits connus dans le commerce, sous les noms de Muscades de Paia ou Fèves Pichurim. Mais nous nous sommes assurés que ces fruits sont ceux de cette espèce de Laurier, qui croît dans l'Amérique méridionale.

§ IL Feuilles caduques.

Laurier Sassafras, *Laurus Sassafras*, L.; Rich., Bot. Méd., j, p. 182. Arbre de trente à quarante pieds de hauteur, oïginaire des forêts de l'Améri que septentrionale , niais qu'on cultive très-bien en pleine terre sous le climat de Paris , ou il acquiert une hauteur presque aussi considérable. Son poi t est à peu près celui d'un Eiable. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, grandes , pubescenies , d'une figure tics-variée, tan~ tôl ovales , presque obtuses , atténuées vers la .base et cnières , tau tôt à deux ou trois lobes, et coidifornies. Elles sont vertes supérieuement et blanchâtres à leur face inférieure. Les Heurs sont dioïques, jaunâtres , formant de petites p.micules qui parlent du centre d'un bourgeon renfermant aussi les feuilles. Le fruit est une petite drupe ovoïde , de la grosseur d'un pois et de couleur violette , entourée à sa base par le calice qui est persistant. C'est principalement la racine de cet Arbre, et surtout son écorce, que l'on emploie en médecine sous le nom de Sassafras. Le commerce nous l'apporte et) morceaux de la grosseur du bi as, brunâtres et comme ferrugineux à l'extérieur , d'une Saveur et d'une odeur aromatiques , plus développées dans l'écorce que d ms le bois. On fait aussi usage de l'eeorcedes jeunes branches. Le Sassafras est un médicament sudorifique , que l'on emploie dans la goutte, la syphilis , le rhumatisme

et les maladies chroniques de la peau. On l'administre ordinairement en infusion,

a44 LAU

sion , en le mêlant aux autres médicaments sudorifiques.

Le Laurier eau Benjoin , *Laurus Benzoin* , L. Il est originaire de l'Amérique septentrionale. Pendant long-temps on a cru qu'il fournissait le Benjoin , que l'on sait aujourd'hui provenir du *Styrax Benzoin*. (a. r.)

On a élu le nom de Laurier à divers Végétaux dont les feuilles présentent par leur consistance ou leur forme quelques rapports avec celles des Arbres dont il vient d'être question , ainsi l'on a appelé :

Laurier Alexandrin , chez les anciens , le *Ruscus Hypoglossum*. V.

Fragon.

Laurier Amandier , le *Prunus Lauro-cerasus* , L., parce qu'on emploie ses feuilles pour donner par infusion au lait un goût d'amande amère.

Laurier aromatique , le *Besill* du genre *Cösalpinia*.

Laurier Cerise, \e *Prunus Laurocerasus*. F". Cerisier.

Laurier épineux, une variété du Houx , *Ilex*.

Laurier Epurge, le *Dapkné Laurcola*.

Laurier grec , le *Melia Jzedarach*.

Laurier impérial ou au lait , la même chose que le Laurier Cerise.

Laurier des Iroquois , le *Laurus Sassafras*.

Laurier a languette , la même chose que le Laurier Alexandrin.

Laurier d'Espagne , le *Prunus Liauro-cerasus* , d'autant plus improprement que cet Arbre originaire des bords de la mer Noire, très-cultivé dans le midi de la France , est absolument étranger à la péninsule Ibérique. Nous n'en avons rencontré que quelques pieds cultivés au jardin de botanique de Madrid , et à Saiul-Hidéfouse , où ils passaient pour avoir été introduits au temps de Philippe V. ,

Laurier de mer , un *Phyllanthus* aux Antilles.

LAU

Laurier nain , le *Vaccinium uliginosum* en Sibérie.

Laurier de Portugal , le *Prunus Lusitanien*, espèce du genre Cerisier.

Laurier rose, *Nerium Oleander* et jusqu'à *Epilobium spicatum*, L.

Laurier rose des Alpes, le *Pinus cembra*.

Laurier rouge ou odorant , 1 *Plumieria rubra*. V. Franchipannier.

Laurier de Saint-Antoine, l'*Epilobium spicatum*. V. Epiloué.

Laurier sauvage , le *Myrica cerifera* , au Canada.

Laurier Tin , le Viburnum Tinus.

Laurier de Trérisonde , le Prit nus Lauro-cerasus , L.

Laurier tulipier ou tulipifère RE , les Magnoliers. (b.)

LAURIERS (famille des; . Lauri

JJOT. PHAN. V. Laurinées.

LAURIFOLIA. bot. piian. C nom irrégulier avait été donné par les anciens botanistes à divers Arbres exotiques, particulièrement au 11 in terania aromatica , au Syderoxyly mite, au Garcinia Mangostana , etc

LAURINE. bot. piian. Variété d'Olive. (R.

LAURINÉES. Laurineæ. bot piian. Famille naturelle de Plante Dicotylédones Apétales , à étamine périgynes , qui a emprunté son nom et ses principaux caractères du genre Laurier. Les Plantes qui forment cette famille sont toutes des Arbres des Arbrisseaux à feuilles alternes très-rarement opposées, entières lobées , persistantes ou caduques, seul genre Cassytophia s'éloigne des autres genres de cette famille par tige herbacée, rampante et dépouillée de feuilles. Les fleurs sont généralement petites , verdâtres et de peu d'apparence, hermaphrodites ou unisexuées , disposées en panicules ou ombelles simples. Leur calice monosépale , offrant de quatre à divisions, quelquefois à peine mar-

LAU

tuées et imbriquées avant leur épanouissement. Les étamines généralement au nombre de douze sont périgynes et disposées sur deux rangs; quelques-unes de ces étamines avor-

Itent ou sont stériles; leurs filets of- I lient ordinairement à leur base une < ou deux grosses glandes globuleuses i et pé'lonculées. Les anthères sont adi nées à la partie supérieure des filets; i elles sont à deux loges s'ouvrant i chacune par un ou deux panneaux i ou valves, qui s'enlèvent de la base

- vers le sommet. L'ovaire est libre , : globuleux ou ovoïde , à une seule lo- ; ge, contenant un ovule pendant du : sommet de la loge; le siyle est sim-] pie, terminé par un stigmate simple , ■ dilaté et souvent membraneux. Le

fruit est une sorte de baie sèche ou

- de drupe , contenant une graine dépourvue d'endosperme , dont les deux cotylédons sont excessivement épais et charnus. La racine est tournée vers le liile. Les genres qui appartiennent à cette famille sont les suivaus : i° Laurus , L., auquel on doit réunir, comme nous l'avons dit à l'article Laurier , les genres Ocotea, jiniba, jfjovea d'Aublet, et Persea de Plumier; 2° Agatophylluni; ?i° Eurjandra, R. Brown ; 4° Cryptocary a , Br.j 5" Litsoea de Jussieu , qui comprend le Tetranthera de Jacquin , l'Hcxanthus deLoureiro, et le Tomex deihuuberg; 6° le Plerygiurn de Correa auquel ou doit réunir le S/iurea de Roxburgh, le Dryobalanops et le Dipterocarpus deGacrtucr fils ; 7o le Cassylha , malgré son port qui est celui d'une Cuscuta. On rapproche encore de cette famille le Gomortega de Ruiz et Pavon, malgré son fruit qui est une noix à trois loges monospermes, et le Gyrocarpus de Jacquin. Quant aux géni es My/istica et Virola, d'abord placés dans celte famille, ils en ont été retirés pour former un ordre naturel particulier sous le nom de Myristicées. V. ce mot. (a.u.)

LADRIOIj. ois. Syn. ancien du Loriot d'Europe. (dr..z.)

LAUROPHYLLUS. *Laurophyllus*.

LAU 245

BOT. PnAN. Tbunberg (Prodr., p. 1, Si, et F/or. Capens., \>. 557) a constitué sous ce nom un genre placé dans la Tétrandrie Monogynie, L., quoique la Plante soit polygame ou dioïque. Il lui a donné les caractères suivans : calice tétraphylle; corolle nulle ; ovaire supère ; style unique. Fleurs mâles sur des individus différens. De tels caractères sont trop incomplets pour qu'on puisse avoir quelque idée précise sur ses affinités. L'espèce unique dont il se compose (*Laurophyllus Capensis*), est un Arbre élevé, qui croît dans le pays des llottentols, non loin du cap de lionne-Espérance. Ses feuilles sont alternes, éparses, dentées en scie, oblongues, un peu aiguës et pétiolées.

Les fleurs sont petites et disposées en panicules. (o..N.)

LATJROSE. bot. piian. Nom substitué par quelques botanistes à celui de Nérion, plus généralement adopté.

V. NÉRON. (b)

LAURUS. BOT. PHAN. V. LAURIER.

* LAURUS. bot. piian. Une espèce ou variété de *Cocos* dans Rumph.

* LAURUS. mam. r. Guenon Maure au mot Guenon.

LAURUS ou LAURUS.

géol. V. Avalanches.

LAUXANIE. Lauxania. INS. Genre de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères, tribu des Muscides , établi par Latreille et Fabricius, et ayant pour caractères : antennes plus longues que la tête, avec le dernier article plus allongé que les précédens et linéaire; cuillerons petits ; balanciers nuls ; ailes couebées sur le corps qui est peu allongé et arqué. Les Lauxanies diffèrent des Sépédons et des Loxocères , par des caractères tirés de la forme des antennes et de celle du corps : ils s'éloignent des Tétanocères par des caractères de la même valeur. Le corps de ces Diptères est court , arqué en dessus, avec la tête comprimée transversalement ;

2*6 LAV

leur abdomen est triangulaire el aplati ; le premier article de leurs antennes est plus long que le suivant ; elles ne sont point insérées sur la partie la plus élevée de [a tête; les ailes sont plus longues que le corps et courbées postérieurement. Ces Insectes habitent les bois; leui s larves elleurs habitudes nous sont inconnues. Fabricius en a décrit trois espèces , dont deux babitent l'Amérique méridionale, et la troisième les environs de Paris et l'Allemagne ; cette dernière est :

Le Lauxanie kufitarse , *L. rufitarsis*, Latr.,i. cy lindricornis , Fabr., Cocqueb. {Illustr. Icon. Ins., déc. 3 , tab, 24, fig. 4); il est long d'environ deux lignes, noir luisant, poilu, avec les ailes et les tarses d'un roux jaunâtre. (g.)

LAVANDE. *Lavandula*. bot.

riiAN. Genre de la famille des Labiées et de la Didynamie Gy-
muospei mie , L. , qui se compose d'un grand nombre d'espèces
très-odorantes , généralement sous- frutescentes , portant des
feuilles entières ou plus ou moins profondément découpées , et
des fleurs violacées , disposées en épis cylindriques et pédon-
cules. Ces fleurs offrent un calice tubuleux , strié, denté au som-
met, accompagné d'une petite bractée arrondie ; la corolle est à
deux lèvres, la supérieure émarginée, l'inférieure à trois lobes ob-
tus; les étamines sont courtes et renfermées dans l'intérieur de la
corolle. Plusieurs espèces de Lavandes croissent en France ou
sont cultivées dans les jardins. Telles sont les suivantes :

Lavande officinale , *Lavandula vera* , D. C. , Fl, Fr. , Suppl.,
398. C'est un petit Arbuste d'un à deux pieds d'élévation, ayant sa
tige frutescente à sa base et ses rameaux herbacés , grêles , pu-
bescens et blanchâtres , portant inférieurement des feuilles oppo-
sées , sessiles , lancéolées , étroites , aiguës , pubescentes ; termi-
nés supérieurement par un pédoncule nu , dont la partie supé-
rieure est garnie de verticilles très-rap-

LAV

proches de petites (leurs violettes formant un épi cylindrique.
Chaque verticille est accompagné de deux bractées obovales-ob-
tuses , longuement mucronées. La Lavande est originaire des
provinces méridionales de la France: elle est surtout très-com-
mune en Espagne, où elle couvre de vastes espaces de terrains
arides. On la cultive dans les jardins. Cette Plante a une odeur
forte et camphrée ; c'est avec elle qu'on prépare l'eau spiritueuse
de Lavande , principalement employée dans la toilette.

Lavande Spic, *Lavandula Spica*, D. C., loc. cit. Cette espèce ainsi que la précédente, bien distinguée par les botanistes anciens, avait été confondue par les modernes. Mais De Candolle a de nouveau prouvé qu'elles devaient être séparées. Elles ont l'une et l'autre le même port, mais la Lavande Spic se distingue de la précédente par ses feuilles élargies au sommet et comme spathulées, par ses calices non cotonneux et par la forme de ses bractées. On la cultive également dans les jardins. Les parfumeurs de la Provence en retirent une huile volatile très-odorante, connue sous le nom vulgaire d'huile d'Aspic; elle est encore fort commune en Espagne.

Lavande Stéicias, *Lavandula Stœchas*, L. Cette espèce croît dans les contrées méridionales de la France, dans les endroits pierreux et incultes; l'Espagne et les Canaries en sont couvertes. Elle y forme un Arbuste de deux à trois pieds de hauteur. Ses feuilles sont persistantes, linéaires, étroites. Ses Heurs forment un épi ovoïde, dont les bractées, surtout celles du sommet, sont beaucoup plus grandes que les fleurs et colorées en violet.

On cultive encore dans les jardins les *Lavandula pinnatifida* et *L. multifida*, dont les feuilles sont profondément découpées et multifides. (a. «.)

LAVANDIÈRE, ois. Syn. de • Bergeronnette grise dans son plu-

LAV

Minage d'été. V". Bergeronnette.

(DR..Z

LAVANDIÈRE, pois. Syn. de Gallionyme Lyre. V. Callionyme.
(b.)

LAVANDOU. bot. ru an. (Liusccot.) Nom de pays du petit Ga-
langa cdes boutiques. (b.)

LAVAJN'DULA. bot. puan. V. La-

1VANDE.

LAVANÈSE. bot. phan. V. Ga-

II.ÉGA.

LAVARET. pois. V. Saumon, : sous-genre Ombre.

LAVATÈRE. Lavatera. bot.

ipiiian. Genre de la famille des Mali vacées , et de la Monadel-
phie Polvan- < drie , établi par Linné , et ainsi cai ractérisé : ca-
lice intérieur divisé en i cinq folioles soudées par la base ; ca- 1
lice extérieur ou involucre composé ■ de trois ou six folioles sou-
dées jus-

- qu'à leur milieu , ou , si l'on veut , : involucre monophylle, à
trois ou six

- découpures peu profondes; corolle à •cinq pétales, cordi-
formes , planes,

ouverts , plus grands que le calice et adhérens entre eux par la
base ainsi qu'au tube siaminal; étamines nombreuses , à filets
monade! plies inférieurement ; fruit multiple , composé de dix à
vingt carpelles capsulaires , monospermes , disposés circulairc-
ment autour d'un axe plus ou moins développé. Les Lavatères
sont des Arbrisseaux ou des Herbes Irès-élevées , garnis de poils

étoilés trèsnombreux, et à fleurs axillaires blanches ou rougeâtres. Dans son *Prorfromus Syst. Fegetab. T. i* , p. 458 , le professeur De Candolle en a fait connaître vingt-six espèces qu'il a disposées en quatre sections de la manière suivante :

§ I. *Stegia*. Cette première section était considérée dans la Flore Française, comme un genre distinct.

Le réceptacle ou l'axe du fruit se développe en un disque qui recouvre les ovaires. Des deux espèces qui la constituent, l'une d'elles [*Lavatera trimestris*, L. , *Stegia Lavatera*, D. C. , Fl. Fr.) est une Plante très-élégante,

LAV a4 7

haute de trois décimètres , à feuilles alternes, pétiolées, presque arrondies , cordiformes , les supérieures très-anguleuses. Ses fleurs sont fort grandes , d'un rouge vif, quelquefois de couleur de chair , avec des raies pourprées. Elle croît dans les lieux chauds du bassin de la Méditerranée, la Syrie , l'Espagne , quelques localités du midi de la France , etc.

§ II. *Olbia*. Cette section a été élevée au rang de genre par Médikus et Moench. Le réceptacle du fruit, central, conique et saillant, la caractérise facilement. Elle se compose de quatorze espèces appartenant pour la plupart à la région méditerranéenne. Plusieurs croissent aux Canaries , et une seule [*L. Julii*] a été trouvée par Burchell au cap de Bonne-Espérance. Parmi les belles Plantes que renferme cette section, nous citerons :

i° le *Lavatera Olbia* , L., Arbrisseau d'un aspect charmant lorsqu'il est en fleur et qui , sous ce rapport, convient à la décoration des jardins où il peut passer toute l'année en pleine terre. Ses

tiges sont hautes de plus d'un mètre , et se divisent en rameaux longs, effilés, et garnis de feuilles alternes pétiolées, assez grandes , molles, blanchâtres et un peu cotonneuses; les inférieures à cinq, les supérieures à trois lobes dont celui du milieu est fort grand et pointu. Les fleurs sont purpurines ou violettes, presque sessiles , et solitaires dans les aisselles supérieures des feuilles. Cette Plante croît dans le midi de l'Europe. 2°. Le *Lavatera Tluringiaca* , L. ; sa tige est herbacée, droite, cotonneuse, haute de six à sept décimètres. Ses feuilles sont pétiolées , légèrement cotonneuses , les inférieures à cinq lobes , les supérieures à trois, dont celui du milieu est le plus long. Ses fleurs sont portées sur des pédoncules solitaires, deux fois plus longs que le pétiole.

Cette espèce est indigène de l'Europe méridionale. On la trouve également recueillie aux environs d'Odessa. \jc *Lavatera acerifolia* est encore une très-jolie espèce de cette

248 LAV

section ; elle croît naturellement à Ténériffe , et on la cultive avec assez de facilité dans les jardins de botanique.

§ III. *Axolopia*. Le réceptacle se termine en autant de crêtes membraneuses qu'il y a de carpelles au fruit. Cette section ne renferme que trois espèces dont la plus remarquable est le *Lavatera maritima* , figuré par Cavanilles {Dissert. 2, t. 3a, f. 5). Cette Plante croît sur les rochers de la France méridionale et de l'Espagne.

§ IV. *Anthema*. Sous ce nom, Médikus a encore fait un genre distinct, mais ce n'est qu'une simple section caractérisée par son réceptacle petit, fovéolé , non saillant, ni développé en forme de crêtes.

Cinq espèces , essentiellement méditerranéennes , c'est-à-dire , indigènes des îles ou du littoral de la Méditerranée , constituent cette section. On distingue , parmi ces Plantes , la *Lavatera arbo-rea*. Cette espèce a une tige arborescente , des feuilles anguleuses, plées, un peu cotonneuses , des Heurs portées sur des

Ïédicelles axillaires plus courts que e pétiole. Elle sort des li-
mites géographiques que nous avons assignées aux Plantes de
cette section, car on prétend qu'elle se trouve aussi en Angleterre
et aux Canaries.

Deux espèces (*Lavatera lanceolata*, Willd., et *Lav. tripartita*,
D. C.) ne sont pas assez bien connues pour être exactement clas-
sées. (g..N.)

LAVÉNIE. *Lavenia*. bot. puan.

Espèce linnéenne de f^erbesina devenue type du genre Aêe-
nostemma de Forster, pour lequel Swarlz a voulu rétablir l'ancien
nom de *Lavenia*. V.

Adénostème. (e.)

LAYER, bot. riiAN. (*Lonicer.*) Syn. d'<E/ia/it/ie *fislulosa*.
(*Dodoëns.*) Syn. de *Cresson* et de *Sium Latifolium*,ij. (b.)

LAVES, tvitn. Ce nom, tiré du mot allemand *laufeit* (couler),
s'applique en général à toutes les substances minérales en masse
qui onléprouvé l'action des feux volcaniques, et

LAV

sont sorties de la terre en se répandant à sa surface sous la
forme de çourans embrasés. Il désigne, non une roche particu-

lière, mais un ensemble de roches provenant d'un même mode de formation et ayant entre elles des rapports remarquables décomposition et de structure. Nous ne les considérerons ici que sous le point de vue minéralogique, c'est-à-dire relativement aux caractères spécifiques qu'elles empruntent, soit de la contexture, soit de la nature de leurs parties composantes, et nous renvoyons à l'article Volcans pour tout ce qui tient à leur histoire géologique, aux causes des éruptions, à la vitesse et à la grandeur des courants, à la fluidité et à la chaleur des Laves, enfin à l'origine encore problématique des matières altérables par le feu qu'elles renferment accidentellement.

D'après un beau travail de Cordier sur la nature des substances volcaniques, les Laves sont composées que d'un très-petit nombre de substances minérales, formant un tissu de grains ou cristaux microscopiques que caractérise la présence constante du Fer titané. Les autres principes essentiels sont le Feldspath et le Pyroxène. L'Amphibole y est très-rare.

Quelques Minéraux s'y montrent accidentellement, en cristaux isolés et fort nets; tels sont l'Amphibole, l'Ôlivine, le Mica, etc. Les diverses sortes de contexture des Laves rappellent presque toutes leur formation par voie de fusion ignée; les principales sont les contextures cellulaire, vitreuse, porphyroïde, amygdalaire et variolée. Suivant Cordier, les substances volcaniques peuvent se rapporter à huit types généraux de composition, dont chacun fournit deux espèces dans lesquelles le Feldspath et le Pyroxène prédominent chacun à leur tour. De-là deux grandes divisions dans le tableau méthodique de ces substances: les Laves feldspathiques et les Laves pyroxéniques. Chacune de ces divisions se partage en deux groupes, composés-

LAV

l'un des roches non altérées, l'autre id. celles qui ont subi une décomposition ou altération quelconque.

1er type. Laves composées exclusivement de cristaux microscopiques, entrelacés, d'un égal volume, réunis -par juxtaposition et offrant des variétés plus ou moins rares.

Lave feldspath. Leucostine.

L. pyrox. Pouzzolite. (o. dkl)

LAV a49

LAVETTE ou LAYETTE, ois.

Syn. vulgaire d'Alouette commune dans quelques cantons méridionaux de la France. (b.)

LAVIGNON. Lauignonus. conch.

Cuvier a proposé sous cette dénomination un sous-genre de Mactres qui réunit plusieurs des Lutraires de Lamarck. V. Lutraire. Férussac, dans ses Tableaux Systématiques, a élevé ce sous-genre au titre de genre dans la famille des Mactracées. Nous pensons que si on conserve cette coupe, elle doit être considérée comme sous-genre des Myes de Lamarck. V.

ce mot.

Ce nom de Lavignon est emprunté des pêcheurs de nos côtes qui le donnent vulgairement aux mêmes coquillages que l'on

trouve enfoncés dans le sable. (D..n.)

LAVISANUS. bot. Pour Levisanus. P' . ce mot. (b.)

LAVOIR DE VÉNUS, bot. piian.

Syn. de Cardère. V. ce mot et Abreuvoir. (b.)

* LAV RADIE. Lavradia. bot.

phan. Ce genre, de la famille des Violacées , et delà Penlandrie Monogynie,L.,fut établi par Vellozo dans l'ouvrage que Vandelli , professeur à Coimbre , publia sous le titre de Floræ Lusitanicæ et Brasil. Spécimen, et dont Roemer fit imprimer une édition à Nuremberg. Les caractères tracés par ces auteurs étaient tellement énigmatiques que la plupart des botanistes ont méconnu les affinités de ce genre. Plusieurs en ont même altéré la dénomination en écrivant tantôt Lauradia , tantôt Leuraiiia. Cependant Rob. Brown (Botany of Congo, p. 22) indiqua la place de ce genre dans les Violacées , en proposant avec doute de le réunir au Conolioria d'Aublet. Tel était l'état des connaissances que l'on possédait sur le Lavradia lorsque notre savant compatriote Auguste Saint-Hilaire rapporta du Brésil la Plante de Vellozo et quatre autres espèces nouvelles. Du des premiers travaux qui

s50 LA.V

signalèrent, son retour fut le Mémoire très-étendu , intitulé : Monographie des genres Sauvagesia et Lavradia (Mém. du Mus. T. xi) , dans lequel il fit connaître aussi complètement que possible le genre en question. Voici la manière dont il l'a caractérisé : calice à cinq divisions profondes, étahies, persistantes et fermées dans le finit; cinq pétales extérieurs, hypogynes , égaux, trèsouverts, ovés ou ovales-lancéolés, caducs; point de filets hypogynes;

corolle intérieure monopétale, ovée, conique, dentée au sommet, persistante , insérée sur un très-court gynophore,- cinq élamines ayant la même insertion , opposées aux divisions calicinnles , alternes avec les pétales extérieurs , ayant leurs filets très-courts, adhérens à la base de la corolle intérieure, les anthères fixées par la base, elliptiques , biloculaires, et s'ouvrant latéralement par une suture longitudinale; style terminal, dressé, terminé par un très-petit stigmat; ovaire supère , uniloculaire dans la partie supérieure , triloculaire inférieurement; capsule enveloppée par les divisions du calice de la corolle intérieure et par les étamines, ovée, aiguë, à trois valves , uniloculaire et vide dans la

Fartie supérieure , triloculaire par introflexion des valves, et polysperme; graines disposées sur deux rangs, très-petites, pourvues d'un tégument crustacé, d'un périsperme charnu, d'un embryon droit, axile, dont la radicule est plus grande que les cotylédons et regarde l'ombilic.

Le genre *Lavradia* diffère du *Sauvagesia* parla forme conique de ses corolles extérieure et intérieure dont les pétales sont lancéolés au lieu d'être obovés ; par l'absence de filets placés au-dessus des pétales dans le *Sauvagesia* ; par ses anthères elliptiques , quelquefois membraneuses, taudis que celles de l'autre genre sont étroites et linéaires; enfin, par la singulière organisation du fruit.

Les *Lavradies* sont des sous-Arbrisseaux très-glabres. Leurs feuilles

LAX

sont simples, très-courles,pétiolées, munies de stipules géminées, ciliées et persistantes. Les (leurs sont blanches ou roses ,

axillaires ou terminales , disposées en grappes ou rare- I meut en panicules, et toujours ac- I accompagnées de bractées.

Aug. Saint-Hilaire a nommé *Lavradia Kellozii* l'espèce qui peut être considérée comme type du genre.

Les quatre espèces nouvelles ont reçu les noms de *Lavradiaericoides* {loc.

cit. , tab. 2 , b) ; *Lai>. elegantissima* (loc. cit. , tab. 3). C'est la Plante que, dans l'aperçu de son voyage au Brésil , l'auteur avait nommée *Sauvagesia elegantissima* ; *L. glandulosa* (tab. 4,fig. a); et *i«. capillaris* (tab.

Ces Plantes sont indigènes de l'empire Brésilien. Le *L. glandulosa* est limité aux pâturages marécageux et assez élevés des provinces de Saint- Paul et des Mines. Les *L. Vellozii* et *capil taris* ne se trouvent que dans la chaîne de montagnes noriimée Serra do Espinhaço par D'Eschwege.

LAW SONIA. BOT. FHAN. V

Henné.

LAXMANNIE. *Laxmannia*. bot.

phan. Plusieurs genres ont été désignés sous ce nom par les botanistes.

Forster le donna primitivement à un genre de Composées qui fut réuni au *Bidens* et au *Spitanthus* par Roxburgh. Rob. Brown [Prodr. Flor.

Nop.-Holland. , p. 285) , admettant cette réunion , nomma Laxmannia un genre de la famille des Asphodélées et de l'Hexandrie Monogynie , L. Ayant reconnu plus tard que le genre de Forster méritait d'être conservé, au lieu de le rétablir sous son ancien nom , il préféra lui imposer celui de Pelrobium. D'autres Laxmannia ont encore été proposés. Celui de S.- G. Gmelin était fondé sur le Crucianetla stylosa. Fischer a voulu aussi séparer sous ce nom générique le Geum potentilloides dont Seringe {in De Cand. Prodrom. Syst.

Veget. T. il) a fait le type de la section qu'il a nommée Stictogeum. En-

LAX

liffin , scion Sleudcl , le nom de Laxvmannia a été employé par Raeusch I pour une autre Plante qu'il a nommée La.v.m. anuenda. (quoique le genre de R. Brown n'ait pas l'an'éiriori'é sur celui de Forsler , il de- \ vient nécessaire , dans l'intérêt de la ^science , de l'admettre seul sous le i nom de Laxmannia , parce qu'il a été jflectiit avec toute l'exactitude désiirable, ce que l'on ne peut dire du j genre de Forster. En conséquence, nous renvoyons aux mots Petkoibium, Benoite et Crucianelle pour les autres Laxmannia , et nous expo- , : sons les caractères donnés par l'illus- I tre auteur du Prodromus J lui: Nuïcb- .Hollandioe : périanllie à six divisions i colorées, conniventes à la base et [persistantes; six étamines dont les I filets sont subulés , glabres , insérés : sur les divisions du périanllie, et les . anthères pellées , presque arrondies; i ovaire n'ayant qu'un petit nombre ■ de loges; style simple; stigmat ob-

tus; capsule renfermée dans le calice persistant, à trois loges cl à trois valves portant les cloisons sur leur milieu; graines peltées , à ombilic nu ; embryon dorsal parallèle à l'ombilic.

Ce genre est voisin du *Sowerbea* et de *Ylphyllanthes*. Il se compose de deux espèces qui croissent au port Jackson et sur les côtes méridionales de la Nouvelle-Hollande. R. Brown lésa nommées *Lax n:an ni a graci lis* et *Laxm. minor*. Ce sont des Plantes herbacées , vivaces , avant le poi t des *Polycarpœa* ou *Hagca*. Leur racine est fibreuse. Leurs tiges sont rameuses , filiformes et garnies de feuilles

fiointues; les radicales agglomérées; es caulinaires alternes et comme insérées sur le milieu d'une gaine courte, scaricuse, laineuse sur les bords et fendue au sommet. Ses fleurs sont presque sessiles , petites, pourprées ou blanches, et pourvues d'une biac-tée; leur capitule est petit, porté sur un pédoncule terminal et en forme de hampe. (G..N.)

* LAZEAZE. bot. piian. (Fla-

LEA a5i

court.) Un Nénufar de Madagascar qui paraît être le *Nymp/toea alla*, (b.)

LAZULÏTE. min. Vulgairement Lapis-Lazuli et Pierre d'azur, Lazurstein , W. Substance minérale d'un bleu d'azur, opaque, fusible, soluble en gelée dans les Acides , composée de six atomes de silicate d'Alumine et d'un atome de silicate de Soude, ou en poids, de Silice, 44; Alumine, 55; Soude, 21 ; ayant pour forme primitive un dodécaèdic rhomboïdal. Sa cassure est mate, à grain très-serré; sa dureté suffisante pour qu'elle étincelle par le choc

du briquet. Sa pesanteur spécifique est de 2,76 à 2,84. Les seules variétés connues sont : le Lazulite cristallisé , le granulaire et le compacte. Il est souvent entremêlé de veines blanches de Feldspath, de Chaux calcaire, et de veines jaunes de Fer pyriteux. Cette substance appartient au sol primordial. On la trouve en filons dans le Granité et le Calcaire granulaire en Sibérie, près du lac Baïkal: dans la petite Bukarie , le Thibet , la Chine; et enfin dans le Chili. Le Lazulite , lorsqu'il est d'un beau bleu et exempt de taches blanches , est recherché par les artistes qui taillent et polissent les Pierres ; on en fait des coupes, des tabatières, des plaques pour être employées en revêtement. Mais son principal usage est de fournir à la peinture cette belle couleur bleue, connue sous le nom d'Outremer, qui est presque inaltérable. Pour la préparer, on broie cette Pierre , et on la réduit en poudre fine que l'on mêle avec de la résine pour en former une pâte. Puis à l'aide du lavage , on extrait de ce mélange une poudre qui , étant desséchée, donne l'Outremer.

(t>. DEL.)

* LËACHIE. Leachia. moll. (Lesueur.) V. Calmaret.

* LËACHIE. Leachia. bot. than.

Genre de la famille des Synanthérées, Corymbifères de Jussieu et de la Syngénésie frustranée , L., établi par II.

Cassini (Diction, des Se. Natur. ,

aSa LEE

t- 25, p. 388) qui lui a imposé des caractères très-détailés parmi lesquels nous choisissons les suivants comme étant les plus essentiels : involucre double ; l'extérieur plus court , étalé , dont

les folioles soudées à la base , un peu coriaces , ovales , lancéolées et obtuses, sont placées presque sur un seul rang ; l'intérieur campanule , formé de folioles appliquées , soudées à leur base , égales larges , ovales, lancéolées, colorées, coriaces à la base, membraneuses sur les bords; calathide, dont les Heurons du centre sont nombreux , réguliers , hermaphrodites ; ceux de la circonférence neutres, au nombre de huit, sur un seul rang, en languettes cunéiformes et

rique, garni de pailles

membraneuses et colorées ; ovaires ¹elopPe , etalt "mPle daDS Je D" obovoïdes-comprimés , arqués en de- f¹.iS¹S¹L et _qUC danS les dans , surmontés de deux squammu-

LEB

Mgypt. illustr., 30, t. 5i, f. 2). De Candolle (Syst. Veget. , 1 , p. 529) a placé cette espèce dans le genre Cuccu/us. (g..n.)

LEANGIUM. bot. crypt. {Champignons.) Ce genre, d'abord créé par Link, a ensuite été réuni au Didyrnium qui diffère à peine du Dicterna , auquel quelques auteurs le réunissent. Son principal caractère est d'avoir un péridium composé d'une enveloppe simple, mais un examen attentif a démontré qu'elle était double dans les Diderma Jloriforme et stellare , types du genre; c'est pourquoi Link l'avait fait disparaître.

Nées , Ehrenberg et d'autres crypter,.TM....., I» . j • ..""s

t tridentées ; réceptacle hémisphé- ^ganuætea 1 ont rétabli de- pu.s , après ique, garni de paillettes linéabes , S asS"r% ' .dn,101'dJ> 1"? 1 e"r

lules opposées, très-courtes , larges, charnues et in égulièrement barbellulées ; akènes pourvus sur chaque coté d'une bordure cartilagineuse , irrégulièrement découpée et qui s'est développée après la fl'euraison.

Mœncb avait autrefois distingué ce^. LÉARD. bot. phan. Le Peuplier genre du Coreopsis et lui avait impo- noir dans certains cantons de la sé la dénomination vicieuse de Co- France centrale. (b.)

deux autres Diderma que nous venons de nommer, les graines étaient portées sur une columelle qui n'était point une deuxième enveloppe , mais bien un organe particulier qui simulait une double membrane, fait qui explique l'erreur de Link. (a. f.)

reopsoïdes. Le Coreopsis lanceolata , L., en est le type. On cultive au Jardin des Plantes de Paris cette jolie espèce qui est originaire de la Caroline. C'est une Plante herbacée, à tiges dressées , hautes de près d'un mètre, et garnies de feuilles opposées , presque sessiles , lancéolées et très -entières. Les calalhides des fleurs sont jaunes , solitaires au sommet de longs pédoncules terminaux.

Cassini a ajouté deux espèces décrites par Linné et par Persoon sous les noms de Coreopsis auriculata et de C. crassifolia. La première est le Leachia trifoliata , la seconde le L. crassifolia , Cass. (g..n.)

LÉ/EBA. bot. pn an. Ce genre ,

LÉBAKH. bot. piian. Nom de pays du Balanite de Delilc. (b.)

LEBBECK. bot. phan. Vulgairement Bois noir à l'Ile-de-France. Espèce du genre Acacie. V. ce mot.

LEBECKIË. *Lebeckia*. bot. piian.

Genre de la famille des Légumineuses, constitué par Thunberg et placé par les auteurs systématiques dans la Diadelphie Décandrie, L., quoiqu'il ait des élamines monadelphes.

Voici ses caractères essentiels : calice découpé en cinq lobes aigus, presque égaux et à sinus arrondis; dix étamines toutes réunies en une gaine fendue antérieurement ; légume cylindrique. Les Lébeckies sont établis par Forskahl (*Flora yEgyp- des Arbrisseaux ou Arbustes inditia/ia* , p. 172) , a été réuni au genre du cap de Bonne-Espérance, *Menisperrmtm* par Delile (*Tlora* ayant le port des Genêts, à feuilles

LEB

L. simples ou trifoliées , quelquefois •nules. De Candolle (*Prodr. Syst.*

\)freget., i, p. i56) en a décrit onze espèces dont plusieurs étaient placées dans les genres *Spartium* et *Geinista* par Linné; telles sont les *Le- Ibeckia contarninala* et *sepiaria*. Laimarck a réuni aux Cytises, sous les moins de *Cytisus se/iceus* et de *C. cai- pensis*, les *Lebeckia sericea* et *L. cy~ i /isoides*. Cette dernière a , d'un autre côté, été placée par Linné dans son ; genre *Eùenus*. (o..N.)

LÉBÉRERZ. min. Mot allemand • qui veut dire Minerai hépatique, el ; par lequel on a désigné certaines variétés compactes de Mercure sulfuré et de Cuivre pyriteux. (g. del.)

LÉBERFELS. min. Roche hëpati- 1 que. D'après Beurard, Trapp inlerrnédiaii e pénétré de Fer oxidé. (G. DEL.)

LÉBÉRIS. rept. orn. Espèce du genre Vipère. K. ce mot. (n)

LÉBERKIES. min. C'est-à-dire "Pyrite hépatique. Nom donné par Werner à certaines variétés de Fer sulfuré passant à l'étal d'hydrate; et par Léonhard , au Fer sulfuré magnétique. (g. del.)

LÉBÊROPAL. min. (Werner.) Syn. de Mênilite ou de l'Opale présinitc de Méuil-Montant , près de Paris. (g.del.)

LÉBERSP.VTH. min. (Werner.) Variété de Baryte sulfatée pénétrée de matière bitumineuse. V: Bahtte

SULFATÉE FÉTIDE. (G. DEL.)

LEBETINE. rept. oph. Espèce du genre Vipère. P. ce mot. (u)

* LEBÉTINE. Lebeti/ia. bot. piian.

Genre de la famille des Synanthérées, Corymbifères de Jusieu, et de la Syngéuésie superflue , L., établi par Cassini (Dict. des Se. nat. T. xxv, r>. ^4), et placé par ce botaniste dans la tribu des Tagétinées. Voici ses principaux caractères : involucre Rouble; l'extérieur plus court, composé d'environ douze bractées presque sur un seul rang, dressées, linéaires, Subulées , pinnatilides et glanduleu-

LEB a55

ses sur la nervure; l'intérieur cylindracé , un peu élargi de bas en haut , formé d'environ vingt folioles égales, presque sur un seul rang , soudées inférieurement, appliquées, glanduleuses et appendiculées au sommet ; réceptacle conoïde , alvéolé , garni de fimbriilles courtes , épaisses et charnues; calathide dont les fleurons du centre sont nombreux, hermaphrodites', à corolle un peu irrégulière, ceux de la circonférence au nombre de douze, en lan-

guettes et femelles; ovaires cylindracés, striés, velus et surmontés d'une aigrette double; l'extérieure courte, composée d'environ dix paillettes oblongues, spathulées; l'intérieure composée d'autant de paillettes filiformes, légèrement plumeuses dans leur partie supérieure. Le genre *Lebetina* est très-voisin du *Dissodia*, mais il en diffère suffisamment par la structure de l'involucre, du réceptacle et de l'aigrette.

L'espèce sur laquelle il a été constitué, a reçu le nom de *Lebetina can— celluta*. C'est une Plante herbacée, très - odorante, comme les *Tagetes*, dont la tige est dressée, rameuse et garnie de feuilles éparses, sessiles et profondément pinnatifides. Ses fleurs sont jaunes et accompagnées de bractées qui forment un assemblage analogue à l'involucre de *X Atractylis cancellata*. Cette Plante est cultivée, sans indication d'origine, au Jardin des Plantes de Paris. Cassini propose avec doute de joindre à cette espèce les *Dissodia puraphylla*, *coccinea* et *Cavanillesii* de Lagasca. Cette dernière Plante a été érigée en un genre distinct nommé par les uns *JVilldenotia*, *Adenophyllum* et *Scæcle/iteudalia* par les autres. V. ces mots.

LEBIA.S. pois. Genre établi par Cuvier (Règn. Anim. T. 11, p. 799) dans la famille des Cyprins, de celle des Cysnidrosomes de Uuméil. Ses caractères consistent dans les dents comprimées et dentées; leur corps est aplati, très-déprimé, couvert d'écailles; la bouche est petite; la membrane branchiostège à cinq rayons;

a5i LEB

une seule dorsale. Du reste, ce sont des Poissons fort voisins des *Poecilies*. Deux espèces qui n'étaient pas décrites, dont on ignore la patrie et qui se trouvent conservées dans les galeries du

Muséum, composaient ce genre auquel not'e savant et laborieux ami Lcsueur, de l'Académie de Philadelphie, vient d'en ajouter une troisième, observée vivante dans les eaux douces de la Floride ; c'est le Lelias ellipsoïdes, d. 11, a. 10, v. 10, i>. n, C. 20. (u.)

LEBIE. Lebia. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Pcn- -tamères , famille des Carnassiers , tribu des Carabiques troncatipennes, établi par Lalreille et ayant pour caractères : croebets des tarses dentelés en dessous; le dernier article des palpes filifoime ou presque ovalaire, tronqué à son extrémité , mais jamais sécuriforme ; antennes filiformes; articles des tarses presque triangulaires ou cordiformes , le pénultième bifide ou bilobé; corps court et aplati ; lête ovale, peu rétrécie postérieurement ; corselet court , transversal , plus large que la tête , prolongé postérieurement dans sou milieu ; él^ très larges, presque carrées. La treille avait divisé ce genre en trois sections basées Sur les proportions du corselet , et la considération du pénultième article des tarses. Bonelli a converti ces divisions en autant de genres nouveaux , auxquels il en a ajouté un de plus ; les quatre genres qu'il a établis sont les Lébie , Lamprie, Dromie et Démétriade ; ces genres furent adoptés par Latreille , dans l'Iconographie des Insectes d'Europe et dans ses Familles Naturelles du Règne Animal.

Dejean (Catal. général des Col., etc., t. 1, p. 253) a réuni les deux premiers genres de Bonelli, ceux de Lébie et de Lampric, parce que les caractères que cet auteur donnait à ces genres pour les distinguer, n'existent pas dans toutes les espèces; ainsi Bonelli donnait pour caractères au genre Lamprie d'avoir le pénultième article des tarses simple, les antennes li-

néaires et le dernier article des palpes tronqué; les caractères qu'il attribuait à son genre *Lébie* étaient d'avoir le pénultième article des tarses bifide, les antennes plus minces à leur base, et le dernier article des palpes moins tronqué que dans les *Lampries*. Dejean, qui possède vingt-trois espèces de ces deux genres, en les examinant toutes attentivement, s'est convaincu qu'il était impossible d'admettre le genre *Lamprie*, car même dans le *Lamprias cjanocéphala*, qui est le type du genre, le pénultième article des tarses n'est point simple, comme le dit Bonelli, mais il est distinctement bifide, et il y a des espèces où il est difficile de décider s'il est bifide ou bilobé, mais il n'est simple dans aucune; et quant aux autres caractères ils sont si peu sensibles qu'il ne croit pas qu'ils soient suffisants pour servir de caractères à un genre. Le genre *Lébie*, tel qu'il est restreint par Dejean {lue.

cit.), se distingue des *Dromies* et des *Démélriades*, par le corselet qui est presque aussi long que large dans ces derniers genres, tandis qu'il est toujours plus large que long dans le premier; il se distingue des *Cymindes* par la forme des palpes, et des *Bracliynnes* par leur languette, leur corps très-aplati, et l'absence de ces organes de crépitation qui sont particuliers à ces derniers Carabiques.

Les *Lébies* ont le dernier article des palpes filiforme ou presque ovalaire, plus ou moins tronqué à l'extrémité, mais jamais sécuriforme; leurs antennes sont filiformes et plus courtes que le corps qui est large et aplati; leur tête est ovale et peu rétrécie postérieurement, le corselet est court, transversal, plus large que la tête, et prolongé postérieurement dans son milieu; ce caractère est tout-à-fait particulier à ce genre, et il le distingue de tous ceux avec lesquels il a quelques rapports; les élytres sont

larges , légèrement convexes , tronquées à l'extrémité et en forme de carré peu allongé. Les mâles ont les trois premiers articles des tarses an-

LEB

idérien's dilatés et garnis en dessous | île poils assez courts et séri es. Ces Illuscetes se trouvent en général sous Mi J es écorces. On eu rencontre quelquefois sous des pierres. Presque toutes les espèces connues sont d'Europe ou d'Amérique. Celle qui sert de type J.iau genre , est :

Le Léuie petite Choix, L. Crux minor, Latr., Gyl., Dej. (/oc. cit., p. 3361); Carabus Crux minor, Fabr.; Car.

(Crux major, Oliv. , m , 55, p. 96, nn. 15a, t. 4, f. 4a, a, b; le Chevalier rouge , GeoiT. Elle est longue de deux lignes et demie à deux lignes trois quarts; noire, avec la base des antennes et le corselet fauves; les élytres sont d'un fauve pâle avec une 1 tache scutellaire et une grande bannière postérieure transversale et dilatée à la suture, noires ; les pieds sont fauves avec les genoux et les tarses noirs. Elle se trouve en Europe , et est rare à Paris. P.. pour les autres espèces , Latreille, Fabricius , Olivier, et l'excellent ouvrage du comte Dejean, que nous avons déjà cité plus haut.

* LEBRETONIE. Lebretonia. uot.

raphan. Genre de la famille des Malvacées, et de la Monadelphie Polyandric , L. , établi par Schrank [Plant. rar. Hort. Mon., tab. 90), adopté et (ainsi caractérisé par De Candolle XProd. Syst. Regn. P'get. 1 , p.

4446) : calice à cinq divisions profondes, entouré d'un petit involucre à cinq divisions profondes et plus couil les que celles du calice intérieur; cinq pétales tordus pendant l'estivattion , à limbe éalé ; dix styles ; car- 1 pelles au nombre de cinq ou de qua- Itre par avortement, inonospermes , 1 indéhiscens. Ce genre est, selon De (Candolle, très-voisin de la seconde .* section des Paronia qui se compose (de Plantes indigènes, comme \nLebre-1/o/ia, de l'Amérique équinoxiale. La i Plante qui a servi de type au gemea < été nommée *L. coccinea* par Schrank .

îSes (leurs sont grandes, d'un roicge BCarlate; ses feuilles ovées , acumi- 1 nées , dentées en scie, sont pubes- <■ centes en dessus et cotonneuses en

LEC a55

dessous. Nées et Martius (Nou. Act.

Bonn, xi , p. 98) en ont publié une seconde espèce à laquelle ils ont donné le nom de *L. latifolia*. Enfin , De Candolle a réuni avec doute au *Lebretonia* , le *Scliouwia semi-serrata* de Schradler (Götting. Ann. , 1821, p.

« LECANACTIS. bot. crypt.

(Lichens.) Ce genre a été fondé par Eschweiler dans son *Systema Liclienum* , pag. i4, et placé dans la cohorte des Graphidées. Il est ainsi caractérisé : thalle crustacé , attaché-, uniforme; apothécion oblong et allongé d'une manière difforme , immergé, noir; périlhécium infère et latéral, avec une marge concrète formée par le thalle , à nucléum nu, à di>que plane un peu convexe; thèques fusiibrm.es, cylindriques, en anneau. Le type de ce genre est *V Opegrapha astroLiea* de VEnglish Bot., vol. 26, tab. 1847.

\1Aithonia lyncea, que l'on trouve si fréquemment dans les environs de Paris, rentre dans le genre *Lecanactis*, qui nous semble bien voisin des Aithonies. Eschweiler en possède six espèces nouvelles toutes américaines; il ne donne les caractères spécifiques d'aucune d'elles, et il nomme l'espèce ligurée *Lecanactis lobata*. (a. f.)

* *Lecananthus*.

bot. PHAN. Genre établi par W. Jack {Mal. Mis. 2) et adopté par V. Wallich dans le *Journal de Botanique*, 2, p. 319. Ce genre, qui fait partie de la famille des Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie, offre les caractères suivans : calice adhérent avec l'ovaire, élargi, campanule, coloré, et à cinq divisions inégales; corolle monopétale, à tube court, à limbe à cinq divisions; ovaire à deux loges contenant un petit nombre d'ovules attachés à un trophosperme qui vient à la cloison; style bifide surmonté de deux stigmates linéaires.

Ce genre se compose d'une seule espèce, *Lecanactis erubescens*, W.

Jack., loc. cit. C'est un petit Arbruste dressé, ayant à peu près le port d'un

Cephaelis. La tige est à quatre angles dont deux plus saillans; les feuilles opposées, ovales, lancéolées, rétrécies et aiguës aux deux extrémités, entières; les stipules sont larges et ligulées. Les fleurs sont réunies en une sorte de capitule, entouré d'un involucre. Cette Plante a été trouvée par Wallich aux environs de Serampore, (a. r.)

LECANARIA. bot. cryft. (Lichens.) C'est le nom donné par Achalius à la première section du genre Parmelia tel que cet auteur l'avait d'abord établi dans sa Méthode; elle renfermait les Parmélie» à thalle cristacé , uniforme , dont la marge de l'apothécion est discolore. Ce sousgenre constitue en entier notre genre Lécane, mais ne l'aît qu'une partie du Lecanora d'Acharius qui renfermait les espèces à thalle figuré en folioles soudées ou en squammes. V.

SQUAMMARIEES CtlÉCANOIE. (A. F.)

* LÉCANOCARPE. Lecanocarpus.

dot. puais. Genre de la famille des Aniaranthacées , et delà Monandrie Monogynie , L., récemment établi par les frères INées d'Esenbeck {Plant.

Horl. vied. Bonn. Icon. Select., p. i , 4) qui lui ont imposé les caractères essentiels suivans : Fleur hermaphrodite ; calice pentaphylle, herbacé; corolle imlle ; une ou deux étamines opposées aux folioles caliciuales et à anthères didymes j style simple, persistant , surmonté de deux stigmates ; caryopse (cystis) orbiculaire , déprimée, bordée; graine unique , horizontale. Ce genre est voisin de \Amaranthus , mais l'hermaphroditisme de ses fleurs, le nombre de ses étamines, et la structure de son fruit l'en distinguent suffisamment. Il ne renferme qu'une seule espèce qui croit dans le Napaul. C'est \cLecanocarpus caulijlorus , Nées {lue. cit.), dont voici la synonymie : Amaranthus caulijlorus , Link, Enum. Horl.

Berol. , vol. n , p. 38g ; Amaranthus diandrus , Spreng. , Neue. Entd. 3, p.

20 ; *Agroglochia ctenopodioides* , Schrad. , Catal. Hort. Götting. ; et *Bli-*

tanthus nepalensis, Reichenbach, Cat.

Horl. Dresd. C'est une Plante herbacée , verte , à feuilles alternes , pétiolées, sans stipules, à fleurs disposées en capitules axillaires , sessiles dans les angles que font les divisions dichotomiques des capitules, très-petits au moment de la floraison; les fruits se développent beaucoup dans leur maturation. L'auteur joint à la description très-détaillée de cette Plante une bonne figure qui représente l'espèce et l'analyse complète de ses organes.

Le nom & *Agroglochin*, imposé par Schrader, est antérieur pour sa publication à celui de *Lecanocarpus* ; cependant les auteurs de ce genre qui l'avaient fait graver depuis longtemps sous ce dernier nom , n'ont pas cru devoir le changer. (g. n.J

LECANORE.Zeca/zo/fl. BOT.cniTT.

(Lichens.)T-le genre *Lécanore*, tel que nous l'avons restreint , se compose des Lichens à thalle crustacé , tartareux ou lépreux, sous-coriilagineux , uniforme, avec et sans limites ; l'apothécium est orbiculaire, épais, sessile , inarginé , à disque plane convexe, à imbrication discolore; la lame proligère est colorée. Ainsi caractérisé notre genre *Lecanora* exclut les *Patellaires* à marge concolore de *Ue Candolle* ; il rejette aussi les *Lecanora* d'*Acharius*, dont le thalle est figuré ; celles-ci rentrent dans notre groupe des *tfquamariées*. L'habitat des *Lecanora* est très-varié. Elles envahissent les parois, les murs, les pierres , les rochers , la terre , l'épiderme des troncs d'Arbres , les vieux bois et même les feuillks vivantes de certains Arbres exotiques. On peut porter à

environ cent cinquante le nombre des espèces connues de ce genre; -nous en avons décrit treize nouvelles espèces, qui sont figurées clans notre Essai sur les Cryptogames des écorces exotiques officinales. Hnviron une cinquantaine de Lécánóres se trouvent en France; parmi les espèces inédites de notre collection se distinguent les suivantes : Lecanora

joccinea, N. , V. planches de ce Dictionnaire et notre Essai sur les Cryptogames des écorces exotiques)DÛicinales, tab. 27, fig. 7, pag. 120: ihhallc granuleux , fendillé dans la poarlie fructifère seulement, sans linmites , d'un blanc grisâtre ; apolhécions sous-immérgés , pressés; à dis- Ijue concave, de couleur écarlate, à nparge très-épaisse. Cette belle Plante 11 le port d'une Urcéolaire , mais son organisation ne permet pas de la séparer des Lécanóres. Elle croît en Amérique, sur l'ééorce de divers Fiiçueis. Lecanora ipip/iyila, N. [f.

■lissai, etc., tab. 1 , fig. 38, pag. g3). IThalle interrompu, sous-squammuccux , blanchâtre, assez épais ; apohhécions à marges très-épaisses , ferrugineuses, à disque creusé , pâle. On ;rouve cette Plante sur les feuilles- Mes Arbres de Cayenne. Lecanora iarlarea , Ach. , Syn. Me/h. Licli. , p. ■72; Verrucaria tartarea, Hoffm. , '71. Germ. , p. 175 ; Patellaria tarta- \ 'ea, De Cand. , Fl. Fr. Sp. 989; à hhalle tartareux granulé, d'un blanc cendré; apo-thécions épais, à disque llncun peu convexe, rugueux, COU-

uur de brique pâle, à marge mllé- Miie , ensuite liexueuse. C'est cette sspèce si commune sur les roches et air la terre, qui sert, dans le Nord,

: teindre les étolFes. (a. F.)

* LÉCANORÉES. bot. crypt. (Lichens.) Cette tribu, établie dans 110^{ve} Méthode Lichénographique (p.

53), renferme les Lichens dont l'apomécion est patellulé, sessile, muni d'un rebord et d'une lame prolifère iblorée, et dont le thalle crustacé, raiorphe, est adhérent. Ce support est ordinairement limité, assez souvent orbiculaire, d'une épaisseur variable. Les Lecanorces vivent sur les écorces, les vieux bois et les pierres, s'étendent sur la terre humide, recrustent les Mousses et les débris végétaux. Les feuilles vivantes de plusieurs Arbres exotiques en nourrissent un petit nombre d'espèces remarquables. Cinq genres comprennent ce groupe; ce sont les genres

Cladonia, Lecanora, Urceolaria, Echinopora, Lecideella, Lecanora. f. ces mots; le troisième au Supplément. Les Lecanorées se lient aux Variolaires et aux Squammariées par le genre Lecanore. (a. F.)

LECCEA. pois. Syn. de Curax^ ce. mot» chez les pêcheurs du golfe de Gênes. (b.)

* LÉCHÉE ou LÉQDÉE. Lechea.

bot. l'HAN. Ce genre, établi par Linné qui le plaçait dans la Triandrie Trigynie, avait été rapporté à la famille des Caryophyllées par Jussieu. Dunal (in De Cand. Prud. Syst. f'eg., i, p. 285) l'a réuni aux Cistinées, et en a ainsi tracé les caractères : calice à trois sépales, accompagné de deux bractées ou sépales extérieurs; trois pétales lancéolés; étamines variant en nombre depuis 10 jusqu'à douze; mais offrant ordinairement le nombre ternaire; ovaire à peu près trigone; trois stigmates à peine distincts; capsule à trois valves qui portent sur leur milieu les cloisons ou

de fortes nervures, auxquelles sont attachées des graines en petit nombre, et munies d'un albumen chair nu, d'un embryon, dorsal droit, à radicule infère et à cotylédons ovés-oblongs.

Ce genre renferme six espèces, toutes indigènes de l'Amérique septentrionale, parmi lesquelles nous citerons le *Lechea minor*, Pursh, Lamk., Illuslr., t. bi, et le *L. racemulosa*, Michx. Lamarck (IUustr., t. 281, f. 5) a donné de celui-ci une bonne figure sous le nom de *Gaura*. Ce sont des Plantes herbacées, à fleurs nombreuses et petites et à rameaux inférieurs différents des florifères. Le *Lec/iea càiliensis* de Loureiro paraît être, selon De Candolle, une espèce de Commelinée. (o..N.)

* LECH EG UAN A. ins. Nom donné par les Brésiliens et par Félix d'Azzara à une Guêpe qui se trouve au Brésil et au Paraguay, et dont le miel a quelquefois des propriétés délétères.

Auguste de St.-Hilaire a failli être empoisonné par ce miel; ce savant donne les détails de cet empoisonnement.

TOME IX

3 fi» LEC

ment dans les Annales des Sciences Naturelles (T. iv, p. 54). Cette Guêpe est nouvelle et appartient au génie Poliste de Latreille qui l'a nommée *Po/is/es Lecheguana*. V. Poliste. (g.)

LÉCHEN AU LTI E. *Lcchenaullia*.

ÉOT. piian. Genre de la famille des Goodénovices, établi par R. Brv7U (Prodrom. 1, p. 58i) en l'honneur du botaniste et

voyageur français Leclienault de la Tour. Il se compose de quatre espèces , toutes originaires de la Nouvelle-Hollande. Ce sont des petits Arbustes ou quelquefois des Plantes herbacées , vivaces, glabres , portant des feuilles étroites, très-entières , et des fleurs , soit axillaires , soit terminales. Leur calice est adhérent ; leur corolle monopétale est fendue longitudinalement d'un côté.

Les anthères sont cohérentes entre elles au moment de l'épanouissement des fleurs. Les grains de pollen sont composés. Le stigmate est caché au fond d'un indusium bilabié. la capsule est prismatique, biloculaire , à quatre valves dont deux opposées portent la moitié de la cloison sur leur face interne. Les graines sont cubiques ou cylindracées, dures.

Ce genre est très-voisin de YAnthotium , mais il en diffère , ainsi que de tous les autres genres de cette lamille, par son pollen composé de quatre petites masses sphériques. (a. r.)

* LECHEOIDES. bot. phan. V.

HÉLIANTHÈME.

LÈCHEPATTE. mam. L'un des noms vulgaires, mais très-impropre, del'Uneau. (b.)

LÉCHDZA. ois. Syn. vulgaire de Chevêche. V. Chouette. (dr..z.)

LÉCHYAS. bot. than. Le fruit de la Chine désigné sous ce nom par d'anciens voyageurs, paraît être le Litchi. (b.)

LÉCIDÉE. Lecidea. bot. cuypt.

(Lichens.) Ce genre, le quatrième de notre groupe des Lécano-rées , a été fondé par Acharius dans son Melhodus Lichenum , et

conservé sans modification importante dans les autres

ouvrages de cet auteur; il figure dans l'ordre premier des Lichens *Idiothalamas* homogènes , et est ainsi caractérisé : réceptacle universel, variable, crustacé , étendu , attaché, uniforme , non figuré, foliacé, stuppeux; réceptacle partiel , scutelliforme , sessile, couvert en entier par une membrane cartilagineuse, contenant un parenchyme solide et similaire dans toutes ses parties; disque marginé.

Nous avons cru devoir modifier ces caractères, et nous considérons seulement comme *Lecidea* les Lichens à thalle difforme dont l'apothécion patellulé est muni d'une marge de la même couleur que le disque. IN'ous écartons ainsi de notre genre les *Lécidées* d'Acharius dont le thalle est figuré en folioles libres ou soudées; nous formons avec ces Plantes notre genre *Circinaria* , et nous rétablissons le genre *Placodium*. Nous excluons] ainsi les espèces renfermées dans 1 sous-genre *Lepidoma*. V. ce mot Nous avons eu entre les mains, sous le nom de *Cyrrlelia*, plusieurs Lichen.' venant d'Acharius; ils nous ont prouvé que ce lichénographe avait songé à démembrer le genre *Lecidea* dont il aurait distrait les espèces à apothécions immarginés , qui de noirs quand ils sont secs, deviennent rubicond lorsqu'on les humecte. Les *Lécidées* naissent sur les écorces , les vieux bois, les pierres, la terre humide etc.; leur thalle est fort variable ; elle aime l'humidité, et leur consistance est plus molle que celle des *Lécaneorées*. Eschweiler place ce genre parmi les *Verrucariées* ; ce rapprochement ne nous semble point heureux. L'organisation des *Lecidea* ne permet pas de les isoler des *Lécaneorées* , avec lesquelles elles ont , par leur scutelle par leur structure, un rapport très intime".. Nous nous bornerons à faire connaître les espèces suivantes :

Lécidée aurigère , Lecidea aurigera, N. , Essai sur les Crypt. d'Ecorc. exot. officin., lab. a8 , fig.

fi> 106. Thalle membraneux , couleur imité de brun , couvert de tubercul ovoïdes , lisses , couleur gris cend

Ll'.C

, à l'extérieur , jaune doré à l'intérieur. ; s'ouvrant dans la vieillesse la Haute; apothécions noirs, épais, ronds, souvent difformes ; à disque convexe, un peu plane, nu , ayant une marge épaisse. Cette belle espèce se fixe sur les écorces des Quinquinas de l'Amérique du sud.

LÉCIDÉE de Du Petit-Thouars , Lecidea Thouarsii , N. (V. planches de ce Dictionnaire). Thalle sous-croûteux , mollasse, à laciniures arrondies et incisées , crustacé vers le centre , stupéfié vers ses extrémités , roussâtre; apothécions globuleux, difformes, couleur de brique pâle, immarginés. La Lécidée d'Aubert Du Petit-Thouars incruste les Mousses et les Fougères des genres Trichomanes : et Hypophyllum dans les lieux montagneux de Mascareigne. Elle y a été trouvée par le botaniste auquel nous nous sommes fait un devoir de la dédier. (a. f.)

* LÉCIDÉIIS. uot. cbyi't. {Lichens.) Deuxième sous-ordre de la famille des Lichens Gasterothalamas de la Méthode proposée par Fries (Act. de Stockholm., 1821). Ce groupe renferme les Trackylia , Lecidea , Opegrapha , Tyrophora. Il correspond presque, exactement aux Lichens Idiothalamas homogènes à apothécions margiflès d'Acharius. Le mot Gastérolhames signifie apothécions ventrus ou ombés. (a. F.)

* LECISCIUM. bot. phan. Ce nom a été donné par Gaerlner fils (Carpo- 'ogia , p. 221 } à un genre qui ne peut être admis définitivement, dans l'ignorance absolue où l'on est des parties de la fleur. Le fruit , qui est une drupe, a été figuré (lue. cit. , t. 220, p. 5) sous le nom de L. drupaceum. Il avait reçu du professeur Desfontaines , et il était nommé Chrysophyllum dans sa collection. (>..N.)

LECRISTICUM. bot. piian. Vieux synonyme de Agnus cas/us. V. Vitex.

* LÉCYTHIDÉES. Lecythideæ.

bot. pu an. Petite famille de Plantes,

LEC af.ti

voisine à la fois des Myrtées et des Malvacées, et qui se compose des genres Lecythis, Couroupita , Couratari, Piriga/a et Bertholletia. Elle offre les caractères suivants : le calice turbiné adhérent par sa base avec l'ovaire ; son limbe offre de quatre à six divisions persistantes; la corolle est formée de quatre à six pétales un peu inégaux , élargis par leur base où ils se soudent latéralement, de manière à représenter une corolle monopétale rotacée. Les étamines sont excessivement nombreuses , monadelphes, formant un urcéole monophylle très-grand , d'abord circulaire , percé dans son centre d'un trou pour le passage du style, et déjeté d'un côté en une languette très-grande , élargie , concave , découpée et frangée à son sommet qui est très-obtus, ayant toute sa face supérieure recouverte d'anthères cordiformes et biloculaires.

L'ovaire est adhérent au calice par ses deux tiers inférieurs; son tiers supérieur est libre, conique, recouvert d'une couche épaisse, jaunâtre, en forme de disque épigyné. Le style est épais, très-court, terminé par un stigmate lobé. Coupé transversalement, l'ovaire présente de deux à six loges, chacune contenant une ou plusieurs graines dressées ou attachées à l'angle interne de la loge. Le fruit est une capsule ligneuse, souvent d'un volume considérable, d'une forme variable suivant les espèces et les genres, quelquefois remplie intérieurement d'une sorte de pulpe fibreuse, ordinairement à deux, quatre ou six loges contenant une ou plusieurs graines; celles-ci se composent d'un tégument propre, recouvrant un gros embryon dont l'organisation varie dans les cinq genres dont se compose cette famille. Ainsi dans les genres *Couroupita* et *Couratia*, la radicule est cylindrique, très-longue, recourbée autour des deux cotylédons qui sont plants et chiffonnés. Dans le *Pirigara* la radicule est excessivement courte et les deux cotylédons très-épais. Dans le *Lecythis* et le *Bertholletia* l'embryon est

a60 LEC

tout— à— fait indivis et semble monocotylédon. V. chacun de ces genres.

LECYTHIDACEÆ. bot. ruAN. Genre placé par Jussieu dans la famille des Myrtées dont il se rapproche en effet beaucoup, mais qui en diffère néanmoins par plusieurs caractères. ! qui ont engagé le professeur Richard à en former un groupe particulier sous le nom de Lécythidées.

F. ce mot. Les *Lecythis* sont tous des Arbres ou des Abris-seaux à feuilles alternes, persistantes, très-entières, non par-

semgics de points glanduleux.

Leurs fleurs, qui sont parfois trèsgrandes , blanches ou purpurines , forment des espèces de grappes simples ou rameuses, placées soit au sommet des ramifications de la tige , soit à l'aisselle des feuilles. Elles offrent un calice turbiné , adhérent par sa base avec l'ovaire infère, divisé supérieurement en six lanières étroites. La corolle se compose de six pétales un peu inégaux , obtus, soudés ensemble par leur base au moyen des filets staminaux et représentant ainsi une corolle monopétale rotacée. Les étamincs sont extrêmement nombreuses, monadelphes, formant un urcéole circulaire , déjeté d'un côté en une languette large et concave, dont toute la face supérieure est garnie d'anthères presque sessiles et dont le sommet est découpé et frangé. L'ovaire est semi-irifère , à deux, quatre ou six loges contenant chacune une seule graine , très-rarementplusieurs.

Le style est court , épais , terminé par un stigmate lobé. Le fruit est une capsule ligneuse ou une pyxide , ovoïde, déprimée, offrant vers la réunion de ses deux tiers inférieurs , avec son tiers supérieur, une ligne circulaire sur laquelle on remarque les six lobes du calice s'ouvrant en cet endroit par un opercule formé de toute la partie supérieure et dont la face inférieure est conique et présente quatre enfoncemens qui correspondent aux loges dont ils sont la paroi supérieure^ Les graines sont ovoïdes , allongées. Elles se composent d'un

épisperme membraneux qui recouvre un embryon dont l'organisation singulière a été décrite de la manière suivante par le professeur Richard dans son Analyse du fruit, p. 84. L'amande du Lecythis est un corps charnu, amygdalin , tellement solide et homogène , qu'il est extrêmement difficile d'en distinguer les deux

extrémités , c'est-à-dire de reconnaître la radicule et le corps cotylédouaire.

Par la germination, un des bouts forme d'abord une petite protubérance qui , après avoir rompu 1 épisperme , se prolonge ensuite en racine; l'aulie donne naissance à une gemmule écailleuse qui, en se développant , forme la tige. La ressemblance de cette amande avec celle du Pekea nous porte à la regarder aussi comme un gros corps radiculaire ou comme un embryon qui semble consister dans la seule radicule. Ce corps, après la germination , paraît comme un renflement bulbiforme ou tubéreux du bas de la jeune tige. L'amande de la graine du BertlioLletia , nommée Tonka par les Gayennois , ressemble à celle du Lecythis.

Les espèces de ce genre que l'on nomme vulgairement Quatela , au nombre d'environ huit à dix , sont toutes originaires de l'Amérique méridionale, à l'exception d'une seule espèce, Lecythis lanceolala , Poiret, qui croît à Madagascar. Leurs fruits, qui sont très-solides, durs et épais, forment des vases ou gobelets que l'on désigne sous le nom vulgaire de Marmite de Singe. Willdenow a réuni à ce genre le Couroupita d'Aublet , sous le nom de Lecythis bracteata , mais ce genre doit rester distinct. Pr. Couroupita. (a. r.)

* LÉDA. Leda. zool.? bot.? {Arthrodiées.) Genre de la division des Conjugées, établi par nous dans ce Dictionnaire , T. I , p. 585 , pour des êtres ambigus, dont les espèces connues avaient été confondues parmi les Conferves, et plus tard dans le genre Zygnéma des algologues modernes. Ce genre Zygnéma , que quel-

ques observateurs superficiels s'obstinent à conserver tel que le fil Agardh , est cependant si évidemment paitagé en plusieurs

autres, qu'il faut une singulière obstination pour n'en pas adopter les coupes.

Quoi qu'il en soit, les espèces singulières en seront facilement reconnues par les deux propagules ovoïdes contenues dans chaque locule prolifère.

Le véritable *Conferva ericetorum*, souvent confondu avec le *nebulosa*, qu'on a regardé à tort comme sa variété totalement aquatique, rentre dans ce genre ou un véritable accouplement a lieu comme dans les autres Conjugées par l'union de deux filaments. — Le *Zygnema bipunctatum* J. Lyngbye, est le type du genre, encore que le savant danois ait confondu cette espèce avec une autre dont il a fait son *Zygnema bipunctatum*, *unipunctatum*, rapprochement bien bizarre par l'énoncé même. (b.)

LEDE. bot. pu an. Pour Lédon. V.

ce mot. On appelle quelquefois vulgairement Lède le Ciste ladanifère ou autre espèce du même genre, (b.)

* LÉDOCARPON. bot. phan. Ce genre, de la Décandrie Pentagynic, a été établi par le professeur Desfontaines (Mém. du Mus. d'Hist. Nat.

T. iv, p. 450, tab. 15) qui l'a placé dans la famille des Géraniacées, et lui a imposé les caractères suivans :

calice persistant, profondément découpé en cinq segments ovales, lancéolés et aigus, entouré d'un involucre composé de feuilles subulées bi ou trifurquées; corolle hypogynic, étalée, à cinq pétales arrondis au sommet, alternes avec les divisions calicinales; dix étamines plus courtes que la corolle, cinq alternativement un peu plus longues que les autres, à filets persistans et

a anthères oblongues obtuses , biloculaires , déhiscentes longiludinalement ; ovaire supère, soyeux , surmonté de cinq styles épais ; capsule ovale , obtuse , soyeuse, à cinq loges , à cinq valves bifides , portant les cloisons sur leur milieu ; graines nombreuses , att-

chées à l'axe central des loges. L'auteur de ce genre a reconnu de grands rapports avec son organisation et celle des Oxalis ; c'est ce qui l'a déterminé à le placer parmi les Géraniées. Il a toutefois exprimé l'analogie du port de la Plante avec celui de certains Hélianthes qui s'en distinguent cependant par leurs feuilles toujours entières. Après avoir comparé attentivement les caractères du nouveau genre avec ceux des Géraniacées et des Cistinées , nous croyons qu'il serait mieux placé auprès de ces dernières, i

Le Ledocarpon Chilense , Desf.

(loc. cit.) , est la seule espèce du genre. C'est un Arbrisseau indigène du Chili , à tige droite, divisée en rameaux grêles, portant des feuilles opposées ou plutôt verticillées , sans stipules , soyeuses , partagées jusqu'à la base en trois parties étroites, aiguës et repliées sur les bords. Les fleurs sont terminales au sommet des rameaux. , (g. .N.)

LÉDON. Ledum. bot. phan. Gouze de la famille de Rhodoraées et de la Décaudrie Monogynic, L., offrant pour caractères : un calice très-petit, étalé , à cinq dents ; une corolle formée de cinq pétales sessiles; dixétamines, rarement cinq , ayant des anthères allongées , dressées , à deux loges , s'ouvrant chacune par un porc.

L'ovaire est ovoïde , appliqué sur un disque hypogyne à cinq-lobes, à peine distinct de la base de l'ovaire. Celui-ci offre cinq loges contenant chacune un très-grand nombre d'ovules attachés à un trophosperme axillaire et saillant. Le style est long, cylindrique, terminé par un stigmate très-petit, à cinq mamelons obtus. Le fruit est une capsule ovoïde , à cinq loges polyspermes , s'ouvrant de la base vers le sommet en cinq valves dont les bords rentrants forment les cloisons. Les graines sont très-grêles et comme filiformes. Ce genre se compose de deux espèces originaires des contrées boréales de l'Europe et de l'Amérique, et qui , l'une et l'autre

s6a LEL)

tre, sont cultivées dans les jardins pour leur élégance.

Le Lèdon des marais , *Ledum palustre*, L.', croît en Allemagne, en Pologne et dans le nord de la France. C'est un petit Arbuste rameux , d'environ un pied de hauteur , portant des feuilles éparses , très-rapprochées , linéaires, lancéolées, courtement péliolées, à bords rabattus en dessous, glabres et un peu bombées à leur face supérieure, toutes couvertes inférieurement d'un duvet tomenteux etroussâtre. Les fleurs sont blanches , longuement pédonculées, réunies en grand nombre au sommet des ramifications de la tige. La capsule est ovoïde, allongée, surmontée par la base du style, et à cinq loges polyspermes.

Le Ljêdon à larges feuilles , *Ledum latifolium* , L. Cette espèce , qui est originaire de l'Amérique septentrionale , est vulgairement connue sous le nom de Thé de Labrador. Elle est plus grande que la précédente , dont elle offre le port. Ses feuilles , rapprochées les unes des autres vers la sommité des branches, sont ovales,

lancéolées, à bords rabattus, glabres en dessus , tomentueuses et rousses à leur face inférieure. Les fleurs sont plus grandes, disposées comme dans l'espèce précédente vers le sommet des rameaux. L'infusion des feuilles a une saveur astringente et aromatique; on la substitue au Thé dans quelques parties de l'Amérique septentrionale.

Le *Ledum tkymifolium* forme un' genre distinct sous le nom de *Leiojihyllum*. V. Léiophylle. (a. r.)

LEDRE. *Ledra*. ins. Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Homoptères , famille des Cicadaires , tribu des Cicadelles , établi par Fabricius , et adopté par Latreille (Règne Anim.) qui lui donne pour caractères : les deux premiers articles des antennes presque de longueur égale; corselet dilaté uniquement sur les côtés. Ce genre se distingua de l'*Etalon* de Latreille, par

LEE

l'insertion des antennes qui sont inférieures dans le dernier et frontales dans le premier. 11 s'éloigne des *Membraces* de Fabricius par la forme du corselet; la tête est aplatie et forme une espèce de chaperon à trois pointes mousses dont une dans le milieu , et les deux autres sur les côtés; elle porte deux antennes insérées entre les yeux; l'écusson est distinct: le corselet est dilaté sur les côtés ; le bord postérieur est anguleux , concave à la base de l'écusson; l'abdomen est allongé. L'espèce qui sert de type à ce genre est :

Le Lèdre a oreilles, *Ledra auritû*, Fabr., Latr.; *Cicada aurita*, Linn ; la Cigale grand Diable, Geoff.

Panz., Schœff. Cet Insecte est long de près de cinq lignes ; il est d'un brun verdâtre, pointillé de noir, lavé d'un peu de rouge. Le dessus du corps et les pâtes sont d'un jaune verdâtre; les élytres sont transparentes avec les nervures brunes. On trouve cet Insecte sur le Chêne aux environs de Paris et en Allemagne; il est assez rare. (g.)

LEDUM. bot. phan. V. Lédon.

* LEEACÉES. Leeaceœ. bot.

phan. C'est le nom que De Candolle [Prodr. Syst. Veg. univ., i, p. 635) a donné à la seconde tribu qu'il a établie dans la famille des Ampélidées ou Viniférées, et qu'il a caractérisée ainsi : corolle monopétale; étamines alternes? avec les pétales, et souvent monadelphes ; fruits et graines dont la structure est peu connue ; les pédoncules des fleurs ne se convertissent point en vrilles. Cette tribu ne renferme que les deux genres suivans :

Leea, L., et Lasianthera, Beauv. F~.

ces mots. (g..n.)

LÉÉE. Leea. bot. phan. Ce genre, établi par Linné, a été placé dans la famille des Ampélidées ou Viniférées par De Candolle (Prodr. Syst.

Keg., i, p. 655) qui l'a ainsi caractérisé : calice à quatre dents; corolle à cinq petites divisions recourbées en dehors ; clamines formant un urcéole

LEE

quiuquélobé , à l'extérieur duquel les filets sont soudés et placés entre les divisions de la corolle; anthères ovées, glabres; style simple ; baie à quatre ou six loges , dont quelquesunes avortent; graines solitaires (selon Gaertner) dans les loges, dressées, munies d'un albumen cartilagineux ,

guinquélobé , et d'un embryon cylindrique , acumié , arqué , légèrement excentrique. De Candolle réunit à ce genre *Y Aquilia* de Linné , que Jussieu plaçait dans les Méliacées ; l'ui céole slaminière dont il est pourvu justifie en effet ce dernier rapprochement, ou du moins établit une grande affinité entre les Méliacées et les Viniférées. On connaît sept espèces de *Leea*, toutes indigènes des Indes- Orientales. (o..N.)

*LÉÉLITE. min. (Clarke, Annal, de Philos. 1818). Substance minérale encore peu connue , trouvée à Gryphytta en Westmanic; clic est de couleur rouge et d'un éclat semblable à celui de la corne. Sa pesanteur spécifique est de 2,71. Elle est formée, d'après Clarke , de Silice, 75 ; Alumine , 32; Manganèse , 2,5 ; Eau , 0,50. (o. DEL.)

LEERSIA. bot. crypt. {Mousses.) Ce genre , créé par Hedwig , n'a point été conservé, le nom de *Leersia* ayant été précédemment employé par Swartz pour un genre de la famille des Graminées. F. Encalypta et

LÉERSIE. (A. F.)

LËERSIE. *Leersia*. bot. piian. Ce genre , de la famille des Graminées , et de la Triandrie Digynie , L., établi par Swartz , avait

été nommé *Asprellapzv* Schreber, et plus antérieurement *Homalocenckrus* par Jialler.

Néanmoins , le nom de *Leersia* , qui rappelle un botaniste dont les travaux ont eu une heureuse influence sur les progrès de l'agrostographie , a été plus généralement adopté. Le *Leersia* se distingue facilement à ses épillets uniflores , uniquement composés d'une glume bivalve sans lépicène. La valve externe est plus grande , comprimée , carence et en forme

de nacelle ; l'intérieure est étroite , également très-comprimée. L'ovaire est surmonté de deux stigmates plumeux. Le nombre des étamines varie d'une à six dans le petit nombre d'espèces qui forment ce genre.

L'espèce la plus commune est le *Leersia oryzoides* , Swartz , ou *P/ialaris oryzoides* de Linné. C'est une Plante vivace et rampante qui croît dans le voisinage des eaux , et qui a été observée en Europe , en Asie et dans l'Amérique septentrionale. Ses chaumes , dont les nœuds sont velus , ont une hauteur d'environ deux pieds. Ses fleurs forment une panicule dressée. (a. b.)

LÉFLINGE. bot. piian. Pour Lœflinge. V. ce mol. (b.)

LEGNOTIS. bot. phan. (Swartz.) Syn. de Cassipourier. F. ce mot. (ji.)

LEGOEZIA bot. phan. (Durande.) Syn. de Campanul'a Spéculum, Prismatocarpe de l'Héritier. V. ce mot. (B.)

* LEGDAN et LEGUANA.rept.

saur. Noms vulgaires des Iguanes à Saint-Domingue. (b.)

LÉGUME. Legumen. bot. phan.

On appelle ainsi le fruit des Légumineuses plus généralement désigné en français sous le nom de Gousse.

LEGUMLNEDSES. Leguminosæ.

bot. piian. Famille de Plantes dicotylédones polypélals, à étamines péngynes. Lorsque l'on ne considère les Légumineuses qu'en masse, cette famille paraît être , au premier abord , une des plus naturelles du règne végétal. Mais lorsqu'on l'examine plus attentivement, lorsque l'on étudie en détail l'organisation particulière des genres nombreux qui la composent , on est frappé des différences remar-

quables qu'ils présentent, et dès-lors isparaîteette uniformité qu'on avait cru apercevoir dans ce groupe de Végétaux. Tâchons, sans entrer dans des détails que ne comporte pas la nature de cet ouvrage , de faire néaivmeins connaître assez exactement

a64 LEG

l'organisation générale des Légumineuses.

On peut rapporter à trois types principaux la structure des fleurs dans la famille des Légumineuses , ce qui forme trois grandes sections ou tribus désignées sous les noms de Papilionacées , de Gœsalpiniées ou Gassiées et de Mimosées. Etudions successivement l'organisation de chacun de ces trois groupes.

i°. Papilionacées. — Le calice est monosépale , tubuleux ou turbiné , ordinairement à cinq dents ou à cinq divisions plus ou moins profondes , quelquefois inégales et comme disposées en deux lèvres ; quelquefois le calice est accompagné extérieurement d'une ou de plusieurs bractées ; il est généralement persistant. La corolle est composée de cinq pétales onguiculés , inégaux , et a

reçu le nom de corolle papilionacée. L'un de ces pétales est supérieur, en général plus grand que les autres, qu'il embrasse et recouvre avant l'épanouissement de la fleur; il porte le nom d'étendard; deux sont latéraux, égaux et semblables, tantôt appliqués contre les deux inférieurs, tantôt ouverts, ce sont les ailes; deux enfin sont inférieurs, rapprochés l'un contre l'autre, de même forme, souvent soudés par leur bord inférieur; on les appelle la carène. Quelquefois la soudure des pétales est plus grande et ils sont tous les cinq réunis en tube par leur partie inférieure de manière à représenter une corolle monopétale, c'est ce que l'on observe entre autres dans plusieurs espèces de Trèfles et en particulier dans le Trèfle des prés. Les étamines, au nombre de dix, sont généralement diadelphes, c'est-à-dire soudées par leurs filets en deux faisceaux; l'un inférieur, composé de neuf filets, forme un tube fendu supérieurement; l'autre, supérieur, composé d'une seule étamine; rarement les étamines sont monadelphes; plus rarement encore elles sont entièrement libres et distinctes les unes des autres. Les anthères sont cordiformes ou globuleuses, à deux loges

s'ouvrant chacune par un sillon longitudinal. L'insertion des étamines et des pétales est, en général, périgynique dans un grand nombre de genres de la famille des Légumineuses, c'est-à-dire qu'elle se fait à la paroi interne du calice qui forme un tube quelquefois allongé, et au sommet duquel se fait l'insertion: mais un nombre non moins considérable de genres présentent une insertion évidemment hypogynique. Dans le genre *Dalea*, les ailes et les deux pétales inférieurs sont attachés à la partie supérieure du tube staminal.

L'ovaire , dont la forme varie beaucoup , est à une seule loge , et contient depuis une jusqu'à un nombre très-considérable d'ovules attachés à un trophosperme qui occupe la suture supérieure du fruit. Le style est plus ou moins allongé, oblique et formant quelquefois un angle plus ou moins aigu avec le sommet de l'ovaire. Le stigmate est simple, glanduleux, quelquefois accompagné d'un bouquet de poils plus ou moins volumineux. Le fruit est une gousse dont nous indiquerons plus loin l'organisation et les variétés.

2°. Cjîsalpiniées. — Le calice est à trois , quatre ou cinq divisions profondes, étalées, caduques :

la corolle se compose de cinq pétales inégaux ou quelquefois presque égaux , et ne formant jamais une corolle papilionacée. Quelquefois les pétales manquent entièrement. Les étamines, au nombre de dix, sont, en général , libres et distinctes; assez souvent plusieurs de ces étamines avortent ou sont stériles et à l'état rudimentaire. Le fruit est généralement une gousse.

5°. Mimosées. — Le calice est monosépale , tubuleux ou campanule, régulier, à quatre ou cinq dents ou à quatre ou cinq divisions quelquefois très -profondes , colorées et pétaloïdes. Il est accompagné extérieurement d'un calicule cupuliforme à quatre ou cinq dents, ou simplement d'une ou de plusieurs bractées régulières ou irrégulières. La corolle

manque. Les étamines sont extrêmement nombreuses , rarement au nombre de cinq ou de dix , monadelphes par la base de leurs filets ou libres et distinctes. Les anthères sont ordinairement globuleuses, didymes, à deux loges. L'ovaire est souvent stipité à sa base. Le fruit est une gousse. Le Caractère que nous venons de

tracer des Mimosées diffère de celui qu'on en donne généralement. Tous les autres botanistes décrivent les Plantes de ce groupe comme pourvues d'un calice monosépale et d'une corolle monopétale régulière. Mais nous croyons que cette manière d'envisager l'organisation des Mimosées est

fautive et contraire à ce que on observe dans les deux autres groupes de cette famille. En effet, le prétendu calice, que nous considérons comme un calicule, manque quelquefois ou du moins ne consiste qu'en une seule écaille ou bractée, ainsi qu'on le voit dans le *Mimosa pudica*; or, dans les autres groupes, nous avons fait remarquer que l'on trouve quelquefois en dehors du véritable calice une bractée calicinale.

Quant à la prétendue corolle monopétale régulière, elle nous paraît devoir être assimilée au calice. En effet, on n'a pas d'autre exemple de corolle monopétale régulière dans aucun des genres nombreux qui forment les deux autres sections. Quant à la corolle pseudo-monopétale de quelques espèces de Trèfle, elle ne peut être citée comme une preuve d'analogie, car la réunion des pétales par leur base en un tube n'a lieu que par l'intermédiaire du tube staminal, ce qui n'a pas lieu pour les Mimosées. Dans notre manière de voir, les Mimosées seraient donc apétales. Or, c'est ce qui a lieu pour plusieurs genres appartenant aux Papilionacées ou aux Césalpiniées.

Nous avons dit précédemment que le fruit des Légumineuses en général était une gousse ou légume; C'est même de cette singularité que ce groupe de Végétaux a emprunté son nom. Mais cette gousse offre

les différences les plus grandes , et c'est principalement d'après cet organe que sont établis la plupart des genres de cette famille. Ainsi généralement les gousses sont allongées, comprimées , uniloculaires , polyspermes et bivalves. Mais quelquefois elles sont globuleuses et monospermes ; d'autres - fois elles sont cylindriques et presque filiformes.

Dans certains genres, elles offrent un grand nombre d'articulations qui se séparent les unes des autres à l'époque de la maturité. Dans d'autres , elles sont partagées en deux ou en un très-grand nombre de loges par de fausses cloisons. Quelquefois l'intérieur des gousses est rempli d'une substance pulpeuse et charnue. D'autres fois elles restent indéhiscentes.

Les graines des Légumineuses sont ou globuleuses, ou lenticulaires, réniformes ou anguleuses. Leur tégument propre recouvre une amande qui tantôt se compose uniquement de l'embryon , et tantôt se compose d'un eudosperme charnu , quelquefois simplement membraneux, qui recouvre en totalité l'embryon.

Celui-ci a sa racine tantôt droite et tantôt recourbée sur la fente qui sépare les deux cotylédons. Les Légumineuses ne varient pas moins dans leur port et la disposition de leurs organes de la végétation, que dans ceux de la fructification. Ainsi depuis le Pois et la Lentille qui sont des Herbes annuelles jusqu'aux Robinia; aux Gymnocladus , etc., qui sont de grands Arbres , on trouve dans cette famille tous les degrés intermédiaires de grandeur et de durée. Les feuilles sont alternes , très - rarement opposées , articulées, simples ou le plus souvent composées et offrant tous les degrés et toutes les modifications possibles. Ces feuilles sont accompagnées de deux stipules, que l'on retrouve également à la base des folioles dans les feuilles composées. C'est surtout

dans cette famille que l'on observe ces mouvemens d'irritabilité si remarquables et si connus dans la Sen-

sitive , et ceux qui paraissent être sous l'influence de la lumière , et que Linné a désignés sous le nom de sommeil des Plantes. Dans les Mimosées, surtout celles de la Nouvelle-Hollande, les feuilles manquent et sont réduites à leur pétiole qui est dilaté , foliiforme, et ressemble tout-à-fait à une feuille simple, y. Acacia. Les Légumineuses peuvent présenter en quelque sorte tous les modes d'inflorescence. Ainsi leurs fleurs sont axillaires ou terminales, solitaires, gémées , fasciculées , en épis, en grappes ou en panicules.

Les genres de cette famille sont extrêmement nombreux. De Candolle , dans le second volume de son *Prodromus* , en compte 83, auxquels se rapportent plus de 3,000 espèces. Les botanistes ont donc dû chercher de tout temps à grouper ces genres pour en faciliter la recherche et la classification systématique. Ainsi , Jussieu, qui a décrit quatre-vingtdix-huit genres de cette famille (*Gen. Planl.*), les a divisés en onze sections dont les caractères sont, tirés de la régularité ou de l'irrégularité de la corolle, de la disposition des éla mines et de la structure de la gousse.

Robert Brown , dans ses *General Remarcls* , a divisé les Légumineuses en trois grands groupes , ainsi que nous l'avons nous-même exposé plus haut, savoir : les Mimosées , les Lomentacées ou Ceesalpiniées et les Papilionacées. Cette division a également été adoptée par Kunth dans le sixième volume des *Nova Gênera*. Ce Célèbre botaniste a de plus subdivisé les Papilionacées en plusieurs autres sections naturelles - A peu près à la même époque le docteur Bronn a publié une très-bonne dissertation sur les Légumineuses, ou il étudie les différentes modifications d'organisa-

tion que présentent leurs diverses parties et une classification naturelle des genres. Mais la classification la plus récente et à la fois la plus complète est celle què le professeur De Candolle a présentée dans le second volume de son Prodrumtts. Nous al-

Ions faire connaître cette classification eu indiquant les genres dont se compose chacun des groupes qui y ont été établis.

Dans le nombre des genres caractérisés et décrits par De Candolle , plusieurs sont nouveaux et établis par le savant professeur de Genève. Il divise la famille des Légumineuses en quatre sous-ordres , savoir: i° les Papilionacées; 2° les Swartziiées ; 3° les Mimosées; 4° les Caasalpiniées. Chacun de ces sousordres , mais particulièrement le premier et le dernier, est ensuite subdivisé en plusieurs tribus dont chacune offre des sous-tribus. C'est en multipliant ainsi le nombre des divisions et des subdivisions que le professeur De Candolle arrive à une classification , au moyen de laquelle on peut parvenir assez facilement aux genres excessivement nombreux qui forment cette famille. Voici l'énumération de ces genres :

Pr Sous-ordre. — Papilionacées.

ire Tribu : Sophorées.

My rosperrum , Jacq. ; Sop/iora , L. ; Edwardsia, Salisb.; Ormosia, Jadis. ; Virgilia , Lamk.; Macrotropis, D. C. ; A lia gy ris, Tourn. : Thermopsis, R. Brown; Baptisia, Vent.; Cyclopia, Vent. ; Podalyra, Lamk. ; Chorizema , Labill. ; Podolobium , R.

Brown ; Oxylobium , Andr. ; Callistacàys , Vent. ; Brackysema , R. Bv.; Gornpholobium , Smith; Burtonia , R. Brown; Jacksonia , R. Brown; Viminaria , Smith; Sphœrolobium, Smith; Aotus .

Smith; Dillwynia, Smith ; Eutaxia , R. Br. ; Sclewtliamnus , R. Br. ; Gastrolobium , R. Br. ; Euchilus , R. Br. ; Pulienœa , Smith ; Daviesia, Smith; Mirbelia, Smith.

2e Tribu : Lotées.

Génislées.

Hovea , Rob. Brown ;Plaiylobium , Smith ; Platyichilum , De launay ; Bossiœa , Vent. ; Goodia , Salisbury; Sco/tea , R. Br. ; Templetonia , R. Br.; Rafida, Thunb. ; ^asco«,De Cand. ; Borbonia , L. ; slchyronia, , Wcudl. ;

il ILiparia , L. ; Priestleya , DeCand. ;

1 1 Hallia , Thunb. ; Heylandia , D. C. ;

\(Crotalaria , L.; Hypocalyptus , Th.;

I) Viborgia , Sprengel ; Loddigesia , ^ Sims ; Diciilus , De Gand. ; Lebeckia , 'Thunb.; Sarcophyllum , Thunb.; . Aspalathus , L. ; Ulex , L. ; Staura- (cant/ius, Link ; Spartium, L. ; Gei nista , L. , Lamk. ; Cylisus , D. Cand.; . Adenocarpus , D. C. ; Ononis, L.; Rej quienia , D. C. , Leg. ; Ant/tyllis , L.

T rifoliées,

Medicago , L. ; Trigonella , L. ; Poi cociia, Serin g.; Melilotus , L.; İ7ijfolium, L.; Dorycnium, Tourn. ;

Lotus , L. ; Tetra'gonolobus , Scop. ;

Cyamopsis , D. G.

Clitoriées.

. Psoralea , L. ; Indigofera , L. ; Cytisus , L. ; Neurocarpum , Desv. ; Martiusia , Schult. ; Cologania , Kunth ; Galactia , Brown ; Odonia , Bertoloni ; Vilmorinia , D. C. ; Grona , Lour. ; Colutea , D. C. ; Otoptera , D. C. ; Pueraria , D. C. ; Dumasia , D. C. ; Glycine , D. C. ; Choetocalyx , D. C.

Galégées.

Petalostemum , Rich. ; Dalea , L. ; Glycyrrhiza , L. ; Galega , Lamk. ; Tephrosia , Pers. ; Amorpha , L. ; Eysenhardtia , Kunth ; Jussolia , Jacq. ; Milviteria , L. ; Lathyrus , Kunth ; Robinia , D. C. ; Poitea , Vent. ; Sabinia , D. C. ; Cotinella , D. C. ; Sesbania , Pers. ; Agali , Rhéed. ; Glottidium , Desv. ; Piscidia , L. ; Daubentonia , D. C. ; Coiylia , D. C. ; Cassipouina , Lamk. ; Ualimodendron , Fisch. ; Diphyssa , Jacq. ; Calophaca , Fisch. ; Colutea , R. Br. ; Spilocropis , U. C. ; Sutherlandia , Salisb. ; Lessertia , D. C. ; Sutherlandia , R. Br. ■

Astragalées.

Phaca , L. ; Oxytropis , D. C. ; Astragalus , U. C. ; Guldenstedtia , Fisch. ; non Neck. ; Bissierula , L.

3e Tribu : HÉDYSARÈES.

Coronillées.

Scorpitmis , L. ; Coronilla , Neck. ; Astrolobium , Desv. ; Ornithopus ,

Desv. ; Hippocrepis , L. ; Securigera , D. C.

Euhédysarées.

Dip/iaca , Lour.; Picletia, D. C; Orniocaipum, Bea uv. ; Amicia, Kunth; Poretia , Vent.; Myriadenus, Desv.; Z omia, Gmel.; Stylosanthes, Swartz; Adesmia , D. C. ; A'schynomene , L.; Smilhia, Ait.; Lourea , Neck.; t//-<zri'a, Desv.; JV icholsonia , D. G.; Ztesmodium , D. C.; Dicerma, D. G. ; Taverniera , D. G.; Hedysarum , L.; Onubrychis , Tourn.; Eleiotis, D. C.; Lespedeza, Rich., /'« Michx.; Ebenus , L.; Flemingia, Roxb.

Alhagèes.

Alliagi, Tourn.; Alysicarpus , Neck.; Bremon liera , D. C.

4e Tribu : Viciées.

Cicer, L.; 7<<7ia , Tourn.; Vicia, Tourn.; Er»um, L.; Pisum , Tourn. ; Lathyrus , L.; Orobus , L.

5e Tribu : Piiaséoi.ées.

A brus , L.; Sweetia, D. C; ^/acrantlms , Poir.; Rothia , Pers.; Teramnus , Browne ; A mphicarpœa , Elliot; Kennedy a , Vent.; Rliynchosia, Lour.; Fagelia, Neck.; Jfisteria, Nuttal ; Apios, Boerh.; Phaseolus , L.; Soja, Moench ; Dolielios , L.; T-'igna, Savi ; Labial , Adans.; Paihyrhizus, Rich.; Parochetus, Hamilt.; Dioclea , Kunth; Psophocarpus , Neck.; Canavalia , D. G.; cuna, Adans.; Cajanus, D. G.; L>upinus, L.; Cy lista. Ait.; Erylhrina , L.; /i//«Wy)/!ifl, Willd.; Butea, Roxb.

6e Tribu : Dalbehgiées.

Denis , Lour. ; Endesperrnum , PI uni ; Pongamia, Lamk.; Dalbergia , L.; Pterocarpits , L.; Drepanocarpus, Meyer; Ecastaphyllum, Rich.; Amerimnum, Browne; Z*/ya, Browne; Deguelia, Aublet.

Ile Sous-ordre. — Swaktziées.

Swarlzia, Willd.; Bap/ia , Al'zélius.

IIIe Sous-ordre. — Mimosées.

Entada, Adans.; Mimosa , Adans.;

Gagnebina, Neck.; Inga , Plum.; Schrankia , Willd. ; Darlingtonia , JJ. G.; Desmanthus , Willd.; Adenantha , L.; Prosopis, L.; Lagonychium, Bieb.; Acacia, Willd.

IVe Sous-ordre. — GassALPiNiÉES.

irc Tribu : GÉOFFREES.

Arachis,h. ; Voandzeia , DuPetit- Thouars; Pevaltea, Kunth ; Brongniartia, Kunth; And ira, Lamk.; Geoffroy a, Jacq ; Brownea, Jacq.; Pipterix , Schreb.

ae Tribu : Cassiées.

Moringa, Burm.; Gleditschia , L. ; Gymnocladus, Lamk.; A/wma, Lour.; Guilandina, J uss. ; Coul/eria, Kunth ; Cœsalpinia, Plum.; Poinciana, L.; Mezoneuron , Desf. ; Reichardia , Roth ; Hoffmanseggia , Cav.; Melanosticta , B.C.; Pomaria , Cav.; Homaloxylon, L.; Parkinsonia , Plumier; Cadia , Forsk.; Zuccagnia , Cav.; Ceratonia , L.; Hardwickia , Roxb.; Jonesia, Roxb.; Tachigallia, Aubl.; Baryxylum , Lour.; Moldenhavera , Schrad.; Humboldllia, Vahl.; Heterostemon , Desf.; Tamari/idi/s , L.; Cassia , L.; Labichea, Gaudichaud ; Metrocynia , Petit-Thouars :

Afze/ia, Smith; Schotia, Jacq.; Copai/era, L.; Cynometra , L.; Iritsia Petit-Thouars ; Eperua, Aubl.; Parivoa , Aubl.; Anthonota , Beauv.; Outea , Aubl.; P'ouapa , Aubl. ; Hymenœa, L.; Schnelta,

Raddi; Bauhinia, Plum.; Cercis, L.; Palovea, Aubl.; Aloexylon, Lour.; Amaranthus, Mutis; Bowdichia, Kunth; Crudya, Willd.; Dialium, Burm.; Codarium, Solaud.; Valaierca, Aubl.

3e Tribu : D'Étaieuées.

Vetarium, Juss.; Cordyla, Lour.

Genres obscurs.

Phyllolobium, Fisch.; Amphinomia, D. C.; Sarcodum, Lour.; Varennea, D. C.; Crafordia, Rafin.; Ammodendron, Fisch.; Lacarra, Spreng.; Harpalyce, Mocino; Diplaprion, Viv.; liuieria, Kunth.

Après avoir trace les caractères des

Légumineuses et des groupes qui y ont été établis, après avoir énuméré les genres qui composent chacun de ces groupes, il nous paraît nécessaire de dire quelques mots des Légumineuses considérées sous les rapports économique et médical. Cette famille, avons-nous dit dans notre Botanique Médicale, vol. II, p. 589, par le grand nombre de médicamens et de substances nutritives qu'elle fournit, mérite un intérêt particulier de la part du médecin et de l'économiste. En exposant les caractères de la famille, nous avons fait remarquer les différences souvent fort tranchées qu'elle présente; ces différences, nous les retrouvons également dans les propriétés médicales des Légumineuses et dans leur mode d'action sur l'économie animale. Eu effet, nous trouvons dans la famille des Légumineuses : 1° des médicamens purgatifs; 2° des substances toniques et astringentes; 3° des résines et des baumes; 4° des agens aromatiques et excitans; 5° des principes

sucrés ; 6° des matières colorantes; 70 des huiles; 8° des gommes ; 90 et enfin des matières nutritives.

La propriété purgative est celle que l'on observe le plus généralement dans les Légumineuses , et en même temps celle qui existe dans le plus grand nombre de leurs organes. Les feuilles et les fruits des *Cassia* *ubc— vata*, *C. acutifolia*, et *C. lanceolata*, forment les espèces de Séné du commerce. La pulpe douce et sucrée , contenue dans les gousses du Canéficier (*Cassia fistula* , L.) et du Caroubier, est un des laxatifs les plus doux; celle des Tamarins est légèrement acide , mais agit de la même manière.

Presque toutes les autres espèces de Casses possèdent cette vertu purgative, et dans les différentes contrées où elles croissent on les substitue au Séné d'Egypte. L'analyse chimique que Lassaigne et Chevallier ont faite du Séné de la Pal te nous a appris que son action purgative est due à un principe particulier, extractifornie , que ces jeunes chimistes oui nommé

tiCqthartine. Il serait curieux de re- Lichercher si cette substance existe ildans les feuilles du Baguenaudier qqui jouissent des mêmes propriétés, <• et qui souvent sont mélangées aux SSénés.

Les principes astringens ne sont ppas rares dans la Famille qui nous oceupe. La plupart des espèces du genre AAcacie, lorsque leurs gousses sont t encore vertes, fournissent un extrait dd'une saveur fort astringente, en ^grande partie composée de tannin; l'iels sont le Cachou et le suc d'Acaceja. C'est à celte classe qu'apparlieucnent encore le Sang-Dragon , le bois dde Campêche employé dans la tein- I ture , et qui , à cause de sa saveur ^astringente , a été recommandé par I les médecins anglais , comme un

^excellent tonique. Nous pourrions légalement citer ici le Pois-Chiche, à i cause de l'Acide oxalique qu'il exsu- (de naturellement , s'il n'était pas rationnel de le ranger parmi les subst ta n ces nutritives.

L'écorce d'un grand nombre de I Légumineuses a une saveur amère cl ; astringente , et jouit de propriétés t toniques. Les diverses espèces du 'genre Geoffrœa sont dans ce cas. On lies a employées soit dans le traitct ment des lièvres intermittentes, soit (comme anhelmintiques.

Si maintenant nous passons aux | principes résineux et balsamiques , i nous les trouverons abondanslHans [plusieurs Végétaux de celle famille.

I Les baumes du Pérou et de Tolu dé- (cotdent de deux espèces du genre ' Myroxylon ; la Résine Animé est [produite par \' Hymenœa Courbaril.

Plusieurs Légumineuses sont rei marquables par leur odeur forte et I leur saveur aromatique, et doivent

■ être placées parmi les agens excllans. I Les différentes espèces de Mélilot, le I Fénugrec , sont très -odorantes et < employées surtout comme sudorilit ques et délersives. La Fève Tonka ,

qui répand une odeur si agréable, est

■ la graine d'une Légumineuse américaine , nommée par Aublet Couma-

' rouria odorata. La racine de quelques

LEG a6çy

espèces est diurétique et sudorifique ; telles sont celles de *Burmannia* et d'*Astragalus* sans tige.

La racine de la Réglisse a une saveur douce, sucrée et mucilagineuse, que l'on retrouve aussi dans celle de *Y Abrus precatorius* en Amérique, qui porte le nom de Réglisse des Antilles et dont les graines luisantes et dures, d'un beau rouge, marquées d'une tache noire, servent à faire des colliers , des bracelets et d'autres oruemens. Cette saveur sucrée existe encore dans la racine du Trèfle des Alpes, dans les feuilles de l'*As— tragalus glycyphyllos* , etc. *Y Hedysarum* A Lliagi , qui croît en Egypte, se couvre d'une exsudation sucrée, que l'on recueille, et qui porte le nom de Manne Alhagi.

La gomme existe dans un grand nombre de Légumineuses , des genres *Astragalus* et *Acacia*. Ainsi la gomme Adragante est produite par les *Astragalus gummifer*, Labill. ; *Astr.*

creticus , L. ; et *Astr.* vents d'Olivier. La gomme Arabique et la gomme du Sénégal découlent spontanément des *Acacia vera* , *A. arabica* , *A. Sénégal* , et probablement de plusieurs autres espèces encore mal connues.

Nous faisons la même remarque à l'égard de l'huile grasse qui se trouve en abondance dans les graines de l'*Arachis* et du *Moringa uleifera*.

La famille des Légumineuses est riche en principes colorans. Le plus précieux de tous est , sans contredit , l'Indigo, que l'on retire des espèces du genre *Indigofera* , mais qui existe aussi dans d'autres Plantes de la même famille et même de familles différentes. Nous devons encore mentionner ici les différens bois de teinture, tels que le bois du Brésil et le bois de Sapan , produits

par deux espèces du genre *Caesalpinie*, le bois de Campêche par l'*Ilémaloxyon*, et le Santal rouge par le *Pterocarpus Santalinus*.

Ces différens genres appartiennent à la section des *Cœsalpiniées* et fournissent un principe colorant rouge.

Les diverses espèces de Genêt , aucontiaii e , donnent une belle teinte jaune.

270 LEI

La famille des Légumineuses n'est pas moins importante par le grand nombre de substances alimentaires qu'elle nous fournit. En effet, les graines de toutes les espèces de cette famille qui ont les cotylédons épais et charnus, sont en grande partie formées de fécule amilacée et servent utilement à la nourriture de l'Homme. Qui ignore en effet que les Pois , les Haricots , les Fèves , etc. , appartiennent à cette famille ?

Enfin , si nous récapitulons les différens matériaux qui existent dans les Légumineuses; si nous faisons attention aux différences qu'ils présentent dans leur nature et leur mode d'action , nous ne pourrions nous empêcher de conclure que cette famille s'écarte sensiblement des lois d'analogie dans les propriétés médicales, et que malgré des ressemblances assez grandes entre la nature de quelques-uns de ses produits , cette famille doit être comptée parmi celles qui s'éloignent des lois générales de l'analogie entre la structure des organes et les propriétés médicales.

* **LEIANITE.** min. Nom donné par Delaméthérie à une roche qui est le Polierschiefer des minéralogistes allemands. H y a réuni les Pierres à faux, lesquelles sont des roches mélangées de parties distinctes et de Tripoli. (G..N.)

* LEIBINITZIE. Leibnitzia. bot.

PHAN. Genre de la famille des Synanthérées , Corymbifères de Jussieu , et de la Syngénésie superflue , L. , établi par H. Cassini (Dict. des Se. Nat.

T. XXV, p. 420) qui l'a placé près du *Leria* dans la tribu des Mutisiées.

Voici ses principaux caractères : involucre ovoïde, cachant entièrement les fleurs , formé d'écaillés très-inégales , imbriquées , appliquées, étroites , oblongues- lancéolées , épaisses, coriaces, carénées, membraneuses sur les bords, obtuses et colorées au sommet; réceptacle large, plane et nu; calathide dont les fleurons du disque sont nombreux , hermaphrodites, à

LEI

deux lèvres, l'extérieure tridentée, M l'intérieure divisée en deux jusqu'à la base; ceux de la circonférence 9 presque sur un seul rang, bilobés 1 et femelles; akènes oblongs , comprimés, allongés en col, surmontés d'une aigrette composée de podes très-légèrement plumeux.

Le *Leibnitzia cryptogama* , H.

Cass. , *Tussilago Anandria* , L. , est une Plante herbacée qui croît dans les champs montueux près du fleuve Jénisséï en Sibérie. De sa racine s'élèvent immédiatement des hampes et des feuilles. Celles-ci varient de forme et de grandeur; les unes sont lyrées , les autres non lyrées. Les hampes, hautes de deux à trois décimètres , portent des calathides solitaires dont les folioles de l'involucre sont rougeâtres au sommet.

Cette Plante fut d'abord nommée Anandria par Siegesbeck , qui , n'ayant pas aperçu ses étamines, en tira un argument contre la théorie de la fécondation sexuelle. Cependant , quelques années plus tard, Tursen, un des disciples de Linné , publia, sous sa présidence , dans les Aménités Académiques , une dissertation sur cette Plante , oii il prouva l'existence des étamines , et proposa de la réunir au Tussilago. Linné inséra, dans son Hortus Upsaliensis , de nouvelles observations sur Y Anandria. Il prétendit que cette Plante, exposée au soleil et dans un terrain plus sec, changeait de caractères et qu'elle devenait semblable à l'espèce décrite par Gmelin [FL Sibirica, T. II, p.

145, t. 67, f. a). En conséquence il en lit deux variétés dépendantes , selon lui , de l'exposition plus ou moins chaude et de la nature du terrain.

Néanmoins l'auteur de la Flore de Sibérie fit connaître des observations toutes contraires à celles de Linné , et ajouta comme une preuve de plus en faveur de la diversité des deux espèces , la différence des contrées de la Sibérie qu'elles habitent. La Plante de Gmelin est indigène des environs d'Irkulsk et d'Okotsk. Elle a été adoptée comme espèce distincte par

LEI

\ Willdenow sous le nom de Tussilago lyrata , et par Cassini sous celui de Leibnitzia phoenogarna. Celui-ci a confirmé les observations de Tursen, relativement à la présence des étamines dans les Plantes de ce genre; > il est vrai qu'elles sont d'une petitesse extrême et analogues à celles d'une espèce d'Eupatoire , nommée par Cassini E. microlemon, en raison de l'exi-

guilé de ses organes mâles, y .] Bulletin de la Société Philomathique, 1822, p. 145. (G..N.)

LEICHE. Scymnus. pois. Sous- ; genre de Squale. V. ce mol. (b.)

* LEIGHIE.Z-e/^/a. bot. phan. H.

(Cassini a proposé, sous ce nom , un ! sous-genre des Helianthus , caractérisé d'après la structure de l'involucre 1 et de l'aigrette. Le premier de ces 1 organes est formé de folioles régulièrement imbriquées, appliquées, sur- 1 montées chacune d'un grand appendice ■ dice très-étalé, analogue aux feuilles. L'aigrette est composée de squamellules sur un seul rang , persistantes , dont deux grandes opposées , triquètres , filiformes , et les autres petites et en forme de paillettes. Ce sousgenre a, selon l'auteur, beaucoup 1 d'affinité avec le Pinguicula de Kunth. Il renferme les espèces suivantes : i° Leighia elegans , H. Cass. , qui est peut-être \ Helianthus squarrosus de Kunth (Noi>. Gêner, et Spec. Aiquin.

T. iv, p. 222, t. 377) ou l'H. linearis de Ca vanilles. On cultive cette Pianta au Jardin du Roi à Paris. 20. Leighia bicolor, Cass.; Helianthus angustifolius , L. et Michx. , espèce indigène de la Virginie. 3°. Leighia microphylla , Cass. ; Helianthus microphyllus , Kunth (loc. cit. T. iv, p. 220 , t. 375). Cette espèce a été trouvée au Pérou par Humboldt et Bonpland.

LEIMANTHIUM ou LEIMANTHIUM. bot. phan. Willdenow a constitué ce genre sur plusieurs espèces placées dans les genres Helonias et Melanthium par les auteurs.

LE

mille qui comprend les genres Stourne , Etourucau et Pique-Bœuf, dont les espèces se distinguent par le bec droit, très-entier, obtus à l'extrémité qui est un peu aplatie et renflée. (DR. .z.)

* LEINCHERIA et LEINKERIA.

bot. fhan. Scopoli et Necker ont substitué ces noms à celui de Roupala, employé par Aublet , et que Schröber, R. Brown et Kunth ont encore changé en celui de Rhopala. F~. ce mot. (g..N.)

LÉIOBATE. Leobatus. rois. (Rafinesque et Blainville.) V. Raik.

* LÉIOCÈRES. mam. Sous-genre d'Antilope. P. ce mot. (b.)

LEIODE. Leiodes. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Héléromères , famille des Taxicornes , section des Cras-sicornes (Latr. , Fam. Natur. du Règn. Anim.), établi par Latreille et ayant pour caractères : antennes découvertes à leur insertion ou n'ayant point la base cachée par le bord latéral et avancé de la tête, et terminées par une massue de cinq articles ; articles des tarses entiers; jambes épineuses; corps presque hémisphérique.

Ces Insectes avaient d'abord été confondus avec les Sphéridies qui sont des Pentamères ; Latreille en a , le premier, formé un genre propre. Illiger, n'ayant pas connaissance de son travail , a donné au même genre le nom H Anisotoma, et il y a compris les Phalacres de Paykull. Fabricius a réuni les Léiodes , les Phalacres et les Agathidies sous la même dénomination d'Anisotome. Ce genre , tel qu'il est restreint par Latreille, diffère de celui des Epi-trages de cet auteur par la position des antennes et par d'autres

caractères tirés des mandibules et des mâchoires; il s'éloigne des Tetra tomés , par les antennes qui, dans ceux-ci, ont la massue composée seulement de quatre articles. Les Léiodes ont les mandibules avancées au-delà du labre ; les palpes courts ; le dernier article des maxil-

LE

lares est presque cylindrique , et le même des labiaux presque ovoïde ; les mâchoires ont deux lobes dont l'externe étroit , linéaire et presque en forme de palpe.

Les Insectes de ce genre habitent les Champignons , les vieux bois et les écorces d'Arbres morts. Ils sont assez rares. L'espèce qu'on trouve en Fiance est :

Le LÉIODE FERITUGINKUX , L. ferruginea, Latr. ; Anisoloma ferruginea, Fabr. Il est entièrement rouge , jaunâtre ; les élytres-sout striées. P~. , pour les autres espèces, Fabricius, Panzer et Latreille. (g.)

* LÉIODERMA. bot. crypt. (Persoon.) Sous-genre de Tremelles. V.

ce mot. (b.)

* LÉIODERMES. rept. oph. Famille établie dans notre Tableau er-

fiétologique , et qui ne contient que r genre Cœcilie sur les confins des Ophidiens et des Batraciens. La peau non écailleuse en est le caractère, (b.)

* LÉ IODINE. *Leiodina*. inf.

Genre de Microscopiques , formé de quelques espèces détachées du genre *Cercaire* , si incohérent dans *Millier*. De l'ordre des *Gymnodés* , il fait partie de la famille des *Urodiés*. Déjà avancées dans l'organisation , les *Léiodines* ont une ouverture buccale bien prononcée , mais cette ouverture est dépourvue de cirres. Une queue bifide termine le corps qui se compose d'une sorte de fourreau lâche et comme musculaire., se contractant ou s'allongeant au moyen d'anneaux peu distincts , mais qui ne leur ont pas moins mérité chez d'anciens micrographes le nom de *Chenilles aquatiques*. Nous en connaissons trois espèces : i° *Leiodina Crumena*, N. ; *Cercaria Cru mena* , *Miill.* , *Inf.*, tab. 20, f. 4-6 ; *Encycl.* , pl. 9, f. 19-21. Ventrue, ayant sa partie antérieure ouverte en forme de cône , sans aucune trompe ni organe qui en sorte, mais avec un organe interne , antérieur et cordiforme toujours agité, qui paraît servir à la respiration et non à la déglutition , com-

LEI

me le dit *Miiller*. Elle habite l'eau de mer. 20. *Leiodina vermicularis* , N. ; *Cercaria vermicularis* , *Miill.*, pl. 20, f. 8, 20; *Encycl.*, pl. 9, f. 30-32. Des eaux douces ou croît la *Lenticule* et dans les infusions d'écorce. 3°. *Leiodina furcipata* , N. ; *Cercaria forcipata* , *Miill.* , pl. 10, f. 21-23 ; *Encycl.* , pl. 9, f. 53-35. Ces deux dernières projettent hors de l'ouverture buccale une sorte de trompe rétractile et bifide , mais nue et sans apparence de cirres ni d'organes rotatoires. (b.)

LÉIOGNATHE. *Leiognathus*. pois.

Le genre formé sous ce nom par Lacépède ne saurait être conservé , selon Cuvier. L'espèce qu'y rapportait le continuateur de BufFon pourrait bien n'être qu'un double emploi de son Cœsio Poulain , et doit rentrer dans le geure Zée. V. ce mot. (b.)

* LEIOLOBIUM. bot. phan. De Candolle {Prodr. Syst. Feget. univ., 2 , p. 343) a ainsi nommé la seconde section du genre He-dysarum. V.

Sainfoin. (g..n)

* LÉIOPALjEA. bot. crypt.

(Acharius.) Sous-genre de Verrucaires. V. ce mot. (b.)

* LEIOPHYLICA. bot. fd/ln. Nom donné par De Candolle (Prodr. Syst.

Keget. , 2 , p. 37) à la seconde section qu'il a établie dans le genre P/iyiica. V. ce mot. (g..n.)

* LÉIOPHYLLE. *Leiophyllum*.

bot. phan. Ce genre, de la famille des Rhodoracées et de la Dé-candrie Monogynie , L. , a été établi parPersoon pour le *Ledum tkymifolium*.

Plus tard,Desvaux(Journ. de Bot.) l'a nommé *Dendrium*, et-Pursh *Ammyrsine*. Mais le nom de Persoon doit être préféré , à cause de son antériorité. Voici quels sont ses caractères :

le calice est à cinq divisions très-profondes et régulières ; la corolle est comme campanulée, formée de cinq pétales simple-ment conliguspar leur base. Les élamines, au nombre ne dix ,

sont dressées et saillantes; les anthères sont presque globuleuses , à deux loges s'ouvrant par un sillon

LKI

1 longitudinal. L'ovaire est prismatique, appliqué sur un disque hypogyne lobé. Il offre trois loges contenant chacune un grand nombre d'ovules attachés à l'angle interne. Le style est un peu oblique, terminé par un stigmate très-petit, à trois mamelons obus. Le fruit est une capsule ovoïde, (presque globuleuse, terminée à son sommet par le style persistant, enveloppée en partie par le calice et s'ouvrant en trois valves par le sommet.

Ce genre a été formé, ainsi que nous l'avons dit précédemment, aux dépens du genre *Ledum* dont il diffère, 1° par son calice à cinq divisions [profondes; 2° par ses anthères globuleuses s'ouvrant par un sillon longitudinal et non par un pore; 3° par son ovaire à trois loges et son style (oblique; 4° par sa capsule à trois loges et à trois valves s'ouvrant par le -sommet et non par la base.

Une seule espèce compose ce genre, c'est le *Leiophyllum thymifolium*, IPers., ou *Ledum thymifolium*, Ait., *Arctostaphylos thymifolia*, Pursh. C'est un petit Arbrisseau ayant le port d'un *Idiosma*, rameux, élevé d'environ un pied, dont les feuilles éparses sont petites, obovales, obtuses, coriaces, glabres et luisantes sur les deux faces.

Les fleurs sont très-petites, blanches, pédunculées, réunies en grand nombre dans les rameaux. Il croît dans les lieux humides de l'Amérique septentrionale, (a. II.)

LÉIOPOMES. pois^ Famille ctalibliepar Duméril dans l'ordre des Ho- Mohranches, sous-ordre des Thoraciques, que cai aclérisent les ventrales :iau-dessous des pectorales ; un corps (épais, comprimé; les mâchoires garâmes de dents et les opercules lisses.

Ii)cs espèces maritimes la composent et y sont distribuées dans les genres UQhéline , Labre, Girelle, Rason , CGhromis, Plésiops, Ophicéphale , (Clicilion, Chéilodiptère , Hofogym-mose , Monodaclyle , Trichopode , ' Osplnonème , Hiatule , Coris , Gompphose, Filou, Plectorhynque, Pogo- ' iiiiias,Sparc, Diptérodou et Mulet, (b.)

tome IX

* LEIOPOTERIUM. bot. fuan.

Nom donné par De Candolle (Prodr.

Sysi. P^eget. , 1 , p. 54g) à la première section qu'il a établie dans le genre Foterium. P~. ce mot. (g..n.)

* LEIOREUMA. bot. cbypt. {Lichens.) L'Opegrapha Lyellii{English Botan. , vol. 27, tab. 1876) a servi à établir ce genre. Escbweiler, qui en est l'auteur {Systema Lic/wnitm, p. t3), le caractérise de la manière suivante: thalle crustacé , attaché, uniforme (souvent coloi é); apotbécion allongé, linéaire oblong, immargé , sous-ramuleux ; périthécium latéral , plane, élargi, faisant corps avec la marge formée par le thalle ; nucléum à quatre faces , à disque plane, canaliculé (noir , voilé de blanc dans la jeunesse; ibèques grandes dans plusieurs espèces , ovales-cylin-

driques , en anneaux. Le genre Leioreuma est le deuxième genre de la première cohorte des Graphidées. (a. f.)

LEIOSTOME. pois. (Lacépède.)

V. SciKNE

* LEIOSİROMA. bot. crypt.

(Champignons.) Nom proposé par Fries pour remplacer celui de Thelep/to/a, généralement employé par les botanistes. (a. F.)

* LİİOTRIQDES. mam. Première section du genre Homme. Fr. ce mot.

LEISTE. Leisius. jns. Nom donné par Frœlich au genre Pogonophoré de Latreille. V. ce mol. (g.)

* LEJKUNIA. bot. cbypt. {Hépatiques.) Ce genre a été créé dans les Annales des Sciences physiques de Bory de Saint-Vincent et Drapiez, par mademoiselle Libertqui, à Malmédy, s'occupe avec succès des parties les plus difficiles de la botanique. Il est fondé sur deux Jungermannes parfaitement figurées dans le recueil précité; l'une était le Jungermannia ininitissima de Hooker, l'autre le Jungermannia serpitifolia de Dickson, qui toutes deux croissent dans les Ardeunes sur l'écorce des Arbres. (a. r.)

a 74 LEM

LÉLÉBA.. bot. PHAN. Syn. de Cay-Hop, V. ce mot, à Amboine. (b.)

* LE M A. pois. On ne saurait reconnaître les deux Poissons d'Amboine auxquels Ruysch a donné ce nom de pays. (b.)

LEM A. Lema. ins. Genre établi par Fabriciùs , et correspondant à celui de Griocèrc. V. ce mot. (g.)

LÉMANÉE. *Lernanea*. bot. crypt.

(Chaodonnées.) Genre que nous avons institué en 1808 dans les Annales du Muséum d'Histoire naturelle (T. xu , p. 177, pl- 21J aux dépens des Conferves de Linné , et dont nous avons alors bien mal saisi les caractères.

Trompés par une figure de Vaillant qui induisit en erreur les botanistes , et par des observations faites trop légèrement sur le sec , nous avons cru à l'existence d'un filament interné et n'avions pas vu le mucus dont les filamens des véritables Lémanées sont remplis , et qui lui-même, pénétré de ramules formées d'articles ovoïdes, présente au microscope l'organisation d'un Nosloc, d'un Cbœtophore , ou des ramilles de Batrachosperme. On dirait l'une de ces Plantes intérieurement ensérée dans la substance membraneuse et nue dont se forment les fjlamens rigides et non muqueux des Lémanées, qu'on pourrait considérer comme des Bati achosperines retournés. Nous ignorons absolument le mode de reproduction de ces Plantes.

Vaucher a été comme nous induit eu erreur par des êtres parasites, et particulièrement par la présence de l'une de nos Audouielles , quand il a parlé de bourrelets etde verticilles. Mais il avait mieux que nous démêlé la structure interne et caractéristique dont nous devons la démonstration à l'infatigable Mougeol. Agardh adopta notre genre Lémauée , et nous pensons que les raisons qui ont déterminé Lyngbye, d'après l'exemple de Link, à

changer son nom pour celui de *Nidularia*, sont insuffisantes. Le nom du savant et modeste Lémau mérite bien qu'on le conserve dans la botanique, et parce qu'il existe un

LEM

naturaliste étranger , Lehmann , auquel Sprengel dédia un genre *Leirmaanea*, nous rie voyons pas pourquoi notre compatriote n'obtiendrait point un honneur dont la différence d'orthographe ne ferait pas un double emploi de nom. Nous persévérons donc à maintenir le nom de Lémanée, en reportant aux *Batrachospermes* nos jL. *batrachospennosa* , *sertularina* et *Dillenii*. Mieux observé aujourd'hui, notre genre demeurera composé du *Lernaea Corallina* ,N., qui est le *Con/è/vajluvia/ilis* de Linné, du *L. incuivata* qui fut le *Confc/va lurulosa* des auteurs , et du *L.*

Jucina , espèce fort rare et certainement très-distincte de toutes les autres , encore qu' Agardh nous ait paru la confondre avec notre *Corallina*.

Agardh , dans son *SjsCerna*, en ajoute deux espèces sous les noms de *subtilis* et de *variegata* : la première originaire des rivières d'Ostro-Gothie , et la seconde des lleuves de l'Amérique septentrionale, (b.)

* LÉMANINES. bot. piian. Sousgenre de *Batrachospermes*. V. ce mot. (b.)

LÉMANITE. min. Jade de Saussure, des bords du lac Léman. V Jade, (g. del.)

LE MI A. bot. phaN; Ce genre, proposé par Vandelli (F/or. husit.

Bras. , p. 55, t. 2) ne diffère pas du Poitulaca de Linné, V. Pourpier.

LEMING ou LEMMING. mam Espèce et sous-genre de Cam-pagnols. Tr. ce mot. (b.)

LEMMA. bot. crypt. {Marsilèacées.) Quelques auteurs ont voulu substituer ce nom emprunté de Théophrasle à celui de Mar^ilée, Marsilea On ne peut guère deviner ce qu'était le Lcm-ma des anciens; il paraît que c'était quelque Fucacée ou Ulve croissant sur lesécaille^ d'Huître, (b.)

L EM MER-GEYE II . ois. Syn. de Gypaète barbu. F. Gypaète. (b.)

LEMMING. mam. V. Leming.

LEM

LEMNA. bot. pu an. V. Lenticule.

LEMNESCIA. bot. phan. Schreber et Willdcnow ont inutile-ment propose- ce nom pour remplacer celui île Vantanea em-ployé par Aublet. V.

ce mot. (c.N.)

* LEMNIA. hept. batb. La Grenouille qui porte ce nom dans Séba , et que cet auteur dit être la nourriture habituelle d'un Ser-pent du même nom , n'est pas déterminée, (b.)

LEMNISQTJE. hept. oph. Espèce du genre Couleuvre. Pr. ce mot. (b.)

LÉMONIATIS. min. Ln Pierreprécieuse ainsi nommée chez les anciens, not/unment dans Pline , est l'Emcraude selon Wallerius. (B.)

LÉMOME. Lernonia. bot. phan.

Sous ce nom générique l'abbé Pourret {Act. Tolus. , vol. 5, p. ïï>) a sé-

[>aré les espèces de Gladiolus dont e périanthe est campanule, le tube court, légèrement courbé, les divisionspre.-que égales et ovales. Pcrsoon u'a fait de ce genre qu'une simple division du Gladiolus. y. Glayeul.

* LEMOSTIENE. Lemosthenus.

INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques Thoiaciques, établi par Bonelli et réuni par Latreille (Règn. Auim.

T. m) au genre Dolique. F. ce mol.

LÉMOULEMON. INS. A Cayenne , on désigne sous ce nom un Insecte qui paraît appartenir à la famille des Capricornes. (g.)

LÉMDR. mam. V. Lémuriens et Maki.

L É M U R I E N S . Lemurini. mam.

Seconde famille de l'ordre des (Quadrumanes établie par Geoffroy Saint- Hilaire : elle comprend les genres Indri, Maki, Loris, Nyctièbe , Galago , Tarsier, et en général tous ces Animaux connus sous le nom vulgaire de faux Singes, à cause de

LEN a75

leurs nombreux rapports avec la première famille de Tordre, ou colle des vrais Singes. On a déjà, dans ce Dictionnaire , remarqué plusieurs fois que Linné , le législateur de la zoologie, guidé par un sentiment exquis des rapports des êtres , avait comme deviné tout ce qu'une étude approfondie a révélé à ses successeurs. La famille des Lémuriens correspond en effet exactement au genre *Lernurde* Linné , de même que celle des Singes à son genre *iimia*. Les Lémuriens se distinguent facilement par leurs dents incisives qui ne sont plus , comme chez les Singes , au nombre de quatre à chaque mâchoire, par l'ongle de leur deuxième doigt des pieds de derrière, qui est en alêne, et par leurs narines terminales et sinueuses, d'où le nom de *Strepsirrtini/is* donné aussi à cette famille par Geoffroy Sainl-Idaire.

IS. G. ST.-H

LENA-NOEL. bot. phan. C'est-à-dire Bois de Noël , et qu'on prononce Légua. Nom du *Convolvulus scoparius* qui donne le bois de Rose aux Canai ies. (B.)

LENDOLA. rois. L'un des synonymes vulgaires d'Exocet, r. ce mot.

* LENGON. bot. rn an. On ne peut reconnaître de quel fruit gros comme une Noix veut parier sous ce nom Flacourt, dans sa relation de Madagascar. Il noircit l'intérieur de la bouche et parfume l'haleine, (b.)

* LENGUADO. pois. (Delaroche.) Syn. de Fleuronecles Sol a , L., aux îles Baléares. V. Pleuronecte. (b.)

LENIDIE. Lenidia. bot. phan. Le genre de Dilléniacées , ainsi nommé par Du Petit-Thouars , avait déjà été nommé Jf'ormia\>av Hoth. Ce dernier nom doit être conservé, f^.
Wormie.

* LENOK. pois. (Pallas.) Espèce de Saumon des torrens de la Sibérie orientale. (b.)

LENS. iNs. r. Lente.

LENS. bot. ni an. V. Lentille.

LENTAGINE. bot. ru an . L'un des noms vulgaires du Viburnum Ti/ius. V. Viorne. (b.)

LENTAGO. bot. dian. Espèce du genre Viorne dans Linné. Césalpin donnait ce nom au Viburnum Tinus.

LENTE, pois. (Risso.) Le Spams Ce/tih Nice. (b.)

LENTE. Lens. ins. Nom donne aux œufs du Pou de la tête, de l'Homme. /'. Pou. (g.)

* LENTE, bot. ru an. (Garidel.) Le Mvdicago falcata dans quelques cantons du midi de la France, (b.)

LENTIBULARIA. bot. piian.

Syn. d'Utrieulaire. V. ce mot. (b.)

* LENTIBULAP.IÉES. Lentibulariœ. bot. phan. Petite famille appartenant à la classe des Plantes dicotylédones monopétales

hypogyues , établie par le professeur Richard, adoptée par Poileau et Turpin (El. Paris , i, pi 26) et par R. Brown [Prurfr.

Fior. Nov.-Holland., 1, p. 42g). Cette famille, qui ne se compose que des seuls genres Ulriculaire et Pinguiculaire jusqu'alors placés dans les Priinulacées , offre les caractères suivans : le calice est persistant, monosépale, à deux ou trois divisions disposées en deux lèvres ; la corolle est mouopétale , irrégulière , éperonnée, à deux lèvres. Les étamines , au nombre de deux, sont insérées tout-à-fait à la base de la corolle et incluses. Les anthères sont terminales et uniloculaires. L'ovaire est sessile , à une seule loge , contenant un grand nombre d'ovules très-serrés les uns contre les autres sur un trophosperme globuleux, central et dressé. Le style est simple et très-court ; le stigmate est membraneux, composé de deux lamelles inégales. Le fruit est une capsule uniloculaire, polysperme, ayant un trophosperme ou placenta central et s'ouvrant soit par son sommet au moyen d'une fente longitudinale , soit comme une boîte à savonnette, c'est-à-dire par le moyen d'un opercule.

Les graines sont très-petites, dé-

pourvues d'endosperme et renferment [I] un embryon ordinairement in~ I divisé comme monocotylédon.

Les Plantes qui composent cette famille sont de petites Herbes qui vivent I au milieu des eaux ou dans les lieux I humides, tourbeux ou inondés. Leurs feuilles sont disposées en rosette à la base des tiges , ou caulinaires , divisées en lobes capillaires , radicaux et vésiculeuses. Cette petite famille se distingue surtout des Primulacées par son port , par ses étamines qui ne sont pas

opposées aux lobes de la corolle et ses graines dépourvues d'endosperme. (a. b..)

LENTICULA. bot. piian. Syn. de Lenticule. V. ce mot. (b.)

LENTICULAIRES ou PIERRES LENTICULAIRES, moll. Nom que l'on donne quelquefois aux Lenticulites et aux Nummulites. On donne particulièrement le nom de Pierres lenticulaires à celles qui contiennent un grand nombre de ces corps agrégés par un circuit solide. (d..h.)

LENTICULE. Le/nna, bot. piian.

Il n'est personne qui n'ait remarqué à la surface des eaux dormantes dans les fossés et les marres , ces petites efflorescences d'un vert clair, ayant à peu près la forme de Lentilles , et que pour cette raison on nomme vulgairement Lentilles d'eau. Ce sont autant de petites Plantes phanérogames qui forment un genre particulier dans la famille des Nayades, et qui a reçu successivement les noms de Lenticula , Hydrophace et Lemna. Comme ces Plantes sont d'une grande ténuité et que l'organisation de leurs fleurs, à cause de leur extrême petitesse, est encore fort peu connue, nous croyons devoir la décrire avec quelque détail, l'ayant étudiée complètement dans toutes ses parties, dans une des espèces que l'on rencontre le plus communément.

La Lemna gibba , L., S/k i 577, est une petite Plante annuelle , flottante à la surface des eaux où elle ressemble en quelque sorte à des petites feuilles lenticulaires dépourvues de

; tige et de pétioles; tantôt elles sont isolées , tantôt elles sont réunies et groupées. Ces petites frondes qui composent toute la Mante , rem-] plissent à la fois les usages de tiges et de feuilles.

Elles sont , ainsi que nous l'avons dit, lenticulaires, très renflées et gibbeuses à leur face inférieure qui est séparée de la supérieure.

Elles sont bordées par un rebord mince et saillant.

Vers la partie la plus étroite de la fronde on observe de chaque côté du rebord une fente ou fissure par laquelle on voit sortir soit une autre fronde , de laquelle il doit en sortir une troisième un peu plus tard , soit les Heurs et quelques racines qui descendent perpendiculairement.

Les fleurs sont monoïques et renfermées d'abord complètement dans une spathe sessile, monophylle, comprimée, irrégulièrement cunéiforme, mince, membraneuse et comme réticulée. Cette spathe se fend sur l'une de ses faces pour laisser saillir les étamines et le style. Chacune d'elles renferme une fleur femelle, qui se compose d'un pistil unique et d'une à deux fleurs mâles également composées d'une seule étamine. Ces étamines ou fleurs mâles offrent un filet cylindrique plus long que le pistil, terminé à son sommet par deux anthères juxtaposées, globuleuses, uniloculaires et s'ouvrant chacune par un sillon longitudinal. Le pistil offre un ovaire ovoïde comprimé, à une seule loge contenant de deux à cinq ovules dressés. Le style est gros, cylindrique, terminé par un stigmate tronqué et concave. Le fruit est une petite capsule arrondie, quelquefois comprimée, contenant une ou plusieurs graines et restant indéhiscence. Ces graines qui sont ovoïdes-arrondies, marquées d'une suture saillante ou raphe, se composent d'un tégument propre assez épais et d'un embryon monocotylédon, qui forme à lui seul toute la masse de l'amande. Plusieurs autres espèces de ce genre croissent également dans nos eaux douces; telles sont les *Lemna trisulca*, *L. mi-*

nor, *L. polyrrhiza* qui est la plus grande, et *L. arhiza* qui est plus petite.

LENTICULINUS et LENTICULITES. moll. Ce genre, que l'on confondait autrefois avec les Camérines ou Nummulites, a été créé par Lamarck pour de petits corps lenticulaires polythalamiques qui ne diffèrent des Nummulites que par les cloisons qui s'étendent jusqu'au centre de la coquille et par l'ouverture qui reste visible lorsque celle des Nummulites disparaît constamment. Ces caractères ont paru suffisants à la plupart des zoologistes pour conserver les deux genres et les placer dans des familles différentes. Une étude comparative des espèces de ces deux genres, et surtout de celles qui ne sont pas pétrifiées, aurait fait apercevoir une structure absolument semblable dans les deux genres; si quelques légères différences se remarquent quelquefois, elles se lient toujours par des nuances insensibles. Nous traiterons de ces corps au mot Nummulites. (D.H.)

* LENTIGO. moll. Klein {lithod.

Ostrac. , p. 100) propose de réunir dans le genre qu'il nomme ainsi, toutes les Coquilles dont les tubercules aplatis et arrondis ressemblent plus ou moins à des Lentilles. De pareils genres ne méritent pas même d'être examinés. (d.h.)

LENTILIER. Lenticulites. pois.

Syn. d'Achire. V. ce mot. (b.)

LENTILLAC. pois. L'un des noms, vulgaires de l'Emission, espèce de Squale. J.~. ce mot. (y.)

LENTILLADE. pois Ce nom s'applique, sur les côtes de la Méditerranée, à plusieurs espèces de Raies, particulièrement à

l'Oxyrinque (b.)

LENTILLE. Lens. bot. pïian. Ce genre, établi par Tournefort , a été réuni par Linné aux espèces d'Ers (Ervum) dont il ne diffère que par sa gousse plus comprimée , à une ou deux graines lenticulaires et non globuleuses. V. Ers. (a.r.)

S LEO

LENÏILLEN. bot. phan. L'un des noms vulgaires du Lathyrus sativus. V. Gesse. (b.)

LENTISQUE.Z,e/z/«ci».BOT phan.

Espèce du genre Pistachier. On a quelquefois fort improprement appelé l'individu mâle, Lentisque du PjÉHou, et le Phyllirea angustifolia

LENTJSQUE BATALID OU FAUX IjEN- TISQUE. (B.)

LENTOS. bot. phan. (Gouan.) Svn. vulgaire d'Ononis Natrix. V.

Ononiue. (b.)

*LENZINITE. min. (John.) Substance blanche, d'un aspect mat et terreux , tendre , légèrement translucide et opaline, douce au toucher et happant à la langue. Pesant spécifiquement 2,10, elle est composée, suivant John de Berlin , de Silice , 37 ; Alumine, 37, et Eau, 25. Elle est regardée par Brongniart comme une variété de sou espèce Collyrite. On la trouve en morceaux isolés à Kall , dans l'Eifel. (g. iikl.)

LEO. mam. F". Lion au mot Chat.

LEOCARPUS. bot. crypt.

(Champignons.) Petits Champignons presque globuleux , munis d'un péricarpium simple , membraneux ou crustacé , fragile , et qui s'ouvre pour donner passage aux spores ; celles-ci sont entassées sur des filaments fixés intérieurement et à la base. Ce genre a été créé par Linl^é qui , quelque temps après , l'a réuni au l'hysarum dont il est en effet très-voisin, ainsi que du Diderma V. ces mois.

LEOCROCOTTE. mam. La crédule antiquité donnait ce nom à un Animal fabuleux qu'on supposait provenu de l'accouplement de l'Hyène mâle avec la Lionne. (u.)

* LÉODICE. Leodice. annel.

Genre de l'ordre des Néréidées, famille des Eunices, établi par Savigny (Syst. des Annelides , p. 1 3 et 48) aux dépens du genre Eunice de Cuvier qu'il a érigé en famille, et ayant pour caractères distinctifs ; trompe

LEO

armée de sept mâchoires , trois du côté droit, quatre du côté gauche; les deux mâchoires intérieures et inférieures très-simples. Antennes découvertes : les extérieures longues , filiformes; les moyennes et l'antérieure de même. Branchies pectinées.

Front à deux ou à quatre lobes. Ce genre offre plusieurs traits de ressemblance avec ceux de Lysidice, d'A— glaure et d'OEnone; il diffère essentiellement des deux derniers par un nombre

moindre de mâchoires , et il se distingue des Lysidices par la longueur des antennes, les branchies pectinées et le front lobé. Un examen plus attentif fournit encore d'autres caractères : le corps des Léodices est linéaire , cylindrique , composé de segments courts et nombreux; le premier segment n'étant point rétréci ni saillant sur la tête, et le second étant plus court que le troisième. Les pieds sont dissemblables , c'est-à-dire qu'on voit des cirres tentaculaires , allongés, subulés , non articulés , rarement nuls , et des pieds proprement dits ambulatoires , pourvus de cirres ; ces pieds ont deux faisceaux distincts, outre un paquet de soies coniques , qui sort de la base du cirre supérieur; les soies sont simples ou terminées par un appendice.

Quant aux cirres ils ont plus ou moins de saillie ; les supérieurs sont plus pointus, les inférieurs sont généralement gibbeux à leur base extérieure. La dernière paire de pieds diffère essentiellement des autres , en ce qu'elle est convertie en deux filets terminaux. Les branchies sont filiformes , légèrement annelées, pectinées d'un côté, surtout vers le tiers ou le milieu du corps ; les dents qui les composent sont longues, filiformes , et décroissent par degrés de la base au sommet de la tige commune ; elles sont tournées du côté de la rame. La tête est plus large que longue , rétrécie par derrière , divisée par devant en quatre ou deux lobes , parfaitement libre, et découverte ainsi que les antennes. Les yeux sont grands et situés entre les antennes

LEO

i mitoyennes et les antennes extérieures. Les antennes sont complètes, | plus longues que la tête; les mitoyennes grandes, filiformes, composées i quelquefois d'articles grenus; Lim- | paire exactement semblable aux mitoyennes, plus longue; les exté-

rieu- : res ressemblant de même exactement : aux mitoyennes, plus courtes. La I bouche offre une trompe qui ne dépasse pas le fiont , et qui est pourvue de mâchoires, au nombre de sept, trois à droite et quatre à gauche ; les extérieures s'appliquant complètement sur les intérieures dans le repos. Les deux premières , à commencer par les intérieures ou les postérieures , sont semblables l'une à l'autre, étroites , avancées, non dentées, pointues , crochues à leur bout , exactement opposées et articulées sur une double tige plus courte qu'elles; les secondes sont encore presque semblables entre elles , larges , aplaties , obtuses, profondément crénelées, opposées, ou à peu près , et articulées sur le dos des premières , dont elles ne dépassent pas le bout lorsqu'elles sont fermées ; les troisièmes sont demi-circulaires, concaves, profondément crénelées •> celle du côté droit est plus petite, plus finement crénelée, plus rentrée que sa correspondante , et située aussi un peu plus haut , presque vis-à-vis la quatrième et dernière mâchoire du côté gauche , qui est également demi-circulaire , crénelée et courbée en voûte. La lèvre inférieure est beaucoup plus large

Îue la première paire de mâchoires.

es mâchoires si compliquées cl la double tige qui les supporte , ne répondent visiblement, suivant Savigny , qu'aux deux mâchoires supérieures des Aphrodites ; la lèvre , par sa position , serait l'analogue de leurs mâchoires inférieures. Savigny décrit huit espèces qu'il range dans deux tribus, de la manière suivante :

f Deux cirres tenlaculaires derrière la nuque. Cirres supérieurs de tous les pieds, beaucoup plus longs que les rames , peu ou point dépassés par les brauchies.

LEO 379 ire Tribu : Leodicœ siinpiccs.

La LEODICE GIGANTESQUE, L. gi-

gantea , Sav., ou VEunic.e gigantea , Cuv., qui est la même es-
pèce que In Nereis apliroditois de Pallas (Noua A et. Vetrop. T. n
, p. aag , tab. 5 , fig. 1-7), est la plus grande des Annelides
connues; son corps est long de quatre pieds et davantage. On la
trouve dans la mer des Indes.

La Leodice antennée , L. antennata, Sav. (ouvrage d'Egypte ,
pl. 5 , fig. 1); elle est très-commune , sur les côtes de la mer
l\ouge, dans les cavités des Madrépores , des Coquilles , etc.

Les autres espèces de cette tribu sont : les Leodice gallica ,
Sav.; L.

nortvegica , Sav., ou la Nereis norwegica de Linné; L. pi/mata
, Sav., ou la Nereis pinnàta de Millier; et L.

hispanica, Sav.

■ff Point de cirres tentaculaires.

Cii res supérieurs aussi courts ou plus courts que les rames ,
dépassés de beaucoup par les branchies.

2e Tribu : Leodicœ marphysce. "

La Leodice opaline, L. opalina, Sav., ou la Nereis sanguinea de
Montagu (Traris. Lirm. Soc. T. xi , p.

26, tab. 3, fig. 1); on la trouve sur les côtes de l'Océan.

La Leodice tubicole, L. tubicola , Sav. , ou la Nereis tubicola de
Millier (Zool. Dan., part. 1, page 60, tab.. 18, fig. 1-6). Elle a été

trouvée dans les mers du Nord , et offre cette particularité remarquable d habiter constamment des tubes solides et transparens comme de la corne.

(abd.).

LEONCİTO. mam. Ce nom signifie proprement Lionceau en espagnol, il paraît que les habitans de l'Amérique méridionale l'ont appliqué à une petite espèce de Singe. V.

Tamarin. (h.)

LEO NIE. Leonia. bot. tiian.

Genre de la Pentandrie Monogynie, L., établi par Ruiz et Pavon [F/or.

Feraï», et C/til. 2, p. 69, t. 322) 5et

aSo LEO

ainsi caractérisé : calice Irès-courl, à cinq dents arrondies, scarieuses sur les bords et caduques ; corolle six fois plus grande que le calice , à cinq pétales concaves et obovales; urcéole membraneux, très-petit, à cinq dents , ebacune surmontée d'une anthère biloculaire; style très -court, terminé par un stigmate aigu ; baie ou drupe globuleuse, à plusieurs loges monospermes. Le professeur De Jussieu (Ann. du Mus. d'Hist. Nat. , i5, p.

349) pense que ce genre doit être réuni au Theophrasta , et par conséquent qu'il doit prendre place à la fin de la famille des Apocynées.

Le Leoniglycicarpa, Ruiz et Pav. , loc: cit., est un Arbre de douze à quinze mètres de haut, qui croît dans les forêts des

Andes du Pérou. Son tronc est cendré; ses branches, formant une cime épaisse, sont couvertes de feuilles alternes , très-grandes , ovales, oblongues, acuminées , coriaces, très-entières, fortement veinées en dessous , luisantes supérieurement. Les fleurs sont disposées en grappes ou en panicules axillaires, et munies de bractées très-petites, ovales et membraneuses. (G. .N.)

LEOMCENIA. bot. piian. Scopoli et Necker [Elem. Bot-, 784) ont donné ce nom générique à une Plante rapportée au Fotheigil-layAY Aublet , et que l'on doit, selon Jussieu, placer dans les Mélastomées. (g..n.)

LEONICEPS. mam. (Klein.) Syn.

de Pinche. (B.)

LEONOTIS. bot. phan. Persoon (Enchirid., 2, p. 1 27) a donné ce nom à une division du genre Phlumis, caractérisée par la lèvre supérieure de la corolle très-longue , diessée , concave, l'inférieure très-courte, 1 ri Ode et marcesemte. Cette section a été élevée au rang de genre par R. Brown {Prodr. Tlor. Nov.-Holl. et in Hort.

Kety., 2e édit. , 5, \>. 4og) qui, en outre, a formé aux dépens des Phlutnis un troisième genre nommé Leucas.

Le Leunolis correspond à l'ancien genre Leonurus de Tournefort. Il se

LEO

compose de trois espèces originaires du cap de Bonne-Espérance et des Indes-Orientales, savoir: i° Leono-?

lis *Leonurus* , ou *Phi. Leonurus* , L. ; 5° *L. Leonolis*, ou *Phi. Leonotis* L.; et *L. nepetifolia* ou *Phi. nepeti- Julia*, L. V. , pour plus de détails sur ces Plantes remarquables par leur beauté, le mot *Piii^omidjl*.

LEONPICE'. *Leonlice*. bot. f-ian.

Genre de la famille des *Berbéridées* , composé d'un petit nombre d'espèces herbacées vivaces, qui croissent en Orient ou dans l'Amérique septentrionale. Leur calice est caduc , composé de six sépales disposés sur deux rangs et alternativement plus petits; leur corolle de six pétales ovales et dépourvus de glandes , mais munis sur leur onglet chacun d'une petite écaille ; les étamines au nombre de six ont les filets très-courts, l'ovaire libre est surmonté d'un style ovoïde , allongé, court, oblique, qui termine un stigmate simple. Le fruit est une capsule vésiculeuse, ovoïde, mince et membraneuse, à une seule loge contenant trois à quatre graines globuleuses insérées au fond de la capsule, qui est tantôt indéhiscente, et tantôt se rompt irrégulièrement. Les graines se composent, outre le tégument , d'un endosperme charnu , creux dans son centre et contenant un embryon dressé.

Les *Léontices* ont ordinairement une souche charnue , tubéreuse , d'où s'élèvent des feuilles radicales pétiolées, divisées en lobes nombreux. Leur lige porte une ou plusieurs feuilles. Leurs fleurs forment des épis ou des panicules. Le professeur Richard , dans la Flore de Michaux, avait retiré de ce genre le *Leonlice thalictroides* , pour en faire un genre particulier sous le nom de *Caulophyllum*. Mais ce genre, qui a été adopté par Willdenow et Nuttall, ne l'a pas été par De Candolle qui en fait simplement une section du genre *Léontice*.

La Plante nommée par Linné Leonice Leontopelaloides , n'est autre

LEO

; chose que son Tacca pinnatifida.

* LÉONTICOIDES. bot. phan.

;Nom donné par De Candolle (Syst.

, Veget. Mat. , a , p. 114) à la pinière : section du genre Corydalis , laquelle i renferme seulement les Corydalis verticillaris et Corydalis oppositifolia , i indigènes de la Perse et de l'Asie-Mineure. (g.n.)

LÉONTOBOTANOS. bot. phan.

! Syn. d'Orobanche. V. ce mot. (b.)

LEONTODON. bot. phan. V.

1 Lion-Dent.

LÉONTODONTOIDÉESouFAUX] LION-DENTS, bot. phan. Première .Section établie par De Candolle (Syn., |p. 258, et Flor. Fr. T. IV, 17) dans le 1 genre Hieracium , si nombreux en (espèces. V. Epiphyrisme. Ce nom est 1 renouvelé de Micheli et de Séb. Vaillant. (b.)

* LEONTONYX. bot.phan. Genre de la famille des Sauranthées , Coirymbifères de Jusseu , et de la Synigée superflue, L., établi par H.

(Cassini (Dict. des Se. Nat.,vol. 25, p. 466) qui l'a ainsi caractérisé : invo- Ucre oblong , formé de folioles im- briquées, ap-

pliées, oblongues, lancéolées, coriaces, membraneuses, terminées par un appendice oljlong , ttubulé , arqué en dehors , roide , épais eet coriace; réceptacle plane et nu ; ccalatbide oblongue, composée de 1 fleurons égaux, nombreux, réguliers, Ihermaphrodîes , offrant à la circon- Iférencce trois ou quatre fleurs femel-, lies , à corolle plusgrèle et tubuleuse ; oovaires cylindriques, ornés de papil- Ues , surmontés d'une aigrette longue cet formée de poils légèrement plunmeux dans leur partie supérieure. Les ccalathides nombreuses forment uncappitule irrégulier, entouré d'un involucre de bractées foliacées. Ce genre, ^constitué aux dépens du Gnapltalium lie Linné, a de grands rapporta avec celui-ci, ain- si qu'avec le Leontopoiium, autre démembrement du Gnaoha- lium ; il se rapproche également ■ les Helicliirysum. f^. ces mots pour

LEO 281

la comparaison des caractères génériques.

Les deux espèces qui composent ce genre sont : 19 Leontonyx tumentosa , Cass. , ou Gnap/talium sqttairosun , L. ; a" L. colo- rata, Cass., ou Gn.tinctum , ihunb. Elles croissent au cap de Boune-Espérance. (g..n.)

LEONTOPETALON ou LEONTO- PETALUM. bot. phan. C'était le nom employé par les anciens botanistes pour désigner la Plante de l'Italie et de l'Orient à laquelle Linné donna celui de Leontice Leontypetalum. Tournefort l'avait admis comme nom générique , et il y avait réuni le Cltrysugonum de Dioscoride , mais la dénomination de Leontice quoique postérieure a prévalu. Le mot de Leontopetalum est employé par De Candolle (Syst. f'e-

get. Mat., 2, p. 24) pour désigner la première section de ce genre. (G..N.)

♦ LÉONTOPHTALME. *Leontophtalmum*. bot. phan. Genre de la famille des Synanthérées, Corymbifères de Jussieu, et de la Syngénésie superflue, L. , établi par Willdenow (Magaz. der nat. freurtd. zu Rerl. 1 . Ja/ir. 1807, p. 140) et ainsi caractérisé par Kunth (Nou Gêner, et Spec.

Plant, œquin. T. IV, p. 296) : involucre accompagné à sa base de quatre bractées coriace.* et inégales, composé de folioles imbriquées , oblongues, arrondies au sommet , scarieuses et striées; réceptacle garni de paillettes lancéolées, carénées, un peu plus longues que l'ovaire, et découpées en ileux , trois ou quatre dents ; cal itbide dont les fleurons du centre sont nombreux , tubuleux „ hermaphrodites , et ceux de la circonférence en languettes cunéiformes et femelles; akènes surmontés d'uneaigrette formée de paillettes nombreuses , linéaires, subulées, scaïeuses, blanchâtres, planes , égales et persistâmes. Kunth a placé cegenre dans la tribu des Hélianthées à laquelle Cassini l'a également rapporté. Le Leonlophtalmum peruvianum , Kunth, loc. cit. , tab.40g, er\

a 8a LEO

est l'unique espèce. Elle a été rapportée du Pérou par Humboldt et Bonpland. C'est un Arbuste à feuilles opposées , entières , coriaces , à fleurs terminales, solitaires, jaunes et longuement pédonculées. (g..n.)

LËONÏOPODE. *Leontopociium*.

UOT. phan. Sous ce nom, employé par les anciens pour désigner des Plantes de familles diverses, parmi lesquelles on remarque quelques Synanthérées , Persoon avait formé un sous-genre parmi les Gnaphalium. Eu 1817, R.

Brown proposa de l'élever au rang de genre, mais il n'en donna point les caractères. Nous allons exposer les plus essentiels parmi ceux qui ont été tracés par Cassini d'abord dans le Bulletin de la Société Philomathique, de septembre 1818, puis rectifiés dans le Dictionnaire des Sciences Naturelles, vol. 45, p. 473 : involucre arrondi , composé de folioles inégales , imbriquées, appliquées, ovale-oblongues , coriaces , lisses extérieurement , glabres intérieurement , pourvues d'une large bordure scarieuse et irrégulièrement découpée; réceptacle hémisphérique , profondément alvéolé, à cloisons charnues, tronquées au sommet ; calathide globuleuse dont les fleurons du disque sont réguliers , mâles avec un rudiment d'ovaire; les fleurons de la circonférence tubuleux et femelles. Le faux ovaire des fleurs mâles est privé d'ovule , oblong, grêle , un peu pubescent , pourvu d'un bourrelet basilaire , surmonté d'une aigrette longue, composée de poils légèrement plumeux. L'ovaire des fleurs femelles de la circonférence a une forme à peu près semblable à celle du faux ovaire, seulement il est obovoïde et comprimé; son aigrette est également longue et composée de poils soudés par la base, légèrement plumeux dans leur partie supérieure. Le capitule de fleurs offre au centre une calathide qui est sessile, renferme dans son milieu un grand nombre de fleurons, et n'a qu'un seul rang de fleurs femelles, tandis que les calathides ex-

LEO

érieures sont portées sur de courts t

pédoncules , que les fleurons de leur I
 disque sont peu nombreux , et que i
 ceux de la circonférence forment plu- '
 sieurs rangées. En proposant d'éta- i
 blir le *Leontopodium* , R. Brown l'a- *
 vait placé entre le genre *gentiana* «
 où il avait été confondu par Gaertner, 1
 et le genre *Gnaphalium*. Mais quand 4
 ce dernier eut été subdivisé de nou- p
 veau par Cassini , les démembremens i »
 qui en ont résulté , tels que les Léon- t
 tonyx, *Filago* , etc. , présentèrent sur- l
 tout de grandes affinités avec le genre B
 en question. Le *Leontopodium* fait II

partie de la tribu des Inulées, et ne a

se compose que d'un petit nombre si
 d'espèces. On en comptait cinq dans i
 le sous -genre formé par Persoon, k

mais R. Brown et Cassini n'admettent que les deux espèces suivantes : 1
 1 o *Leontopodium alpinum*, Cass., Filago *Leontopodium*, L. ; *Antennaria* *Leontopodium*, Gaertn. ; *Gnaphalium* *Leontopodium*, Pers. Cette plante est herbacée, cotonneuse et remarquable par les trois bractées, dont une très-grande, qui entourent le capitule des fleurs. Elle est assez abondante sur les sommets des Alpes, des Pyrénées et du Jura. 20. p
 Le *Leontopodium sibiricum*, H. a Cass. ; *Gnaphalium leontopodioides*, Pers., a été confondu avec la précédente espèce, mais il s'en distingue, surtout par son capitule composé, seulement de trois calathides, par ses bractées linéaires, lancéolées, et par ses aigrettes plus grandes et

plus fortes. Cette espèce croît en Sibérie, près du lac Baïkal. (g. .N.) J{
 LÉONTOSÈRE. min. On ne connaît plus la Pierre précieuse ou l'Aga-kthc, à laquelle les anciens donnaient *
 ce nom, laquelle, selon quelques-uns, avait la propriété « de vaincre la rage des bêtes féroces, » et selon le Hcrédule Pline, de chasser les Scorpions. (b.) ii
 LÉONTOSTOMON. bot. rii.vN. S (Gesner.) Syn. de l'Ancolie des jardins. (G--N.)
 LÉONURE. Leonurus. bot. phan. [

LEO

Genre de la famille des Labiées et de la Didymie Gymnospermie, L., ainsi caractérisé par R. Brown [Prodrom.

Flor. Nov. - Holland., p. 504 ; et in Aiton Hort. Kew., 2e éd., vol. 3, p. 1405) : calice à cinq dents; corolle dont la lèvre supérieure est entière, l'inférieure à trois découpures, celle du milieu indivise; anthères à lobes [parallèles et rapprochés; stigmates à deux divisions égales. Le Leonurus est très-voisin des genres Phlomis, Leucas et Leonotis, car il n'en diffère essentiellement que par la structure du stigmate qui, dans ces der-

niers , n'offre qu'une très-courte division supérieure, et par le rapprochement des lobes des anthères, lesquelles, au contraire , sont très-rapprochées dans les genres que nous venons de citer. Tournefort avait consacré sous le nom de *Leonurus* un genre différent de celui dont nous parlons ici et qui a été établi par Linné. Ce genre de Tournefort est maintenant le *Leonotis* de Persoon «et Robert Brown. K. ce mot. C'est sans doute ce qui a engagé Lamarck, dans la première édition de la Flore Française, à rétablir | pour celui-ci le nom de *Cardiaca* , . anciennement admis par Tournefort.

Moench l'a subdivisé en trois genres 1 nommés *Cardiaca*, *Chaiturus* et *Panzeria*; mais les deux premiers ne sont • considérés par De Cailholle (Flore 1 Française , 2e édit.) que comme de ; simples sections.

Environ dix espèces de *Leonurus* ont été décrites par les auteurs. Ce ; sont des plantes herbacées , assez élevées, et qui croissent pour la plupart (dans l'Europe orientale et la Russie .- asiatique. L'espèce suivante est la plus remarquable.

Le Léoniste Cardiaque , *Leonurus Cardiaca* , L. , vulgairement -Agripaunie , est une Plante haute de .six à neuf décimètres et même davantage lorsqu'on la cultive. Sa tige , un

feu rameuse , porte des feuilles pétioolées, d'un vert foncé en dessus, les inférieures larges , presque arrondies et partagées en trois lobes princi-

LEO 285

paux dentés ou incisés sur les bords.

Les supérieures sont plus étroites, découpées en lobes simples et pointus ; enfin celles qui occupent le haut de la tige sont quelquefois entières.

Les fleurs d'un rouge clair, mêlé de blanc, forment des faisceaux trèsdenses en forme de verticilles dans les aisselles des feuilles. La lèvre supérieure de la corolle est velue. Cette Plante croît dans les lieux incultes et le long des haies de l'Europe. Son nom de Cardiaque vient de ce qu'elle était employée autrefois pour guérir la cardialgie des enfans. (G. .S.)

LÉOPARD. *Leopardus*. mam. Espèce du genre Chat. Pf. ce mot. (b.)

LÉOPARD, moll. V. Bouche d'Argent et Turbo. Les marchands de Coquilles donnent aussi ce nom à une Porcelaine ainsi qu'à un Cône.

* LEO PO LDI NIE. *Leopoldinia*.

bot. piian. Genre de la famille des Palmiers, et de la Monoecie Hexandrie , L., nouvellement établi par Martius (Gen. et Sp. Palm. Brasil., p. 58, t. 5 -i et 53) qui l'a ainsi caractérisé : fleurs monoïques rassemblées sur un même régime paniculé et irréguliers , sessiles dans de petites fossettes , et accompagnées de bractées ; spathe nulle. Les fleurs mâles sont pourvues d'un calice à trois folioles imbriquées , d'une corolle à trois pétales , et de six étamines. Les fleurs femelles ont un calice al une corolle , comme dans les mâles, un ovaire t ri— loculaire , des stigmates sessiles , excentriques. Le fruit est une baie drupacée , sèche , à fibres réticulées , ne contenant qu'une seule graine mpnie d'un albumen égal, et d'un embryon latéral et presque basilaire. Le Palmier , sur lequel ce enre a été constitué, est indigène u Brésil. Sa tige,

revêtue d'un réseau de fibrilles, n'est pas très-élevée ; son bois est tendre , rougeâtre. Il a des frondes pinnées , non épineuses , un régime très-rameux , couvert d'un, duvet ferrugineux. Les (leurs sont

a84 LEP

petites, rougeâtres, et les fruits d'un vert jaunâtre. (o. n.)

LEORIS. mam, V. Loris.

LEOTIA. rot. crypt. {Champignons.) Hill est le créateur de ce genre conservé avec des modifications par tous les mycologues. Persoon , dans sa Mycologie Européenne , le caractérise ainsi: chapeau ovale ou orbiculaire dont le bord élevé entoure le stipe. Cet auteur décrit neuf espèces dont voici les principales : 1° *Leotia drainons*, Pers. , charnue (grande), roux-cannelle, à chapeau orbiculaire, convexe. Cette Plante se trouve dans les pineraies, en Allemagne et en Suisse; elle croît sur la terre et se groupe circulairement. Le chapeau des jeunes espèces est sousvisqueux , pâle-livide, de trois à quatre lignes de largeur; à marge sous-ondulée; le stipe est couleur de suie ; à base noirâtre. 2°. *Leotia Clavus*, Pers.; chapeau assez grand , hémisphérique, jaune-rouge ; stipe fuligineux, verdâtre ou sous-olivâtre , atténué en dessous; la substance en est un peu ferme; le chapeau sous-globuleux , assez grand comparativement à la grandeur des stipes ; celui-ci est lisse, couvert de quelques squammes en fort petit nombre; il noircit par la dessiccation. Mougeot et Nestler l'ont trouvé sur le bois de Sapin, au bord des ruisseaux.

Le genre *Leotia* de Hill , qui comprenait plusieurs *Helvelles* et des *Pezizes* , a été réuni au premier de ces genres par quelques auteurs.

D'autres botanistes l'ont partagé et ont créé comme genres les trois principales coupes ou sous-genres formés primitivement par Persoon, savoir : *Mitrula*, *Leotia* et *Verpa*.

* **LEPACHYS.** bot. phan. Sous ce nom, Rafinesque (*Journ. de Physique*, août 1819) a établi un nouveau genre de la famille des *Synanthérées*.

Les caractères qu'il lui a imposés sont trop vagues pour qu'on puisse le distinguer du *Liudbeckia*, aux dépens duquel il a été formé. H. Cas-

LEP

sini propose d'en faire une section de ce dernier genre, sous le nom de *Lepachys* ou *Obelistus* (autre dénomination employée par Rafinesque I pour le même genre), section qui serait caractérisée par l'absence de l'aigrette. (C...).

* **LÉPADELLE.** *Lepadella*. inf. J Genre de la famille des *Brachionides*, dans l'ordre des *Crustodés*, dont les caractères sont : test univalve en carapace, indifféremment denté, ou échancré par derrière; organes digestifs obscurs, mais rapprochés de la partie antérieure quand ils sont distincts, les ciliaires ne formant pas de *J* rotifères radiés complets; queue terminale bifide. Ce genre faisait partie des *Brachions* de Millier mais ne pouvait demeurer confondu sous un même nom avec des espèces bivalves ou utriculaires, non plus qu'avec des *Anourelles*, ou espèces sans queue, car une queue ne laisse pas que d'être un caractère fort considérable, lorsqu'elle s'articule déjà, ce qui marque une complication d'organisation im-

portante à signaler. Les Lépadelles vivent dans les eaux douces, parmi les Infusorifères et les Charagines. Protégées par une petite carapace translucide, elles y nagent avec rapidité à la manière des petits Crustacés. Le 1, *Brachionus lamellaris*, Müll., p. 340, (tab. 47, fig. 8-11, Encycl., pl. 27, , fig. 22-21 ; le *Trichoda cornuta* , « Müll., p. 208, tab. 30, f. 1-3, Encycl., pl. 15, f. 24-26, et le *Brachionus paterula*, Mail., p. 541, pl. 48, f. 18-19, [Encycl., pl. 27, f. 26-00, sont les espèces qui peuvent le mieux donner l'idée de ce qu'on doit entendre par une Lépadelle. (R.) »

LÉPADITES. m 1 1 1 . 1 foss. V. Ba-j!

LANE

LÉPADOGASTRE. *Lepadogaster*. [pois. Genre foie mé par Gouan , adop- .

té par tous les ichthyologistes , placé par Cuvier dans la famille des Disco- . boles, de l'ordre des Malacoptérygiens Subbranchiens , et par Dninénil , dans sa famille des Pléctoptères , de l'ordre des Téléobranches. Ses caractéristiques

LEP

Les Lépades sont dans l'ampleur des pectorales les descendues à la face inférieure du tronc , où elles prennent des rayons plus courts, se replacent un peu en ; avant et s'unissent l'une à l'autre sous la gorge par une membrane transversale : se dirigée en avant ; une autre membrane transverse dirigée en arrière, adhérente au bassin, elle se prolonge ; géant sur les côtes pour s'attacher au corps, leur tient lieu de ventrales. Du reste le corps est lisse et

sans écaillage; la tête est large et déprimée, le museau saillant et extensible; les opercules sont peu fendues, garnies de quatre ou cinq rayons. Les Lépadogaster sont de petits Poissons maigres qui n'ont qu'une dorsale nageoire vis-à-vis une anale pareille. Leur intestin est court, droit, sans coecum; la vessie natatoire manque; cet appendice, dit Cuvier, ils n'en nagent pas moins avec vivacité le long des rivages. Us sont voisins des Cycloptères. Les espèces que nous en connaissons sont réparties en deux sous-genres.

f. Port-Ecuelle de Cuvier, Lépadogaster de Lacépède, "Lepadogaster, Gouan, où la membrane représentant les ventrales règne circulairement sous le bassin et forme un pli concave, et chez lequel, d'un autre côté, les os de l'épaule forment en arrière une légère saillie qui complète un second disque avec la membrane qui unit les pectorales. Les plus se trouvent près de nos côtes.

* Où la dorsale et l'anale sont distinctes de la caudale.

Le Gouanien, Lepadogaster Gouanii, Lacép., Poiss. T. I, pl. 34, f. 3-4; le Port-Ecuelle, Encycl. Poiss., pl.

66; (fig. 556; Lepadogaster rostratus de Schneider; Poisson d'une forme baroque, avec deux sillons déliés sur le dos; le corps verdâtre, couvert de petits tubercules bruns, avant la tête en cœur, plus grosse que le corps, sur le front de gros yeux se voient en dessus deux taches brunes en forme de croissant. Cette espèce atteint de dix pouces à un pied de

long , et se tient dans les galets des rivages du golfe de Lyon et de Gênes.

Le Lépadogastre Balbisien figuré par Risso, pl. 4, fig. g , et le Lepado- ■ poster Canduliiàu même auteur , petit Poisson qui n'a guère que trois pouces , complètent celle section.

** Où les nageoires dorsale, caudale et anale n'en font qu'une.

Le Lepadogaster Tfilldenowii , fort bien figuré par Risso, pl. 4, f. 10, t: ès-petil Poisson de la mer de Nice, dépourvu d'appendice aux narines, est la seule espèce connue de cette section. La couleur de son dos est celle de la feuille morte, nuancée de brunâtre avec de très-petits points rouges.

ff Gomésoces , Gobiesox de Lacépède, qui n'ont point ces doubles rebords par lesquels les ventrales et les pectorales forment un double disque. Us ont une seule dorsale, et leur anal >•, distincte de la caudale, est com te. On en connaît trois espèces :

Le Testah, Gobiésoce de Lacépède, T. il, pl. 19, f. 1; Cyclopterus nudus? L.

Le Lepadogaster dentex de Schneider , Poisson peu connu , médiocrement représenté par Lacépède, d'après un dessin de Plumier; originaire des rivières de l'Amérique méridionale; le Cyclopterus bimaculatus de Pennant, boi.clicr à double tache, Encycl. Pois. , pl. 86 , fig. 555 , très-petite espèce des côtes d'Angleterre, cl le Cyclopterus littoreus de Schneider, complètent ce sous-genre. (b.)

LEP A IN THES. Lepanthes. bot.

PIIan. Genre de la famille des Orchidées , établi par Swartz (l'ior.

1 nd. -Occident. , 5, p. 1 557) pour quelques espèces auparavant placées dans le geuie Epidendrum , dont elles ditl'èrent par les caractères suivans ; les trois divisions extérieures du calice sont ovales , acuminées , un peu concaves, étalées et soudées ensemble par leur base ; les deux intérieures sont très-petites, difformes , rapprochées du gynostème. Le la-

5286 LEP

belle est nul ; mais le gynoslème qui est cylindrique, présente deux petites ailes falciformes, placées à son sommet ou à sa base ; le stigate est une petite fossette glanduleuse située au-dessous de l'anthère ; celle-ci est terminale, operculée, à deux loges contenant chacune une seule masse pollinique solide et globuleuse. Le fruit est une capsule pédicellée , arrondie et trigone. Ce genre, encore assez imparfaitement connu, nous paraît avoir de grands rapports avec le Stelis. Il se compose de petites Plantes parasites croissant sur l'écor- Ce des autres Arbres. Leur tige est simple , courte , monophylle ; les (leurs très-petites , disposées en un épi qui naît de la gaine de la feuille. Dans sa Flore des Indes- Occidentales , Swartz décrit quatre espèces de ce genre, observées par lui à la Jamaïque. Ces quatre espèces avaient d'abord été signalées par le même auteur comme faisant partie du genre Epidendre , dans le Prodrome de sa Flore. (a.r.)

LÉPAS. môll. Nom scientifique des Balanes dans Linné, et nom vulgaire et marchand des Patelles. V.

Balane et Patelle. Les marchands de Coquilles nomment LÉpas en bateau, le Fa/ella ruseica ; Lépas fendu, Y Einarginula fis-

sur; LÉPAS DE Magellan, le *Fissurella picta* ; LÉ- Pas en treillis, le *Fissurella græca*, etc. (b.)

LÉPECHINIE. *Lepechinia*. bot.

phan. Genre de la famille des Labiées et de la Didjnamie Gymnospermie , L. , établi par Willdeuow {Enumer. HorC. Berol., m 21) qui lui a donné pour caractères essentiels :

un calice dont la lèvre supérieure est bifide , l'inférieure divisée en trois lobes presque égaux ; deux étamines écartées. Ce genre, qui a été réuni à l' *Horminum* de Linné par Persoon, se compose de deux espèces , savoir :

Lepechinia spicala et *L. clinopodifolia*. Celle-ci croît en Sibérie ; la première, qui était cultivée au jardin de Berlin , et dont Willdenow a donné

LEP

une bonne figure, a été rapportée du Mexique par Humboldt et Bonpland.

* LEPIA. bot. phan. Nom donné par De Candolle à la cinquième section de *Lepidiurn*. V. Lépidier.

Desvaux (Journ. de Bot. , 5, p. 165) 5, s'en était servi pour désigner un genre 4 composé d'espèces appartenant, pour [la plupart, à cette section'.

Dans Hill (E.rot. , n. 20) ce nom est L synonyme de *Zinnia pauciflora* , L.

LEPIC AUNE. bot. phan. Lapey- \ rouse (Hist. abrégée des Plantes des 1 Pyrénées) a donné ce nom à un genre sll de la fa-

mille des Syuantbérées, établi ,|(antérieurement par Mœnch sous ce- i lui de Catonia. De même que ce dernier auteur, il lui donnait pour types 1 les .Hieracium blattarioides et am- t plexicaule , L. ; mais il y faisait aussi 1 entrer plusieurs autres espèces à'Hie- ^ racium , tels que les H. intybaceum , grand ijlorum , prunelloefolium , etc.

Ce genre a été adopté par Cassini, qui en a exclu plusieurs de ces es— If pèces et l'a restreint aux H. blatta- \ riuides et grandiflorum. Ne lui trou- / vanl aucune affinité avec les Eper- fi vières , il l'a placé entre le Barckhau- a s/a et le Crépis. A l'article Eper- I v ière (V. ce mot), nous avons ex- o primé l'opinion universellement re- li eue sur ce nouveau genre. (g..n.) {

* LÉPICÈNE. Lepicena. bot. \ phan. Le professeur Richard a don-] né ce nom aux deux écailles les plus p extérieures de chaque épillet dans la . famille des Graminées. C'est la mê- 1 me partie que Linné nommait calice, Jussieu glume , et Palisot de Beauvois baie. La Lépicène contient une , ' deux ou un nombre plus ou moins ' considérable de fleurs. En général 11 elle est formée de deux écailles ou valves; mais quelquefois elle ne se « compose que d'une seule. Enfin cet | organe peut offrir un grand nombre „ de modifications clans sa forme , sa [consistance, sa longueur, relativement aux fleurs qu'il recouvre , la j présence ou l'absence de soies ou ,

LEP

d'à i êtes. Ces diverses modifications i ont été mises en usage par les agios- 1 tographes pour l'établissement des t genres dans la vaste famille desGrai minées. V. ce mot. (a.b..)

LÉPID AG ATHYS. bot. phan.

t Genre de la famille des Acanthaceées et de la Didymie Augiosperniée, IL., proposé par Willdenow (Species Plant. T. III, p. 400) qui l'a ainsi caractérisé : calice polyphylle imbriqué; corolle dont la lèvre supérieure est très-petite, l'inférieure tripartite; (Capsuleiloculaire. Ce genre, très-voisin des Acanthes, a été constitué sur une Plante des Indes-Orientales dont les échantillons n'étaient pas en bon état. Aussi a-t-il besoin d'une

■ révision attentive avant d'être admis (définitivement. Le *Lepidagathis crisitata*, W., a une tige ligneuse, des feuilles opposées, sessiles, linéaires, obtuses et très-enlières; ses fleurs sont agglomérées en capitules. (g.n.)

* LÉPIDAPLOA. Bot. phan. C'est le nom donné par Cassini à un des groupes qu'il a formés dans le genre *Yserouia*. Il lui assigne, pour le différencier essentiellement des *Peruvia* proprement dits, un involucre à l'orbe d'écaillés dont les extérieures ont le sommet étroit, subulé et nul- l'écaille colorée, tandis que, dans ces

■ derniers (P. Novas-Urb. 148, etc.), les écailles intérieures de l'involucre ont le sommet arrondi, large et coloré. Ce sous-genre se compose d'une douzaine d'espèces indigènes de l'Amérique méridionale. V.

Vehnonie. (O.N.)

* LEIHUIASTRUM. bot. phan.

5 Sous ce nom, De Candolle a désigné la septième section du genre *Lepidium*. V. Lépidier. (g.n.)

* LÉPIDIE. *Lepidia*. annel., Savigny (Syst. des Anim., p. 46, note) propose ce nom pour désigner un nouveau genre qu'il

suppose pouvoir être étaholi sur une espèce d'Annelide, la SNe-
reis stellifera de Miiller { Zool.

IVau. , part, a, tab. 6a, fig. i-5). Sadgny u'a pas vu l'Animal,
mais il

LEP 287

juge, d'après la figure et la description , qu'on devrait trouver
des antennes et qu'il existe une grosse trompe couronnée de ten-
tacules; deux mâchoires cornées; des cirres lentaculaires au
nombre de six ; des cirres supérieurs en forme d'écaillés ellip-
tiques, appliquées transversalement sur le dos; deux laisceaux de
soies, ou plutôt deux lames réunies pour chaque pied, et les cirres
inférieurs très-courts. Ce genre offre plusieurs points de ressem-
blance extérieure avec les Aphrodites. Il appartient, dans la Mé-
thode de Savigny , à l'ordre des Néréidces et à la famille des Né-
réides. (aud.)

LÉPIDIER. *Lepidium*. bot. phan.

Génie de la famille des Crucifères et de la Tédi adynamie sili-
culeuse , L. , ainsi caractérisé par De Candolle (Sjfst. Veg. Nal., a,
p. 627) : calice à quatie lobules égales; quatre pétales entiers: six
é ta mines létradynames , libres , et dont les filets ne présentent
aucune dent; silicuie ovale, déprimée , déhiscente, à valves caré-
nées, tantôt ne présentant aucun appendice , tantôt ailée vers le
sommet, à cloison membraneuse, étroite , égale aux valves ou
quelquefois plus courte que celles-ci , et alors la silicuie est
échancrée, surmontée d'un stjle îlli— lorme , ordinairement très -
court; graines solitaires et pendantes dans chaque loge, tri-
quètres ou comprimées , à cotylédons oblongs ou linéaires, încô-
nibaus. Ce genre est le type de la neuvième tribu établie par De

Candolle sous le nom de Lépidiuées ou de Notorhizées angustiseptées. Les auteurs l'ont souvent confondu avec le Thlaspi ou en ont fort mal déliai les caractères. Dans la seconde édition de YHortus Kewensis , R.

Browu a lixé les limites du Lepidium.

et y a réuni des espèces que Linné plaçait dans les genres Thlaspi et Coc/ilea/ia. En adoptant cette réforme, De Candolle y a fondu les genres Kandis d'Adanson , Cardaria et Lepia de Desvaux. Le Lepidium se distingue facilement du Tâlaspi par ses

*88 LEP

loges constamment monosperines et par ses cotylédons incombans au lieu d'être accombans; il diffère du Senebiera par ses silicules déhiscentes , à valves carénées, tandis qu'elles sont indéhiscentes et à valves concaves dans ce dernier genre ; enfin ses loges monospermes empêchent de le confondre avec Y Eu notai a dans lequel les loges sont dispermes.

Les Lcpidiers sont des Plantes herbacées ou à peine sous- frutescentes. Leurs liges " sont cylindriques, rameuses, à feuilles simples, de formes diverses ; ils ont de petites fleurs blanches et disposées en grappes terminales, longues et dressées. Plus que la plupart des autres Crucifères, ces Plantes se trouvent dispersées sur toute la surface du globe , car dix espèces croissent en Europe, quinze dans les provinces d'Asie voisines de l'Europe, sept au cap de Bonne •- Espérance , neuf dans la Nouvelle-Hollande, et onze en Amérique. Ces espèces ont été distribuées de la manière suivante en sept sections par le professeur De Candolle.

§ 1. *Caudarta*. ^ Desvaux (Journal de Bot. , 5, p. 165) en avait fait un genre. Elle est caractérisée par sa silicule ovale en cœur , presque déprimée, à valves concaves sans ailes sur le dos, et surmontée d'un style filiforme. Elle forme le passage au moyen du caractère fourni par la concavité des valves, entre le *Senebiera* et le *Lepidium*; mais son port semblable à celui de ce dernier genre est une raison pour ne pas l'en éloigner.

L'unique espèce qui le constitue est le *Lepidium Draba* que Linné , dans sa seconde édition , avait transporté parmi les *Cochlecia*. Cette Plante, qui est très - commune dans les champs cultivés de l'Europe australe , s'y rencontre aussi à Montmartre et à la plaine des Sablons dans les environs de Paris; mais elle y est peu abondante.

§ 2. *Leptorhiza*. La silicule est elliptique , à valves carénées, et surmontée d'un style filiforme. Les es-

LEP

Les espèces de cette section ressemblent à celles de la précédente; leur silicule ne diffère de la silicule des *Lepia* , une des sections suivantes , que parce qu'elle est stylifère ; au reste , les *Eupsaria* servent de lien entre le *Cardaria* et les autres *Lepidium*. Quatre espèces, dont trois sont indigènes du bassin de la Méditerranée , et une de la Sibérie, composent cette section. Nous nous contenterons de les indiquer : *Lepidium Chalepense* , L. ; *L. oxyotum* , Labill. ; *L. glanlfolium* , Desf., Ftor. Ail. , t. 147 ; et *L. amplexicaule* , Willd. j.

§ 3. *Leptorhiza*. Cette section *Li* offre une silicule elliptique, entière ou presque échancrée , à valves carénées , munie d'un style court, à peine saillant ; le calice est persistant ou il ne

tombe que très-tard; les feuilles i cauliuaies ne sont ni amplexi-caules, i ni auriculées. Elle renferme trois es- k pèces , savoir : *Lepidium cœspilosum* , di Desv. , indigène d'Arménie; *L. coropoui/uliitm* , Fisch. , de la Russie | orientale, et *L. Humholdtii* , D. C. , n qui croît dans les hautes montagnes b du Pérou , près de Chillo , et qui a t|, été réuni par Kuntli au *Senebiera*, j| sous le nom de *S. dubia*.

§ 4. Cabdamon. Le genre *Nastur'* ré iium de Boerhaave et de Médikus, qu'il \ ne fautpas confondre avec un autre { genre de Crucifères formé par Brown et qui a -reçu la même dénomination , . compose cette section. Elle est carac-- a tée par sa silicule presque orbicu- i) lée, échancrée au sommet, à valves cai enées-naviculaires , un peu ailées |jj sur le dos , munie d'un style très- j court caché dans l'échancrure ; co- t tylédons divisés en trois lobes. On ne compte que deux espèces dans cette section , savoir : le *Lepidium salivum* , L. ; et le *L. spinescens*, D. C. i La première offre assez d'intérêt pour | mériter une courte description.

be Lki'idieh cultivé , *Lepidium salivum*, L. , vulgairement Cresson g alénois et Nasitort, est une petite I Plante annuelle dont la tige est dressée , cylindrique , glauque, rameuse,

LEP

baule d'environ trois décimètres. Ses ((feuilles inférieures sont péliolccs , loipinnatilides , glabres et glauques , à -îegtnens incisés; les inférieures sont porcsqne simples cl sessiles. Les Oeurs (.ont blanches, très - petites , portées i.iur de courts pétioles , et forment des ppis courts à l'extrémité supérieure Ides rameaux. Cette Plante ci oît naturellement en Perse et dans d'autres «oti-trées de l'Orient. On la cultive liaus les jardins potagers de l'Euro-

>oe , d'où elle s'échappe et naît spontanément aux environs. Une variété Mont les feuilles sont sinueuses et r.répues , est fort commune partout.

Lua saveur du Cresson alénois est I lunule, légèrement acre et piquante.

ITest un aniscorbulique et un assaioonnement agréable dans les salades ; |i uclqitefois même on le mange sans nuélangé d'auti es Herbes potagères.

§ 5. Lepia. Cette section, dont pluieurs espèces formaient un genre uuquel Desvaux donnait le nom cil.essus employé et qui a été désigne jus celui de Lasivptera par An- . rzcowski , offre les caractères sui- »àhs : silicule presque orbiculéc , icliancrée au^sommets, à valves naiculaires , munies au sommet d'ailes)uvent adnées au style, lequel est rrè.'-court et renfermé dans l'échanvure; cotylédons entiers. Les Lepiitui campesire et hirtum , qui croisjnl in 1mm ope , étaient des Tklaspi c Linné. Lus L. Iciucaipurn , D. C, t: L. spinosum , L., se trouvent dans 'Orient; le L. rotuntlum est une liante indigène de la Nouvcille-Holi nde.

§ 6. Dileptium. Ce nom est emi ii il te à Ralinesqtie-Schmallz (Flot: Ūfiuv'. , p. 85) qui a fait un genre urliculier de cette section. Elle est mractérisée par sa siliculc presque lliptique , écliancrée au sommet, à iklvcs carénées , non ailée sur le dos il.. .au sommet, et n'ayant presque imV de style.. Les fleurs sont trèsotites, quelquefois à deux ou quatre lamines , ou plus rarement mannuant de pétales. On y compte plus •e vingt espèces indigènes de toutes

TOME IX

LEP 289

les parties du monde, et parmi lesquelles nous indiquerons comme les plus remarquables : le *Lepidium virgi/iicurn* , L., de l'Amérique septentrionale ; le *Êi. rudera/e* , qui se trouve dans les lieux stériles de presque toute l'Europe , depuis l'Italie et la Fiance méridionale jusqu'à Pélersbourg, et depuis l'Angleterre jusqu'à Constantinople ; le *L. perfuliaturn* de 1 Europe orientale et de l'Asie qui lui est contiguë. Cette espèce est facile à distinguer à ses feuilles inférieures multifides , tandis que les supérieures sont très-entières et amplexicaules; le *L. piscidium* des îles de la mer du,Sud , qui sert aux habitants à enivrçr le Poisson ; enfui plusieurs espèces indigènes de la Nouvelle-Hollande, du cap de bonne- Espérance et de l'Amérique méridionale, telles que les *L. /lyssupifuliitm*, *foliosum* , *Aoi œ-HoJ/a/tdiœ* , *subdentatum* , *C/ùc/ticara*, *Bonaricnse* , etc.

Ç 7. *Lepidiastrum*. La filleule est ovée ou elliptique, très-entière et nullement écliancrée, terminée en pointe par le stigmaté presque sessile, à valves carénées et sans appendices. Cette section se compose de onze espèces, parmi lesquelles ou distingue le//, *latljoliuin* et le *L. Ibe/is*, indigènes d'Europe, et le *L. olcra-ceum*, Forst. , de la Nouvelle-Zébmde. La saveur de cette espèce est légèrement acre et même agréable, approchant «le celle de l'Kpinard ou de la Laitue. Ce fut à l'aide de cet antiscorbutique que l'équipage du capitaine Cook fut Ljuéri de la maladie qui le désolait pendant une longue traversée.

Plusieurs espèces de *Lepidii/m* établies par Linné sont devenues les types des genres *Eunomia*, *Teesdalia*, *Hutchinsia* de De

Candolle et R.

Brown. F. ces mois, (g..n.)

* LÉPIDINÉES. Lepidineœ. bot.

PH an. C'est le nom donné par De Candolle (Sjst. Veg. Nat., vol. a , p. 5ai) à la neuvième tribu fies Crucilères. Elle est ainsi caractérisée : siliculc oblongue, ovée, didyme où obeordée , à cloison très-étroite , à

a go LEP

valves carénées ou très-concaves ; raines solitaires ou en petit nombre ans chaque loge, ovées, non bordées ; cotylédons planes, rarement trilobés ou découpés, incornbans. D'après ce dernier caractère et celui de la cloison très-étroite des silicules , cette tribu a été encore nommée Notorhizées angustiseptées (No/oràizece angiiis/iseptœ). Parla structure des cotylédons et la forme des graines , elle est voisine des Thlaspidécs. Elle se lie aussi avec les Camélinées et les Lsatidées , au moyeu des genres Senebiera et sEthionema. (g..n.)

* LÉPIDION. pois. (Risso.) Espèce du genre Gade. . (b.)

LÉPIDION. bot. tian. (Dioscoride.) Syn. de Passerage ou Lépidier.

V. ce dernier mot. (b

LÉPIDIOPTÈRES. Lepidioplera.

IN8. Nom donné par Clairville aux Insectes à ailes farineuses, plus connus sous le nom de Lépidoptères.

ce mol. (g.J

LEPIDIUM. BOT. PIAN. V. LÉPI- DIER.

LÉPIDOCARPODENDRON. bot.

ni an. (Boerhaave.) Svn. de Protéa.

V. ce mot. Adanson nommait *Lepidoca*/pus une section du même genre, (u.)

* LEPIDOCARYUM. bot. piian.

Genre de la famille des Palmiers , et de la Polygamie Diœcie , L., nouvellement établi par Martius (Gen. et Spec. Faim. B/asiL, p. 4g, t. 45-47; qui lui a imposé les caractères suivans : régime (SpadLv) enveloppé de plusieurs spathes incomplètes; fleurs distiques , disposées en chatons légèrement comprimés , et accompagnées de petites spathes. Les fleurs mâles sont composées d'un calice campanule' à trois petites dents; d'une corolle à trois pétales; de six étamines dont les anthères sont ovées-oblongues , et adnées par leur dos au filet. Les fleurs hermaphrodites offrent un calice comme dans les mâles ; une corolle monopétale , trifide ; six étamines; trois stigmates connés, linéai-

LEP

res, dressés; une baie drupacée, renfermant une seule graine munie d'un | H 11) umen homogène , d'un embryon il latéral logé dans la fossette circulaire I ombilicale. Le type de ce genre est I un Palmier du Brésil, dont le stipe I est petit, composé

à l'intérieur d'un bois dur et rongéâtre , revêtu des débris des péti-
 oles , à frondes terminales , flabelliformes , irrégulièrement fen-
 dues ; les régimes placés entre les frondes, portant des (leurs
 roses et rougeâtres. Les fruits sont en forme de cônes, et d'une
 couleur brunerougâtre. (g..n.)

* LÉPIDOKROIT. min. Variété de Fer hydraté en petits ro-
 gnons, à texture fibreuse et écailleusc, d'un éclat métalloïde et
 d'un brun-rougeâtre, accompagnant dans quelques localités le
 Fer hydraté aciculaire ou fibreux. (g. del.) !

LÉPIDOLÈPRE. *Lepidoleprus*. i rois. Genre formé par Risso ,
 et voi- gv sin des Gades , adopté par Cuvier, qui le place sous le
 nom de Grena- j (lier dans la première famille de l'ordre des Ma-
 lacoptéi ygiens Subbra- % chiens. Ses caractères consistent],,,
 dans les sous-orbicnlaires s'uuissant en avant entre eux et avec
 les os du ,, nez pour former un museau déprimé „j qui avance
 au-dessus de la bouche, M et sous lequel celle-ci conserve sa, mo-
 bilité. La tête entière et tout le jJ corps sont garnis d'écaillés
 dures et .. hérissées de petites épines. Les ven- (. traies sont pe-
 tites et un peu jugulai- ;î, res ; les pectorales médiocres; la pre- h
 mière dorsale est courte et haute; la o deuxième dors.de et l'anale
 sont très- 5 longues et s'unissent en pointe à la J caudale. Les
 dents aux mâchoires sont || hues et courtes. Les deux espèces
 con- i nues de ce genre vivent dans les plus ' grandes profondeurs
 de la Méditerranée; elles sont connues sous le nom > de ïrachy-
 rynche et de Cœlorhynche. • " Risso, qui les a fait connaître, les a
 s', figurées pl. 7, fig. il et aa. (b.) 1;

LÉPIUOLITHE ou LILALITHE. 1 min. Variété dq Mica, en
 masses t.

composées de petites écailles ou la- ty

LEP

moelles , ordinairement de couleur \ violette , et dont on faisait une espèce particulière , avant que Cordier eut Jdémontré son identité avec le iVtica.

(g. DEL.)

* LEI'IDOMA. bot. crtpt. (Licchens.) Sous-genre du Lecidea de la Méthode lichénographique d'Acharhusj il est caractéiisé par un thalle ecrustacé efliguré; il correspond au igenre Psora du même auteur , genre qqe nous avons cru devoir rétablir.

LLc sous-genre Lepidoma du Synopsis ILichenum et de la Li- chénographic miniverselle , a reçu de l'extension et rf enferme les espèces du sous-genre SSaphcnaria , qui est notre Circinaria.

* LEPIDONOTE. Lepido/iota, anmi.ll. Genre établi par Leach aux dé- ;oens des Aplirodites de Linné et îyantpour type Yjlphro- dUa squiam-

<:nata , L. Savigny l'avait précédemment distingué sous le nom de PoI3njoé. V. ce mot. (aud.)

LÉPIDOPE. Lepidopus. rois, jjenre établi par Gouan , adopte par Juvier, sous le nom de Jarretière,, llans la famille des Tœ- nioides, de Vordre des Acanthoptérvgiens , et uar Duméril qui le place dans sa fannille des Pétalosomes. Ses caractères consistent dans l'allongement du corps qui est aplati et garni d'une norsale fort prolongée. Les mâchoires ont pointues, et les ilcuts aussi lorles (t aiguës que dans les Trichiures.

./anale est fort remarquable, étant tchi posée d'un seul ra\ou; elle est uourte et située vers l'extrémité de la queue. Deux petites écadles Domines, mobiles , situées sous les pectorales , y tiennent lieu de ventrales.

'n en connaît deux espèces qui furent d'abord confondues; l'une et aa titre vivent dans la Méditerranée.

Le GouanieN, type du genre, Le- >i>idnpus Gouaiiiianus , Lac, Pois. T.

il, p. âao ; la Jarretière, Encycl.

Vois., pl. 84, f. 564, a sa mâchoire [inférieure plus avancée que la supérieure oii sont trois longues dents Tochucs , outre celles qui la garnis-

LEP agi

sent. Cette espèce n'atteint jamais deux pieds de longueur; sa couleur générale est argentée, avec des reflets azurés et la nuque bleue. L'anus occupe le milieu du corps. B. 7, d. 53, V. 1, a. 1. La seconde espèce connue a été décrite plusieurs l'ois comme uue espèce nouvelle , et toujours sous des noms nouveaux'; elle est bien plus grande , atteignant plus de quatre pieds et resplendissante de la pins belle teinte d'argent. Rissol'a dédiée à Pérou ; c'est le Triçhiurtt, caudatits d'Eiipbrasen et ensiformis de Vandelli; le Vandellius linitanicus de Shaw et le Zip/tot/icca tetradens de Moutagu. (b.)

* LEPIDOPHORUM. BOT. PJB AN.

Le genre formé sous ce nom par Necker (Elem. Bot., n. 22), aux dépens des Anthémis de Linné, n'a pas été adopté. (g..n.)

* LÉPIDOPHYLLE. *Lepidophyllum*. bot. PHAN. Genre de la famille des Synanthérées, Corymbifères de Jussieu et de la Syn-génésie superduc, L., établi par Gassini (Bulletin de la Soc. Philom., décemb. 1816) qui l'a ainsi caractérisé : involucre oblong, cylindracé, formé d'écaillés imbriquées, appliquées, les extérieures ovales, les intérieures oblongues, très-obtuses, coriaces, à bords membraneux, ciliés ou rangés; réceptacle petit, plane et nu; calathide cylindracée, dont le disque ne se compose que d'un petit nombre de fleurs (4 à 6) régulières., hermaphrodites à la circonférence de deux ou trois (leurs distantes en languettes et femelles; ovaires oblongs, striés, surmontés d'une aigrette longue, formée de poils inégaux, paléiformes et plumeux. Ce genre est placé, par son auteur, dans la tribu des Astérées, près du Baccharis, avec lequel il a beaucoup d'affinité; il se rapproche aussi du Braconia de Nuttall, dont il est peut-être congénère. Une seule espèce le constitue : c'est le *Lepidophyllum* eu pressiforme, Cass., *Baccharis cupressiformis*, Pers., Arbrisseau rapporté de la Patagonie par

de LEP

Commerson, et qui est surtout remarquable par ses feuilles extrêmement petites, rapprochées et disposées sur quatre rangées longitudinales. (G.N.)

* LÉPIDOPILUM. bot. Cuvier.

(?Jousses.) Sous-genre établi dans le *Pilotrichum* de Palisot-Beauvois pour les espèces dont la coiffe est hérissée de paillettes. Le *Pilotrichum* de Richard et de Selwaegnchen, qui croît sur les Arbres de la Guiane, est la seule espèce qui figure dans ce sous-genre. V. *Pilotrichum*. (a.f.)

LÉPIDOPOMES. fois. Famille d'Holobranches de l'ordre des Abdominaux , et dont les caractères correspondent exactement aux genres Mugil et Exocetus de Linné , que l'auteur de la Zoologie analytique élevant ainsi dans l'ordre méthodique, divise en Exocet, Mugilomorç, Ohanos , Mugiloïde et Muge. (b.)

LÉPIDOPTÈRES. Lepidopteru..

jns. Ordre d'Insectes établi par Liuné , et auquel Fabricius a donné le nom de Glossates (Glossata.) H formait , dans tous les ouvrages de Latreille , le dixième ordre ; mais depuis que ce savant a converti ses Myriapodes en classes (Fam. Nat. du Piègne Anim.), il ne forme plus que le neuvième ordre de la classe ries Insectes : il est ainsi caractérisé :

qu-itre ailes membraneuses , couvertes d'une poussière farineuse formée de petites écailles; une trompe roulée en spirale à là bouche.

Les Lépidoptères sont les Insectes les plus beaux et ceux que la niture a le plus favorisés sous le point de vue des omemens ; ces Animaux sont, parmi les Insectes, ce que les Oiseaux-Mouches et les Colibris sont parmi les Oiseaux. Doués d'une très-grande facilité pour le vol , ils semblent destinés à régner sur les fleurs, et on dirait qu'à eux seuls est attribué le droit de choisir leur nourriture dans leur corolle, en pompant, avec leur longue trompe, le suc qu'elle contient. Leurs ailes sont,

LEP

eu général , ornées des couleurs les L plus variées et les plus brillantes :

l'or, l'argent, l'azur, l'émeraude et la pourpre s'y mélangent de mille et mille manières pour produire des dessins de la plus grande beauté, et, tandis que la nature n'a donné aux ailes des autres Insectes que la surface rigoureusement nécessaire à l'exécution de leurs mouvemens, il semble qu'elle s'est plu à s'écarter de cette règle en faveur des Lépidoptères, en augmentant beaucoup l'étendue de leurs ailes, afin d'avoir la faculté de produire des dessins plus grands et d'exercer davantage son pinceau. Elle a employé, pour l'ornement de ces Insectes privilégiés, un genre de peinture que l'on connaît sous le nom de mosaïque. Des écailles en nombre infini, diversement colorées, implantées sur les deux surfaces de leurs ailes et disposées par imbrication, comme les tuiles d'un toit, avec une harmonie admirable, composent, par leur réunion, ces dessins si diversifiés et si élégans qui surprennent et charment les regards; enfin la nature a été si prodigue d'ornemens à l'égard des Lépidoptères, qu'elle a voulu, contre son habitude, que ces Animaux en eussent jusque dans leur enfance, ou sous la forme de chenille et souvent encore sous celle de chrysalide. Il semble que celle soit la de suprématie que la nature paraît avoir donnée aux Papillons à dirigé Degéer et Olivier dans leurs distribution; méthodiques des Insectes, puisqu'ils ont placé les Lépidoptères à la tête de la classe des Insectes.

La bouche des Lépidoptères se diffère pas organiquement de celle des Insectes broyeur ou pourvus de mâchoires. Savigny et Latreille ont démontré qu'elle était composée de mêmes pièces, mais que ces pièces étaient appropriées aux fonctions qu'elles étaient destinées à remplir ainsi, plusieurs sont restées rudimentaires, tandis que d'autres ont pris un accroissement excessif. Cette bouche est composée d'un labre ou

LEP

\vent presque invisible , conique ou Ettubulé; de deux mandibules cornées, iitrs-pctites , rudimentaires , poilues oou garnies de petites écailles , fixes est d'aucun usage; de deux mâchoires ccornées , en forme de filets tubulairres , ordinairement fort longs , souillés inférieurçment et à demeure , jjusqu'à. la naissance des palpes , avec la lèvre pareillement fixée et fermant lia cavité buccale, se réunissant auildelà, par leur bord interne, pour [(former une trompe {lingua, Fah.)ou , {pour la distinguer nominalement des Ifiùtres parties désignées aiusi , noinrmée par Lalreille spiritrompe (tromppe en spirale), dont l'intérieur presente trois canaux ; de deux palpes nmaxillaires souvent presque imperceptibles, d'un à trois articles inserrés près du coude des mâchoires , et dde deux palpes labiaux ou inférieurs , tlde trois articles très-garnis de poils oou d'écai^les , remontant de chaque ccôté de la spiritrompe et lui formant uune sorte d'étui. La lèvre est formée iTune seule pièce plate et triangulaire.

Les antennes des Lépidoptères sont variables et toujours composées d'un ggrand nombre d'articles; elles sont toujours simples dansceux qui volent Me jour, c'est-à-dire les Diurnes, et celles se terminent par un bouton plus oou moins renflé. Dans les espèces qui ffont le passage des Diurnes aux Noctturnes , elles prennent la forme d'une ■ massue allongée ou d'un fuseau, et lorsqu'on arrive aux espèces qui ne [paraissent que la nuit , elles ressemblent à un fil ou à une soie tantôt «simple et tantôt peetiné, et souvent iimême plumeusc, soit dans les deux -sexes , soit dans les mâles seulement. • Ou découvre , dans plusieurs espèces , deux yeux lisses cachés entre Mes écailles et situés entre les

yeux "ordinaires; ils sont demi-sphériques, à à facettes et souvent assez gros. La trompe n'est d'aucun usage et man- 'ique quelquefois dans plusieurs Lépidoptères crépusculaires ou nocturnes. Les trois segments dont le. tronc :des Insectes Hexapodes est composé

LEP 390

se réunissent ici en un seul corps; ils sont intimement unis, et l'aiguillon est très-court et transversal, comme cela a lieu dans la plupart des, Hyménoptères et des Diptères; il ne varie jamais de forme , et les différences que les Lépidoptères présentent, tant sur leur dos que dans les autres parties , proviennent des écailles et des poils du dos qui imitent quelquefois une huppe ou une crête.

L'abdomen est composé de six à sept anneaux; il est attaché au corselet par une très-petite portion de son diamètre , et n'a ni aiguillon ni tarière comme les Hyménoptères ; il n'y a que quelques femelles comme celles des Cossus qui aient les derniers anneaux rétrécis et prolongés pour former un oviduct en forme de queue pointue et retractile. Le dessus de l'abdomen offre , dans quelques espèces , des écailles et des poils relevés et formant des sortes de doublures. Les quatre ailes des Lépidoptères sont simplement veinées , de grandeur et de position variables :

les premières ou les supérieures sont toujours plus grandes que les inférieures ; dans plusieurs espèces une portion de ces organes, plus ou moins spacieuse , est tout-à-fait nue et transparente. Les écailles sont implantées, au moyen d'un pédicule , sur leur surface et disposées en recouvrement avec une symétrie re-

marquable ; leur ligure n'est pas constamment la même , et le plus souvent elles sont oblongues, arrondies à leur base du côté du pédicule qui les attache à l'aile , et tronquées à l'autre extrémité avec plusieurs petites dents.

Les ailes inférieures sont souvent plissées à leur bord interne et semblent former un canal propre à recevoir et à garantir l'abdomen. Les quatre sont quelquefois relevées perpendiculairement dans le repos , et c'est ce qui a lieu pour les Papillons diurnes ; dans d'autres, elles sont horizontales ou inclinées en manière de toit : c'est le cas des Lépidoptères crépusculaires et nocturnes. La nature a pourvu ces Insectes d'un organe

a94 LEP

propre à retenir les ailes dans cette situation : c'est une espèce de frein ou de crochet attaché aux ailes inférieures et passant dans une boucle des supérieures.

Les pattes des Lépidoptères sont au nombre de six; ils ont des tarses composés de cinq articles et terminés par deux crochets : dans plusieurs Lépidoptères diurnes, les deux pieds antérieurs sont beaucoup plus petits, inutiles au mouvement et repliés de chaque côté sur la poitrine, en manière de cordons ou de palatines; ils sont terminés par des tarses gros, velus, dont les articles sont moins distincts et sans crochets apparents au bout. Quelquefois ce caractère n'est propre qu'à l'un des sexes. Les Lépidoptères qui ont les pattes antérieures ainsi organisées ont été nommés Tétrapes ou Tétrapodes. Les Lépidoptères ne présentent jamais que deux sortes d'individus, des mâles et des femelles; ils sont toujours ailés, et on ne peut en excepter que très-peu dont les femelles sont aptères. Les mâles des Lépidoptères, surtout les

nocturnes , découvrent leurs femelles d'une distance très-considérable , et à l'aide de l'odorat, qui paraît être chez ces Animaux d'une finesse ex-

guise. Les deux sexes restent penant quelque temps unis; souvent la femelle , qui est toujours plus , grosse, entraîne dans les airs le mâle qui reste attaché à elle. Celles-ci pondent leurs œufs , souvent trèsnombreux, sur les substances ordinairement végétales dont leurs larves doivent se nourrir, et elles périssent bientôt. L'intestin des Lépidoptères est composé d'un premier estomac latéral ou jabot, d'un second estomac boursoufflé, d'un intestin grêle assez long et d'un cœcum près du cloaque.

Les larves des Lépidoptères, que l'on connaît sous le nom de Chenilles , sont Composées de douze anneaux non compris la tête ; elles ont de chaque côté neuf stigmates , elles sont munies de six pieds écailleux ou à crochets, qui correspondent à ceux

LEP

de l'Insecte parfait; elles ont, en outre , quatre à dix pieds membraneux, dont les deux derniers ou les postérieurs sont situés à l'extrémité du corps et près de l'anus. Le corps de ces larves est en général allongé , mou, presque cylindrique et coloré diversement , tantôt hérissé de poils, de tubercules , ou d'épines, et tantôt nu ou ras ; leur tête est revêtue d'un derme corné ou écailleux; on voit, de chaque côté-, six petits grains luisans , qui paraissent être de petits yeux lisses ; elle a , de plus , deux antennes très-courtes et coniques, et une bouche composée de deux fortes mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre et de quatre palpes ; comme ces larves sont destinées à vivre de matières coriaces , telles que des feuilles, des racines et même du bois, la na-

ture les a pourvues d'organes assez forts pour remplir ces fonctions pendant qu'elles sont dans cet état ; mais aussitôt que ces Animaux sont appelés par elle à devenir habitants fixes et à se nourrir du nectar des fleurs et de matières fluides , elle change ces fortes mandibules et ces mâchoires dures et puissantes en longs filets , minces et déliés , réunis entre eux, formant une trompe tortillée sur elle-même et dont la fonction n'est plus que de sucer. La matière soyeuse dont elles font usage , s'élabore dans deux vaisseaux intérieurs , longs et tortueux , dont les extrémités supérieures viennent, en s'amusant, aboutir à la lèvre; la filière qui donne issue aux fils de la soie , est un mamelon tubulaire et conique situé au bout de la lèvre. Les chenilles qui n'ont, en tout, que dix à douze pieds , ont été appelées à raison de la manière dont elles marchent , Géomètres ou Arpeuleuses.

Elles se cramponnent avec leurs pâtes écailleuses au plan de position, et, élevant les articles intermédiaires du corps en forme d'anneau ou de boucle , elles rapprochent les dernières pâtes des précédentes, dégagent celles-ci , s'accrochent avec les dernières , et portent leur corps en

LEP

Iwant pour recommencer la même Bimanœuvr. Quelques-unes de ces chenilles dites en bâton , se fixent , flans Le repos , aux branches des Végétaux Loar les seuls pieds de derrière , se tiennent immobiles et ressemblent à Line petite branché. D'autres chenilles, ayant quatorze à seize pâtes idout quelques-unes des membraneuses intermédiaires sont plus courtes, portent le nom de demi-Arpenleuscs ou fausses Géomètres. Les pieds membraneux des chenilles sous- U'ont terminés par une couronne de petits crochets plus ou moins complète. Leur in-

testin est composé d'un ,'^ros canal sans inflexions , dont lia partie antérieure est quelquefois uun peu séparée en manière d'es-toiimac et dont la partie postérieure Ifonnne un cloaque lidé; il donne attache à quatre vaisseaux biliaires Itrès-longes et s'insér-ant fort en arrière. f . , pour plus de détails , l'article Métamor-phoses et les ouvrages dde Lyonnel sur l'aualomie de la Cheinille du Cossus, et de Hérold (Hist.

ildu Développ. des Pap. 181.5). La Iplupart des chenilles se nourrissent ilcles feuilles des Végétaux; d'autres cen rongent les racines , les boutons , lies (leurs et les graines; les parties lli-gneuses les plus dures des Arbres me résistent pas à quelques es-pèces eet entre autres à celles qui produisent le genre de Noc-turnes que l'on tnoinme (,'ussus. D'autres chenilles irongent nos draps cl nos étoiles de (raine; elles 11'éparguent pas même lie cuir, le lard, la cire et dilleirenles graisses. Plusieurs vivent exclu-sivement d'une s,culc matière , imais d'autres s'accommodent in-différemment de plusieurs sortes de mourritures et ont mérité le nom de IPolyphages. Quelques clieuilles se 'réunissent en société sous une tente (de soie qu'elles filent en commun; (d'autres se fa-briquent des fourreaux I fixes ou portatifs; plusieurs se lo- ! gent et se creusent des galeries dans Ile parenchyme des feuilles. Tou-1 tes ces chenilles ne sortent que la : nuit , mais le plus grand nombre se

LEP agS

plaît à la lumière. Les chenilles changent ordinairement quatre fois de peau avant de passer à l'état de chrysalide ou de nymphe. V. ces mots.

La plupart filent alors une coque ou elles se renferment; une liqueur souvent rougeâtre que les Lépidoptères jettent par l'anus au moment de leur métamorphose, attendrit un des bouts de la coque et facilite leur sortie; communément encore, une des extrémités du cocon est plus faible ou présente une issue propice par la disposition des fils. Quelques chenilles lient avec leur soie des molécules de terre, des feuilles ou les parcelles des substances où elles ont vécu, et s'en forment ainsi une coque grossière. Les chrysalides des Lépidoptères diurnes sont à nu et fixées par l'extrémité postérieure du corps.

Toutes ces chrysalides ou nymphes de Lépidoptères offrent un caractère particulier ; elles sont emmaillottées ou en forme de momies. Ces chrysalides éclosent en peu de jours; souvent même les Lépidoptères donnent deux générations par année ; quelques autres passent l'hiver, et l'Insecte ne subit sa dernière métamorphose qu'au printemps ou dans l'été de l'année suivante. L'Insecte parfait sort de la chrysalide à la manière ordinaire ou par une fente qui se fait sur le dos du corselet.

Les larves des Ichneumonides et des Chalcidiles , ainsi que celles de quelques Diptères, détruisent beaucoup de chenilles et de chrysalides et nous délivrent ainsi de ces Insectes qui , sous leur état de chenilles , l'ont de grands dégâts dans les jardins et surtout à nos Arbres fruitiers.

Il serait trop long d'exposer ici les différentes méthodes qu'on a employées pour faciliter l'étude des Lépidoptères ; aucune d'elles n'est satisfaisante, et les organes de la manducation étant beaucoup plus simples que dans les autres ordres, offrent moins de ressources ; il serait à souhaiter que les naturalistes fissent

aux ailes des Lépidoptères l'application des principes établis* par Jurine, re-

296 LEP

l'alimentation à celles des Hyménoptères. Les auteurs iconographes que l'on peut, consulter pour la détermination des espèces d'Europe, sont Esper, Hubner, Engramolle, Godard, etc. Quant aux exotiques ils ont été traités par Cramer, Stoll, Donovan, Abbot, Lewin, (Garris, Godard, Fabricius. Valh. Ochsenbeimer est très-important pour l'épuration de la synonymie, et quoiqu'il ait établi un grand nombre de genres sans en donner les caractères, il n'en est pas moins recommandable.

Latrille partage les Lépidoptères en trois familles qui correspondent aux trois genres composant cet ordre dans la méthode de Linné. Ce sont les Diurnes, les Crépusculaires et les Nocturnes. V. ces mots. (g.)

LÉPIDOSPERME. *Lepidosperma*.

bot. pu an. Genre de la famille des Cypéracées, voisin des genres *Cladium* et *Scleria*, établi par Labillardière et adopté par R. Brown (Prodr.

Flor. Nov.-Holl.) qui en a décrit un grand nombre d'espèces nouvelles.

Toutes sont des Plantes herbacées, vivaces, originaires de la Nouvelle-Hollande, ayant des chaumes simples, dépourvus de feuilles, excepté à leur base. Leurs fleurs forment des panicules, plus rarement des épis divisés et terminaux. Les épillets contiennent une ou deux fleurs et se composent d'écaillés imbriquées en tous sens et dont un grand nombre sont vides. Au-

tour de l'ovaire on trouve six squammules hypogynes , planes , un peu épaissies, et légèrement soudées par leur base. Le >i\ le est caduc. Le fruit est un akène renflé el obtus. Ce genre ne dif- fère des Cladium que par la présence de ses soies hypogynes , el des Scleria que par le nombre de ses soies ou écailles hypogynes, par ses épillets toujours hermaphrodiles. Dans sa Flore de la Nouvelle- Hollande , Labillardière a décrit et figuré sept espèces de ce genre , savoir : *Lepidosperma elatior*, t. 11 ; *L. gladiata*, t. 12 ; *L. longitudinalis* , t. i3; *L. globosa* , t.

LEP

1 4; *L./iliformis* , t. 1 5 ; *L. sqimntma-* .

ta, t. 16; *L. telragona* , t. 17. Le nom- Si

bre des espèces caractérisées par R. :

Brown est de dix-neuf. (a. R.) •

LÉPIDOTE. rois. Pour Lépidope

dans le Dictionnaire de Déterville. !'

Les anciens paraissent avoir désigné il

par ce nom le Binny. r. Cyprin. A

LEPIDOTE. bot. crypt. (Jieau- I»

vois.) V. Lycopode. 1

LEPIDOTIS. min. La Pierre m en- } tionnée sous ce nom par Pline, imitait l'éclat et les reflets des écailles f de Poisson ; un tel caractère ne suffit pas pour reconnaître ce donlprétén- t dit parler le crédule compilateur Ro- si inani. (b.) B

* LEPIDOTOSPERM A. bot. phan. p (Rœmer et Schultes.)
Pour Lépidos- d penne. V. ce mot. (g..n.) (

* LEPIGONUM. bot. ptiak. Sous ce nom générique, Wahien-
berg a 1 séparé les espèces àArenaria , dont r la capsule est à
Irois valves , les feuil- 1 les munies de stipules. Quelques- i unes ,
qui croissent dans les endroits s salés, sont des Plantes grasses, et
t Kaworth en a constitué son genre t Stipularia. Pcrsoon et Se-
riuge (ia t De Cand. Prodr., 1, p. 400) ne 1 considèrent ce géni e
que comme une 1 section des vlrenaria , section qu'ils I nomment
Spergularia. V. Sablinh., t

LEPIMPHIS. pois. Rafinesque, t

dans son Jtiologia Siciliana , établit |

sous ce nom un genre voisin des Co- i

ryphœnes qu'il caractérise par un <

corps conique et comprimé ; la tête 1 comprimée et anguleuse
en dessus ; une seule dorsale; les ventrales falciformes et réunies
à leur base par une lame écailleuse. Il en existe deux espèces dont
l'une, commune dans

le golfe de Palerme, y est nommée I Pesce Capone; c'est \eLe-
pimphisHippuroides, qui acquiert jusqu'à dixbuit pouces de
long;. l'autre est le Lepimphis ruber , et n'a guère qu'un pied ; on
le nomme Munacada dans le pays. Ce genre n'est pas définitive-
ment adopté. .

LEP

LEPIOTOE. bot. crypt. (HiU. } :Syn. d'Agaric. Adopté pour un sousi genre par Persoon el par Fries. I'.

.Agaric, (a. f.)

* LEPIPTERUS. pois. Rafinesqne ; (ltiol. Hic, p. i6) établit sous ce nom mn genre qu'il avait appelé Lepterus (dans un ouvrage précédent et qui pairail devoir reutrer clans les Holocen- 1 très. . Il ne coutient qu'une espèce

nommée J'etola, qui appartient à la famille des Percoïdes , et se trouve i dans la mer de Catane où sa chair est ; peu estimée. (b.)

* LËPIRE. Lepirus. ins. Genre de 'Charansons, établi par Gernar, et ; adopté par Latreille (Fam. INalur. du

Règne Anim.). Mous ne connaissons pas ses caractères ; l'espèce qui sert de type à ce genre est le Curculio Colon de Fabncius. (g.)

LÉPIRON I E. Lepironia. bot.

: Piian. Genre de la famille des Cypéracées et de l'Hexandrie Monogynie , L., établi ppr le "professeur Richard

■ dans le Synopsis Plantaruin de Persoon, avec les caractères suivans : les fleurs forment un épi latéral , sessile , ovoïde, allongé , pointu , formé d'é— cailles .imbriquées Irès-étoitement , cai tilagineuses , les plus inférieures vides el sessiles , les supérieures uniflores j chacune de ces écailles, qui est large et obtuse, renferme environ

• seize paléoles, très-rarement douze ou quatorze , dont les deux extrémités plus larges, comprimées et carences, forment

une sorte de glume qui enveloppe les autres ; celles-ci sont

étroites, d'une largeur inégale, et paraissent être en quelque sorte des étamines avortées. Le nombre des étamines varie de trois à six ; leurs filets sont courts ; les anthères très-longues, linéaires, surmontées

■ d'une petite pointe. L'ovaire est comprimé, lenticulaire ; le style est court, surmonté de deux stigmates filiformes. Le fruit est un akène lenticulaire, osseux, terminé en pointe. On ne

l'on connaît qu'une seule espèce de ce genre, *Lepironia mucronata*, Rich., l. loc. cit., Plante vivace, originaire de

LEP 397

Madagascar, ayant ses chaumes simples, dépourvus de feuilles, hauts de deux à trois pieds, articulés intérieurement comme ceux de plusieurs espèces de Joncs, terminés à leur sommet par une pointe roide et très-aiguë, et portant latéralement un seul épi de fleurs à environ un pouce au-dessous de leur sommet. (a. r.)

LÉPISACANTHE. *Lepisacanthus*.

pois. Genre de la famille des Percoides à dorsale double, dans l'ordre des Acanthoptérygiens ; fort remarquable en ce qu'il tient aux Sciènes, aux Trigles et aux Gastérostées par divers points de conformation. Le corps est court, gros et entièrement cuirassé d'énormes écailles anguleuses, à l'apex des carénées ; quatre ou cinq grosses épines tiennent lieu de la première dorsale ; les ventrales sont composées d'une énorme épine chacune, à la base interne de laquelle se trouvent quelques rayons mous, presque imperceptibles ; la tête est grosse, cuirassée ; le front bombé, la bouche gl

aride , les mâchoires garnies seulement d'un velours très-ras au lieu de dents. La membrane branchiostège est à huit rayons , et l'on distingue quelque apparence de dentelures aux opercules. On n'en connaît qu'une espèce des mers du Japon, qui fut décrite pour la première fois par Houttuyn comme un *Casterosleus* , ensuite par Thunberg sous le nom de *Scioena catapiracta*, et figurée par Schneider, pl. a4 , sous le nom *Monocentris carinata*. Sa taille n'est que de cinq à six pouces, et ses grandes écailles ciliées sont terminées par un aiguillon. (b.)

* **LEPISCLINE.** bot. phan. Genre de la famille des Synanthérées , G'orymbifères de Jussieu , et de la S\ngénésie égale, L., établi par Cassin (Uull. de la Société Philomat., février 1818) qui l'a caractérisé ainsi : involucre ovoïde , cylindracé , formé d'écailles imbriquées, appliquées; les extérieures ovales , scarieuses ; les.

intérieures oblongues cl coriaces intérieurement , arrondies , concaves x

LEP

Scarieuses et colorées supérieurement; réceptacle petit , plane, garni d'écailles oblongues , larges , obtuses, tronquées ou dentées au sommet ; calathide oblongue , composée de (leurs nombreuses , égales , régulières et hermaphrodites; offrant très-souvent à la circonférence une ou deux Heurs femelles dont la corolle est plus grêle; ovaires oblongs , pourvus d'un bourrelet basilaire t surmontés d'une aigrette dont les poils sont légèrement plumeux. Ce genre est. placé par son auteur dans la tribu des Inulées , section des Inulées-Gnapharliées. Il se compose de deux espèces rapportées par Linné à son genre *Griaphalhim* , savoir : i° *Lepiscliae cynosa* , Cav., ou *Gnaplialium cyniosurn*, L.;

2° L.1 audifolia, Cass., ou Gn. nudifolium, L. Ces deux Plantes croissent au cap de Bonne-Espérance. La dernière avait été placée par Gaertner dans son nouveau genre Atiaxeton, mais Cassini prétend que celui-ci est formé de Plantes qui ne sont nullement congénères, que le type {Gn. foetidum), de l'aveu même de Gaertner, lui est même étrauger par les caractères, que son Anaxetoi arboreuin est la Plante sur laquelle Wecker avait constitué son genre Argyranthus, etc. Ces motifs ont déterminé Cassini à ne point adopter le nom générique donné par Gaertner, et à le réserver pour un génie particulier qui serait composé uniquement de V Atiaxeton crispum de cet auteur.

F. ce mot. (g..N.)

LÉPISME. Lepisma. ins. Genre de l'ordre des Thysanoures, famille des Lépismènes, établi par Linné, et adopté par tous les entomologistes.

Les caractères de ce genre sont : yeux très-petits, fort écartés, composés d'un petit nombre de grains ; corps aplati et terminé par trois filets de la même longueur, insérés sur la même ligne et ne servant point à sauter.

Les Lépismes ont le corps allongé et couvert de petites écailles souvent argentées et brillantes; il est mou et déprimé. Leurs antennes sont en for-

LEP

me de soies et partagées, dès leur base, en un grand nombre d'articles.' La bouche est composée d'un labre, de deux mandibules presque membraneuses, de deux mâchoires à deux divisions avec un palpe de cinq à six articles, et d'une lèvre à quatre

découpures et portant deux palpes de quatre articles. Le tronc est de trois pièces ; l'abdomen , qui se rétrécit peu à peu vers son extrémité postérieure , a , le long de chaque côté du ventre , une rangée de petits appendices portés sur un court article et terminés en pointe soyeuse ; les derniers sont plus longs; de l'anus sort une espèce de stylet écailleux, comprimé , et de deux pièces : viennent ensuite les trois soies articulées qui se prolongent au-delà du corps. Les pieds sont courts et ont des hanches très-grandes , fortement comprimées en manière d'écaillés. Ces Insectes se distinguent des Machiles de La treille {V. ce mot) par des caractères tirés de la forme du corps , et surtout en ce que ces derniers ont la faculté de sauter, ce que ne peuvent pas les Lépismes : ce sont de petits Animaux:

qu'Aldrovande et Geoffroy avaient nommés Forbicines , et que l'on con-

fiare à de petits Poissons à raison de la manière dont ils se glissent en courant et des couleurs brillantes de quelques espèces ; ils se cachent ordinairement dans les boiseries , les fentes des châssis qu'on n'ouvre que rarement , ou sous les planches un peu humides, etc.; d'autres se tiennent sous les pierres. Ces petits Animaux courent très-vite, et il est difficile de les saisir sans élever une partie des écailles dont leur corps est couvert; ils paraissent fuir la lumière. La mollesse des organes masticateurs de ces Insectes annonce qu'ils ne peuvent ronger des matières dures ; cependant Linné et Fabricius ont dit que l'espèce commune se nourrit de sucre et de bois pourri : suivant le premier, elle ronge les livres et les babilles de laine; Geoffroy pense qu'elle mange les individus du Psoque pulsateur , connu sous le nom de Pou

ide bois. L'espèce qui sert de type au i genre est :

Le Lépisme du sucre , *L. saccharilita* , Linn., Fabr., Latr.; la Forbiccine plate, *GcofT.* (*Ins. h. xx* , 3), Ê&hîeff. (*Elém. Entom. lxxv*). Long tde quatre lignes , d'une couleur artgentée et un peu plumbe'e, sans tacebe. Il est très-commun en Europe cet est originaire d'Amérique. (g.)

* LÉPISME. *Lepisma. bot. phan.*

IdE Candolle (*Théorie élément, de la IBotan.*, p. 408) donne ce nom à une ssorte d'écaillés membroueuses ou un [peu charnues qui se trouvent ù la base ides ovaires dans les Pivoines, les :Ancolies , etc., et qui paraissent être ttanlôt des étamines avortées , tantôt (des expansions du torus. Dans ce dernier cas , les Lépismes très-dévelopipés entourent quelquefois les ovaires ten entier, par exemple, dans la vairiété du *Poenia Moutan* appelée *paipaveracea*. (g..n.)

LEPISMENES. *Lepismenœ. ins.*

IFamille de l'ordre des Xhysauoures, (établie par Latreille, et renfermant lie genre Lépisme de Linné. Les cairaclères de cette famille sont : anlenmes divisées, dès leur naissance, en tun grand nombre d'articles ; des pales très - distincts et saillans à la ouche; abdomen muni de chaque (côté, en dessous, d'une rangée d'api- pendices mobiles , en forme de fausses [pâtes , et terminé par des soies articulées, dont trois plus remarqua- Ibles. Ces Insectes se tiennent cachés ■ dans les lieux où la lumière du jour me pénètre pas; ils sont très-agiles, (quelques-uns exécutent, à l'aide de Heur queue, des sauts assez longs.

ILes Lépisismènes renferment les genres Machilc et. Lépisisme.
F'. ces mots.

LEP1SOSTEE. Lepisosteus. rois.

(Genre très-remarquable de là famille «des Clupcs, dans l'ordre des Malaicoptérvigicns abdominaux selon la i méthode de Cuvier, et de la famille edes Siagonotes de Duméril. « De tous lies Poissons, dit Lacépède (T. V, p.

: 333), les Lépisostécs sont ceux qui ont

LEP 299

reçu les armes défensives les plus sûres. Les écailles dures, épaisses et osseuses . dont toute leur surface est revêtue, forment une cuirasse impénétrable à la dent de presque tous les habitans des eaux, comme l'enveloppe des Oslracions , le bouclier des Acipensèrcs , la carapace des Tortues, et la couverture des Caïmans.

A l'abri sous leur tégument privilégié , plus confians dans leurs forces, plus hardis dans leurs attaques que les Esoces , les Synodes et les Sphyrènes avec lesquels ils ont de trèsgrands rapports; ravageant avec plus de sécurité le séjour qu'ils préfèrent; exerçant sur leurs, victimes une tyrannie moins contestée; satisfaisant avec plus de facilité leurs appétits violens; ils sont d'autant plus voraces , et porteraient dans les eaux qu'ils habitent une dévastation à laquelle très-peu de Poissons pourraiimt se dérober , si ces mêmes écailles défensives, qui par leur impénétrabilité ajoutent à leur audace, ne diminuaient pas leur grandeur et leur inflexibilité , la rapidité de leurs mouvemens , la facilité de leurs évolutions , l'impétuosité de leurs élans , et ne laissaient pas ainsi

à leur proie quelque ressource dans l'adresse et l'agilité. Mais cette même voracité les livre souvent entre les mains de leurs ennemis ; elle les porte à mordre sans précaution à l'hameçon préparé pour leur perte; et cet effet de leur tendance naturelle à soutenir leur existence leur est d'autant plus funeste par son excès, qu'ils sont très-recherchés à cause de la bonté de leur chair. » Les caractères du genre *Lépisostée* consistent dans un museau très-prolongé formé de la réunion des internaxillaires , des maxillaires et des palatins, au vomer et à l'ethmoïde; la mâchoire inférieure l'égale en longueur, et l'un et l'autre hérissés sur toute leur surface intérieure de dents en lèvre, ont le long de leur bord une série de longues dents pointues. Leurs opercules sont réunies sous la gorge par une membrane commune qui a trois rayons de

300 LEP

chaque côté. Ils sont revêtus d'écaillés d'une dureté pierreuse ; la dorsale et l'anale sont vis-à-vis l'une de l'autre et fort en arrière. Les deux rayons extrêmes de la queue et les premiers de toutes les autres nageoires sont garnis d'écaillés qui les font paraître dentelés. Leur estomac se continue en un intestin mince, deux fois replié , ayant au pylore beaucoup de cœcums courts; leur vessie natatoire est celluleuse et occupe la longueur de l'abdomen (Cuv., Règ.

Anim. 2, p. 181). Ce sont des Poissons d'eau douce très-forts et presque inattaquables. Il est très-douteux qu'il s'en trouve dans les deux Indes comme on l'a avancé. Leur patrie constatée est jusqu'ici les fleuves et les lacs de l'Amérique ; on en connaît trois espèces ;

Le Gavial, *Lepisosteus Gavial*, Lac. , Pois. T. v, p. 333; Caïman , *Encycl. Pois.*, pl. 71 , f. 292; *Esox osseus*, L., *GjneJ.*, *Sjst. Nat.* xni ,T. 1, p. i38g. Ce Poisson présente une giande ressemblance avec le Crocodilien dont on lui -a donné le nom comme spécifique. On dirait le Gavial privé de pâtes; tout sou corps est couvert d'écaillés rhomboïdales qui semblent avoir été disposées par l'art ; sa longueur est de deux pieds et plus; sa couleur verdâtre en dessus , violâlre en dessous , et les nageoires tirent sur le rougeâtre. d. 6, F. 1 1 , v. 6 , a. 5,7, c. 12 .

La Spatule , *Lepisosteus Spalula* , Lac., *Pois.*, /oc. cit., p. 6, f. 2(bonne).- L'extrémité du museau de ce Poisson est plus large que le reste des mâchoires ; la longueur de sa tête est à peu près égale à celle de la moitié du corps; les opercules sont rayonnées et composées de trois pièces. Le palais est hérissé de petites dents ; chaque mâchoire est garnie de deux rangées de dents courtes, inégales, crochues et serrées. L'œil est trèsprès de la bouche. Outre les deux rangs de dents de chaque mâchoire, celle d'en haut est armée de deux séries de dents plus longues , sillonnées , éloignées les unes des autres

LEP

et distribuées irrégulièrement. Ces dents plus longues sont re-ques dans une cavité opposée oii elles s'implantent. Au-devant des orifices des narines, deux de la mâchoire inférieure transversent la supérieure , de sorte que lorsque la bouche est fermée elles montrent leur pointe audessus du museau, r. 10, V. 7.

Le Roblo, *Lepisosteus Roblo*, Lac., *Pois.*, loc. cit., p. 33g; *Esox chiliensis* , *Gmel.*, loc. cit., p. 1392, habite les côtes du Chili, acquiert jusqu'à un mètre selon Lacépède , a la chair délicate et fort

transparente. Les Chiliens qui le font saler en font un certain commerce. B. 10, D. i4, P.

* LÉPISDRE. rois. (Lacépède.) Espèce du genre Diacope. Fr. ce mot.

* LEPOCERE. Lepocera. polyp.

Genre de l'ordre des Caryophyllaires , dans la division des Polypies entièrement pierreux , établi par Rafinesque (Journ. de Phys. , 1819 , T.

lxxxviii, p. 429) qui le caractérise par une écorce très-distincte, et par sa bouche qui est à peine radiée. Le naturaliste américain fait mention des espèces suivantes: L. amblocra, xylopris, rugosa , lœvigaia-, il n'en donne point la description. Nous présumons qu'elles se trouvent dans les Etats-Unis. (e.d..l.)

LEPODUS. rois. Rafinesque a établi sous ce nom, aux dépens des Scarcs , un genre qui contient l'espèce appelée imperialis par Cupani, et Saragus dans les mers de Sicile. Il n'a pas encore été adopté. (b.)

LËPORINS. mam. Famille de.

Rongeurs, établie par Desmarest dans le vingt-quatrième volume de la première édition de Détéville, qui contient seulement les deux genres Lièvre et Pika. ces mots, (b.)

LÉPRAIRE. Lepraria. bot. crypt.

Pour Lèpre , Lepra. V. ce mot. (b.)

LÈPRE. Lepra. bot. crypt. (IJchens.) Avant que le genre Lepra fût

LEP

fixe , le mol qui sert à le désigner fut employé par Haïler , YViggers , Persoon et De Candolle pour nommer des Plantes dont les unes sont placées maintenant dans les Colleuia, les Urcéolaires, les Lécanores , les Xsidium et les Lécidées , et les autres reléguées dans des genres qui ne figurent plus dans l'a famille des Lichens. V. Palmella et Spokotri- CHUM. Acharius, dans sa Méthode, avait fait deux genres du Lepra, le Puheraria pour les espèces à thallus

{lulvéruleut ou nul (considérant alors es gongyles comme des apothéeions), et le Lepraria pour les espèces à I lia l— lus crtis-tacë. Plus tard, dans la Lichénographie et le Synopsis, il les a réunis, et c'est ce genre qu'il nomme Lepraria, que nous adoptons sous le nom de Lepra , plus ancien. Bory de Saint-Vincent , en l'an V de la 'république , constitua le premier ce genre sous le nom de Phytoconis dont Linné avait l'ait ses Byssus pul- -Vérulens. Nous le caractérisons ainsi : thalle cruslacé, lépreux, uniforme isnns limites; apothéciou nul; gon- -gyles nus, libres et agglomérés, épars. sur la surface de la Plante.

Bien que plusieurs espèces de Lepra aient été réparties dans les Lécanores et les Lécidées et que plusieurs antres aient -figuré dans les ■Coirfrves , il serait hasardeux d'en 'conclure que toutes doivent disparaître du genre. Les Lèpres se trouvent sur les murs, les pierres et les vieilles éeorces ; on les rencontre rarement sur les éeorces d'Arbres sains; 'elles se plaisent dans les lieux sombres et humides; plusieurs sont odorantes. Le thalle, si l'on peut don- 'her ce nom à l'agglomération des :gongyles , est d'une cousistanec mol- "le et spongieuse , il varie beaucoup : Jsa couleur est ordinairement assez vive; voici l'ordre des nuances par

'degré de fréquence : jaune et jaune- "soufre, verte, blanche, giise , rose et blanchâtre. Le Lepra est \cPulina et le Conia d'Adanson ; son nom lui a été donné à cause de la ressemblance de cette sorte du Lichens avec

LEP Soi

les affections cutanées connues sous le nom de dartres. Nous ne ferons connaître que l'espèce suivante qui est cosmopolite : *Phytoconis candellaii* , Bory , *Lepra flava* , N. ; *Lepraria /lava*, Ach., Lich. univ., p.

663 ; *Pulveraria flava* de Floerke ; *Lichen flavidus* de Schreber, etc., à croûte cfiuse, égale, mince, un peu ridée, très-jauuc, composée de granules globuleux, nus. Nous avons des échantillons de cette Plante, venant d'un grand nombre de régions du globe. Le genre $Zn^{\wedge}/va$ commence l'ordre des vrais Lichens dans notre méthode ; il est placé dans le groupe des Coniocarpées. (a.F.)

LEPRONCUS. boj. CRYPT.

{Lichens.) Ce genre créé par Ventcuat sur une des divisions du genre Lichen de Linné , renferme les Lichens lépreux de cet auteur.

Il est ainsi caractérisé : poussière épars sur une croule lépreuse (organe mâle selon quelques naturalistes) ; tubercules ordinairement convexes , sphéroïdes, linéaires, oblongs (organes femelles); il renferme les Opégraphcs , les Patellaires, etc.; enfin , tous les Lichens à thalle adhérent, amorphe , ayant des tubercules ou des scutélles dont la marge est peu prononcée. Le genre *Leproncus* n'a pu être adopté. (a. f.)

LEPR.OP1NACIA. bot.chypt. [Lichens.) Genre artificiel, non adopté, créé par Vculeual dans la famille des Lichens; il renferme des Patellaires , des Urcéolaires et même des Yerrucaires. ce» mots. (a. F.)

*LEPI\OSIS.uoT.cnYi>T.(Z,/c/««s.) Necker avait proposé ce nom pour remplacer celui de Lichens. V. ce mot. (a. :e)

LEP TA. bot. pu an. Loureiro (Flor. Cochinc/iiu , édit. WilldenoAV, 1, p. îo'i) a établi sous ce nom un genre de la Tétrandrie Monogynie, L. , auquel il a donné les caractères suivans : calice très-petit , à quatre divisions profondes , ' étalées ; quatre

301 LEP

pétales presque triangulaires striés, courbés en dedans; quatre étamines à filets subulés et insérés sur les angles du réceptacle ; ovaire presqu'arrondi; style à peu près nul; stigmate obtus; baie à quatre lobes monosperines. Ce genre est à peine connu ; aussi a-t-il été rapporté à divers autres genres par les auteurs. Ainsi Jus-sieu l'a réuni au Skiminia de Thunberg, Sprengel à Yllex , Smith au Vitis et Poirét à YOthera. Dans le second volume de son Pro-dromûs Sy&t.

Veget., De Candolle l'a placé à la fin de la famille des Célastri-nées. Une seule espèce le constitue ; c'est le Lepta t/iphylla , Lour., Arbrisseau trèsrameux , à feuilles ternées , lancéolées et très- entières. Ses fleurs sont blanches , petites et dispersées en grappes axillaires. Il croit dans les forêts de la Çochinchine. (g..n.)

LEPTADEN1E. Leptadenia. bot.

. riJAN. Dans son travail sur les Asclépiadées , publié dans le premier volume des Mémoires de la Société Wernérienne, R. Brown appelle ainsi un nouveau genre de celle famille qui se compose de deux ou trois espèces volubiles , cendrées , à feuilles planes et opposées et à fleurs disposées en ombelles placées latéralement à côté des pétioles. Leur calice est à cinq divisions profondes; leur corolle monopétale, presque rotacée , ayant le tube très-court, la gorge munie d'écailles ; les étamines sont libres, à anthères simples à leur sommet; les masses polliniques sont droites, attachées par leur base et rétrécies à leur sommet. Le fruit n'est pas connu.

*LEPTALEUM. bot. phan. Genre de la famille des Crucifères, établi par De Candolle (Syst. Vegct. Nat. , 2, p. 510) qui l'a ainsi caractérisé : calice fermé, composé de sépales linéaires, égaux à la base; pétales linéaires, du double plus longs que le calice; quatre étamines alternes avec les pétales , dont deux plus longs ; silique cylindracée, indéhiscente ? biloculaire , à valves convexes , et à cloi-

LEP

son étroite; deux stigmates aigus, H réunis en un seul; semences nom- y breuses disposées en un seul rang. 1 Ce genre fait partie de la tribu des \ Sisymbriées de L) e Candolle. Il est caractérisé par un aspect très-grêle , particulier , et par ses quatre étamines formées peut-être chacune par la soudure de deux , une dernière étant 1 avortée. En adoptant cette théorie , on n'éloignerait pas le Leptaleum de la (tétradynamie de Linné , classe qui renferme toutes les autres Crucifères'. 1 Par ses fleurs il ressemble au Malva- & //lia, par son stigmate à VHesperis, et par son calice et sa silique au Sisymbrium. Deux espèces, dont

l'une était placée dans ce dernier genre , ' constituent le *Leplaleum*. De Candolle les a décrites sous les noms de *L. Jilifolium* et *L. pygmœum* , et elles ont été figurées dans les *Icônes ' Se/ectœ de Benj. Delessert* (T. il, lab. ! 68). La première croît en Sibérie et la . seconde en Perse. (g..n.) ,

* *LEPTAMNIDM* et *LEPTAM-* i *NUS*. bot. phan. Ces noms ont été n donnés par *Rafinesque-Schmaltz* à un li géni e formé aux dépens des *Oroban-* si ches , et qui est le même que *YEpifa-* li gus de *Nuttall*. V. ce mot et *Ono-* Il

BANCHE. (G..N.) Il

* *LEPT ANDRE*. *Lapiandra*. bot. , phan. *Nuttall* (*Gen. ofNorth Jmer.* , j -i, p. 7) a proposé d'établir un genre (nouveau pour la *V~eronica virgi.nica*. j de Linné, genre qui, selon ce bota- j nisle, se ^tiggfterait.^es *Véroni-* y ques par son calice à cinq divisions , . sa.coiolle tubuleuse , çampanulée,ses étamines très-saillantes et sa capsule 5 dont les loges sont polyspermes.

Mais ces différons caractères sont de fort peu d'importance el d'ailleurs se rencontrent soit isolément , soit réu- ! nis dans plusieurs autres espèces qui appartieunentsiireinent au genre *Véronique*. Nous pensons donc que le genre proposé par le célèbre botaniste américain ne peut être adopté. V .

Véronique, (a. b.)

LEPIANTHE. *Leplanthus*. bot.

LEP

i ph an. Ce genre, de la *Triandrie Momogynie* , *L.*, voisin du *Pontederia*, a (été établi par *Richard* {in *lUichx*.

F/or. Borea/i-Amcr., i, p. 24); mais lil est identique avec le genre Ilele-

rantlicra constitué antérieurement]par Beauvois , dans le 4e volume des

Actes de Philadelphie. P. Hétîran- •thèjik. Le Leptantlius grarnincus se i distingue des autres espèces par des i caractères qui ont paru sulHsans pour • en former un genre particulier aui- quel Willdenow a donné le nom de . Ûc/iollera. y. ce mot. (g..N.)

LEPTASPIS. Leptaspis. bot. i*han.

'C'est un genre de Graminées établi par R. Brown {Prodr. , 1 , p. 211) et ■qui offre des fleurs monoïques. Los mâles ont une lépicène uniflore , bivalve , une glume plus grande , composée de deux paillettes membraneu- : ses ; l'externe ovale concave; l'in-terne plus étroite , linéaire, plane; point 1 desoies hypogynes. Les fleurs femel- 1 les ont la lépicène semblable à celle >des mâles; la valve externe de la glu- ' me est très-renflée , presque globuleuse, avec une petite ouverture à : son sommet; l'interne t> è* — petite et ! linéaire. Point desoies hypogynes; Ile style est terminé par trois stigma- 1 tes velus. Le fi nit est renfermé daus lia valve ex-terne de la glume, qui est

■ vésiculeuse. Ce genre se compose 'd'une seule espèce, Lep-aspis Bank-

■ sii, Brown , /oc. cil. Cette Plante, 'originaires delà Nouvelle -Hollande , ra le poit du Phartis latifoiuus , dont • elle se rapproche aussi beaucoup par

sou organisation , n'en différant que par l'organisation de la valve externe de sa glume. (a. h.)

LLPTE. Leptus. ar achn. Genre de l'ordre des Trachéennes , famille des Mieïophthires de Latreille (Fam. Nat.

du Règn. Anim.}, auquel ce savant donne pour caractères : six pates ; un suçoir avancé ; des palpes appareils , couits et presque coniques; corps très-mou et ovale. Ces Arachnides ont .le corps ovale , renflé , la partie antérieure présente comme une tête , ayant de chaque côté un point noir ,

LEP ôo.7

les yeux probablement; la peau qui couvre le corps est souple , bien tendue et luisante; l'Animal la fronce et la ride quelquefois. Ce genre s'éloigne des Colis par le corps qui est mou , tandis qu'il est écailleux dans ces derniers. Ils diffèrent des Atomes, en ce que ceux-ci n'ont point de suçoirs ni de palpes visibles. Ces petites Arachnides sont parasites ; l'espèce la plus commune, Leptus Pha/angii , vil sur le Faucheur {Phalangium Opi- /io); souvent elle ne s'y tient fixée que par son suçoir. Une autre espèce est très-commune en automne sur les Graminées et d'autres Plantes ; c'est :

Le Lepte automnal , Leptus autumnalis, Latr., Acarus autumnalis , Shaw (Miscell. Zool., t. 2, pl. 4a). II est très-petit et d'une couleur rouge ; il grimpe et s'insinue dans la peau, à la racine des poils , et cause des démangeaisons très-vives; il est connu vulgairement sous le nom de Rouget par les habitans des campagnes; notre savant ami Quoy , naturaliste et médecin distingué, nous a appris qu'il est très-commun , à l'époque des vendanges, dans le département de la Charente-Inférieure , où il est connu sous le nom de Vendangeron. Latreille a apaisé les démangeaisons qu'il

cause en lavant les endroits irrités avec de l'eau mêlée d'un peu de vinaigre. (g.)

LEPTEMON. bot. phan. (Rafinesque.) Syn. de Crolonopsis. V. ce mot. (b.)

LEPTÉRATNTHE. Leptcranthus.

bot. PHAN. Necker {Elem. Bot. , n.

1 50) a proposé de distinguer , sous ce nom générique, toutes les espèces Linnéennes de Centaurées , dont les écailles de l'involucre sont recourbées, plumeuses des deux côtés, et dont les akènes fertiles sont pourvus d'une aigrette soyeuse. La section des (Jentaurea , à laquelle Persoon donne le nom de Phrygia , correspond à ce genre de Necker, qui a pour type le Centaurca Phrygia de Linné, espèce qui croît dans les hautes montagnes

304 LEP

de l'Europe. Cassini a adopté ce genre , ainsi que le Jacea , formé aux dépens des Centaurées. Non-seulement ces deux genres ne sont à nos yeux qu'un seul et unique groupe , mais ils ne nous semblent pas devoir être séparés du Centaurea. V. ce mot.

LEPTERUS. pois. (Rafinesque.) V. Lepipterus.

* LEPTIDIUM. bot. phan. Nom donné par de Gingins (in De Cand.

Prodr. , 1 , p. 504) à la cinquième section qu'il a établie dans le genre Violette, f. ce mot. (G..N.)

" * LEPTINELLE. Leptinella. bot.

phan. Genre de la famille des Synanthérées , Corymbifères de Jussieu , et de la Syngénésie nécessaire , L. , établi par H. Cassini (Bidlet. de la Soc.

Philomat. , août 1822) qui l'a ainsi caractérisé : involucre hémisphérique , formé d'environ dix écailles appliquées, sur deux ou trois rangs, tiès— larges , membraneuses et scarieuses sur le bord supérieur; réceptacle nu, conoïde ; calathide tantôt unisexuelle , tantôt monoïque; le disque composé de fleurons nombreux , réguliers et mâles ; la circonférence composée de fleurs en languettes et femelles. Lra fleurs mâles renferment un rudiment d'ovaire qui est petit, dépourvu d'aigrette, et surmonté d'un style long», simple, terminé au sommet par une troncature orbiculaire. L'ovaire des fleurs femelles est grand, obovale, avec une bordure sur les deux côtés ; il est dépourvu d'aigrette. Le style est long, surmonté do deux stigmates larges et divergens.

11. Cassini a placé ce genre dans la ii ibu des Anlliéinidéés près des genres Jlipia, Cotula et Gymnosly les ou Saliva. Il en a décrit deux espèces {Lepiinella scariusa et L. pi/mata) qui sont de très-petites Plantes herbacées <lont la palne est inconnue. Enfin, il a indiqué avec doute, comme congénères de son Leptinella , les Hippia l>eduncularis et Bogotensis de Kunth.

LEP

LEPTIS. Leptis. ins. Genre de l'ordre des Diptères que Fabricius nomme ainsi dans son Système des Anlliates et qu'il appelait auparavant Rhagiu. Latreille, qui a établi un genre d'Arachnides , sous le nom de Lepte,- n'adopte pas la première dénomination de Fabricius et continue d'appeler Rhagie (Rhagio) les Insectes du genre Leptis de ce dernier. P^.

RnAGIE. (g.)

LEPTOCARPE. Leplocarpus. bot.

phan. R. Brown appelle ainsi un nouveau genre qu'il a établi dans la famille des Restiacées et qu'il caractérise de la manière suivante : les fleurs sont unisexuées, dioïques , disposées en faisceaux ou en chatons.

Leur périgone est formé de six écailles glumacées. Dans les fleurs mâles on compte trois étamines , dont les anthères sont simples et peltées ; dans les fleurs femelles , un ovaire uniloculaire, monosperme, surmonté d'un style simple et de deux ou trois stigmates filiformes. Le fruit est un akène enustacé , couronné par la base du style. Ce genre se compose d'espèces qui croissent à la Nouvelle-Hollande et au cap de Bonne-Espérance.

Ce sont des Plantes herbacées donc; les chaumes , dépourvus de feuilles, sont simples et environnés à leur base de gaines fendues. Les fleurs, comme nous l'avons dit, sont disposées

en faisceaux ou en chatons, différence qui en entraînant quelques autres

différences dans l'organisation , pourrait , selon R. Brown , déterminer la formation d'un genre particulier de chacun de ces groupes. Dans l'ouvrage que nous avons cité précédemment, Brown donne les caractères de sept espèces de ce genre , observées par lui à la Nouvelle-Hollande. Parmi ces espèces, on remarque le *Leptocarpus simplex* qui est le *Restiopsis simplex* de Forster , et le *Leptocarpus tenax* ou *Schoeriodendron tenax foemina* de Labillardière , *Nouv.-Holl.*, t. 22g. Selon Brown, le *Schoeriodendron tenax* n'est pas du même

auteur appartient à un autre genre qu'il nomme Lyginia. Il faut encore rap-

LEP

.porter au genre Leplocaipus les Resitio imbricalus de Thunberg, distaïc/tjos de Rollboel, et quelques autres <cspèces également originaires du cap iide Bonne-Espérance. (a. h.)

* LEPTOCARPÉE. Leptocarpœa.

S3oT. l'ïian. Le professeur De Candol- 11e , dans le second volume de sou iSystema Vtgelabilium , appelle ainsi mn genre nouveau qu'il forme dans lia famille des Crucifères , pour le Si- -syrn- brium Luese/ii , L. Ce genre a [pour caractères : une silique très- Sgrêle et cylindrique, dressée; unstigunatc sessile et bilobé ; un calice éta- Ué , formé de quatre sépales égaux; (ides graines fort petites , disposées sur uune ou deux rangées. Les fleurs sont jjaunes et inodores; les cotylédons N»ont probablement incom- baus. Ce genre nous paraît devoir être réuni nu Sisymbrium. (a. h.)

LEPTOCARYON. bot. phan.

FDioscoride.) Syn. de Noisette. (B.)

LEPTOCÉPHALE. Lwtocephalus.

peois. Genre établi par Gronou , pla- :cé dans l'ordre des ftla- lacoptérygiens ifpodes, et conséquemment de la famille des An- guifoi mes, qui est la seule pju'on y trouve. Ses caractères consistent dans l'ouverture des branchies li ituces de chaque coté en partie sous la l^orge ; dans la petitesse de la dorsale H de l'anale qui sont à peine visibles, et s'unissent à la pointe de la

|meue ; dans le corps qui est comprimé online un ruban. La tête est extrêmement petite, ayant le museau pointu; mn n'en connaît encore qu'une espèce:

ce Mop. iusien, Lac, Pois. T. n, p. 3, .a; *Leptocephalus Morrisii*, Gmel., ijyst. Is'at. uni, T. i, p. n50 ; vulgairement le Hameçon de mer, petit Pois~on des côtes d'Angleterre , iiong de quatre ou cinq pouces , d'une -orme bizarre , lancéolé aux deux nttrémilés. Le *Leptocephalus Spal- :anza/ii* de Risso appartient aux Spbaté-branches. V. ce mot. (h.)

LEPTOCERAS. bot. tuas. R.

•rown [Frodr. Flor. Nov.-Holl. , p.

tome IX

LEP 505

3^5) a ainsi uomméla seconde section du genre *Caladenia* , qui , par ses caractères assez saillans, sera probablement par la suite érigée en genre distinct. V. Caladénie. (g..n.)

* LEPTOCÈRE. *Lepiocera*. œs.

Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Tétramères, famille des Loiigicornes , tribu des Cérambycins, établi parDejean (Catal. des Coléopt., p. io8,i et dont il ne donne pas les caractères. La seule espèce qui forme ce genre est le *Cerambyx striplus* de Fabricius. Il se trouve à l'Ile-de- France.

Le même nom a aussi été donné à un genre de Charançons mentionné par Latreille (Familles Naturelles du Règne Animal) el dont ce savant ne donne pas les caractères. (g.)

LEPTOCHI.OA. bot. ru an. Genre de la famille des Graminées , et de la Triandrie Digynie , L. , établi par Palisot- Beauvois (Agrioslograpbie , p.

71, lab. i5, f. i.) qui l'a ainsi caractérisé : panicule simple , à épillets alternes et simples, et à locustes disposées d'un même côté; lépicène (glume, Palis.) renfermant trois à cinq fleurs, et dont les valves sont lancéolées , aiguës et presque égales aux fleurs; glume inférieure (paillette, Beauv.) naviculaire et aiguë, la supérieure bifide et dentée ; caryopse libre , sillonnée.

Ce genre est, selon Beauvois, un de ceux qui ont Je plus de rapport avec le Foa, dont il se distingue par le port , sa panicule simple , ses rameaux grêles et ses locustes disposés du même côté. Les espèces qui lui ont été rapportées par l'auteur sont au nombre de trois , savoir : i° *Leplochloa capillacea* , Beauv. , ou *Cynosurus capi* II accus ; a° *L. Jilifurmis*; 3° et *L. i rigata*.

Cbr. Godofr. Nées d'Esenbeck {Sylluge F lanlarutn novarum , Ratisbonne, 18⁴), en donnant la description très-détaillée d'une nouvelle espèce, *Leptochloa proccra*, que le prince de Neuwied a rapportée du Brésil,

ao

306 LEP

et qui est cultivée au jardin de Bonn , a fait en même temps une petitemonographie de ce genre. Il a indiqué comme synonymes génériques le *Leptostacl*/.ys de Méyer et X *Oxy dénia* de

Mut ta 11. Quelques espèces placées clans le Rhabdochloa par Palisot-Beauvois doivent encore faire partie du Leptoc/iloa; et, d'un autre côté, on doit éliminer de celui-ci les L. cynosuroides , tenerima et mynostachya de Roemer et Schultes. En définitive, il a composé le Leptochloa des Plantes suivantes : i° L. Jiiiiformis; 2° Z<.

procera, Nées, qui a peut-être pour synonyme le Festuca Jiiiiformis de Lainarck; 5° L. virgata-, 4° L. chinensis , Nées ; 5° L. domingensis , Nées , ou Rhabdochlua domingensis , Palis. - Beauv. ; 6" L. gracilis , Nées , ou Clitoris gracilis , Kuntli; 7o L. duhia , Nées , ou Clitoris ditbia , Kuntli; 8° i. digitaria , Nées , ou Clitoris digitaria , K un th . (g. .N.)

* LEPTOCORISE. ma. Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères , famille des Géocorises, tribu des Longilabres, mentionné par La treille (Fam. du Règn.

Anim.,p. 42t) et dont les caractères nous sont inconnus. Il est voisin du geure Alyde. (g.)

* LEPTOCR AMBE . bot. phan.

Nom donné par De Candolle à la seconde section du genre Crambe , laquelle correspond au genre Rapisifilm de Médikus et de Moench. V.

Ckambe. (g..n.)

■ LEPTODAGTYLES. Leptodactyla. MAM. Illiger forme sous ce nom une petite famille entre les Makis et les Marsupiaux pour le genre Aye- Aye. V. ce mot. . (u)

* LEPTODERMIS. Leptoder/nis.

bot. pu AN. Genre de la famille des Rnbiacées et de la Pentandrie Monogynie , L. , établi par Wallich (in Fl. Jhd., a, p. 191) qui lui donne les caractères suivans : calice supérieur; corolle monopélale , infundibuliforme; étamines courtes et incluses; ovaire accompagné d'une bractée ca-

LEP

liciforme , lubuleuse et bilobée; cet I ovaire est à cinq loge's contenant clia- I cune un seul ovule dressé. Le stig- I mate est à cinq lobes. Le fruit est une capsule à cinq loges monosper- I mes , s'ouvrant en cinq valves.

Ce genre ne se compose que d'une I seule espèce , Leptoder/nis lanceolata, I Wall. , toc. cit. C'est un Arbrisseau I à feuilles opposées, presque décus- I sées, lancéolées, aiguës, entières, portées sur un court pétiole. Les fleurs sont blanches, inodores, ternées et placées au sommet des rameaux. Il .cioît dans les montagnes du Napaul. (a. h.)

LEPTODON. bât. crypt. (Mousses.) Weber et Mobr (Tab. Syn.

Musc.) avaient proposé ce nom pour le t

genre Lasia de Palisot-Beauvois ; ce i

dernier nom ayant, la priorité a dû c

prévaloir. V. Lasia. (>.f.) i

LEPTOGASTÉR. ins. (Meingen.) } Syn. deGonype. V. ce mot. (b.)

* LEPTOGIDM. bot. crypt. (Li- ci cliens.) Sixième sous-genre établi parmi les Collémas par Acharius; il renferme huit espèces , et est ainsi caractérisé: thalle foliacé ; lobes ar-)j; ronds, membraneux , d'une consis- G tance très-tendre , nus , d'un gris- f, cendré, presque diaphanes; apothé- ^ cions sous-pérliccllés. Il serait bien dé- ,\,, sirabie qu'un lichénographe habile fît \> ,une Monographie du genre Collema |r, dont la France possède un grand nombre. Pouzolz a récolté en Corse, rv à Sau Bonilacio , le Collema azureum <, de Swartz qui n'avait encore été trouvé qu'à la Jamaïque par ce der- j nier botaniste, et par nous sur les g Quinquinas péruviens. Ce beau Li- ï chen rentre dans la section dont il est » ici question. (A. F.) j

LEP.TOLÈNE. Leptolœna. bot. H pu an. Du Petit-Thouars dans son lé Histoire des Végétaux des îles austra- 1 les d'Afric{uc, p. 4i , appelle ainsi un genre nouveau de Plantes, qu'il établit dans sa pct.te famille des Chléuacées. Ce genre se compose I d'une seule espèce, Leptolœna multi-

LEP

,flora, loc. cit., T. il. C'est un petit . Arbuste élégant , originaire de Mai dagascar. Ses rameaux sont grêles ; : ses feuilles alternes, courtenient pctiolées, ovales -oblongues , entières, un peu ondu- lées sur les bords, glabres , accompagnées à leur base de | deux stipules très-caducs. Les (leurs .•sont blanches, léunies en co- rymbe terminal. Chaque ûeur ofl're un involucre monophylle épais à six dents; lie calice est plus long que l'involucre , formé de trois sépales concaves ; lia corolle est composée de cinq pé- tails rétrécis à leur base et rappioichés de manière à former un tube.

Les étamines, au nombre de dix, :Sont monadelphes par leur base où «elles constituent un uicéole entier.

.L'ovaire est à trois loges contenant • chacune deux ovules; le style est 'épais, terminé par un stigmate trilo- Ibé. Le fruit est une capsule uniloculaire et mono-qierme par avortement, lentièremment recouverte par l'involucre qui est charnu. La graine se com-]pose d'un tégument propre qui est

■ coriace, d'un endosperme corné et (d'un embryon dont la radicule cyllindrique est tournée veis le bile.

(Cet Arbrisseau , commun autour de IFoulcpointe , fleurit en août. Le {genre Lepiolœna est très-voisin du LÛarcolœna; cependant il en difflère :

ii° par le calice plus long que l'iuvo- Uucre; i° par ses étamines seulement «■en nombre double des pétales ; 5° et {par son fruit uniloeulaire et monossperme. (a. n.)

LEPTOMERE. Leptomera. crust.

(Genre de l'ordre des Lœmodipodes , (famille des Filiformes (Làtr. , Fam.

'Natur. du Règn. Anim.), établi par ILa treille et ayant pour caractères :

rpieds au nombre de quatoï ze , dispossds en une série continue depuis la Mêle jusqu'à l'extrémité postérieure tdu corps, y compris les deux prei mini s qui sont annexés à la tête. Ces i pieds sont très-grêles ; corps composé

■ d'une tête et de six segmens.

Ces Crustacés se distinguent des genres Proton et Chevrolle, parce

LEP Sot que ceux-ci n'ont que dix pieds, les premiers en série continue, et les seconds en série interrompue. Le Crustacé qui forme le type de ce genre est la Squil/a ventricosa de Millier (ZoôI« Dau., lab. 56, fig. i-3);Hcrbst(Caucr.

T. XXXVI, fig. il). Latreille rapporte aussi à ce genre l'espèce représentée par Slabber (Mém., tab. 10, (ig. a) quia un appendice en forme de lobe à tous les pieds, les deux premiers exceptés, et le Cancer pedatus, Monlagu {l'rans. Linn. T. XI, pl. -2, fig. n) qui en a tous les pieds pourvus, moins ceux de la première et des trois dernières paires. (g.)

LEPTOMÉRIE. Leplomeria. bot.

riiAN*. Genre de la famille des Santalacées, très-voisin des Thliesium, établi par l\ob. Brown {Prodr. i, p.

553), et qui peut être ainsi caractérisé : calice adhérent avec l'ovaire infère et terminé par un limbe rolacé, à quatre ou cinq divisions profondes et persistantes; disque épigyne à quatre ou cinq lobes; étamines au nombre de cinq, insérées en de- Jiors des lohes du disque; stigmatte lobé. Le fruit est une drupe couronnée par le limbe du calice. Ce genre se compose de petits Arbustes à feuilles éparses, petites ei quelquefois nulles. Leurs (leurs sont également fort petites, disposées en épis. Le genie Comandra proposé par Nuttall, pour le Thliesium umbeUalum, nous paraît devoir être réuni à ce genre.

Le Lcptomeria auquel Brown réunit le Thesiitrn drupaceuin de Labillardière, dilfère des Thliesium par la présence d'un disque

épigyne. (a. h.)

* LEPTOMITUS. bot. crypt.

{Coriferuées ?) Genre récemment établi par Agardb [Sysl. ,11g. , p. 23 et 4g) qui lui donne pour caractères :

des filamens hyalins ou peu colorés, arachnoïdes, obscurément aciculés, libres, di oits, et non entrelacés. Ce sout, au dire de l'auteur , les ébauches de la végétation sur les corps inondés. Il en mentionne dix espèces, toutes excessivement petites , à

LEP

peine visibles à l'œil désarmé et ne se manifestant guère que comme un duvet pâle. Les unes croissent sur les Jlydrocharides de l'eau douce, d'autres sur les Céramiaires de la mer.

Mademoiselle Libert en a découvert une espèce fort élégante dans les environs de Malmédy ; nous l'avons communiquée à Agardh qui lui a conservé le nom de Libertine par lequel nous la désignâmes le premier.

LEPTON. bot. pu an. La Plante désignée sous ce nom dans Pline paraît èlre la petite Centaurée. V . Erythrée, (b.)

* LEPTONÈME. Leptonema. bot.

fhan. Genre de la famille des Euphorbiacées , et de la Diœcie Penlan- .dric, L., nouvellement établi par notre collaborateur Adrien de Jussieu {De Euphorb. Generib. , p. 19, pl.

4, f. 12) qui l'a ainsi caractérisé:

fleurs dioïques ; calice à cinq divisions profondes. Les fleurs mâles sont pourvues de cinq ou rarement six étamines dont les filets sont libres , capillaires , saillans , les anthères grosses , courbées , à loges distinctes pendant la préfloraison et ensuite redressées. Les fleurs femelles présentent trois à cinq styles profondément divisés en deux , surmontant un ovaire à trois ou cinq loges dispenses. Le fruit est capsulaire, globuleux, déprimé, à trois ou plus fréquemment cinq coques bivalves et dispermes. Le placenta porte trois à cinq cloisons , et forme supérieurement autant d'expansions {massuicæ) pendantes dans Les loges , et sous lesquelles on voit les funicules qui suspendent les ôvules. Ce genre ne se compose que d'une seule espèce que Poirer (Dict. Encycl.) avait décrite sous le nom d' ' *Acalyphia venosa*. C'est un Arbuste de Madagascar , à feuilles alternes, stipulacées , longuement pétiolées , presque entières et velues.

Les pédoucles des fleurs sont solitaires et axillaires , plus longs et uniflores dans les individus femelles , multiflores dans les mâles, et acconi-

LEP

pagnés de plusieurs bractées linéaires.

* LEPÏONIA.BOT. crypt. {C/tampignons.) Quinzième sous-genre d'Agaric dans la Méthode de Frics, Agaiuc. (b.)

LEPTOPE. Leptopus. ins. Genre de l'ordre des Hémiptères , section des liétéroptères , famille des Géocorisés, tribu des Oculées, établi par Latreille , et ayant pour caractères :

bec court , arqué et épineux en dessous ; antennes en forme de soies ; cuisses antérieures grandes et épineuses. Ce genre se dis-

tiugue de celui de Salde par le bec qui est long dans ce dernier. Les Pclgonics de Lalreil- Je s'en distinguent par les antennes et par la forme du corps. L'espèce sur laquelle Latreille a établi ce genre est :

Le Leftope littoral, , L. littoralis, Latr. Il est long de deux lignes, ovale, d'un cendré obscur, avec quelques taches sur les élytres et leur bord extérieur , blanchâtres. Leurs appendices membraneux sont pâles avec les nervures obscures , les pieds sont d'un jaunâtre pâle. Cette espèce a été trouvée en Espagne par Léon Dufour. Le Leptopus lapidicola en est très-voisin ; il a été découvert dans le département du Calvados par Ilasoches. (o.)

LEPTQPEYTE. Leptop/tytus. eot.

Ph^.n, Ce nom a été donné par H.

Cassini(Bullet. delà Société Philom., janvier 1817) à une section du genre Leysera , laquelle se distingue des espèces considérées comme types de celui-ci par sa calathide discoïde au lieu d'être radiée , par son involucre oblong, cylindracc , formé d'écaillés dressées , entièrement appliquées , non appendiculées , tiès -aiguës au sommet , tandis que les vrais Leysera ont l'involucre campaniforme, formé d'écaillés surmontées d'un appendicej étalé et ai rondi au sommet. Le Lepto phytus diffère en outre du Leyser par sa tige herbacée. L'auteur de c sous-genre a donné une ti ès-longu description de tous les organes flo

LEP

raux , description que nous ne pou- ■ vous retracer ici , en avant fait coni naître les caractères les plus sail- I lans. Une seule

espèce le constitue; c'est le *Gnaphalium leyscroides* , Desf., Flor. Allant., auquel Cassini , i d'après un principe qui lui est parti culier, adonné le nom de *Leptophytus* , leyseroides. Il a néanmoins indiqué i celui de *Leysera discoidea* pour ceux . qui admettent qu'une espèce doit porter le nom du genre principal auquel l'auteur du *Leptophytus* convient luimême qu'il doit être rapporté. V. au

- surplus le mot Leysère. (g..n.)

LEPTOPODE. rois. Sous-genre i de Coryphœne. V. ce mot. (u.)

- * LEPTOPODE. *Leptopoda*. bot.

PHAN. Genre de la famille des Synanthérées et de la Syngénésie supernue, L., établi par Nuttall [Gêner, of Ji'ort/i Amer. Plants) qui lui a donné les caractères suivans : involucre court, formé de folioles aiguës, disposées sur un seul rang; réceptacle nu

- et hémisphérique; (leurs du disque nombreuses, régulières, hémiaphroïtes, ayant une corolle à tube court,

- et à limbe glanduleux, quadrilobé ou i quinquélobé ; un ovaire cylindrique , | glabre , surmonté d'une aigrette composée de huit à dix paillettes oblon-

gues , obtuses , un peu découpées ; fleurs des rayons nombreuses, neutres , disposées sur un seul rang , et présentant une corolle à languette

' tridentée et élargie vers le sommet.

'Ce genre est très-voisin de *Vffelenium* , dont il ne diffère que par son involucre simple et par les fleurs neutres delà circonfé-

rence. 11 a aussi beaucoup de rapports avec les genres Gaillardia ou Galardia et Balduina, mais il en est suffisamment distinct par des caractères que, dans la crainte d'être prolix, nous ne pouvons énumérer ici ; il suffira de jeter les yeux sur les descriptions de es genres. V. Balivink et Galardie.

Le Leptopoda Helenium , Nuttall , Galardia Jimbriata, Michx. , est une Plante herbacée dont la lige est simple,

LEP 30g

haute d'environ un mètre, garnie dans sa partie moyenne de feuilles décurrentes, les inférieures très - longues , linéaires , lancéolées , les supérieures moins longues, sessiles et linéaires.

La calathide composée de fleurs jaunes est solitaire au sommet de la tige. Cette Plante croît dans les terrains marécageux et découverts de la Caroline et de la Géorgie. (g..n.)

LEPTOPOD1E. Leplopodia. crust.

Genre établi par Leach. V. Macrofodje. (g.)

* LEPTOPOR A. bot. crypt. (Champignons.) Genre formé aux dépens des bolets; il renferme les espèces qui ont leurs porfs situés à la partie supérieure de la Plante. Rafinesque- Schmaltzen fait connaître plusieurs nouvelles espèces ; ce genre est encore mal caractérisé: les Leptopora riuea, stercuraria et diffonnis , de l'Amérique boréale, sont les types de ce genre créé par Rafinesque. (a. F.)

* LEPTORAMP11E. ois. Division formée par Duméril (Zool. An., p.

47) parmi les Passereaux pour ceux qui ont le bec long, étroit, sans échancrure et souvent flexible, (b.)

LEPTORCMS. bot. piian. Sous ce nom, Du Petit-Thouars (Mist. des Orchidées des îles australes d'Afr.) a établi un genre qui correspond au Malaxis de Swartz. Les deux espèces dont il se compose et qui croissent dans les îles de France et de Bourbon, ont été nommées par l'auteur , selon sa nomenclature particulière, Tlavileptis et Erythroleptis. V. ces mots. (G..N.)

LEPTORIMA. roLYP. ? Rafinesque établit sous ce nom un genre qu'il est impossible de rapporter avec certitude, soit au règne végétal parmi les Uydrophytes , soit au règne animal, mais qu'on peut supposer appartenir aux Polypiers jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau examiné. L'auteur le dit voisin de son genre Phylélis {f. ce mot) et le caractérise ainsi : corps parasite , irrégulier, coriace, crustacé ,

3 io LEP

friable , poreux en dessus. Il en mentionne trois espèces :

ISundulata , rose , lobé , ondulé , à pores rouges, très-petits et égaux;

Le nivea, blanc , lisse, à pores petits et inégaux ;

h'oculara, rougeâtre , lisse , à bord convexe et sans pores, mais garni au milieu de grands pores inégaux, plus grands, entourés d'un cercle blanchâtre.

Ces trois espèces des mers de Sicile sont parasites sur les Zostères et les Fucacées. (b.)

LEPTORKIS. bot. phan. Pour Leptorchis. V. ce mot. (b.)

* LEPTORMUS. bot. phan. (De Candolle.) Sous-genre d'Héliophile.

F~, ce mot. (b.)

LEPTOSOMES. pois. Famille de l'ordre des Holobranches Thoraciques, composée d'espèces à branchies complètes, ayant les ventrales situées sous les pectorales j le corps très-mince , aussi liant que long , et les yeux latéraux. Elle répond aux genres Chœlodon et Zée , et contient tous ceux qu'en ont formés les ichthyologistes. fB.)¹

LEPTOSOMDS. ois. (Vieillot.) Syn. de Vouroiulriou. (b.)

* LEPTOSOPHOS. >tin. La Roche ainsi nommée dans Pline paraît être un Porphyre. (b.)

LEPTOSPERME. LeVtospernuun .

I3oT. PHAN. Genre de la famille des Myrtinées , et de Plcosandii Monogynie, L., composé d'un assez grand nombre d'espèces>qui sont toutes des Arbustes ou des Arbrisseaux originaires de la Nouvelle - Hollande , ayant les feuilles généralement petites , coriaces , persistantes , alternes , poinlillés et odorantes; les fleurs terminales, solitaires ou groupées et réunies plusieurs ensemble. Leur calice est turbiné à sa base où il adhère avec l'ovaire infère; son limbe est à cinq divisions égales ou régulières; la corolle se compose de cinq pétales égaux, étalés en forme de rose et obtus. Les élamines sont nombreuses,

LEP

un peu réunies ensemble par la base de leurs filets. L'ovaire est infère , à cinq loges contenant chacune un grand nombre

d'ovules ; le style est simple, terminé par un stigmate un peu élargi, déprimé et à peine bilobé.

Le fruit est une capsule glohuleuse , ligneuse , ombiliquée , couronnée par le limbe calicinal , à trois , quatre ou cinq loges, contenant chacune un tiès-grand nombre de graines allongées, très-menues et s'ouvrant par son sommet en autant de valves septifèies sur le milieu de leur face interne. Ce genre très-rapproché des Melaleuca en diffère surtout par ses élamines non réunies en plusieurs faisceaux , par son fruit capsulaire et non charnu. Plusieurs des espèces de ce genre sont cultivées dans les jardins, et demandent à être rentrées dans l'orangerie. Nous citerons les suivantes :

Leptospebme Thé , *Leptospermum T/iea* , Willd., petit Arbuste d'un à deux pieds d'élévation , rameux et quelquefois étalé. Ses feuilles sont éparses , très-rapprochées , petites, linéaires , allongées, entières, aiguës, coriaces, persistantes, glabres, ponctuées. Les (leurs sont blanches , petites , axillaires. Les capsules sont déprimées , à cinq côtes , à cinq loges s'ouviant en cinq valves par la moitié supérieure. Les feuilles de cette espèce ont une saveur et une odeur aromatiques et agréables. A la Nouvelle-Hollande on les emploie en infusion théiforme . et Cook dit que leur usage a été fort utile pour les gens de son équipage.

Leptoskrrie a balais , *Leptospermum scuparium* , Eorst., Gen., t.

36. Cette espèce, plus grande que la précédente dont elle est très-voisine , s'élève à une bailleur de trois à quatre pieds. Ses feuilles sont plus roides , un peu plus larges cl dès-aiguës. Les fleurs sont blanches; ses capsules ligneuses, déprimées, à cinq

loges. Les feuilles de celle espèce s'emploient aux mêmes usages que celles du Leptosperme Thé.

Leptosperme soyeux , Leptosper-

LEP

imum sericeum , Labill., Nouv-Holl. , 2, t. 147. C'est un Arbrisseau de (cinq à six pieds d'élévation , dont les feuilles éparses et très-rapprochées sont obovales, aiguës, petites, couvertes sur leurs deux faces de poils blancs et soyeux. Les fleurs sont ; grandes et blanches. La capsule est également soyeuse. Ces trois espèces et plusieurs autres que l'on cultive encore dans les jardins , doivent être rentrées en orangerie. On les cultive dans la terre de bruyère, et on les multiplie de graines. (a. r.)

LEPTOSTACHYA. bot. phan.

(Adanson , d'après Micheli.) Syn. de *Phryma*. P~. ce mot. (B.)

* LEPTOSTACHYS. bot. phan.

Le genre de Graminées constitué sous ce nom par Meyer (Essequib. , p. 73) est le même que le *Leplochloa* de Palisol-Beauvois. K. cemot.(o..N.)

LEPTOSTOMUM. *Leptostomum*. bot.

CRYPT. (Mousses.) Ce genre créé par R. Brown , dans les Actes de la Soc.

Linnéenne de Londres, 10, p. 130, T.

xxiii, f. 2, et conservé par Schwa:gricheii dans la deuxième partie du premier Supplément d'Hedwig , p.

346 , figure dans la troisième classe : Mousses à péristome, oncle premier, Acrocarpes de la Méthode de Uridel.

Le péristome est simple, membraneux, annulaire, plane, indivis, prenant naissance de la membrane interne de la capsule; celle-ci est oblongue, amincie à sa base en une sorte d'apophyse conoïde; sa coiffe est glabre, lisse et caduque. Cinq espèces de Mousses , qui toutes croissent sur les rochers dans les Etats-Unis et la Nouvelle-Hollande , composent ce genre qui n'a pas été adopté par la totalité des botanistes.

Hooker place les quatre premières es-

clèces , celles dont les poils des feuilles sont simples, parmi les Gymnostomes , et l'unique espèce qui forme la section dont les poils des feuilles sont rameux parmi les Brys ; on est certain que le genre Leptostomum a de l'analogie avec les Brys et les

LEP

Gymnoslomes ; néanmoins il en est distinct puisqu'il est muni d'un péristome qui manque dans les Gymnostomes , et que ce péristome, indivis dans le genre qui nous occupe , est divisé dans les brys. Nous pensons donc que le Leptoslome doit être conservé. Les deux espèces suivantes sont très-remarquables : 1° Leptostomie grêle , *Leptostomum gracile* (Menzies , Brown, Brid.), à feuilles ovales oblongues un peu aiguës , à poil simple égal à la moitié de la feuille; à capsules oblongues , équilibrées , inclinées; on la trouve dans les ombrages humides de la Nouvelle-Zélande près de la baie de Dusky ; 2° Leptoslome de Menzies , *Leptostomum Menziesii* (Hook.), à feuilles oblongues, lancéolées , aiguës , à poil simple , quatre fois plus court que les feuilles , à capsules oblongues incli-

nées , recourbées en arc. Celle Mousse forme des touffes d'un vert agréable sur la terre, dans diverses parties des Etats-Unis. Menzies est le premier qui l'a fait connaître. (a. F.)

* LEPTOSTROMA. bot. crypt.

{Hypoxylées.) Fries a établi ce genre (Clas. s. ii, Ord. 11, 16), fort voisin, de V Jlysterium. Il n'en diffère en effet que par ses conceptacles sans ouvertures, ne renfermant point de liquide gélatineux. Parmi les dix espèces qui ont été décrites , nous citerons le Leptostroma Jilicinum , qui se trouve dans la Flore Française, sous le nom de Hypoderma striasforme avec sa variété qui croît sur la Fougère femelle, variété qui fait partie des Cryptogames de la belle collection de Mougeot et Nestler, où elle a reçu le nom de Sclerotium Pteridis , elle Leptostroma bulgare , nom 111 é Sclerotium nitidum dans le même recueil. Ehrenberg a aussi un genre Leptostroma; mais Fries ne pense pas que ce soit le sien , et propose pour ce Leptostroma le nom d'Ectrouroma , caractérisé par ses conceptacles contigus. Ce dernier botaniste croit que le genre Sclerotium-

Sia LEP

derma d'Ehrenberg est son genre Leptostroma. V. Schizoderma. (a.f.)

* LEPTOTHECA. bot. crypt.

{Mousses.) Genre établi par Schwaegrichen (Spec. Musc, suppl. , 2, p.

135, t. 137) qui l'a ainsi caractérisé : péristome double , à seize dents ; l'intérieur muni de cils très-courts. Ce genre est très-distinct par son port; mais , selon l'auteur, il se rapproche tellement

du Leplostomum, qu'on ne peut l'en distinguer que par un caractère artificiel. Il ne se compose que d'une seule espèce trouvée près du port Jackson dans la Nouvelle- Hollande , par Gaudi- chaud , et nommée en son honneur Leptotheca Gaudichaudi. Walker Arnott (Mém. Soc.

Hist. Nat. T. n) place cette Mousse parmi les Bryum. (g..n.)

LEPTOÏHRIUM. bot. phan.

(Kunth.) Syn. d'Isochile. V. ce mot.

* LEPTOTHYRIUM. bot. crypt.

(Hypoxylés.) Ce genre est intermédiaire entre les genres Lep-
tostoma et Xyloma. 11 a été fondé par Kunze.

Persoon pense qu'il doit être réuni au Xyloma. La seule espèce connue est le Leptothyrium Lunariorum qui se fixe sur les feuilles de la Lune, dont le réceptacle est en forme d'écusson , sillonné longitudinalement , et recouvre des sporidies fusiformes.

* LEPTUBERIA. bot. crypt. {Lichens.) Rafinesque-Schmaltz a fondé ce genre pour des Lichens à thalle crustacé amorphe. Il n'est pas suffisamment/Caractérisé pour que nous puissions l'adopter. (A-Fo

LEPTURE. Leptitrus. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères , famille des Longicornes, tribu des Lep-
turètes , établi par Linné qui y comprenait beaucoup d'Insectes appartenant à présent à d'autres genres. Fabricius a beaucoup res-
treint ce genre et Latreille l'a adopté avec ces caractères : yeux un peu échancrés, n'entourant pas la base des antennes; tête ré-
trécie en manière de cou , immédiatement

LEP

après les yeux; antennes longues, grêles, à articles cylindracés ; corselet rétréci de la base à l'extrémité, uni , ou n'ayant ni épines ni tubercules.

Les Leptures, telles qu'elles sont caractérisées ici , diffèrent des Desmocères et des Vesperus ces mots) , en ce que les Insectes de ces deux genres ont la tête prolongée, mais non rétrécie en arrière ; elles se distinguent des Steucores (Rhagium , Fabr.) par leur corselet qui est lisse et mutique, tandis qu'il porte de chaque côté un tubercule en forme d'épine dans ce dernier genre. Enfin elles diffèrent des Toxotes et des Pachyles par la forme de leur corps qui est allongé, tandis qu'il est court et pour ainsi dire triangulaire dans ces derniers genres et que leur corselet porte de chaque côté un tubercule bien distinct*

Le genre Lepture de Linné comprenait tous les Insectes dont Geoffroy a formé depuis son genre Slencore et quelques Callidies et autres genres voisins. Ce dernier a signalé d'une manière précise les coupes génériques qui appartiennent à la famille des Longicornes ; la coupe à laquelle il donne le nom de Lepture est composée des Saperdes, des Callidies, des ClytrCs et d'une partie des Molorques de Fabricius. Degéer s'est rapproché , à cet égard, de Linné; il a épuré le genre Lepture en n'y laissant que les espèces dont les antennes sont posées devant les \eux.

Il réunit les Leptures et les Pi ions de GeouVoy en autant de petites familles dont Fabricius a converti plusieurs en autant de genres; mais il ne confond pas , comme l'avaient fait tous les précédents, les Donacies avec ces espèces.

Les Leptures ont la tête ovale , penchée, plus large postérieurement que l'extrémité antérieure du corselet, ou distinguée de cette partie par un étranglement. Leurs yeux sont entiers ou légèrement échancrés , saillans ; les antennes sont insérées entre eux , filiformes, de la longueur du corps. Les palpes sont courts et

LËP

,bnt le dernier article presque triangulaire et comprimé; le lobe extérior de leurs mâchoires est allongé et rétréci à sa base, et la languette profondément bifide. Le corps des Leptures est allongé ; leur corselet est conique , rétréci en avant , plus étroit que l'abdomen. Les élytres diminuent de largeur depuis la base (jusqu'à l'extrémité; elles sont aussi longues que l'abdomen. Enfin les pattes sont longues. Le canal digestif des Leptures est composé d'un Irès- (Court jabot; le ventricule chylique (débouche presque aussitôt de la tête; il est à peu près droit, hérissé de papilles courtes et obtuses , assez prononcées surtout à sa partie antérieure ; l'intestin grêle est replié sur lui-même , filiforme , et se renfle en un œcécum oblong , terminé par un coin et irjectum. Les vaisseaux hépatiques sont au nombre de six; ils s'insèrent séparément à la base du ventricule chylique , font un grand nombre de circonvolution." et vont se réunir en deux faisceaux de trois chaque qui aboutissent au commencement du cœur (cum. Les larves des Leptures vivent (dans le bois pourri et ressemblent essentiellement à celles des autres Longicornes ; les Insectes parfaits se trouvent dans les bois , sur les fleurs et sur les troncs des Arbres. Dejean (Cat. des Col., p. 112, N mentionne quarante-six espèces de Leptures, presque toutes d'Europe; la plus commune à Paris est :

La *Lp.ptuhk tokenteuse* , *L. loimeniosa*, Fabr. , Oliv. (Col. T. iv, m. 69 , pl. 2 , fig. i3 j. Elle est noire, son corselet est couvert d'un duvet jaunâtre. Les élytres sont testacées, avec l'extrémité noire et tronquée; les pâtes sont noires. F[^]., pour les autres espèces, Latreille , Fabricius , (Olivier, Gylhenhal, etc. (g.)

LEPTURE. *Lepturus*. bot. ni an.

• Genre établi par R. Brown dans la Bataille des Graminées, pour le *Rutl'boella repens* de Foisler , et qu'il caractérise ainsi : fleurs disposées en épi cylindrique articulé; chaque ar-

LEP Si 5

ticule portant une seule fleur placée dans une petite fossette du rachis. La lépicène est univalve , cartilagineuse, contenant une ou deux fleurs, et quelquefois le rudiment d'une troisième.

La glume est incluse , membraneuse , mulique, à deux valves : lorsqu'il y a deux fleurs , l'une et l'autre sont hermaphrodites, mais l'externe est pédicellée, chacune offre deux petites paléoles , trois étamines , deux styles portant chacun un stigmate plumeux. Le *Lepturus depens* est une petite Graminée rampante sur les rivages sablonneux de la Nouvelle- Hollande. Ses rameaux sont ascendants , ses feuilles distiques , linéaires , roides. (A. 11.)

LEPTULVES. *Lepturetoæ*. ins.

Tribu de l'ordre des Coléoptères , famille des Longicornes , établie par Latreille qui la caractérise ainsi :

antennes insérées hors des yeux qui sont entiers ou simplement un peu échancrées, mais non étroites, allongées et lunulées. Ces Insectes ont, en général , la tête ovoïde ou ovalaire , rétrécie brus-

quement à sa base, en manière de col ; leur corselet est conique ou trapézoïde. L'abdomen est ordinairement presque triangulaire.

Le corps est souvent arqué , avec les pâtes longues. Les antennes sont fréquemment rapprochées entre les yeux. Latreille divise ainsi cette tribu:

I. Tête prolongée derrière les yeux, avant le cou , en conservant la même largeur; yeux toujours un peu ébauchés ; antennes souvent courtes , à articles obconiques ; abdomen plus carré que triangulaire.

A. Corselet mutique ou sans tubercules pointus sur les côtés. Les genres : DESMOCHLE, Vesperus.

b. Un tubercule pointu, en forme d'épine sur le milieu des côtés du corselet. Le genre : Stenobea.

II. Tête rétrécie en manière de cou, immédiatement après les yeux; antennes longues, grêles, à articles cylindracés ; abdomen presque triangulaire. Les genres Toxotes (Toxotes et

Si4 LEP

Pac/iyte,'De\..)) Lefture.JP'. tous ces mots. (g.)

LEPTODRDS. ois. (Brisson.) Syn.

de Phaéton. V. ce mot. (b.)

LEPTODRDS. bot. phan./^. Lep-

TURE

LEPTYNITE.min. Nom donné par Haiiy à un Roche composée de Feldspath subgrariulaire dans un état d'atténuation qui lui donne un as-

{>ect analogue à celui du Grès. C'est e Weisstein des minéralogistes allemands. Elle a beaucoup de rapports avec la Pegmatite. Ses teintes sont ordinairement blanches, quelquefois verdâtres. Le Minéral qui s'y trouve le plus fréquemment disséminé est le Grenat. On y trouve aussi le Mica , et plus rarement l'Amphibole et le Corindon, (g. DEL.)

* LEPDROPET ALON. bot. phan.

Genre de laPentandrie Trigynie, L. , établi par S. Elliot [Sketch of Botany of South-Carolina and Geurgià) , et caractérisé de la manière suivante :

calice à cinq divisions profondes ; cinq pétales squammi-formes , insérés sur le calice; capsule libre supérieurement, uniloculaire et bivalve. Le Lepurupetalon spathulatum , Ell. , Pyxidantha spathulata, Muhlenberg, Catal. , est la seule espèce du genre; on la trouve dans le sud des Etats-Dnis d'Amérique. (g..n.)

LEPDS. mam. V. Lièvre.

* LEPDSCDLI. bot. civyft. [Champignons.) Le Bouc a nommé ainsi plusieurs Agarics que l'on tenleiait vainement de déterminer. (a. f.)

LEPDSCDLDS. mam. (Klein.) Syn.

de Lapin. (b.)

LËPYRODIE. Lepyrodia. bot.

PHAN. Genre de la famille des Restiacées , établi par Rob. .Brown , et caractérisé par des fleurs hermaphrodites ou unisexuées , et dioïques ; un calice formé de six écailles glumacées, presque égales , saillant au-dessus de la bractée, à l'aisselle de laquelle il est placé. Dans les Heurs maies on compte trois élamincs , à anthères

LER

simples et peltées , avec un rudiment de pistil. Dans les fleurs femelles l'ovaire est surmonté de trois styles et le fruit est une capsule triloculaire à trois lobes et à trois angles saillans par lesquels elle s'ouvre. Chaque loge contient une seule graine. Ce genre est rapproché de VElegia du même auteur, et par son calice accompagné de bractées , et par ses fleurs mâles dont le calice est semblable à celui des fleurs femelles. Il se compose de quatre espèces qui ont été observées à la Nouvelle - Hollande.

LEQDE. bot. pu an. V. Léchée.

LERCHILE. Lerchea. bot. phan.

Genre de la Monadelphie Pentandrie, établi par Linné qui lui a donné pour caractères essentiels : un calice a cinq dents; une corolle infundibuliforme, quinquéfide ; cinq antlières insérées sur un tube formé par la réunion des filets; un style ; une capsule triloculaire et polysperme. Ce genre, qui est trop peu connu pour qu'on puisse en déterminer les affinités naturelles , ne se compose que d'une seule espèce , Lerchea /o/igicanda, L. C'est un Arbrisseau sans élégance , dont les branches sont comme articulées et portant des feuilles opposées , lancéolées, accompagnées de

stipules. Les fleurs sont très-petites, et forment un épi terminal très-allongé. Cette Plante croît dans les Indes-Orientales.

Haller [Hort. Gotting., 2, p. 21 et 22) a donné le nom de Lerchea à des espèces de Salsola et de Chenopodium. (g..n.)

* LÈRE. mam. On ne sait quelle est la Chauve-Souris brésilienne à laquelle Marcgraaffa donné ce nom.

LEREOD. mam. L'un des noms de pays du Lamantin en Afrique, particulièrement au Sénégal. (B.j

LÉRIE. Leria. bot. phan. Genre de la famille des Synanthérées, et de la Syngéuésie superflue, L. , établi par De Candolle (Annales du Mus.

d'Hist. INat. T. xix) , adopté par

LER

&unth et Cassini qui en ont modifié les caractères. Parmi ceux qu'a proposés ce dernier botaniste , voici les plus ■.essentiels : involucre presque cylindrique ou campaniforme , formé d'é- : <<ailes nombreuses, disposées sur plusieurs rangs, inégales, imbriquées, linéaires , aiguës, membraneuses sur ces bords et au sommet; réceptacle iblane et absolument nu; calatbide Mont les fleurs offrent une grande Université dans leurs formes. Celles lu centre possèdent une corolle variable , à cinq découpures inégalement profondes, foiman't ordinairement deux lèvres dont l'intérieure est partagée en deux jusqu'à la base et "extérieure à trois segmens plus ou moins longs; le tube des anthères est muni au sommet de cinq appendices arrondis ou tronqués et à la base de diûx appendices très-longs et filiformes. Les fleurs des rangées internes ûle la circonférence ont la corolle ccourte , très-grêle , tu-

buleuse et comme terminée au sommet par une Irèsp petite languette ; point d'étamines.

Les fleurs de la rangée externe de la circonférence ont la corolle tubuleuse , étroite, à languette longue, linoéaire , irrégulièrement dentée au sommet; point d'étamines ni de l'annuelle intérieure. Le style est semblable à celui des autres genres de MMulisiées, tribu dans laquelle Cassini [place le *Leria*. Les akènes sont légèrement pédicellés , oblongs , parsemés de papilles, surmontés d'un col très grêle et d'une aigrette dont les soies sont à peine plumeuses.

En décrivant le genre *Leria*, Kurth ne s'accorde pas parfaitement pour les caractères avec Cassini; il n'admet que deux sortes de fleurs , celles de la circonférence femelles , en rayons, ayant la corolle à deux languettes , et toutes les autres hermaphrodites et à corolles bilabiées.

Cette dissidence dans l'énoncé des caractères génériques porte Cassini à conjecturer que la Plante qui a servi de type <à Kurth n'est pas identique avec la sienne , quoique cet habile l'botaniste {Nov. Génér. et Spéc. Plant.

LER 3x5

œquin. , 4 , p. 5) ait indiqué comme synonyme le *Tussilago nutans* de Linné. C'est la Plante qui peut être considérée comme l'espèce fondamentale du genre *Leria*. De Candolle lui en avait associé cinq autres , dont une seulement (*Tussilago albicans* , Swartz) est sa congénère , selon Cassini. Le *Tussilago* de Linné, aux dépens duquel le nouveau genre a été constitué , était un groupe monstrueux que plusieurs botanistes se sont appliqués à diviser. On serait tenté de croire que le *Thyrsanthema* , un des

quatre groupes formés par Necker avec le *Tussilago*, est le même que le *Leria*; mais quelle confiance doit-on accorder à cet auteur, puisque ses quatre genres « sont des énigmes impossibles à deviner, parce que Necker n'a indiqué aucune des espèces qui les composent, et que leurs descriptions caractéristiques contiennent les plus grossières absurdités? » Tels sont les considérans d'un jugement, un peu sévère à la vérité, mais assez juste, que Cassini a porté contre le novateur de Manheim.

De Candolle avait placé le genre *Leria* dans ses *Labialiflores*. La diversité des corolles ne peut être un argument contre l'existence de cette tribu; leur labitition, d est vrai, est quelquefois si peu manifeste qu'on pourrait y voir les passages des corolles labiées aux corolles régulières. Mais ce caractère, combiné avec ceux fournis par les autres organes floraux, a servi utilement à Cassini pour distinguer les *Mutisiées* et *Nassauviées* qui ne sont autre chose que les *Labiatiflores* de I Je Candolle ou *Chœnanthiflores* de Lagasca. V. ces mots.

Les genres avec lesquels le *Leria* offre le plus d'affinités sont le *Clija* de Ventenat et le *Leibnitzia* de Cassini. Nous n'en ferons point ressortir les différences, parce qu'elles pourront être facilement senties par la lecture des caractères de ces genres dont nous avons seulement exprimé les plus essentiels.

On ne connaît avec certitude que deux espèces de *Leria*. Cassini les a

316 LER

nommées *L. lyrata* et *L. integrifolia*, et leur a donné comme synonymes douteux les *Tussilago nutans* (L. C. et

Kunth) et albicans des auteurs linnéistes. Ces Plantes sont indigènes des Antilles et de l'Amérique méridionale. (o..N.)

* LERN ACANTHE, zool. Sousgenre de Lernée. f. ce mot. (b.)

* LERNANTHROPE. zool. Sousgenre de Lernée. P~. ce mot. (n.)

LERNÉE. Lernœa. zool.. L'un des genres dont il est le plus difficile de déterminer la place dans nos méthodes de classification , et qui semble former le type d'un ordre particulier qu'on ne saurait rapporter avec certitude à ce qu'on nomme les Vers intestinaux où les place Cuvier (Règn.

Anim. T. rv, p. 36) , ou bien aux Vers mollusques de Linné où ce législateur, qui créa le genre dont il est question , l'avait intercalé. Duméril , ne sachant qu'en faire , selon l'observation de Blainville , l'omit dans sa Zoologie analytique. Dès 3809 , Lamarck eut l'idée de rapprocher les Lernées des Sangsues et des Lombrics ; il les plaça vers le commencement de sa classe des Annelides. Enfin ce savant a senti la nécessité de le retirer encore de ce groupe pour en former un particulier , qui marche à la suite de sa classe des Vers en terminant sa grande série des Animaux inarticulés sous le nom d'Epizoaires. f^ . ce mot. Tous ces changemens prouvent que non-seulement les Lernées n'étaient pas faciles à colloquer , mais qu'elles étaient encore assez mal connues. Leur histoire était une sorte de chaos, malgré tout ce qu'on en avait écrit et les figures qu'on avait données d'une douzaine d'espèces, quand Blainville publia d'abord, dans le vingt-sixième volume du Dictionnaire de Levrault, un de ces articles qui peuvent être considérés comme des dissertations préférables par leur im-

portance à tant d'ouvrages qui ne contiennent rien de neuf que les figures, mais qui n'en sont pas

LER

moins mis en avant comme des titres à l'Institut. Dans Ce savant travail, qui n'est modestement donné que comme l'extrait d'un travail plus étendu qui a paru depuis dans un Journal , Blainville convient qu'on sait encore fort peu de chose sur l'organisation des Lernées , qui n'ont guère été examinées jusqu'ici que par des naturalistes qui , se bornant à décrire les formes extérieures des êtres, ne passaient guère O'ltre, et ne pénétraient jamais dans ces détails anatomiques sur lesquels on sent aujourd'hui la nécessité de baser la science.

Les Lernées sont munies d'une enveloppe transparente, jaunâtre ou brunâtre, (lexible , quoique plus ou moins résistante; et elle nous a paru, dans trois espèces que nous avons eu occasion d'examiner, surtout à lét partie supérieure du corps, comme celle à peu près des Ecrevisses que l'on surprend au moment où elles viennent de changer d'enveloppe. La forme de ces Animaux varie beau-1 coup, elle est très-bizarre , mais elle commence déjà à présenter cette sy-*métrie qui se remarque à partir des Epizoaires , comme un des caractères les plus importants de l'animalité. On y distingue un partie antérieure plus petite, plus étroite, que Blainville appelle sans difficulté un thorax , où la tête est quelquefois tant soit peu sentie. Cette partie offre les premières traces des véritables appendices dans les crochets dont la bouche est armée et même dans certains rudimenà d'antennes qui motivent le rapprochement qui existe dans la méthode de Lamarck (Anim. sans vert. T. 111) entre les Epizoaires et les Insectes.

Ces antennes, comme d'essai, sont déjà subarticulées, et l'on trouve jusqu'à des traces d'yeux sessiles ou slemmates. Ces parties et d'autres rapports lient encore les Lernées aux Crustacés branchiopodes par les Calyges, selon la remarque de Cuvier.

« Quant aux appendices de toutes les espèces que j'ai pu examiner avec soin , dit Blainville , j'ai trouvé que la bouche était constamment pour-

il); M

Si

te.

LER

;ue d'une paire de crochets mobiles •jpnvergens , quelquefois de deux et même a une sorte do lèvre inférieure.

Vour les véritables , qui se joignent iu thorax , ils sont généralement peu iiiombreux. Dans les espèces que leur ;i raudeur m'a permis de disséquer, j'ai ;rouvé que la couche musculaire qui iiouble l'enveloppe extérieure, le liilus ordinairement fort simple el composée de fibres longitudinales coycuses, se subdivise eu portions ..atéralcs pour les appendices et subi|ppendiccs. Le canal intestinal est vomplet , c'eat-à-dire étendu de la oouche à l'anus. Il paraît même qu'il jait quelquefois des replis ou circonvolutions. La bouche , médiocre , située ordinairement à la paitie inférieure du cépbalo thorax , est au milieu d'un espace dont la peau est inolee; elle est constamment accompagnée, à droite et à gauchu, d'un trochet court, aigu et corné; mais '»n ne le voit souvent qu'à l'aide d'urne trù;— forte loupe. Le canal intestinal se termine en arrière dans un Lubercule ou mamelon plus ou moins

iaillant et médian. Je n'ai pu disséquer le système circulatoire ; mais il ASt certain qu'il existe , ou du moins ces auteurs qui ont observé ces Aninaux vivans en parlent d'unemanière certaine. On ne peut cependant aas dire qu'il y ait d'autres .organes !lp respiration que les subappentlices iJe la peau. Les organes de la génération ne sont pas connus plus complètement. On sait seulement que Uans toutes les espèces du groupe il existe de ebaque côté du tubercule mal une sorte de sac de forme uu Jeu variable et qui est rempli par une infinité de coipuscules quelquebis ronds , d'autres fois anguleux ou même discoïdes, qui sont indubitablement des ceuls , comme nous l'apprend une observation curieuse du idoet-cur Surrirai qui habile le Havre.

D'après cette observation , ces Aninnaux naissent sous une forme qu'ils 'oerdent par la suile en avançant en ijge; et cette forme est beaucoup noins anormale que celle que l'Ani-

LER 3i7

mal finit par acquérir , de sorte que c'est une métamorphose en sens inverse de ce qui a lieu ordinairement.

Nous ignorons du reste s'il existe des sexes distincts. Ou ne peut non plus rien dire du système nerveux , mais il paraît qu'il doit exister. »

Les Lernés sont des parasites qu'on trouve sur les Poissons, soit de rivière, soit de mer; elles sont poulies autres babitans des eaux ce que les Taons sont pour ceux de la terre et de l'air; elles en attaquent les parties les plus sensibles , y pénètrent , s'y fixent et s'y nourrissent , causant souvent d'insupportables douleurs à leurs victimes au point d'en rendre plusieurs comme furieux. Les Ler— nées se fixent jusqu'entre les écailles; mais c est autour des

yeux , aux plis des nageoires oii la peau est plus fine . dans la boue même et dans les ouies, qu'elles choisissent leur domicile; elles s'y enfoncent en suçant et longant jusqu'au point d'y disparaître. Blaiuville , élevant le genre *Lernée* à la dignité de famille, y établit huit genres que nous conserverons

i. *Lernéogèhe*, *Lerneocera*. Corps plus ou moins allongé, renflé dans son milieu ou ventru, droit ou contourné, couvert d'une peau lisse et presque cornée antérieurement ; terminé en avant , à la suite d'un long cou, par un renflement céphalique bien distinct, armé de trois cornes immobiles , branchues à l'extrémité , deux latérales et une supérieure ; trois petits yeux lisses à la partie antérieure de la tête; bouche inférieure en suçoir; aucune trace d'appendice au corps. Nous citerons comme type de ce genre le *Lernœa brancialis* , L. , Gmel., Syst. nat. , xii , T. i, p.

514 r ; Mu II., Zool. Dan., tab. u8, f. 4 ; Enr-ycl. Vers , pl. 78 , f. 2 , qui se tient sur les branchies des Morues dans, les mers du Nord où les Groenlandais la recherchent pour s'en nourrir. Les *Lernœa cyclopterina* , Miill., Prodr., 3745, Gmel., /oc. cit..

p. 517; — *Suiririensis* , Blaiuv.,/oc.

c/.u. 5; —et *Cypriacea* , h. , Gmel.,

318 LER

loc. cit., p. 314; Encycl. , pl. 78, f. 6., sont les autres *Lernéo-*
cères connues.

Leknéopenne , Lerneopenna

Corps allongé , cylindrique , subcartilagineux, terminé antérieurement

fiai' un renflement céphalique, circuaire, tronqué , garni dans sa circonférence d'un grand nombre de mamelons au milieu desquels est probablement la bouche, et pourvu d'une paire de cornes courtes , obliques en arrière , postérieurement terminées en pointe et ayant de chaque côté des filets coniques , creux, bien rangés et imitant les barbes d'une plume, à la partie antérieure et supérieure desquels sont deux filamens très-fins et très-allongés , servant probablement d'ovaires.

Les espèces de ce genre sont les *Lerneopenna Eoccunii* , blainv. , loc.

cit., n. 1; *Le mas a cirrhusa*, Lamark., Journ. de Phys., 1787, 11, 6; *Encycl.* , pl. 78, f. 5; *Fennella d'Oken*; — *L. Holteni*, Blainv., 11. 2; *Lernœa Exoceti* , Act. Hulm. , 1802; — et *L. sagilta* , Blainv. , n. 3 ; *Pennatulasagitta* , Gmel., /oc. cit. ,p. 3863 , Eli., Act. AngL, 53, lab. 20, f. 6. — *Le Pennatula mirabilis* , L. et Mull. , ZooL Dan., est regardé par Gmelin comme l'état adulte decelte dernière, qui ne serait alors qu'un individu imparfait.

3. *Letinee* proprement dite , *Lernœa*. Corps peu allongé , subcylindrique ou [déprimé , sans traces de divisions ou de rudiment d'appendices sur les côtés; uu renflement céphalique plus ou moins distinct; la bouche inférieure pourvue d'une paire de crochets ; l'abdomen terminé par deux sacs ovifères plus ou moins prolongés.

Les espèces de ce genre sont les *Lemœa clauata*, Miill. , *ZooL.-Dan.* , Gmel., *Sysl. A'a/.* , lue. cit. , p. 3j4ô; *Encycl.*, p. 78, f. 4 ; *Blainv.* , loc. cit., n. 1. — *L. B aster i* , *Blainv.*, n. 2 , — *e\L. cyclophora* , *Blainv.*, n. 3.

LernÉomyze , Lemeomyzss

Corps ovoïde ou déprimé, avec une sorte de céphalothorax en forme de

LER

cou étroit , cylindrique , terminé an- g térieurcmenlpar une bouche bilabée, p pourvue en effet de mandibules en. I.

crochets et d'une lèvre inférieure; it un suçoir plus ou moins protractile à t la racine inférieure de l'abdomen ; deux sacs ovi- gères peu allongés. Les bi espèces qui appartiennent à ce genre m n'ayant d'appendices qu'à la bouche, j, on sent qu'elles ne peuvent guère se o1 déplacer et circuler à volonté , et j; qu'elles doivent demeurer fixées où „(elles se développèrent, et' seule- ment i(tourner sur elles-mêmes parlemoyen (, de leur bouche qui sert comme de | pivot au seul mouvement qu'il leur \> soit donné d'exercer.)(Les espèces de ce genre sont les 1(*Lernea uncinata*, Miill., *Zool. Dan.*; -t Gmel., loc. cit., p. 3i45; *Encycl.*, pl. , 78 , lig. 7; — *L. pinnarum* , Gmel. , \y loc. cit., p. 5 1 47 ; — *Lerneomyzon py- nf riformis* , *Blainv.*, loc. cit. n. 3; — 1., *L. per/iet- tiana* , *Blainv.*, n. 4, *Pernetty, Voyag. aux Mal.* , pl. 5, 6, ,B — *Lerneomyzon elongata* , *Blainv.*, u, n. 5.

Lernentome, Lcmentoma. Gen

re qui répond à celui que Lamarck r:

(Aniin.sans vert. T. m, p. 200) établit sous le nom d'Entomode. V. ce mot. ^ Blainville le caractérise de la sorte : K corps eu général carré , subdéprimé , avec des espèces de bras ou d'appendices de forme variable et inarticulés j de chaque côté ; la tête plus ou moins t distincte , pourvue de cornes et de ^ crochets à la bouche; les sacs ovifères 1 le plus souvent claviformes. Ce groupe renferme les espèces les plus bizarres sous le rapport des singuliers : appendices qui hérissent le corps et 1 qui servent à fixer l'Animal de manière à ce qu'il soit presque immobile.

Les espèces de Lernentomes sont :

les *Lerne radiata* , Miill., Zool.

Dan.; Gmel., loc. cit., p. 3146 ; En- , cyclop., pl. 78 , fig. g; Entomoda radiata, Lamk.; loc. cit., n. 4; — *L. Gobina*, Miill. , Gmel. , Encyclop., pl.

78, fig. 8 ; Entomoda , n. 3, Lamk.; — *L. nodosa*, Miill. , Gmel., Encycl., pl. 78, fig. 10; — *L. ylscllina*, Wi\\.,

LER

iimel., Encycl., pj. 78, fig. a ; — *Ler~ \tentoma Trigloë*, Blainv., n. 5; — *Leric'ea cornu/a* , Mull. ; Gmel. , Encycl., 'II. 78, (ig. 10; — et *Lernentorna Durïesnii*, Blainv. , n. 7.

Lernacanthé , Lemacantha

Uorps gros, court, assez déprimé, Ki'ourvu <le chaque côté d'appendices uudimentaires , aplatis , digités et carillagineux; la tête séparée du thorax war un sillon et portant de chaque côté un rudiment d'autenneS; bouche nnférieure accompagnée d'une païie lee mâchoires ou de palpes; les sacs ivvivères gros, courts et aplatis.

Le Lemacaittha Delarochiana , tflainv. , décrit antérieurement par Delaioche sous le nom de Chondra- .lante du ïhon, est la seule espèce de ce genre.

7. Lerséopode, Lenieopocla. Corps i-ssc , assez allongé, divisé en abdomen ovale et céphalothorax aplati et rouvert d'un bouclier crustacé; une >>aire de palpes courts , gros , coui- 1 ues et subarliculés, accompagnant la mouche; deux paires de pieds articulés , subonguiculés sous le thorax; Mes sacs ovifères courts et subcylinllriques.

Les espèces de ce ginre sont : les Werneopoda BrungniartU , Blaiuv. , voc. cit., n. 1; — et L. Salmonea, L., rrinel. , lue. c/V.,p. 3 1 44; Encycl., pl. Î8,fig. 1 3— 1 6 , Entomoda; n. i, Limk;

Lernantiiope, Lernanthropus

Uorps ovale, assez allongé, divisé en Ueux parties; un bouclier céphalolihoracique , et un abdomen prolongé inri arrière par une large écaille dé- Mordant l'extrémité du tronc; deux

lès-forls crochets verticaux sous le Vont; trois paires de très-petits appendices ciochus et transverscs sous ■■e thorax proprement dit; une paire Me bras simples , renllés, et une seconde paire bifide et comme branchiale sous l'abdomen ; les sacs oviieres longs et c\ lindriques.

Une seule espèce , le Lerneanihrorpi/s Musca, Blainv., compose ce nouveau genre tonné sur des individus trouvés dans uu petitDiodon apporté le Manille.

LES 3ig

Blainville pense que le Lernea Huchonis , Gmel. , toc. cit., p. 3i45, et quelques au Ires espèces imparfaitement décrites pardi-vers naturalistes , pourront, étant mieux examinées, rentrer dans les genres ci-dessus mentionnés ou bien en constituer de nou-

veaux.

* LERNENTOME.

ZOOL.

Sous-

genre deLernée. V. ce

mot.

* LERNÉOGÈRE.

ZOOL.

Sous-

genre de Lernée. y. ce

mot.

* LERNÉOMYZE.

ZOOL.

Sous-

genre de Lernée. P. ce

mot.

* LERNÉOPENNE.

ZOOL.

Sous-

genre de Lernée. f[^]. ce

mot.

* LERNÉOPODE.

ZOOL.

Sous-

genre deLernée. V. ce

mot.

LE11oT oo LIRON. mam. Espèce du genre Loir. V. ce mot.

On a appelé Léhot a queue dorée un Echimys , et LéoT volant
une espèce de l'aphien. y. ces mots.

LEROUXIE. Lerou.xia. bot. pu an.

Le docteur Mérat , 'dans sa Flore des environs de Paris, a établi sous ce nom un genre nouveau pour la *Lysimachia nemuru/n* , L. , qui croît dans les bois un peu humides. Le caractère principal de ce genre consiste dans la capsule qui s'ouvrirait en boîte à savonnette , ce qui ferait rentrer ce prétendu genre parmi les *Anagatlis*. V. *Lysimachie*.

LERQDE. bot. phan. Pour *Lerchée*. V. ce mot. (b.)

LERWÉE. mam. L'Antilope mentionné sous ce nom {si ntilope *Lerwia*) par Shaw, et vulgairement appelé *Fisch-Tall* , est le *Kob* selon Pallas,mais Cuvier n'admet pas ce rapprochement. V. *Antilope du Sénégal*.

LESAN-EL A'SFOUR. bot. Delile nous apprend que les fruits du *Fraxinus O/nus* portent ce nom au Caire, où. leur saveur aromatique les fait rechercher, et où on les vend

Sjo les

dans les boutiques pour pire mis dans divers assaisonnemens.
(B.)

* LESBIA. ois. (Gmelin.) Syn. de *Bruant Mililène*. V~. ce mot.
(dr..z.)

LESBIE. *Lesbius*. rois. Du Dictionnaire de *Délerville*. Pour *Lcbias*.

Pu ce mot. (b.)

LESCHE DE MER ou ASCHÉE.

Annel. Nom vulgaire employé par les pêcheurs de nos côtes pour désigner une espèce d'*Annelide* qui leur sert d'appât. V.

Arénicole. (aud.)

LESKEA. bot. crypt. (Mousses.) Hedwig a créé ce genre sous le nom de Leskia changé, sans doute par erreur, en celui de Leskça qui a prévalu. Ses caractères sont : péristoine double; l'extérieur à seize dents subulées, infléchies; l'intérieur formé par une membrane divisée en seize lanières égales; coiffe cucullil'ormc. Les nombreuses espèces qui forment ce genre ont le port des Hypnes, avec lesquels on les a long-temps confondues. La plupart des botanistes l'ont adopté. Néanmoins, Palisot-Beauvois a refusé de le reconnaître et ne voit en lui qu'un Hypnum. Il est certain qu'il n'en diffère guère que par les dents du péristome interne, infléchies dans le Leskea, et réfléchies dans X Hypnum, caractère propre seulement à l'établissement d'un sous-genre. On compte près de soixante-dix espèces de Leskea, dont la septième partie environ est propre à la France. Un plus grand nombre se trouve dans l'Amérique septentrionale; quelques-unes seulement croissent dans le Mexique et le Pérou. On distingue parmi ces dernières: 1° le Leskea involvens, Hedw., Spec. Musc, p. 43; Fée, Essai sur les Cryptogam. des Ecorc.

exot. officin., p. 143, tab. 34, fig. 6.; à lige rampante, capillaire, bipinnée, dont les rameaux sont droits, les feuilles distiques, étalées, ovales, aiguës, très-entières, à nervure pellucide, s'élevant avant d'arriver au sommet; capsule ovale, penchée; opercule en bec recourbé. Cette Plante

LES

a le port de XHypnum proUfrurn et | de V Hypnum gratum, avec des pro- D portions beaucoup moindres; ses ra- D inaux ne sont pas bipinnés; les feuilles les sont ponctuées. Elle croît fré-

quem- B ment sur les troncs et les branches 1 du Cinchona
condaminea , près de I Loxa. 2°. Lsskea rfensa , Hook. et I Kuulh,
Syn. Plant. Orb. nov. spec, I p. i ; Fée, loc. cit., p. i45, lab. 54, fig.
7; à tiges en touffes rampantes, rameuses, à feuilles ovales, imbri-
quées en tous sens, sous-acuminulées , très-en lières , sans ner-
vures, à capsule oblongue, cylindracéc, droite , munie d'un oper-
cule conique, acumiué. Celte Plante croît au Pérou , sur les
vieilles écorces des Quinquinas, (a. F.)

LESKIA. bot. crypt. P~. Leskea.

LESr'ÉDÈZE. Lespedeza. bot. »

piian. Genre de la famille des Légú- le mineuses , et de la Dia-
delphie Décan- ,[drie , L. , établi par le professeur Ri- o1 chard
[in Michaux FL Bar. Jm.t JF 2 , p. 70) pour quelques espèces au-
" paravant placées parmi les Sainfoins TM dont elles diflèrent par
les caractères lfl suivans : le calice est à cinq divisions ' profondes
, presque égales, linéaires , " !l lancéolées ou même subulées; la
corolle est papiliouacée ; les étamines diadelphes ; l'ovaire est sti-
pilé , ovoï- Pc de, comprimé, ayant un style fdi- ks forme, terminé
par un stigmat co- ipp noïde et capitulé. Le fruit est une *>i
gousse très-pelite , lenticulaire et mo- !il nosperme. Michaux,
dans sa Flore de l'Amérique septentrionale, rap- h porte à ce
genre quatre espèces. Leur ici tige est sous-frutescente , leurs
feuil- »!(les rarement simples , plus souvent > trifoliées. Toutes
croissent dans les .

diverses parties de l'Amérique septentrionale. Ces espèces
sont : ^Lespedeza sessilifto/'a ou Hedysarum u junceum, Walt. ;
Medicago virginica, L., qui croît dans la Virginie et la Caroline;
Lespedeza p/veum-é bens, Michx., tab. 3g; espèce très-voi-Jt;

sine de V Hedysarum violaceum , L. ;»■ 5° Lespedeza capitala , dont les fleurs* forment des capitules sessdes et tcr-|.

LES

niinaux; 4° Lespedeza pufystackia , tlm'chv. , loc. cil. , lab. 40, on Hedymrum hirtum, L. r. Sainfoin.

LESSERT1E. Lessertia. mot.

pphaw Ce genre , de la famille des Légumineuses et de la Diadelphie Déléndrie , L., a été dédié au protecteur iJe la botanique à Paris, à l'hono- ■srable Benjamin Delessert, par IJeCan- Uollc (Jsf/aga/ogia, p. 07) qui lui a imposé les caractères essentiels sui- : 'ans : calice divisé jusqu'à la moitié Me sa longueur en cinq découpures ; ;t!endard plane; carène obtuse; dix iitainines rlont une libre et- les neuf nulres réunies en un faisceau ; style '(élu dans la partie antérieure et unes du sommet, nu dans la partie Postérieure , et surmonté d'un stigmaté capité; légume scaricux , indéhiscent, comprimé ou renflé, plus vêtit vers le sommet. Ce genre ne se oomposait dans l'origine que de deux sspèces "placées par Linné dans les colutea. K. Brovv , en l'admettant ians la seconde édition de YHortus \Cewensis , y réunit, sous le non de u! diffusa , le (la le «a d tibia de Jacobin {le. rar. , S, t. S76). Le Frodrouus Syst. Veget. , dont le deuxième lolume vient de paraître , contient la eescription de dix -sept espèces de «esserlies dont sc[]t Seulement sont apportées avec certitude à ce genre; 'iS dix autres étant , pour la plupart , es Plantes décrites cemme des Colu- Ofa par Thunberg.

Les Lessertics sont des Plantes hersacées ou rarement sous-frutescentes, mates indigènes du cap de Bonncssperance. Leurs feuilles sont peneées avec impaire. Leurs fleurs sont uurpuriucs ,

portées sur des pédonules axillaires , et disposées en graphes penebées. Parmi les espèces bien éternminées, nous citerons les Lesnrtia annua et Lessertia perennans , nui sont les types du genre, Lcsnrtia falciformis , dont le professeur t"e Candolle (Mémoires sur les Lémmincuses , vi , t. 46) a publié tout liceinment la description et la figure.

LES 3ai

* LESSONIE. Lessonia. bot.

CRYPT. (llydrop/iyles.) Genre trèsremarquable de cette belle famille des Laminai iées , dont nous avons proposé la formation , p. jci du présent volume de ce Dictionnaire , et de la première section que particularisent des tiges fort distinctes, qui se ramifient dans les Lessonies. Lesiacines sont puissantes, rameuses, s'accrochent sur les rochers par les fentes de ceux-ci, y deviennent souvent dures, très - grosses , en amas considérables qui , réjetés à la côte avec les tiges, quand le Végétal a cessé de vivre, y forment de grands amas d'un détritus mollasse et tui — feux. Ces tiges, dont la base doit être comparée à un véritable tronc , peuvent acquérir des dimensions énormes. Nous en avons examiné qui, semblables à d'assez foi tes branches d'Arbres, n'avaient pas inoins que deux à trois pouces de diamètre , ou la grosseur du bras ; leur substance dure et flexible , mais cependant résistante , était recouverte d'une écoicc rugueuse et bosse-lée, présentantdes nœuds d'où les vieilles branches étaient tombées, d'un brun foncé quand on 1rs imbibait, et pouvant alors se couper avec un instrument tranchant , mais devenant d'une extrême dureté par la dessiccation , d'une teinte d'ardoise noirâtre et en tout semblable à de la corne. Le retrait y était considérable, et des coupes transversales que nous en avons faites, dont le dia-

mètre n'était pas moindre que deux pouces, se réduisaient à un. Sur ces coupes ou tranches que nous conservons précieusement-dans notre herbier, on distingue plus que dans tout autre Hydrophyte des couches concentriques en tout semblables à celles du bois des Dicotylédones les mieux caractérisées, et au centre un canal médullaire plus foncé et plus mou. A l'extrémité de ces tiges, comme d'une cime d'Arbre, parlent des rameaux souvent fort entrelacés, plus ou moins comprimés dans les espèces qui nous sont connues, rugueux à leur surface corticiforme et constamment dichotomes.

TOME IX

522 LES

Cette disposition dichotomique provient de la manière dont se développent les frondes par lesquelles ces rameaux sont terminés. Ces frondes sont un peu moins épaisses que celles des Laminariées de la seconde section; allongées dans leur jeunesse, elles finissent par se fissurer pour se diviser en deux feuilles qui à leur tour se doivent diviser encore; mais cette division ne s'opère point par l'extrémité de la lame, comme la chose arrive pour les Laminaires proprement dites. Elle a lieu premièrement à l'insertion même de la fronde sur la ramule qui la supporte et qu'on peut considérer comme un pétiole. Elle y commence d'abord comme par un trou ou déchirure mitoyenne qui se prolonge ensuite longitudinalement, de sorte que, parvenue à l'extrémité, elle forme deux lames distinctes de ce qui d'abord n'en était qu'une seule. Le même phénomène a lieu dans les Mncrocysles;

mais ici les frondes ou feuilles terminal esne se fissent pas inté-
rieurement seulement en deux , mais en trois , quatre et même
jusqu'eu six grandes divisions. La fructification de ces Plantes
consiste , comme dans le reste des Laminariées , en des groupes
ou propagules graniformes, compactes et disperses dans l'éten-
due des lames et qui finissent par leur donner une certaine ru-
desse au tact. Avant le développement de ces groupes , la lame
est lisse , brunâtre et plus ou moins mince et transparente. Elle
devient ensuite épaisse et opaque. LcsLessonies sont dans tonte
l'étendue du mot des Arbres marins q ui paraissent acquérir de
grandes dimensions. Nous eu possédons trois espèces dont au-
cun auteur n'avait encore parlé ; ces espèces sont :

Lessonia fuscescens, N., à tige arborescente, inférieurement
simple, se divisantàson extrémiléen rameaux nombreux, cylin-
driques , qui à leur tour se fourchent en ramules entrelacées , fort
comprimées, noirâtres, supportant des frondes linéaires ou
ovales-allongées, acuminées inférieurement et supérieurement, à
bords

LES

légèrement ou fort obscurément den- H tés quand ces bords
ne sont pas d'une 1 intégrité parfaite. Celle espèce nous ■ fut
d'abord communiquée par Lesson \ ui l'avait recueillie à la
Conception u Chili et par Dm ville qui l'a rapportée des îles Ma-
louines , ou elle f croît en grande quantité à quelque * distance du
rivage. Elle sera figurée % dans la relation du voyage de la
Coquille.

Lessonianigi'escens, N. , à tige divi- k sée, produisantdans tou-
teson étendue des rameaux alternes qui se divisant à leur louren

ramules lacinées par la division des lames, forment le long a du Végétal des paquets de frondes ou l' feuilles linéaires longues d'un pied à il dix-huit pouces , larges d'un pouce l't au plus , très-entières , plus courtes que dans la précédente, et fi d'une couleur noirâtre qui devient très-foncée par la dessiccation. Elle est originaire du cap Horn , et nous fut communiquée en 1824 par notre collègue le professeur Linné et par Chauv. Le zèle botaniste de Caen , qui la nommait *Laminaria ramosissima*.

Lessonia quercifolia , N. Nous n'en il connaissons que les derniers rameaux qui, moins comprimés que dans les espèces précédentes , et couverts d'un velouté de villosité due peut-être à la présence de quelque Cératophore ou d'un petit Polypier flexible n'en sont pas moins dichotomes. Les lames ou frondes qui s'y implantent sont oblongues, irrégulièrement dentées sur les bords de manière à présenter obscurément la figure d'une feuille de Chêne qui serait étroite par rapport à sa longueur. Sa surface devient plus rugueuse que celle des espèces précédentes, les gongyles étant beaucoup plus gros et égalant en volume des grains de moutarde. Elle , nous fut communiquée anciennement par Lesueur qui la rapporta de son voyage aux Terres Australes. Nous la croyons de la Nouvelle-Hollande; du moins Chauv. nous en a-t-il en 1825 communiqué un échantillon donné comme venant de ce pays.

LES

LESTÈVE. Lesteva. iss. Génie l'ordre des Coléoptères, section Hémipentamères , Camille ries Brachyptères, tribu des Aplatis (Fani. Mat.

du Règ. Anini. de Latr.), établi par Latreille, et presque en même temps par Gravenhorst qui lui a donné le nom d'Aiitophagus, et ayant pour caractères : antennes insérées devant les yeux et sous un rebord, presque de la même grosseur, avec la plupart des articles en cône renverse, et le dernier presque cylindrique; palpes filiformes. Ces Insectes se distinguent des Aloéchaes par l'insertion des antennes qui, dans ces derniers, n'est pas recouverte par un rebord de la tête. Dans les Protéines les antennes vont en grossissant vers l'extrémité ainsi que dans les Omalics et les Oxytélés.

Les antennes des Leslèves sont insérées devant les yeux sous un rebord de la tête; elles sont presque filiformes, composées de onze articles dont le dernier est presque cylindrique; tous ces articles sont presque de la même grosseur. Les palpes sont filiformes; les maxillaires sont de quatre articles; le troisième un peu [plus gros que les autres, le dernier (beaucoup plus grêle, allongé, plus long que les trois autres réunis; les labiaux de trois articles; la tête est libre, entièrement séparée du thorax; le corps est déprimé, avec le thorax allongé, presque en cœur, tronqué et rétréci postérieurement. Les élytres recouvrent ordinairement la plus grande partie de l'abdomen et les ailes; les tarses ont leurs articles allongés, et le dernier beaucoup plus court que les précédents réunis. Les Lestives se trouvent sur les fleurs et sur les Arbres; quelques-unes fréquentent particulièrement les fleurs de l'Épine blanche (*Cratægus oxyacantha*). On en connaît une douzaine d'espèces, toutes européennes; et de petite taille. Leurs métamorphoses nous sont inconnues.

b #La Lesté ve .vlpinjî, Lesteva- alpi- . ma, Latr. (Gêner. Cruel, et Ins. T. 1, ; ^p. 297, n° 2); Stapliilinus alpinus

LES 5a3

(Fabr., Oliv. , Entom. T. ni, Staphyl. , p. 3a, n° 45 , plv 6 , lig. 55) ; A ntophagus alpinus , Graven. (Coléopt. Micr. , p. 188, n. 2). Cette espèce est longue de deux lignes et demie ; la tête est noire , avec les antennes brunes et lisses ;\ leur base, la bouche est un peu testacc'e; le front est très - enfoncé ; le corselet est brun , ponctué , un peu bordé ; les élytres sont d'un testacé pâle , luisant ; le dessous du corps est noir ; les pâtes sont d'un testacé pâle. Cet Insecte se trouve en Laponie, ainsi que dans les hautes montagnes de l'Allemagne et de la llussie. (g.)

LEST1BOUDOISE. Lestibudesla.

bot. priAN. Genre établi parDu Pelil- Thouars (Plant. cleslles Austr., 1, p.

55 , tau. 16) dans la famille des Amaranlhagees, et adopté par R. Browu (Prodr. Flor. Hou.-MolL i,p. 4i5), avec les caractères suivans : calice à cinq divisions profondes; étamiueS au nombre de cinq , réunies par leur base et monadelphes ; anthères à deux loges ; ovaire uniloculaire, polyspermc; style court ou nul; stigmates filiformes , recourbés, au nombre de trois à quatre; capsule polysperme s'ouvrant transversalement eu boîte à savonnette. Ce genre est trèsvoisin des C.rlosia dont il ne diffère guère que par ses trois à quaîre stigmates lilifoimes, tandis que le Stigmate est simple ou seulement bilobe dans les vraies Célosies. Du Petit-Thouarsen a fait connaître une seule espèce qu'il nomme Loslibudesia spicata. Elle est originaire de Madagascar. Rob. Brown en a décrit une seconde espèce qu'il nomme Lestibudesla arbo-

rescens , parce que sa lige est frutescente et volubile. ICI le croit à la Nouvelle-Hollande. Le même auteur dit qu'on doit réunir au même genre les (*Jelosia paniculata* , uirgataultrigyna. (a. r.)

LESTIBDDÉE. Lestibudœa. bot.

piian. Necker appelait ainsi un genre nouveau qu'il formait avec le *Calendula gramiifolia*; mais ce genre n'a pas été adopté. (a. r.)

5a4 LET

LlSTITIS. bot. m an. Syn. d'A-

i istolochu Clématite.

LESTRIS. ois. (lUiger.) \$yn. de Labe ou Stercoraire, (b.)

LET-CHI ou LIT-CHI. bot. pijan.

Fruit délicieux d'une espèce d'Euplوريا , très-cul livée maintenant à Mascareigne et à l'Ile-de-France.

LETHIFERE. bett. opii. Sousdivision établie par Blainville , dans le genre Vipère , à laquelle appartient l'Haïe , dont le venin, dit-on , fait mourir dans le sommeil. (b.)

. LËTHRE. Lethrus. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Penlamères , famille des Lamellicornes, tribu des Scarabéides, division des Arénicoles (Latr., Fam. Nat. du Règne Anim.), établi par Scopoli et adopté par Fabricius et tous les entomologistes avec ces caractères : palpes labiaux terminés par un article de la longueur au moins des précédens; mandibules cornées, fortes, avancées et arquées autour du labre qui est aussi saillant; antennes de onze articles , le neuvième étant en forme

d'entonnoir et enveloppant les deux derniers; tête prolongée en arrière ; abdomen fort court. Ces Insectes ont de grands rapports avec les Géotrupes ou les Scarabés de Fabricius ; mais ils en diffèrent par la massue des antennes , qui dans ces derniers est formée d'articles libres et en feuillets. Les Lèlhres ont le corps arrondi et convexe ; les mâles onlles mandibules plus grandes, avec une branche ou une forte dent au côté extérieur. Leurs élytres sont voûtées et inclinées autour de l'abdomen ,et les pâtes postérieures reculées en arrière. Ces Coléoptères volent le soir après le coucher du soleil ; ils contrefont les morts quand on les prend , au rapport de Fischer (Ann.

des Scienc. Natur. , t. 1, p. 221). Le Lèthrc Céphalote est un Insecte trèsnuisible aux endroits cultivés , parce qu'il- cherche de préférence les bourgeons et les feuilles à peine apparen-

LET

tes , et les coupe net avec les pinces tranchantes de ses mandibules. En Hon grie , ou il (ait beaucoup de mal aux vignes, on l'appelle Schneider , c'est-à-dire Tailleur. 11 grimpe trèsbien , et après avoir coupé les bourgeons de la Plante, il revient sur ses pas en marchant à reculons , et emporte son butin dans le trou qu'il habile. Chaque trou est creusé dans la terre , il est occupé par un couple ; mais à l'époque des amours , il arrive souvent qu'un mâle étranger vient troubler la tranquillité du ménage et cherclie à s'introduire dans l'habitation; alors il se livre un combat acharné entre le mâle propriétaire et l'usurpateur. La femelle ne reste pas inactive; elle bouclie l'ouverture du trou , soutient

son compagnon , cl le poussant sans cesse par le derrière, e.'le entretient l'animosité du combat; l'action ne cesse qu'après la mort ou la fuite de l'agresseur. Fischer (loc. cil.) décrit quatre espèces de ce genre, toutes propres à la Russie ; celle qui est la plus commune et la seule connue avant lui est :

Le Lèthre Céphalote, L. Ce~ phalotes , Fabr., Latr. , Oliv. (Col. 1, 2, 1, 1), Fischer (Enlomogr. de la Russie, T. 1, p. i55, tab. iô, fig.

1). Long de huit à neuf lignes , large de cinq à six , tout noir avec le thorax et les élytres lisses. 11 se trouve dans les champs arides de la Tarin— rie , de la Hongrie et de la Russie; en Sibérie près du Volga, et près de Charkow. H vit dans les fumiers secs , et autour des racines , des Plantes vivaces et des sous-Arbrisseaux.

Le Lethrus œneus de Fabricius appartient au genre Lamprime. K. ce mot. (o.)

LETT SOMTE. Letisomia. bot.

piian. Genre de la famille des Convolvulacées et de la Pentandrie Monogynie, L. , établi par Roxburghet adopté par Wallich dans le second volume de la Flora hiciica de Carey où il en a décrit un grand nombre d'espèces nouvelles. "Voici comment il le caractérise : calice pentasépalc ;

LEU

corolle campanulée ou infundibuliiforme ; ovaire à deux loges ; stigmate bilobé; fruit sec ou charnu , à deux loges, chacune contenant une ou deux graines dont l'embryon est dressé , recourbe , et les cotylédons bifurqués. Ce genre se compose de Plantes herbacées, vivaces , lactescentes, s'étendant beaucoup, et munies de Veilles simples et de Heurs axillaires.

Dans la Flora Indica cîlée précédemment, le docteur Wallich a décrit, avec un soin minutieux, douze cespèes de ce genre qu'il range en ideux sections , suivant qu'elles ont la (Corolle campanulce ou infundibuli- Iforme. Parmi ces espèces, plusieurs ^sont nouvelles; les autres avaient itlèjà été décrites sous les noms de I Co/i volu u lus o u d ' Ipomœ a ; t e 1 1 es so n l :

1° hcllsomia nervoia ou Convolvulus

nervosus , Burin. , T'ior. Ind. ; 2° Letl- ■ sowia setosa ou lpom. stiigosa , Uoth;

3° Lettsomia por/iacea ou lpom. seyilaica, Gacrtn.

Il existe encore un autre genre

Lellsomia , proposé par Ruiz et Pa- ' von dans leur Flore du Chili et du I Pérou , fort différent de celui de Rox- Iburch , mais qui n'a pas été adopte.

LEUCADE. Leucas. bot. phan.

i Genre de la famille des Labiées et de la Didynamie Gy mno-
spermie , L. ,

i indiqué par Burmann {Thesaur.

Zeyl. , p. i40) et établi par R. Brown

[kProdr. Flor. Nou.-Holl. , p. 504) avec les caractères suivans : calice tubuleux à dix stries , terminé par huit à dix dents quelque-fois illégales ; corolle dont le casque ou la lèvre supérieure est coucave , entière , barbue ; la lèvre inférieure à trois petits seg-
mens, celui du milieu plus grand; anthères didymes , nues , à lobes écartés; stigmate lu labié, la branche supérieure très-

courte. Linné réunissait ce genre avec les *Phlomis* , dont il présente , entre autres caractères , celui qui est tiré de la structure du stigmate. Mais comme il en diffère par le calice et la corolle, et que d'un autre côté il a quelques rapports avec le genre *Leonurus* , le professeur De

LEU Sa5

fontaines (Mém. du Muséum , T. xi > p. î) l'a adopté et eu a publié la monographie. K. Bl'OWn a indiqué comme type le *Phlomis* *Zejala/tica* , L. , et lui a adjoint plusieurs autres espèces des contrées équatoriales décrites par Svarlz , Valh , Retz et WilldeDOWf. Il a , en outre, fait connaître une espèce de la Nouvelle-Hollande, sous le nom de *L. Jlaccida*. Sept nouvelles espèces indigènes des Indes- Orientales ont été décrites avec soin et figurées par Desfontaines qui les a nommées : 1° *Leucas lielianthcmifolia* , 3° *L. ternifolia*, 5° *L. lamiifolia* , 4° *L. lanceœfolia* , 5° *L. marrubioides* , 6° *L. procumbens* , 7° *L. capitata*. (g..n.)

LEDCADENDRON. bot. pha.n. Ce genre , de la famille des Protéacées , avait été réuni aux *Protea* par Linné.

Adanson lui avait donné le nom de *L'oiocarpos*. Salisbury , dans son *Paraître* *Loitdine/isis* , en a publié plusieurs espèces qu'il a distribuées dans les genres *Protea* , *Euryspermum* et *Chasme*. Enfin R. Brown, examinant de nouveau la famille des Piolécées {l'ians. Li/in., vo\ 10, p. 50), a rétabli le genre *Leucadendron* qu'il a caractérisé ainsi : fleurs réunies en tête, dioïques par l'avortement ou l'imperfection des organes sexuels. Ses Heurs femelles possèdent un stigmate oblique, en massue, émarginé, hispidule. Le fruit est une noix ou samare monosperme , renfermée dans les écailles du strobile formé par les-

fleurs. Ce genre se compose d'environ quarante espèces, qui diffèrent principalement des Protea, auxquels on les rapportait autrefois, par leurs fleurs dioïques. La séparation des sexes soupçonnée par Linné dans son *Protea parviflora* a été observée très-positivement par Lamarck dans le *Protea pinifolia* qui est devenu le type du genre *Juniperus*, voisin du *Leucadendron*. R. Brown et d'autres savants botanistes anglais ont confirmé cette structure par l'examen d'un grand nombre de plantes vivantes, d'où les Leuca—

3a6 LED

deudrons sont indigènes de l'Afrique australe, et surtout des environs du cap de Bonne-Espérance. Ce sont des Arbrisseaux, rarement des Arbres, souvent couverts d'un duvet soyeux.

Leurs feuilles sont très - entières.

Leurs fleurs sont disposées en capitulas terminaux et solitaires, enveloppées, le plus souvent, par des bradées imbriquées ou des feuilles verticillées et colorées. (g..N.)

LEUCJERIA. bot. phan. (De Candolle.) Pour *Leucideria*. pr. ce mot. (b.)

LEUGANTHÈME. *Leucanthemum*.

bot. phan. Ce nom, qui paraît avoir désigné chez les anciens la Camomille romaine, a été donné par Tournefort à un genre de Composées que Linné réunit à son *Ckrysanthemum*.

V. ce mot. > (g..n

LEDCAS. BOT. PHAN. V. Leuca- DE. Ce nom avait aussi été donné au Dry as octopetala, V. Dryade, et par Césalpin au Lamiurn. (b.)

* LEUCATHON. bot. phan. L'un des noms de l'OEnanthe dans Dioscoride. (b.)

* LEUCEORUM. bot. phan. (Pline.) Même chose que Dorypétrou. V.

ce mol. (b.)

* LEUCHERIE. Leucheria. bot.

phan. Ce genre, de la famille des Synanthérées , a été établi par Lagasca , dans sa dissertation sur les Chœnantophores, publiée en 1811. En le plaçant auprès du Chaptalia et du Clarionea, parmi les Labiatiflores qui correspondent à cette tribu, le professeur De Candolle (Ann. du Muséum, T. xix, 1812) a présenté ce genre sous une dénomination légèrement modifiée; il l'a nommé Leucceia. Voici les caractères qui peuvent être déduits de la description fournie par Lagasca ; involucre presque hémisphérique, dont les écailles sont probablement disposées sur un seul rang; réceptacle plane, ponctué, portant près de ses bords une rangée

LEU

circulaire de petites écailles (squameules) analogues à celles de 1 involucre, et qui séparent les fleurs marginales des autres fleurs; calathide sans rayons , composée de fleurons hermaphrodites, nombreux , dont les corolles ont deux lèvres, l'intérieure

bipartite et roulée en spirale; akènes non prolongés en col, surmontés d'une aigrette légèrement plumeuse. Dans l'exposition des caractères que fournit le réceptacle , nous nous sommes conformés au sentiment de Cassini ; car Lagasca considère les

fietites écailles de cet organe comme es écailles intérieures de l'involucre.

L'auteur de ce genre n'a pas décrit les espèces qui le composent ; il a indiqué seulement ses affinités avec les genres *Peresia* et *Lasiorrhiza* , ce qui revient au même que celles assignées par De Candolle. Les *Leucheries* sont des Plantes herbacées, ordinairement cotonneuses, blanchâtres , à feuilles alternes, sessiles, pinnatifides , à calathides terminales, souvent disposées en corymbes , composées de fleurs purpurines ou jaunâtres. Elles habitent l'Amérique méridionale.

* *LEUCICIITE*. pois. Espèce de

Saumon du sous

genre *Corégone*.

» *LEUCISCUS*. pois. V. *Able*.

LEUCITE. min, Syn. d'*Amphigène*. V. ce mot. (g. del.)

LEUCOCHRYSOS. min. La Gemme ainsi nommée par Pline et dont il distinguait deux espèces, celle à .veine blanche et l'enfumée, peut être indifféremment un Quartz hyalin ,

Suelque *Topaze* ou une *Chrysoliie*,etc. (b.)

LEUCODON. bot. crypt. {*Mousses*.) Un péristome simple, externe , membraneux, à seize dents fendues en deux ; une coiffe

cuculliforme distinguent ce genre voisin *Azspterigynandrum* et des *Neclera*. Dix espèces, dont la plupart sont exotiques, le composent : elles sont rameuses, à rameaux cylindriques qui se courbent

LETJ

par la sécheresse ; les folioles du périchèse sont longues et engainantes; Ma capsule est droite, pédicellée; le périsme est remarquable par ses dents blanchâtres , caractère qui lui a valu le nom de *Leucodon*. Elles croissent sur les Arbres. Bridel a adopté ce genre fondé par Schwœgrichen. Parmi les espèces françaises , on distingue le *Leucodon* de Ramond , *Leucodon* Ramondi , *Pterigynandrum* Ramondi , D. C. , Flor. Franc. ; à tige (droite, divisée en rameaux cylindriques, grêles; à feuilles ovales-lancéolées, striées; à pédicelles très-courts ; à capsule ovale. On la trouve (dans les Pyrénées , sur les troncs (d'Arbres, ou elle a été découverte par Ramond. Cette Plante a quelque rapport avec l'espèce suivante dont elle diffère cependant par sa tige non rampante , divisée à sa base en rameaux ; par ses feuilles très-entières , un peu tournées d'un seul côté:

par ses pédicelles très-courts, et par son périsme ; à denticulations légers, ovales, très-entières, striées.

.Le *Leucodon* queue d'Ecureuil, L.

Le *Sciuroides* , Schwœgr. , décrit dans la .Flore Française , sous le nom de *Dicranum Sciuroides*, très -commun dans toute la France. Sa tige est rampante et rameuse; ses rameaux sont fasciés , ascendants et arqués ; les feuilles sont imbriquées, ovales, acuminées; la capsule est oblongue et ovale. Cette Mousse, si commune, a été pour les botanistes un tel sujet de controverse

que la synonymie en est encore vacillante. Palisot-Beauvois en a fait un *Cccalypaum*; Eb.cb.art , Smith, Swartz , De Candolle, un *Dicranum* ; c'est un *ïssidens* suivant Hedwig ; un *Fascina* d'après l'opinion de Schrauk ; un *P/erigynandrum* pour Bridel, qui, depuis, a changé d'opinion ; un *Fterogonium* pour Turner; un *Tric/iostomiin* pour Palisot-Beauvois ; enfin, cette Mousse était un *Hypnum* pour Linné.

* **LEUCODRABA.** bot. tian. (De Candolle.) Sous-genre de *Drave*. V.

ce mot. (h.)

LEUCOGRAPHIS. bot. rn.vx. La Plante ainsi nommée par Plin, peut être le *Carduus Leucographus* , L., qui est un *Circiitm*. Selon d'autres , mais sans fondement, c'était un *So-*

lidago.

LEUCOION ou **PERCE -NEIGE.**

Leucoium. bot. phan. Ce nom , fort ancien dans la langue de la botanique, a été employé par Théophraste et par Dioscoride. Le premier nommait *Leucoium* la Plante bulbeuse à laquelle les botanistes modernes ont conservé le même nom générique.

Dioscoride, au contraire, appelait ainsi certaines espèces de Crucifères qui toutes appartiennent au genre *Ckeiranthus*. iNous ne nous occuperons dans cet article que du genre *Leucoium* des modernes. Ce genre appartient à la famille des Narcissées et à l'Hexandrie Monogynie, L. Ses fleurs, ainsi que l'indique son nom , sont blanches , pédonculces , réunies plusieurs ensemble dans une spathe monophylle et terminale. Le calice est adhérent par sa base avec l'ovaire infère. Son limbe est comme campanulé,

à six divisions très-profondes , ovales , oblongues , un peu épaissies et verdâtres à leur extrémité supérieure; trois de ces divisions sont un peu plus courtes que les trois autres. Les étamines , au nombre de six, sont dressées et incluses , insérées sur une sorte de bourrelet ou de disque épigyne garnissant le sommet de l'ovaire; les anthères sont introrsées et à deux loges. L'ovaire est ovoïde infère , à trois loges contenant chacune un assez grand nombre d'ovules attachés à l'angle interne et disposés sur deux rangées. Le style est de la longueur des étamines , quelquefois un peu renflé en massue , terminé par un stigmate extrêmement petit et entier. Le fruit est une capsule globuleuse à trois loges et à trois valves.

Les espèces de ce genre croissent, en général, dans les montagnes, et fleurissent souvent lorsque la terre est encore couverte de neige. De-là les noms de Nivèol et de Vercc-Nci-

3j8 LEU

ge ,sous lesquels on les désigne assez communément. Ce sont de petites Plantes à bulbe ovoïde, à feuilles linéaires et à hampe généralement comprimée et ensiforme. Les deux suivantes sont souvent cultivées dans les jardins.

Leucoion du printemps, Leu- Loium vernum, L. Cette petite espèce, qui est indigène d'Europe, a ses feuilles linéaires, très-étroites ; sa hampe, haute de cinq à six pouces , terminée par une spathe membraneuse, monophylle, d'où, sortent une ou deux fleurs blanches, variées de vert.

Leucoion d'été, L. æstivum , L.

Beaucoup plus grande que la précédente dans toutes ses parties, cette espèce est également indigène d'Europe.

Ses feuilles sont linéaires; sa hampe d'un pied à un pied et demi d'élévation, est comprimée et ensiforme.

Ses Œurs , plus grandes , ayant chaque division marquée d'une tache verte, sont pédonculées et sortent au nombre de quatre à huit d'une spathe monopétale et terminale. Ces deux espèces se cultivent en pleine terre.

* LEUCOL/ENA. bot. phan. Sous ce nom, R. Brown {Gêner. Remar. on the Bot. of Terra Australis , p. a 5.) a indiqué un nouveau genre qui appartient à la famille des Ombellifères, mais dont il n'a point donné les caractères. Il a seulement parlé des diversités d'inflorescences que présentent les espèces , quoique d'ailleurs elles soient très-rapprochées par le port, et les parties essentielles de la fructification. Le nombre des rayons de leurs ombelles, celui des fleurs qui comprend les rayons , sont très-variables, puisque certaines espèces ont une ombelle composée de plusieurs rayons , tandis que chez d'autres elle n'en a que trois, deux et même un seul. Ce singulier genre pourrait , selon Sprengel , être rapporté au Trachymènè» Rudge. P. ce mot.

* LEDCOLITHE. min. V. Dipy-

ÎE.

LEU

* LEUCOMÉRIDE. Leucomeris.

BOT. phan. Genre de la famille des Synanthérées , tribu des Carduacées, et de la Syngénésie égale, L., récemment établi par

U. Don {Prodrom.

Lloice Nepalensis , p. 169) qui Fa ainsi caractérisé : involucre oblong , cylindracé, formé de plusieurs folioles coriaces , appliquées et imbriquées; réceptacle petit et marqué de iossettes ; calathide composée de quatre fleurons hermaphrodites, dont le tube est très-long, filiforme , le limbe à cinq divisions réfléchies; anthères blanches , à moitié saillantes hors du tube de la corolle , munies de deux longues soies à la base ; stigmate saillant, bifide; akènes cylindracs, entièrement velus, surmontés d'une aigrette très-longue, composée de poils légèrement plumeux. L'auteur de ce genre n'a point indiqué ses affinités immédiates, et l'a seulement placé entre les genres *Liatris* et *Eupatorium*. Il ne se compose que d'une seule espèce qui a reçu le nom de *Leucomeris spectabilis* , et qui a été trouvée dans le Napaul et le Sirinagur par Wallich. C'est un Arbrisseau dressé, à rameaux anguleux, couvert d'un duvet blanchâtre. Ses feuilles sont alternes , elliptiques^ oblongues, aiguës, entières, coriaces, atténuées à la base , vertes en dessus, et couvertes en dessous d'un duvet blanchâtre. Les fleurs sont pédonculées et disposées en corymbes terminaux. (G..N.)

*LEUCOMYCES. bot. crypt.

{Champignons.) Battara a donné ce nom à des Champignons du genre *Agaric* remarquables par leur blancheur. On les a rapportés aux *Agaricus asper* et *ruiscens* {*Leucomyces gemmatus*); *A. volvaceus*{*L. supertnef usais*), *A. ouoideus*{*L. pectinatus*), *A. phaloides* {*L. speciosior*). Ou ne sait point exactement quels sont les *Leucomyces reniformis* et *pectinatus alter*. (a. f.)

LEUCONARCISSUS. bot. phan (C. Bauhin.) Syn. d'Ant/icri-
cum sera tinum , L. (b.)

LEU

* LEUCONOTIS. iiOT.PHAN.Genrrc de la famille des Apocy-
nées de IR. lliown , et de la Tétrandrie Mono- Egynie, L., établi
parle docteur Jack \ (Tra/isaci. of tlic Linn. Societ., vol. il4, p.
iai) qui l'a ainsi caractérisé : ccalice infère, à quatre divisions pro-
fondes ; corolle dont le tube est plus étroit supérieurement , et
le limbe ,ià quatre segmens; quatre étamines iincluses , alternes
avec les segmens i;de la corolle; ovaire simple, à deux Uoges di-
spermes; style unique court; sstigmat conique au sommet et en
[tonne d'anneau à la base ; baie renffermant une à trois graines
sans albuuneu, et munie d'un embryon renversé. Ce genre
semble à l'auteur tenir lie milieu entre le Gerbera et le Carissssa. Il
ne renferme qu'une seule Plantte , Lenconotis anceps , qui croît à
."Sumatra. C'est un Arbrisseau lactesiccul, à feuilles opposées,
sansstipu- I les , à lleuis disposées en corymbes tdichotomes et
axdlaires. (G..N.)

* LEUCONYMPH/EA. bot. phan.

lBocrhaave (Hort. Lugd. Bot., 36 i) mommait ainsi le genre
Nymphœa tel cqu'il a été limité par iNecker, Richard cet De Cau-
clolb:. f. ce mot. (u..n.)

LEUCOP1IRE. Leucup/ira. inf.

(Genre fort naturel et parfuitementeaîrctérisé de l'ordre des
Tricbodés, (dans la classe des Microscopiques , iustilué par-
Miilleiqui luidouua pour (.caractères : corps transparent , garni
c'de cils de toutes paris, c'est-à-dire (comme velu , et hérissé sur

toute la superficie de poils courts , soyeux , ce ijqui les distingue de nos Péritriques 'iqui n'en ont que tout autour, des véritables Trichodés qui n'en présentent ijqu'un faisceau, et des Mystacod-ciles 'jqui les ont distribués en deux séries. ILamarck n'a pas dis-lingué ces Animnaux et les a confondus avec le geniic formé par Millier sous le nom de ITricbode. V, ce mot. Ce sont pour la [plupart des êtres invisibles à l'œil désarmé, et qui pour la forme ont des •analogues dans l'ordre des Gymno- Idés dont ils diflêrnt ce-pendaut beau-

LEU 5j9

coup par les cils ou poils dont ils sont couverts. La plupart sont malins; peu vivent dans les infusions.

Nous en connaissons près d'une trentaine d'espèces distri-buées en cinq sections ou sous genres.

f Enchééidiens. En forme de poire. Les espèces de celte section sont les *Leucophra acuta* , Miill. , Inf., p. i5i, pl. Jfl, f. 11-1 J; En-cycl., Yer3 dl. , pl. 1 1 , f. 5-5 , etc.; *Leucophra acuta*, Miill. , pl. ao , 1. 8-9; Encycl. , pl. 1 1 , fig. 1 , 2. Ue l'eau de mer fraîche ou corrompte.

ff Volvociens. Corps obrond.

Les *Trichoda horrida* , Miill., pl. 24, f. 5; Encycl., pl. 19, f. 26, qu'on trouve dans l'eau des Moules mangeables; *T. vesiculifera*, Miill., pl.

22 , f. 2-3 ; Eucycl. , pl. 10, f. 23-a4 ; Joblot, Micr. , pl. a, f. B-s , qui vit dans diverses infusions végétales; *T.*

Mamilla , Miill. , Inf. , pl. ai , f. 5-5 ; Encycl. , pl. 10 , f. 3-3, de l'eau oii ctoît la Limlicule , sonl les espèces les mieux caractérisées de cette section , où rentre probablement le *Leucophra post/iuma* , Miill. , pl. ai , fig. i3; Encycl., pl. 10, 1 3.

fff P a n a m Éc 1 ens . Corps allongé, avec un indice de sillon vers la partie amincie. L^s *Leucophra notata*, Miill., pl. aa, f. i3-i6; Encycl., pl.

il, f. 6-9, de l'eau marine; *Conflictor*, Miill., pl. ai , f. î-a; Encycl. , pl. 10, f. î-a , et le Poisson en forme de bouteille de Joblot , pl. 1 a , f. Y , appartiennent à oc sous-genre.

fttt Koepodiens. Plus ou moins trigones , en forme de ce que les anciens micrographes nommaient des Pandeloques. Les *Leucophra pertusa*, Miill. , pl. ai , f. i5-i6 ; Encycl., pl. 10, f. i5-i6, de l'eau des marais, et *fluida*, Miill. , Zool. Dan. , tab. 73 , f. 1-6; Encycl. , pl. 1 1 , f . 34-29 , de l'eau des Moules, font partie de cette quatrième section.

tttti Protéoides. A corps variable ; sont les *Leucophra dilatata* , Miill. , pl. ai , f. 19-31 ; Encycl., pl. 10, fig. 19-21, *ctfracta*, Midi. ,pl. 21, f. 17-18; Encycl., pl. 10 , f. 17-18. Ils nagent à la manière des Planaires,

33o LED

mais en changeant un peu de forme.

Les *Leucophra crinita* , Miill. , pl.

37, f. ai; Encycl., pl. i4, f. 18; *Trir clioda Larus*, Mull. , pl. 3i, l. 5-7; Encycl. , pl. 16 , f. 6-8; *Leucophra bursata*, Miill., pl. ai , f. ia ; Encycl., pl. 10, f. ia; *T. nodulata*, Miill., Zool. Dan., tab. 80, f. a-i ;

Encycl., pl. 1 1, f. i3-ai , et cet Animal si polymorphe , représente par Joblot, pl. ia,fig. A-x, sous les noms de Chenille, Chausse, Guêtre, Cornet-à-Bouquin , etc., sont des espèces ambiguës de ce genre fort singulier. (b.)

LEUCOPHT ALMOS . min. La Gemme ainsi nommée par Pline paraît être une Sardoïue. (b.)

LEDCOPHY LLE . *Leucophyllum*.

BOT. phan. Genre de la famille des Antirrhinées et de la Didynamie Aniospermie, établi par Humboldt et onpland {Plant, œquin., 2, p. g5, t.

109) pour un Arbuste très-rameux, couvert dans toutes ses parties d'un duvet blanc et tomenteux. Le *Leucophyllum ambiguum* , loc. cit. , croît au Mexique auprès d'Aclopan à une hauteur d'environ mille cinquante toises au-dessus du niveau delà mer.

Ses feuilles sont alternes , très-entières. Ses fleurs sont solitaires à l'aisselle des feuilles et de couleur violette. Leur calice est à cinq divisions profondes et égales. Leur corolle monopélale, lubuleuse et subcampaniforme, plus longue que le calice, ayant son limbe à deux lèvres, la supérieure bilobée, l'inférieure à trois divisions , dont celle du milieu est la plus large. Les étamines sont didynames et incluses. Les anthères sont à deux loges écartées. Le style est terminé par un stigmat simple. Le fruit est une capsule biloculaire et polysperme. (a. r.)

* LEUCOPHYTE. *Leucophyta*.

BOT.priAN. Dans ses Observations sur les Composées, R. Brown a indiqué la formation de ce genre qui appartient à la fa-

mille des Synanthérées , et à la Syngcnésieséparée, L. Gassini le place dans la tribu des Initiées , section des

LEU

Inulées-Gnaphaliées. Voici les principaux caractères que ce dernier botaniste lui a attribués : involucre composé d'environ dix folioles , à peu près égales, appliquées , obovalesoblongues, scarieuses , non colorées, coriaces dans leur milieu, laineuses extérieurement et au sommet; réceptacle nu et très-petit; calathide formée de trois fleurs égales , régulières et hermaphrodites; ovaires obovoïdes , glanduleux , surmontés d'une aigrette blanche , composée d'un seul rang de paillettes égales, libres supérieurement, soudées à la base, linéaires-laminées , garnies des deux côtés dans leur partie supérieure de longues barbes épaisses. Les calathides nombreuses et sessiles forment un capitule globuleux, entouré d'un involucre général court, composé de bractées à peu près égales et appli-

luées. En indiquant ce genre, R.

rown l'avait placé entre les genres Calocephalus et Craspedium Richea.

Mais Cassini lui a trouvé plus de rapports avec le Stœbe et le Dispermis ; il en a décrit une seule espèce qu'il a nommée Leucophyta Brownii , en l'honneur du savant botaniste qui l'a découverte dans la Nouvelle-Hollande , près le port du roi George , et sur la côte australe, au détroit de Bass. Cette espèce est un Arbruste cotonneux , blanc ou blanchâtre , quelquefois même verdâtre. Sa tige est très-rameuse , garnie de feuilles alternes , sessiles , linéaires , obtuses et très-entières. Les capitules se composent de fleurs jaunes. (g.n.)

LEUCOPOGON. *Leucopogon*. bot.

phan. Genre établi par II. Brown dans la famille des Epacridées , aux dépens du genre *Styphelia*, et caractérisé de la manière suivante : chaque fleur est accompagnée extérieurement de deux bractées; le calice est à cinq divisions profondes et égales; la corolle est infundibuliforme , à tube court, à limbe quinquéfide cl barbu longitudinalement- Les cinq étamines sont incluses. L'ovaire est globuleux, à deux ou cinq loges; le style

LEO

«st court , simple , terminé par un iiitigmate très-petit. Le disque qui morte l'ovaire forme un rebord légèrement lobé; rarement ce disque ^manque en totalité. Le fruit est une Jlrue charnue, quelquefois presque ;oèche et coriace. Toutes les espèces lie ce genre habitent les diverses parties de la Nouvelle-Hollande et delà Icerre de Van-Diémen. R. Brown, dans won Prodrôme , en décrit quarantelauit espèces. Ce sont , en général , de Ir.rès-pelits Arbustes à feuilles éparses, ccoriaces , persistantes , très-entières , te plus souvent étroites et lancéolées. Leurs fleurs sont fort petites, Ilisposées en épis ou en grappes axil- Laires ou terminales - R. Brown a placcé dans ce genre le *Styphella lanceoiala* de Smith ; le *Styph. Hic/iei* , Lawill. , Nov.-Holl., t. 60 ; le *Styph.*

vofrovata , Labill. , t. 67 ; le *Styph. tri- (chocarpa*, Labill. , t. 66 ; le *Styph.*

rericoïdes , Smith; le *Styph. virgata* , LLabill., t. 64; le *Styph. cullina* , LLabill. , t. 65; le *Styph. amplexitcaulis* , Rudge. Les autres espèces rêont des Plantes tout-à-fait nouvelles, .observées par cet illustre botanisie Idans les différentes régions de la JNouvelle-Hollande qu'ils visitées.

LEDCOPSIS. ins. Pour Leucospis. V. ce mot. (g.)

* LEUCOPTÈRES. ois. Espèces genres Glaucoppe, Foulque et Ster-

nne. F. ces mots. (b.)

* LEUCORODIA. ois. Nom scientifique d'une espèce du genre Spatul.

IV. ce mot. (a

* LEUCORYX. mam. Ou Onyx ulanc, espèce d'Antilope. F '. ce mot.

: LEUCOSCEPTRUM. bot. i>ian.

SSmith {Exot. Bot., j ,p. 1 1 5 , t. 116) 11 décrit et figuré sous le nom de ULeucosceptrum canum une Plante formant un genre nouveau qui appartient à la Didymie Angiospermie , LL., et à la famille des Verbénacées.

58es tiges sont couvertes d'un duvet •blanc, et se divisent en rameaux •joniprimés et quadrangulaires. Elles

LEU 5£i

portent des feuilles opposées , oblongues , elliptiques, presque lancéolées, dentées en scie, aiguës à leur sommet, rétrécies en pétioles à leur base , veinées , glabres et blanchâtres en dessous. Les fleurs forment un bel épi terminal , et chacune d'elles est accompagnée d'une petite bractée blanchâtre. Le calice est court , tubuleux, à cinq segments obtus, inégaux; la corolle , plus longue que

le calice, a un tube court et un limbe presque Lilabié , à cinq lobes inégaux , obtus ; les quatre étamines sont didynames , saillantes , inclinées et très-longues ; les anthères arrondies ; l'ovaire quadri-lobé , portant un style plus long ue les étamines. Le fruit se compose e quatre akènes luisans et tronqués.

Celte Plante a été trouvée dans les forêts du Napaul. (g..N.)

LEDCOSIE. Leucosia. crust. Genre de l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures , tribu des Oibiculaires (Lat.jFam. Nat. duRègn. Anim.), établi par Fabricius et a^ant pour caractères : test rond , bombé, comme globuleux ; yeux placés dans un court rétrécissement de sa partie antérieure , petits, à pédicules courts, presque immobiles dans leurs fossettes entre lesquelles en sont d'autres qui cachent de ti ès-courtes antennes.

Pieds -mâchoires extérieurs pointus , formant ensemble un triangle dont la poinie est en haut. Les pieds de ces Crustacés vont en diminuant graduellement à partircles serres qui sont ordinairement longues et cylindriques dans les mâles surtout. Les autres pieds sont onguiculés, courts, souvent grêles ; la queue est composée de quatre à cinq tablettes , celle de la femelle est grande , presque orbiculaire, et recouvre la poitrine.

Ces Crustacés diffèrent des Maia et des Juachus par des caractères tiés du nombre de feuillets de la queue; ils se distinguent des Coristes parla forme du corps et les antennes , et des J.xa de Lcach , parce que ces derniers ont de chaque côté du test une grosse emiuenec cylindrique et mous-

Suivant Boscet Risso, les Leucosies font leur séjour dans les moyennes profondeurs de la mer, dans les creux des rchers calcaires , parmi les Flustres et les Madrépores , et y vivent solitaires et cachées. Elles attendent, pour sortir, que le hasard leur amène quelque proie facile à saisir. La démarche de ces Animaux est lente, et on ne les voit guère courir que dans le danger. Suivant Risso, la femelle de la Leucosie Noyau a deux ou trois cents œufs rougeâtres , qui éclosent pendant l'été. Ces Crustacés sont , en général , de grandeur moyenne ; on ne les mange pas. Latreille a fait plusieurs coupes dans ce genre ; il les base sur le plus ou moins grand nombre de tubercules et épines du lest et sur sa forme plus ou moins globuleuse. L'espèce qui se trouve dans nos mers est :

La Leucosie Noyau, L. Nucleus , Fabr. , Bosc, Lâtr. , Risso, Herbst (Cancr., tab. a , fig. j4); Cancer Macrurus, Rondel., Aldrov. Elle est globuleuse avec de petits grains épars sur les côtés et à l'extrémité postérieure et une petite éminence en forme de dents de chaque côté, en avant et au-dessus des deux serres. Elle a une épine aiguë, recourbée de chaque côté, au-dessus de la naissance des deux pattes postérieures , et deux dents au bord postérieur du test ; les doigts sont très-longs, grêles, filiformes et pointus. Cette espèce habite la Méditerranée.

On trouve communément à l'état fossile la Leucosie Craniole qui vit sur la côte de Malabar. V- Crustacés

FOSSILES. (G

LEUCOSIE. Leucosia. bot. than.

Ce genre de la Pentandrie Monogynie, L. , a été établi par Du Petit- Thouars (Gênera IN ou. Madag. , n.

79) et placé dans la famille des Térébinthacées. Selon R. Brown , il doit être réuni au Chailletia qui constitue un ordre distinct sous le nom de Chailletiées ou de Chailletiacées. V.

ce mot au Supplément. Dans le 2U vo-

LEU

lu me de son Prodrom. Syst. Veg., p. i

58, De Candolle a conservé ce genre, et l'a ainsi caractérisé d'après Du Petit- 1: Thouars : calice quinquéfide ; cinq

pétales; cinq étamines; ovaire adhé- f

renl au calice? contenant trois ovules; 11

style unique ; fruit trigonc., renfer- 11

mant un noyau rugueux et osseux. >"

L'espèce unique qui compose ce gen- »'

re a été nommée Leucosia Thouarsia- i(

11a par Roemer et Schultes. Sprengel, ! adoptant l'opinion de Brown , l'a dé-

signé sous le nom de Chailletia Leu- w

cosia. C'est un Arbrisseau petit et 1

très -grêle. Ses feuilles sont munies [

d'un petit nombre de nervures sca- ,

bres et colonneuses , blanchâtres en ■
dessous. Il croît dans l'île de Mada- -
gascar. (o..K.) v

* LEUCO-SINAPIS. tiot. than. jf

Sous-genre établi par De Candolle r
parmi les Sinairis. F. Moutarde. 1

LEUCOSPERME. Leucospermum. j

bot. pu an. Ce genre, de la famille des ti
Protéacées, fut réuni par Linné aux ioi
Protea. Salisbury en forma son genre m
Leucadendrum qu'il faut bien distin- m
guer du Leucadendron de R. Brown. en
C'est ce dernier botaniste qui a don- |

né le nom de Leucospermum au gen- ^
re dont il est ici question , et qui l'a tl
ainsi caractérisé : calice irrégulier. j][
labié, dont trois des divisions (rare- Tf
ment toutes) sont réunies par leurs f.
onglets, tandis que les lames stamini-
fères sont distinctes ; style filiforme, :i

caduc , surmonté d'un stigmate épais- j:

si , glabre , quelquefois inéquilatéral ; j,j noix renflée , sessile, lisse; capitule

des fleurs en nombre indéfini; iuvo- ((: lucre polyphylle, imbriqué.

Le Leucadendron conocarpoden- !(:

dron , L. , Spec. Plant- , 'éd. 1, p. 9S , |

ou Protea conocarpa , ihunb. , es- |(

pèce la plus anciennement connue , 1

peut être considérée comme Je type , du genre Leucospermum. R. Brown (Transact. Linn. Soc. o/Londdn, vol.

X, p. g5) en a décrit dix-huit espe- t ces qui toutes croissent dans l'Afrique australe, principalement aux environs du cap de Bonne-Espérance.

LEU

LEU

,ic sont des Arbrisseaux, ordinairement très-petits , quelque-fois arboescens , le plus souvent hérissés ou cotonneux. Leurs feuilles sont enliè- ■QS ou munies au sommet de denteures calleuses. Les capitules sont ■iTiniriaux ; ils se composent de fleurs muies , tantôt très-distinctes, imbriuuées et accompagnées de bractées, il endurcies, tantôt réunies en faisceaux sur un réceptacle à peu près liane , et munies de paillettes caduques. (G..N.)

* LEUCOSPHOEROCEPHA- .iUS. bot. crypt. [Champignons.)
 b'atlarà donne ce nom à divers Agaiiics de couleur blanche, à
 chapeau tombe. Il n'est guère possible de déterminer exactement
 quelles sont les espèces qui y correspondent suivant il nomenclature
 moderne. On désime pourtant parmi eux X Agaricus
 campos/ris. (a. f.)

LEUCOSPIS. Leucospis. ins. Genre de l'ordre des Hyménoptères , seccou des Térébrans , famille des Pupinorcs, tribu des Chalcidites, établi aar Fabricius, et ayant pour caractères : cuisses des pieds postérieurs rrès-grandes ; abdomen paraissant ippliqué contre l'extrémité postérieure du corselet, comprimé clans toute 1 hauteur , arrondi postérieurement , wee la tarière recourbée sur le dos; "3S ailes supérieures sont doublées.

,ùcs Insectes se distinguent des Chal- :ides par l'abdomen , qui , dans cenxii, est attaché au corselet par un pécncle très-apparent. Ils se distin- I urnt des Eulophcs par les pieds poslirieurs , qui, dans ces derniers, 'ont ni les cuisses à la fois très reniées et lenticulaires, ni les jambes tcès-arq nées. Ces Hyménoptères ont h tête triangulaire, comprimée, appliquée contre le thorax ; les antennes nnt insérées entre les yeux, coûtées, composées de douze articles, '•ont les dix derniers forment une jgc conico-eylindrique ; les palpes 'ont courts, un peu renflés au bout ; 'ss maxillaires sont composés de quatre articles dont le pénultième est

allongé, les labiaux de trois; les mandibules sont bidentées; la languette est très-échaucrée , le corselet a son premier segment grand , carré; les ailes supérieures ont une cellule cubitale incomplète, et une cellule radiale très-étroite et fort allongée; les pâtes postérieures sont propres pour le saut ; la jambe est arquée et terminée par une lbrtc pointe, elle reçoit dans sa courbure la

cuisse qui est renflée; enfin, l'abdomen eslovalaire, comprimé postérieurement, paraissant sessile , le premier anneau tenant au corselet par une bonne partie de sa largeur, et le point central du mouvement n'étant qu'au second anneau. Dans les femelles, il porte une tarière de trois filets qui prend naissance à la poitrine, et remonte sur le dos dans une rainure.

Ces Insectes placent leurs œufs dans les nids des Abeilles maçonnes et dans quelques guêpiers. L'espèce la plus commune est :

Le *Leucospis dousigèr* , *Leucospis dorsigera* , Fabr. , la femelle ; Latr. ; JL dispar, Fabr., le mâle (Pauz., Faun. Ins. Germ. lvi, xv).

ISOIR; abdomen presque une fois aussi long que le corselet , avec trois bandes et deux petites taches jaunes ; une ligne transverse sur l'écusson et deux autres à la partie antérieure du corselet de cette même couleur. Longueur, environ sept lignes. On trouve cette espèce dans les parties méridionales de la France et aux environs de Paris. V. pour les autres espèces , la Monographie de Klig (Actes des Cur. de la INat. de Berlin) et Jurine.

* LEUCOSPORDS. bot. crypt.

[Champignons.] Première série des espèces du genre *Agaric* de Frics.

V. *Agaric*. C'est aussi le nom de la quatrième série des *Bolets*. ce mot,

LEDOSTICŌS. mis. Même chose, ou à peu près, que *Leptosiphos*. V. ce mot. (b.)

LEUCOSTINE. min- C'est-à-dire Roche à petits points blancs.
De Lamé-

thefro a le premier donné ce nom aux Porphyres rouges , à base de Pétrosilex, contenant de petits cristaux de Feldspath blanc. Cordier, dans son Tableau méthodique des Laves, l'applique à celles de ces Roches qui sont pectrosiliceuses , et composées de cristaux microscopiques entrelacés , d'un égal volume, réunis par juxtaposition et offrant entre eux des vacuoles plus ou moins rares. Il en distingue trois variétés : la Leucostine compacte ou Phonolite , la Leucostine écaillée ou Dolérite , et la Leucostine granulaire ou Domite.

V. les mots Roches et Laves

• (G. DEL

LEUCOTHOE. Leucolhoe. crust.

Genre de l'ordre, des Amphipodes , famille des Crevettines, établi par Leach aux dépens des Gammarus de Lalreille , et n'en différant que par le pouce des mains antérieures, qui est biarticulé. Ce genre a été formé sur un petit Crustacé des mers Britanniques ; c'est le Cancer articulatus de Monlagu {Tra/is. Linn. T. vu , tab.

6, fig. 6). V. Crevettes et Chevrettes, (g.)

LED RADIA, bot. phan. (Poiret.) Pour Lavradia. V . ce mot.
(g..n.)

LEDTRITE. mtn. Pierre marneuse d'un blanc-grisâtre très-phosphorique , avec laquelle on amende les terres à Leutre , près d'Iéna, en Saxe.

(g.del.ï

LED-TZE. ois. Espèce du genre Cormoran. V. ce mot. (dr..z.)

LEDZÉE. Leuzea. bot. ciian. Ce genre de la famille des Synanthérées, Ciuarocéphales de Jussieu , et de la Syn^énésie égale, L., a été dédié au savant et respectable Deleuze par De Candolle (Flore Française , deuxième édition) qui l'a ainsi caractérisé : involucre imbriqué, sphérique , composé d'écaillés sans piquans , arrondies,scarieuseset lacéréesau sommet; réceptacle hérissé de soies soudées par la base ; fleurons nombreux , réguliers et hermaphrodites; akènes tuberculeux, surmontés d'une aigrette longue et plumeuse. Ce genre a été

LEV

constitué aux dépens des Ceritaurea de Linné. Adanson avait déjà proposé sa formation sous le nom de Rkacoma ; mais il y avait réuni une Plante qui forme le type du Rhaponticum. Les genres auprès desquels le Leuzea doit être placé sont , selon De Candolle , le Saussurea et le Cinara ; mais Cassini indique une plus grande affinité entre le genre en question et les genres Rhaponticum et Fornicium. Il offre , en effet , l'involucre du premier et l'aigrette du second. Le genre Hookia de Necker, indiqué par De Candolle, comme renfermant le Leuzea , est plus voisin de Y J Ifredia et du Rhaponticum.

La Ledzée conifere , *Leuzea conifera*, D. C. , Fl. Fr. et Ann. du Muséum d'Hist. Natur. T. xvi, *Centaurea conifera*, L., est une Plante herbacée, dont la tige haute environ de deux décimètres, est droite, cotonneuse , garnie de feuilles verdâtres supérieurement, cotonneuses en dessous , les radicales pétiolées, ovales , lancéolées, presque simples, les caulinaires plus étroites et pinatifides. La calathide, très-grande et terminale, se compose de Heurs purpurines; son involucre, formé d'écaillés luisantes et jaunâtres , a été comparé par C. Baudin à un cône de Pin ; d'où le nom spécifique de conifera imposé par Linné. Cette Plante croît dans les montagnes de la France méridionale. (c.N.)

LEVANTINE, conch. Nom vulgaire, et marchand de diverses Coquilles du genre Vénus. (b.)

LÉVENHOOKIE. *Levenhookia*.

bot. jhan. Genre de la famille naturelle des Stylidiées, lequel se compose d'une seule espèce, *Levenhookia pusilla* , Brown (Prodr. Flor. Nov.- Holl., i ,p. 573). C'est une très-petite Plante ayant le port et la grandeur du *Radiola millegrana*, des feuilles alternes pétiolées , très-rapprochées les unes des autres au sommet des ramifications de la tige, et de très-petites fleurs fasciculées au milieu des feuilles. Le calice est à cinq divisions

LËV

légales disposées en deux lèvres. La uurolle est tubuleusc, son limbe est uuinqnèparti et irrégulier. Le labello sst concave, plus élevé que la colonne staminifère , articulé avec le tube , It mobile dans cet endroit. La coloulue staminifère est dressée , attachée iu tube au-dessous de l'articulation Il u label le. Les a n t hères on t leurs deux oages placées l'une au-dessous de 'autre. Les deux

stigmates sont capillaires et la capsule est à une seule ooge. Cette petite Plante présente un 'phénomène d'irritabilité irès-rcmari-piahle. Nous avons dit que son lamelle ou division inférieure de sa cooqflc était articulé avec la colonne Uaminifère. Lorsqu'une cause quelconque irrite cette partie, elle se redresse avec rapidité. On sait qu'un ikhénomène analogue s'observe dans ce Htylidium oii la colonne staminale >st égalemen l irritabile. (A. R.)

* LEVERIAN. ois. Espèce du flëûre Couroucou, V. ce mot, et syuonunc de Balbusar. V. Aigle, (d.)

LÉVIATAN.heit.? Bans plusieurs oassages de la Bible et particulièrement dans le livre de Job , il est parlé ll'un Animal amphibie nommé Lé- •iatan. Les uns ont cru reconnaître, Llans la description incomplète de cet Animal, le Crocodile, d'autres la Baleine , quelques-uns une espèce de Serpent. Mais on manque de lionnées positives pour pouvoir déterminer, en histoire naturelle, à quelle ••espèce aujourd'hui connue appa. ûent ce Lévi»lan des livres sacrés, (a. b.)

LEVINA. bot. EH AN. (Adanson.) >iijn. de Prasiurn. y. ce mot. (b.)

LEVISANUS. bot. piian. Cè mot servait à désigner une Plante que ILinné réunit à son Protea. D'un auï*re côté, Schreber l'a substitué à cèelui de Staavia déjà proposé par IThunberg. V. ce mot. (g..n.)

LEVIS1LEX. min. Nom donné par >lde Lamclhcric à la variété de Silex iappc'ée Nectique , à cause de sa grande légèreté. (G. DEL.)

LEVISTICUM. bot. piian. Nom

LEW 555

scientifique et spécifique de la Livêche. V. ce mot. (b.)

LEVRAUT et LEVRETEAU.

Le petit du Lièvre. V. ce mot. (b.)

LEVRETTE, mam. Femelle du Lévrier. (b.)

LEVRETTE, ins. Nom donné par Geoffroy à une espèce de Coléoptère de son genre Becmare ou Rhinomacre , décrit sous le n. 1er , et qu'il est fort difficile de déterminer. (g.)

LEVTUCHE. MAM. Femelle du Levion. (b.)

LEVRIER. Canis Graius. mam.

(Linné.) Race ou plutôt espèce du genre Chien, f. ce mot. (b.)

* LEVRIER A STRIES, ins.

(Geoffroy.) Espèce du genre Lycle.

* LEVRIERS, rois. Les pêcheurs donnent ce nom aux Brochets maies , plus allongés que les femelles, y.

Esoce. (b.)

LEVRON. mam. Tiès-petite variété île Levier, originaire d'Italie.

* LEVYNE. min. (Brewster, Edimb. Journ. T. II, p. 33a). Substance blanche, demi-transparente, d'un éclat vitreux, fragile, ayant pour forme primitive un îhomboïde de 790 a{}.. Le clivage est peu sensible ; la cassure est imparfaitement conchoïdale. Cette substance observée pour la première fois parlleuland, a été

soumise à un examen optique par Brewster qui lui a donné le nom de Lévyne , en l'honneur du jeune minéralogiste Lévy , auquel on doit la première description de ce minéral. Chauffée dans le tube de verre, elle donne beaucoup d'eau , et devient opaque. On la trouve à Dalsnypen , dans une des îles Féroé , dans les cavités d'une Amigdaloïde qui contient aussi de la Stilbite.

(G. DEL

LËWISIE. *Lewisia*. bot. phan.

Pursh {*Flora Ainericœ septentr.*, p.

3G8) a décrit sous le nom de *Lewisia rediviva*, une Plante de la Polyandrie

LE Y

Monogjnic, L., dont il n'n pas fixé les caractères génériques , mais pour lesquels il a renvoyé au volume onzième des Transactions de la Société Linnéenne de Londres. C'est en vain que nous avons recherché ces caractères à la source ci-dessus indiquée; nous sommes donc obligés de donner ici la description complèc de cette Plante. Elle a une racine fusiforroee, rameuse et de couleur de sang.

Ses feuilles sont radicales , linéaires , presque charnues , légèrement obtuses. La hampe ne porte qu'une ou deux fleurs attachées .à un pédicelle

f;éniculé à la base. Le calice est cooré , scarieux ; composé de sept à neuf folioles , étalées , ovales , aiguës , concaves , veinées , les intérieures plus étroites. La corolle est formée de quatorze à dix-huit pétales blancs , lancéolés , étalés , presque du double plus longs que le calice. Les étamines , en nombre égal à celui des pétales, ont leurs filels opposés à ceuxci , et insérés sur eux. L'ovaire est supère , ové , glabre , surmonté d'un style filiforme, plus long que les étamines, et supérieurement bifide. La capsule est oblongue triloculaire ; chaque loge renfermé deux graines lenticulaires , noires et luisantes.

Cette Plante croît sur les bords de la rivière de Clark , dans l'Amérique septentrionale. (g..n.)

* LEYCESTERIE. Leycesterla.

bot. F il an. Nouveau genre de la famille des Rubiacées , et de la Penlandrie Monogynie, L. , établi par Wallich [Flor. Ind. 2, p. 181), et qui a pour caractères : un calice supérieur, à cinq divisions iuégales; une corolle infundibuliforme, renflée etgibbeuse à sa base, ayant son limbe divisé en cinq lobes presque égaux ; les étamines sont saillantes; le stigmale capité. Le fruit est une baie couronnée par le calice, à cinq loges polyspermes. Les graines sont lisses et luisantes. Ce genre , dit Wallich , sert à établi? le passage entre les Rubiacées et les Caprifoliacées.

La seule espèce qui le compose ,

LEY

Leycesteria Jbrmosa, Wall. , /oc. cit., est un charmant Arbuste, originaire des montagnes du Napaul. Ses feuilles sont opposées , ovales , lancéolées, échancrées et subcordiformes à leur base. Les Heurs sont purpurines et disposées en longues grappes, (a. n.)

LEYSERE. Leysera. bot. piian.

Genre de la famille des Synanthérées, Corymbifères fie Jus-sieu, el de la Syngénésie superflue, L., établi par Vaillant, sous la dénomination d' Asie) 'opteras , qu'ont proposée de nouveau Adanson et Gaertner, bien postérieurement à la publication et. à l'admission universelle du Leysera de Linné^ Voici ses caractères essentiels : invocre campanulé , formé d'écaillés nombreuses , régulièrement imbriquées, appliquées , ovales ou oblongues , coriaces , pourvues d'une bordure membraneuse, terminées par un appendice étalé, scarieux et incolore ; réceptacle plane , muni d'une rangée de paillettes situées entre les fleurs du centre et celles delà circonférence. Les fleurs du centre sont nombreuses , régulières, hermaphrodites; leur ovaire est pédicelle, long , grêle , cylindrique, surmonté d'une aigrette composée de dix paillettes dont cinq très- longues , plumeuses au sommet, et cinq plus courtes alternant avec les précédentes. Les fleurs de la circonférence sont femelles et pourvues d'uue corolle à languette oblongue tridentc'e; d'un ovaire long, grêle, cylindrique, surmonté d'une aigrette courte en forme de couronne , divisée presque jusqu'à sa base en segmeus inégaux et irréguliers. Ce genre fait partie de la tribu des Inulées, section des Inulées -Gnaphaliées de Cassini. On doit considérer comme type fondamental, le Leysera *Gnapha/odes*, L., Arbuste indigène du cap de Bonne-Espérance,

et que l'on cultive au Jardin des Plantes de Paris. Linné avait ajouté à son genre *Leysera* comme seconde espèce le *Callicornia* de Burmann; et Cassini y réunit encore le *Gnaphalium leyseroides* de Desfontaines, mais il en

LEZ

■ orina un sous-genre, sous le nom de *Leptophytus*. Néanmoins, on devra oominer cette espèce *Leysera discui- Veal*. *Leptophyte*. Quant au *Leytera paleacea* de Linné et de Gaertner, il fait partie du *Relhania* de l'Héritier, et Necker en avait constitué son genre *Uic/iau.via*. Les espèces de *Leysera* décrites par Thnmieig, le sont avec trop peu de détails pour être adoptées. D'ailleurs, lune d'elles a été érigée en un genre *Marticulier* par De Candolle qui l'a tQiQtaéeSy/tcarpaa.F. cemot. (g..n.)

LÉZARD. *Lacerta heft. saup.*

Le genre ainsi nommé par Linné peut être considéré comme n'existant plus, me partie des Animaux qu'y comrrenait ce naturaliste ayant passé dans l'ordre des Batraciens, et le rési, qui l'urine l'ordre des Sauriens, \yaut été réparti non- seulement dans des genres nouveaux, mais enmre dans des familles fort distinctes et très -caractérisées. Les Lézards, :fels que les comprennent aujourd'hui les erpétologistes, ont pour caractères : une langue mince, extensible, wminée en lieux longs filets ; le pa- iis armé de deux rangs de dents; un collier sous le cou forme par une nngée transversale de larges écailles .^parées de celles du ventre par un espace oii il n'y en a que de petites comme sous la gorge; un corps allongé;

les pieds munis de cinq doigts armés d'ongles non opposables, séparés et i*égaux; une queue cylindrique, sans ète, ni carène.

La fente de l'anus •tt transversale , des plaques garnison! le dessous du corps; une partie ces os du crâne s'avance sur les tempes et sur les orbites, en sorte que le dessus de la tête est muni d'un bou-

i.ier osseux ou couvert de graudes

;ailles; le tympan y est à fleur et membraneux ; la paupière , composée

.une seule pièce orbiculaire et fendue longitudinalement , s'ouvre ou se

ame au moyen d'un petit sphincter, l'es Animaux n'ont ni ailes comme les Ir'ragons, ni goûtécommeles Iguanes; ' i disposition des dents les distingue

TOME IX

LliZ 557

suffisamment des Alnéi vas et des Sauvegardes qui d'ailleurs ont leur queue compiiimée. Les Lézards, compris sous les caractères ci-dessus énoncés, sont encore assez nombreux, et forment avec les Couleuvres les genres de Reptiles dont on trouve le plus d'espèces en Europe el notamment en Fiance. Ce sont des Animaux agiles, élégans dans leurs formes , courageux , inuoeens, et dont les couleurs sont souvent très-brillantes. Ils s'engourdissent durant l'hiver qu'ils passent blottis dans des trous; ils paraissent d'autant plus vifs que la chaleur est plus gran.le, aimant à s'allonger sur la pierre nue à l'ardeur du soleil dont en été ils semblent

savourer les rayons , en tirant comme certains Seipens leur langue qu'ils promènent et agitent autour de leur mâchoire; aussi , dans quelques cantons , les croit-on venimeux et redoute-t-on cette langue que le vulgaire nomme un dard; en d'autres lieux, au contraire, on ne fait pas de mal à ce Reptile, on le nomme l'ami de l'Homme , dans la pensée ou l'on est que lorsque les Serpens cherchent à mordre les habitans de la campagne en s'en approchant traîtreusement , le Léopard les avertit du danger en faisant du bruit, ou se jetant sur l'agresseur pour le combattre. Il n'y a sorte de conte qu'on ne fasse sur cet Animal , qui du reste! doux, s'apprivoise aisément , fuit à la moindre apparence du plus petit danger, mais qui se voyant réduit à la défense , montre autant d'adresse que de résolution. Nous en avons vu plusieurs saisir bravement au museau des Chiens d'arrêt qui les avaient surpris dans quelque pelouse sèche, et ne pas lâcher prise malgré les secousses violentes et les efforts que faisaient ces Chiens pour se délivrer. Tous ont la vie fort dure; il faut leur casser les reins pour les tuer ou leur enfoncer quelque épine dans l'un des naseaux. Ils vivent long- temps sans manger ni boire ; mais ils boivent très-certainement, encore qu'on ait avancé le contraire.

Il peuvent parvenir à un âge fort

LEZ

avariée. Les Moucheron, les Insectes, les petits Mollusques terrestres, des Reptiles moins grands qu'eux, et des œufs des petits Oiseaux qu'ils recherchent en grim pant aux Arbres, l'ormeul leur nourriture habituelle; mais ils veulent une proie vivante.

Ils sont à leur tour dévoies par les Serpens et surtout par les Oiseaux de proie , qui font un grand dégât parmi eux. Ils pa-

raissent doués d'une certaine intelligence et enclins à la curiosité. On les voit souvent suspendre leur fuite pour regarder l'objet qui causa leur effroi , lorsqu'ils ont acquis la certitude que ce n'était pas quelque ennemi dévorant. Nous en avons observe, plusieurs fois humain , pour ainsi dire, les rayons du joui , entendant tomber près d'eux quelque chose, ou voyant une feuille s'agiter, venir reconnaître les objets qui avaient appelé leur attention , et retourner ensuite à leur première place après s'être tranquilisés par une scrupuleuse investigation. On les voit d'autres fois dans l'altitude de l'attention relever leur jolie tête le plus qu'ils peuvent pour dominer un plus grand horizon, et regarder autour d'eux sans trop s'effrayer de la présence de l'Homme; mais l'aspect d'un Chien les fait fuir de très -loin. Ils changent de peau comme les autres. Reptiles. C'est lorsqu'ils sont remis des fatigues que leur cause cette opération qu'ils s'en livrent aux plaisirs de l'amour qui pour eux paraît être une passion très-vive; elle les rend querelleurs , et l'on voit souvent les mâles se battre avec acharnement pour la possession d'une femelle, avec laquelle ils vivent fidèlement après l'avoir conquise; les individus de chaque couple s'écartent peu- l'un de l'autre. L'accouplement est intime; les œufs qui en résultent ont leur coque blanchâtre et membraneuse; ils sont confiés à la chaleur du soleil qui les fait éclore , et grandissent à mesure que le petit Léopard s'y développe. Au moment de la naissance de cet Animal , il s'en trouve qui sont le double de ce qu'ils

LEZ

étaient quand ils furent pondus.

Avant de s'engourdir pour passer l'hiver, ils changent encore une fois de peau. On ne les trouve jamais dans l'eau, dont ils

n'approchent guère, et que même ils semblent craindre, s'y noyant aisément. Leur queue est excessivement fragile; le moindre coup suffit pour la casser, et la détacher même assez près de son insertion. Séparée du corps, elle continue de s'agiter long-temps et de manifester quelque sensibilité, tandis que le Lézard qu'on en a privé fuit, sans paraître trop s'embarrasser de ce qu'il a perdu. ÎS'ous avons vu de ces queues ainsi abattues demeurer tranquilles et comme fatiguées après s'être d'abord fort tourmentées en tout sens; mais quand on les piquait, elles s'agitaient de nouveau. Le Lézard qui a perdu sa queue la reproduit en partie, ou du moins pendant la cicatrisation elle s'allonge et croît. Il arrive quelquefois qu'elle se bifurque; la moindre mutilation suffit pour faire fourcher cette partie dans les petites espèces dont on rencontre fréquemment des individus à deux queues, mais alors l'une des extrémités est toujours plus petite que l'autre et comme implantée. La chair des Lézards passe pour sucoïfrique, ce qui fait qu'on ne la mange point; ce pendant elle est assez bnnue, et nous avons vu, dans une année de disette qui affligea l'Andalousie, de pauvres habilans s'en nourrir presque uniquement et s'en bien trouver. Cuvier ayant réuni aux Lézards les Takydro mesdeDaudin, on doit les répartir en deux sous-genres.

f iakydromes, c'est-à-dire prompts coureurs. Ils ont la queue (:, excessivement longue en proportion du corps, des rangées d'écaillés carrées même sur le dos; leur forme générale est presque ophi'oïde; ils n'ont point de tubercules poreux sous les cuisses, mais on leur trouve deux vésicules aux côtés de l'anus. Uaudin, qui distingua ces Animaux, en nientionna deux espèces, le Takydromc brun à quatre raies, et le Nacré à six

LEZ

fiirs, figurés dans la planche 3g de '1 Histoire des Reptiles , qui fait partie uu Bullon tie Sonnini. Bosc soupçonne l'existence d'une troisième. On l'indique le lieu nalnl d'aucune.

ff Lézards proprement dits, qui Vont point de vésicules à l'pnus, i.iais où règne sous chaque cuisse une unquée de petits grains ou de tuberculales formés d'écaillés rudes au tonner , et munis de pores. Les espèces iiropéennes connues de ce sous-gen-

, qui s'élèvent maintenant à quinze «pièces au moins, avaient été présure toutes confondues sous ie nom tijLacerla e«7//spar Linné , et depuis ifcoatmalisle, Daudia .lepremier, en Ebi ou il la la confusion. Mais les esioes qu'établit cet erpétologiste , cen tranchées quand on en examine l'telque. individu parfaitement caraeirisé , présentent des dégradations

divi luelle.s de l'une à i .mil e qui >5 rendent fort difficiles à reconnaîaa en beaucoup d'occasions. No.is ciirons comme les plus dignes d'arrè-

- l'attention des naturalistes par UCir beauté ou par leurs rapports <f.c l'Homme :

lljie Grand Lézard veut, L ie. , nadr. Ovip.,p. 3t>9, pl. 20, Encyel.

C2pt. Lézard , pl. 6 , f . 3; Lacerta wellala , Daudin ; Lacerta agilis y, mu., Gmcl., Syst. Nat., xiri, T.

p. 1071 ; Seps viridis, Laurent, nnpli., n. m. L i plus belle es-
pèce 1 . genre, assez commune dans le miide la France, en Italie,

eu barbi- 7, en Espagne et généralement dans ut le bassin de la Méditerranée :

uis il est douteux que cet Animal ttiouvc jusqu'au Kamlsclial-ka, car yyant observé avec soin dans pluuurs des contrées où il se plaît, il nus a paru extrêmement sensible froid. En ayant même trouvé usieurs fort beaux individus, au ; uis de janvier, engourdis dans les 1 :>ncs des racines d'Olivier , que 1 us faisons déraciner pour notre làuflage durant le siège de liadajoz, . I Estramadura, tous ceux que nous l -fisàincs exposés à l'air v mouraient, (core que le froid de la nuit n'ait

LEZ 53g

jamais fait descendre le thermomètre de Réauinur à uu demi-degré audessus de zéro, tandis que ceux que nous fîmes dégourdir et que nous nourrissions par délassement dans la grange qui nous servait d'asile, se portèrent à merveille, et purent profiter de la libellé que nous leur donnâmes au retour des premiers rayons printanieis. Le Léopard est déjà fort commun dans les Landes aquitaniques , où il se tient dans les bruyères au bord des bois. On en trouve communément des individus d'un pied à quinze pouces de longueur; nous en avons tué qui avaient jusqu'à deux pieds de l'extrémité du museau à celle, de la queue , mais ils sont rares. Nous n'en avons jamais rencontré à queue double. Ce bel Animal un peu trapu , mais cependant d'une forme encore élégante, a son dos noir, et non couleur d'or, d'Ymerairle , d'azur, de rouge, comme le dit Lacépède qui l'a décrit un peu trop poétiquement ; mais ce dos est formé de irès-peliles éc lilles sembla ble-- à ces perles en verroterie dont on forme de petites bourses élégantes; sur ce fond, des ronds en perles d'un vert d'émeraude ou jaunâtre, sont distribués avec profusion, et l'harmonie de ce vert

ci istallin et du noir brillant sur lequel il éclate , n 'a pas besoin d cl re exagérée pour être a. Imitable. La tête est brillamment marbrée de vert et de noir , ainsi que le dessus des cuisses et des pales; la queue est brunâtre, et tout le dessous d'un jaune verdâtre. Le Lézard dont il est question est innocent, mais hardi; il fuit au moindre bruit , non lâchement, s'arrêtant dé distances en distances pour observer la cause de sa crainte , et si on le presse de trop près il se jette sur l'assaillant en faisant entendre un certain soulHement qui rappelle en petit celui que font entendre les Oies en colère.

Comme on en trouvait beaucoup aux environs d'une baronie de Saint- Magne où nous avons passé les premiers temps de notre jeunesse, et que nous en avons été souvent vio-

LEZ

lemment mordus eu leur faisant la petite guerreque l'enfance livre à tout ce qui fuit, nous pouvons affirmer que leur dent ne produit aucuu mauvais effet après la douleur du moment.

Il suffit d'avoir vu un seul grand Lézard vert , pour s'étonner que Linné" ait pu confondre celte espèce avec le Lézard gris.

Le Lézaïid vert , Lacer/a viridis, Duud. T. m, p. 54; Lacerta agilis , ■y, L., Gmel., lac. cit.; Seps varius , Laurent. Ampli., n. 110, tab. 5, f. 2. Plus petit que le précédent d'un tiers environ, plus svelle; le fond de ses parties supérieures est d'un beau vert , et les taches ou les bigarrures en sont uoircs, ce qui est le contraire de l'espèce précédente. Le dessous est également d'un jaune verdâlre , mais plus brillant. Il suffit d'avoir vu cet Animal pour ne pas le regarder comme une variété du Lacerta ocellata.

Il se trouve aux mêmes lieux, où nous en avons observé quelques individus dont le dessous était bleuâtre.

Cette espèce est l'une des deux que nous avons trouvées le plus communément aux environs de Fontainebleau , dans les lieux découverts à la base des collines de grès. L'autre espèce que nous y avons observée est en dessus d'un vert tirant sur le bleu si répandu sur la robe de beaucoup de Sauriens du Nouveau-Monde; c'est le *Lacerta Brongnartii* de Daudin; en le comparant au Lézard que Latreille décrivit sous le nom de Verdelet. *Lacerta viridula*, comme un Animal de l'histoire de Pavana , nous avons peine à croire qu'il n'y ait pas eu quelque erreur dans l'étiquette du bocal qui contenait l'individu décrit par notre savant confrère, et nous regardons ces deux Animaux comme identiques.

Le Lézard des souches, *Lacerta stirpium*, Daud., pl. 35, fig. a, fort commun au bois de Boulogne, dans . les environs de Paris ; ce Lézard plus petit que les précédens , plus grand que le gris , de la couleur du dernier sur le dos , sur les flancs et en dessous,. long de six à huit pouces,

fi

LEZ

et très-agile, semble être un vérita-fl

ble hybride.

Le LÉZARD GUIZ DES MURAILLES J

Lacerta agilis, et, L., Gmel., /oc cii.jk p. 1070 , Lac. , Quadr. Ov. , p. 298 En c y cl. Rept. Lézard, pl. 6, fig. 2' Répandu dans toute l'Europe , mai:

surtout dans le midi de la France ce petit Animal s'y fait remarquer par sa vivacité ; il est d'ailleurs près que domestique , vivant dans le :

murs de toutes nos habitations. Ces particulièrement contre ceux de jardins où l'on appuie des espaliers et dont les moellons offrent des trou qui lui peuvent servir de refuge qu'il semble se plaire ; il y vieil guetter les Insectes destructeurs de fruits , et nous l'y avons surpris in sinuant sa petite langue dans le blessures faites aux raisins par I Diptère qu'il venait de saisir. Lei multitude dans les pays de vignoble où Iles propriétés sont encintes c 111 pierres sèches et sur les coteaux pie f reux est incroyable. Nous en avoi 1 observé plusieurs variétés très retira JI quables , qui mieux examinées s< iS raient peut-être autant d'espèces. I* première, la plus belle, mince, pl agile , sans aucune tache , d'un br cannelle clair avec le dessous bla châtre; la seconde plus grande av deux lignes longitudinales d'un bu noir sur le dos, et les flancs, va ri de verdâtre et de noir; la troisièi avec trois ligues longitudinal noires, dont celle du milieu est plus étroite; la quatrième avec lignes et de grosses taches noires d persées , entrecoupées, et le desso j' couleur d'acier, beaucoup plus gri l se d'ailleurs et moins leste; la ci quièine enfin avec des lignes et grosses taches noires, et le dessc du corps lavé d'une teinte rougeâ souvent très- vive et piquetée de ne Nous. avons perdu un travail I en Espagne sur ces Reptiles, où ni avons déciit et figuré avec le p grand soin les Lézards que notre jour nous permit d'y observer. N(\ ' y avons retrouvé le Lacerta nun lata de Daudin , élécouvert par B

ti

LHE

m environs de la Corogne , et nous îDUVons répondre qu'il est certaine-

eut une espèce bien distincte, eninrc que Cuvier ne le regarde que mmme une variété.

'Le Tiliguèra de Sarraigne qu'on a apporté au genre Lézard , paraît cire • Cuvier une espèce douteuse; ce cest peut-èlreque le Lacerta viridis.

ee L. du/netoram de Surinam, Bos- 'ianaàe. Saint-Domingue, Teyuu du aaraguay , sont les espèces américaiees constatées de ce genre.

Les Améivas , qui ont été confonnuus par quelques-uns avec les A*ninaux dont il vient d'être question , centrent comme sous-genre parmi les lupinambis. r. ce mot.

On a étendu le nom de Lézard à ces Reptiles qui n'en sont pas, et uême à un Mammifère : ainsi l'on a pppelé Lézard Écaillé, le Pangolin ; Lézard DE mer , le Callyonyme ■>iyre , un Esoce et un Saumon; Léami» d'eau, les Batraciens du genre Triton; Lézard Leguan, les lguaiees, et un variété de Galéote appelée Kemliaant-jès , c'est-à-dire Coq ce bataille. (b.)

LÉZARDELLE. bot. piian. Ce iJOM a été employé par plusieurs lootanistes français pour désigner le Xenre Saururus. V . ce mot. (b.)

* LÉZARDET. rept. saur. Nom Irtonné par Daudin , à une division du ;>'enre Agame ou il plaçait comme espèce unique le Lacerta mannorata , 'j., qu'i forme aujourd'hui le genre Marbré de Cuvier. V. Marbré. Dau- Itlin a aussi donné ce même nom à mne

espèce de Tupinambis. V. ce nnot. On l'applique vulgairement aux oetits Lézards gris. (g.)

LHERZOLITE. MIN. Pyroxène en vochc de Charpentier(Jour. des Min...

.. 5a, p. 3a 1). Le Lièvre a ainsi nommé une Roche composée de Pyroxène laimellaire, grenu ou compacte, observée :çn grandes masses par Charpentier, 'près de l'étang de Lherz , et sur tout 16 terrain qui s'étend depuis la vallée

LIA 5 il

de Vicdessos , jusqu'à celle de la Garonne. Elle forme des assises puissantes dans le sol primordial , et alterne avec le Calcaire primitif.

La Lherzolite compacte a été confondue avec la Serpentine ; elle en diffère en ce qu'elle est plus dure, et ne contient ni Talc ni Feldspath.

(g. DEL.)

LIABON. Liabum. bot. piian.

Sous celte dénomination , Adanson (Familles des Plantes, vol. a, p. i3i) avait constitué un genre de la famille des Synanthérées , qui avait pour type une Plante de la Jamaïque décrite et figurée par P. Browne sous le nom de Solidago. Linné réunit cette Plante à son genre Amellus, et plus lai d , Swartz, dans ses Observa— tiones Botanicæ , adopta cette réunion. Willdenow ignorant sans doute ou n'ayant aucun égard à la dénomination proposée par Adanson , établit son Starkea qui est identique avec le Liabum. Entin le genre Andromac/iia, proposé par Humboldt el Bouplanil

(/-Va///. sEyuin., vol. a, p. io4), est encore le même sous un nouveau nom. U est certain que si on veut ici être sévère dans l'application de la loi de l'antériorité, le nom An Liabum doit être préféré à tous les autres; mais alors comment pourra -t -on cl) a nger, sans occasioner beaucoup de confusion, le nom à'Andromac/ia donné à la plupart des espèces par Kunlh (Now. Gêner, et Spoc. T.

îv, p. 97-io3)? Cete considération nous semble assez puissante pour empêcher de ressusciter un mot bizarre qui désignait un genre très-mal caractérisé et composé de Plantes non congénères. C'est un motif semblable qui a fait préférer le nom de Drepania proposé par Jussieu pour un genre de Chicoracées à celui de Tulpis antérieurement donné par Adanson-. Cassini a une toute autre opinion relativement au nom du genre dont il esl ici question. Il adopte maintenant le Liabum, et il substitue les noms de L. lirotvnei et L. Jussioei à ceux d' ' Andromachia Poiteau et à ' A. Jussievi qu'il avait lui-même

LIA

donnes à ces Plantes. La première est le Starkea umbellata , Willd. P' , pour lus détails génériques et les usages remarquables d'une espèce indigène du Pérou, le mot Andhoma- CHIA. (g..n.)

LIAGOR.E. Liagora. roj/îr. Dichotomaria , LamK. Genre de l'ordre des Tubulariées dans la division des Polypiers flexibles. Caractères : polypierphyloïde , rameux , fistuleux, liohè'niforme , encroûté d'une légère couche de matière crétacée. Beaucoup de naturalistes ont regardé comme des Plantes marines ces êtres que Lamouroux range dans son genre Liagora , et qu'il croit devoir rapporter au; règne animal. Turner, Gmelin , Desfontaines et

Rolli en firent des Fiicus. Mais Gmelin et Esper en avaient déjà fait des Tu biliaires. Les Liagores ont le port, la forme et même la couleur de certains Lichens; elles sont' couvertes d'une légère incrustation de carbonate calcaire ; leur substance intérieure est gélatineuse et assez ferme. Leurs tiges et rameaux sont cylindroïdes dans l'état de vie ou lorsqu'on les a mis tremper dans l'eau ; ils se resserrent, s'aplatissent et se plissent de diverses manières par la dessiccation. Lamouroux attribue à toutes les Liagores une tige fistuleuse. Nous ne savons si ce caractère existe dans les espèces que nous n'avons point examinées; mais nous l'avons vainement cherché sur les Liagora fersiculor et articillata que nous avons étudiés; celles-ci ont leur tige pleine. Nous avons soumis ces espèces à différents essais pour reconnaître leur organisation .

mises dans l'Acide nitrique très affaibli, leur croûte calcaire ne tarde pas à être enlevée avec une effervescence assez vive ; il reste un axe gélatineux assez solide , ayant tout l'aspect de certaines Plantes marines décolorées et macérées dans l'eau de la mer, après qu'elles ont été détachées depuis quelque temps.

En examinant au microscope des fragments de Liagores dépouillées de

LIA

leur incrustation crétacée , on aperçoit à la surface et spécialement aux extrémités des rameaux , des espèces de bouquets branchus, infiniment petits , implantés dans la substance gélatineuse de l'axe; ils ont beaucoup de ressemblance avec ce que l'on remarque à la surface des grandes Corallinées dépouillées aussi de leur matière crétacée par les Acides , mais ils sont bien moins

distincts- Mises sur les charbons allumés , les Liago re? , dépouillées ou non de leur incrustation , ne donnent en brûlant aucune odeur animale. On n'aperçoit sur leur surface aucune trace de pores; leur couleur varie : elle est blanche, rougeâtre, jaune ou verte ; elles vivent dans les mers des climats chauds. Lamouroux a rapporté les Liagores aux Tubulariées II nous semble qu'elles auraient plus de rap-

Sorts avec les Coralliées, si toutefois elles appartiennent véritablement au règne animal. Ce genre renferme les Liagora versicolor , ceianoides , polyischioides , alirantiaca , farinosa , albicans , distenla, aniculala , toutes originaires des mers des pays chauds de la zone tempérée ou des tropiques.

Où n'en trouve aucune espèce au-dessus du quarantième degré nord

Agardh comprend ce genre dans son *Sys/ema silgarum* , et le place dans l'ordre des Floridées. (E.D..L.)

LIAIS (pierre de), min. On donne ce nom , dans l'art de la bâtisse, à une Pierre calcaire à grain fin , à cassure terreuse, formant dans les terrains tertiaires des environs de Paris , des bancs de sept à quinze pouces d'épaisseur : elle est recherchée comme très-propre à être employée pour les rampes, les chapiteaux , les colonnes , les balustrades, etc. Elle est facile à tailler et assez tenace pour conserver les moulures, (g. del.)

LIANE: bot. Ce nom vulgaire , employé dans toutes les colonies françaises par les premiers flibustiers et passe dans la langue française, désigne tout Végétal sarmenteux dont les rameaux débiles choisissant d'au-

LIA

Les Végétaux pour support, grimpent le long des troncs d'Arbres, s'enroulent dans leurs rameaux et finissent quelquefois par les étouffer sous une verdure plus épaisse encore que la leur. Quelques-unes se serrent au tour comme notre Lierre; d'autres ont moins d'élégance, comme nos Clématites et nos Liserons des haies; les autres enfin sont accrochantes, comme nos Ronces. Ces Ronces, ces Liserons, ces Clématites, ces Lierres, notre Biione et notre Tamnus seraient des Lianes aux Antilles, à la Réunion et dans l'île de Mascareignes.

Mais aucune des lianes qui dans nos unies ou dans nos huissiers remplissent un tel rôle, n'égale en force ou en étendue les Lianes des pays chauds.

Vous en avez vu couvrir de près et de loin, des parties assez considérables de certaines forêts, et finir par ces confondre en une seule masse de feuillage. Le nom de Liane vient évidemment de lien, parce que les rameaux des Lianes lient et retiennent les objets qu'elles saisissent. Beaucoup de Plantes non-seulement de genres divers, mais encore de familles et de classes différentes sont des Lianes. Il en existe parmi les Herbes et les Arbustes; des Fougères (même rampent en Lianes. Les Glumifères sont les seuls Végétaux qui n'ont jamais les formes, (parmi les Lianes les plus communes et dont les noms sont presque consacrés, nous citerons les :

Liane à l'Ail, le *Bignonia alliacea*, L., aux Antilles.

* Liane amère, *Valeriana candicans* à Cayenne.

* Liane à l'Ane, *Omphalea diandra* à la Guiane.

* Liane d'Asie jaune, le *Tetrappteris inœqualis* de Cavauilles , selon SSurian.

* Liane Avancaré, une espèce du Jgenre *P/iasu/us*.

' Liane a barrique , le *Uvinia oc- Vandra* à Saint-Domingue;
Y Ecasta- *Ipiliyllum Brownii* à la Martinique.

Liane a Batate, le *Convolvulus I Bal a/as*.

LIA 343

Liane a Bauduit , le *Convolvulus brasiliensis*, employé comme purgatif dans toutes les Anlilles par les anciens flihustieis-

Liane blanche, le *Rivinia lœvis* à la .Martinique ; un *Bignonia** Saint- Domingue.

Liane de Boeuf , V *Acacia scan- <fc/is ii* Saint-Thomas.

Liane Bondieu , YJbrus *precatorius* , L .

* Liane a bouton, un *Ditranta* , ausM nommé Castor et Ronda par les anciens na'urels de Saint-Domingue.

Li \nk BRULANTE , une Aroïde qui paraît appartenir au genre *D/aco/itiurn*, et qui contient un laitâcre à Saint-Domingue. A la flMartinique , c'est le *Tragia volubilis*.

Liane brûlée , le (*iouania dorningensis* a u x A n t i 1 1 es .

Liane a Cabiut, un *Tabernœmontana* à Saint-Domingue , un Eupatoire grimpant à Mascareignc.

Liane a Cacone, le *Passi/lora maliformis* , selon Turpin, ctleZ-
Joliclios urens , suivant Nicolson.

Liane a caleçon, les Bauhinies , le Murucuja , l'Aristolochie bilobée , et la plupart des Passiflores dont les feuilles ont deux plus grands lobes.

Liane carrée, le *Eaullinia pinnata* à la Guiane; un *Serjania* à Saint-Domingue.

* Li ANE a ceble , le *Rclraea volubilis* à Cayenne.

Liane de Chat ou Grieee de Chat , le *Bignonia Ungitis* Cad à Saint-Domingue et à la Guiane.

* Liane A Chiques, le *Tournefortia nitida* à Saint-Domingue.

Liane a Citron. Adanson appelle ainsi une Plante grimpante du Sénégal nommée Tobl ou Toll par les naturels et dont le fruit ressemble au Citron par sa saveur acide.

Liane a Cochon. On ignore quelle Plante des Antilles Nicolson désigne ainsi. A Mascareigne et à l'Ilede-France nous avons entendu nommer ainsi par les nègres diverses espèces ou variétés de *Dioscorua* et un *Cissanipclos* sauvage.

Liane en coeur , le *Cissampelos*

LIA

Partira à Saint-Domingue ; les grandes espèces de Liserons qui couvrent les forêts à Mascareigne et surtout à l'Ile-de-France.

Liane contre-poison, la Feuillée grimpante.

Liane Coratl, un *Cissus* aux Antilles, selon Surian; lePo/V/usaà l'Ilede-France où cette belle Liane paraît avoir été portée rie Madagascar.

Liane a cordes , le *Bignonia vinûnea*.

Liane a Couleuvre , la Feuillée grimpante.

Liane coupante. Encore que nulle Gramine'e n'offre le port des Lianes , on a, selon Aublet, donne ce nom à *Y Arundo fureta* , dont le feuillage embarrasse les jambes quand on parcourt les marais de la Guiane, et coupe les bottes comme le ferait un couteau.

Liane acoureux, aussi nommée Timac à Saint-Domingue , paraît être une Térébintbacée encore peu connue.

Liane a Crabes , le *Bignonia œquinoclialis* aux Antilles; le *Lonvolvulus* Pes-Caproe à l'Ile-de-France.

Liane Crape, même chose que Liane à cordes.

Liane croc de Chien, le *Ziziphus*», *iguanus* à Saint-Domingue.

Liane a crochets , l'Ourou paria d'Aublet à la Guiane.

Liane a eau, un Gouet grimpant qui fournit assez d'eau quand on le coupe par tronçons pour désaltérer les chasseurs.

Liane a enivrer le Poisson, le *Robinia Nicou* à la Guiane.

* Liane épineuse, le *Pisonia aculeata* à la Martinique ; le *Paulinia asiatica* à l'Ile-de-France.

Liane franche, le *Securida c volubilis* à la Martinique; le *Dracontium pertusum* sur la Terre -Ferme ; le *Bignonia Kerera* d'Aublet à Cayenne ; un *Smilax* à l'Ile-de- France.

Liane a geler ou a glacer , un *Cissampelos* aux Antilles.

* Liane a grand bois ou des grands bois. On ne sait trop quelle

LIA

Plante est désignée sous ce nom aux Antilles. A l'Ile-de-France, c'est un Liseron qui s'élève à une hauteur extraordinaire dans les forêts.

* Liane a grand Cerf, le Pavonia spicata de Cavanilles, selon Surian.

Liane jaune , le Bignonia viminea cl Vlpomœa tuberosa aux Antilles.

Liane a lait, YOrelia d'Aublet à la Guiane.

Liane laiteuse , divers Apocins et le Cynanckum hirsutum aux Antilles.

Liane mauole , Y Echues bijlora.

* Liane a malingre , le Convolvulus umbellatus.

Liane a médecine , même chose que Liane à Bauduit.

* Liane Mibibal , le Banisteria convolvulifolia.

Liane Mibipi , diverses Bignonées.

Liane mince, le Rajania scandens Liane a Minguet, le Cissus sicyoides, selon Turpin, à Saint-Domingue.

* Liane malabare, une variété de JJioscorea à l'Ile-de-France.

Liane Ouarit, même chose que Liane à Minguet.

Liane Palétuvier, YEchites biflora à Cayenne.

Liane "a panier, le *Bignonia œquinotialis* à Cayenne et plusieurs autres espèces du même genre.

Liane Papaye, *Y Ompluilea diandra* aux Antilles.

Liane de Paque, *Je Securidaca volubilis* à la Martinique.

* Liane de la Passion, diverses Passionnaires, particulièrement celles qui ont les plus grandes fleurs.

Liane a Patates ou Liane a.

Raves , l'Iguame selon Surian.

Liane percée , le *Dracontium perlusum*.

Liane a Pepsil , le *Serjania iriternata* à Saint-Domingue, et le *Kolreulera tripaylla* à la Martinique.

Liane a pisser, un *Riuinia* aux Antilles , selon Surian ; un *Smilax* à l'Ile-de-France.

Liane purgative, même chose que Liane à Bauduit.

Liane quinze jours , le *Cissanipelos Carapeba*'d la Martinique.

LIA

Liane a raisins, un *Coccoloba* à Saint-Domingue, et les *Jiivinia* à la Martinique.

* Liane a Râpe., le *Bignonia echinata* à Cayenne.

Liane Â Réglisse , *Y Abrus precatio/ius*.

Liane rouge. Ce nom est appliqué indifféremment au *Bignonia alliacea*, au *Ziziphus volubilis* et au *Tetracera inspera*.

* Liane rude ou de Saint-Jean, 1 le *Pelroea volubilis*.

Liane a sang. On n'a pas encore ■ reconnu l'espèce désignée par JNicolison .sous ce nom. On soupçonne, que (c'est un Millepertuis.

Liane a savon, le *Momordica loperculata* selon Turpin, le *Gouania tdomingensis* selon Poileau , un *Banisiteria* suivant Pou-pée-Desporles.

Liane a savonnette, le *J'eullea tscande/is*.

Liane a scie, le *Paullinia curassamicak* Saint-Domingue.

Liane a Serpent r diverses *Aristtoloehcs*, particulièrement Y *Anguicii* da des botanistes.

* Liane de sirop , le *Columnnea i scande ns*.

Liane tocoyenne, le *Bignonia (.œquinoctialis* à la Guiane.

Liane a Tonnelles, les diverses (espèces de *Quamoclit* aux Antilles, tel d'*Ipomées* aux îles de France et de .Mascareigne.

* Liane a Tulipes , à l'Ile-delFrance la seule espèce de *Passiflore* (qui croisse naturellement à la lisière tues forêts.

Liane a Vers , le *Cactus t/iangullaris* selon Nicolson

* Liane vulnérable, même chose ique Liane d'Asie jaune. (b.)

LIARD. EOT. piian. L'un des inoms vulgaires du *Peuplier* chez les (■pépiniéristes. (b.)

, *LIAS. géol. Les terrains oolithiques, si abondans dans tout le nordiiouesl de l'Europe et dont notamment '«les montagnes du

Jura sont Ibrmées , i reposent principalement en Anglei terre
comme en France sur une série

LIA 545

puissante de couches nombreuses et alternantes de Calcaire marneux, généralement gris ou bleuâtre et d'Argile schisteuse de couleur également foncée. C'està l'ensemble de ces couches remarquables par le grand nombre et la variété des corps organisés fossiles qu'elles renferment , que les ' géologues anglais ont les premiers donné le nom particulier de Lias qu'ils prononcent comme si nous écrivions Layasse. Cette expression courte, facile à écrire et à lire dans toutes les langues, insignifiante par elle-même et que pour cela seul il était très-bon de conserver , est heureusement adoptée aujourd'hui par la plupart des géologues du continent pour désigner les dépôts sédimenteux qui leur paraissent , par leur position relative et leurs' Fossiles , être semblables à ceux primitivement bien observés et bien décrits en Angleterre comme y constituant le premier membre de la grande formation oolithique {Oolite formation). Ce sont donc les descriptions spéciales du Lias de l'Angleterre qui doivent nous servir de terme de comparaison et fournir le type de ce que les uns appelleront une formation particulière indépendante , tandis que d'autres y verront , soit ell'ecli veinent le commencement des terrains oolithiques , soit la terminaison des formations qui ont précédé j question qui paraît être indifférente en elle-même, mais qui tient cependant aux diverses manières d'envisager les principes fondamentaux de la science géologique; question qui au surplus est étrangère au sujet qui nous occupe. {V.

Terrain.) Notre but , pour le moment , doit être de bien caractériser ce que les Anglais ont appelé Lias, afin qu'il soit facile de

rapporter les portions de l'enveloppe de la terre que Pon peut observer partout ailleurs qu'en Angleterre et spécialement en France à la même cause et à la même époque de fondation.

Le Lias est un dépôt sédimenteux composé de particules également fines et légères, dans lequel l'Argile

346 LIA

domine essentiellement^; les assises intérieures ou les plus anciennes sont même presque uniquement formées de lits argileux puissans que séparent de loin en loin quelques bancs de Calcaire maineux, comparativement très-minces. C'est en s'élevant dans la formation que l'on voit les couches solides du Calcaire devenir plus nombreuses , au point que dans le tiers supérieur environ du dépôt , considéré dans son ensemble, et qui dans quelques carrières ou sur les falaises , présente des coupes de plus de cent pieds de puissance, les couches de Calcaire marneux et celles d'Argiles qui alternent avec lui sont en nombre égal , ayant chacune au plus un pied d'épaisseur, ce qui donne à ces coupes 1 aspect de murs régulièrement rubannés. Effectivement, bien que la couleur dominante de tout le système soit le gris-bleu plus ou moins foncé, la teinte des bancs calcaires est plus pâle que celle des couches d'Argile qui, presque toujours humides, paraissent le plus souvent noires ou d'un violet foncé; ces dernières sont plus rarement jaunâtres , quelquefois elles sont teintées eu couleur de rouille à leur ti anche visible et dans les fissures par des eaux ferrugineuses; la grande quantité de matière charbonneuse disséminée et de Bitume que quelques-unes renferment les rend réellement noires et semblables à de la boue. Le»Calcaire est assez généralement d'un gris plus ou moins bleu; cependant dans plusieurs localités, celui des parties inférieures devient plus épais , et

sa couleur est le blanc un peu cendré. Les Anglais nomment ce Calcaire (White Lias, pour le distinguer du Blue Lias , expression composée qui est plus habituellement employée que celle de Lias seule pour désigner spécialement les couches solides de la formation. Quelle que soit sa couleur, le Calcaire du Lias est généralement compacte, dur , sans cavité , homogène dans ses parties et donnant une cassure conchoïde; quelques variétés peuvent prendre un beau poli

LIA

et être employées comme marbres; quelques-unes sont surtout remarquables par un grand nombre de petites Ammonites .changées en Spath calcaire blanc et par d'autres qui ont conservé une partie noire de leur test dont l'intérieur est rempli de cristaux de Chaux carbonalée. Le Lias blanc peut servir de Pierre lithographique. L'Argile interposée est schisteuse; elle se divise • facilement en feuillets minces parallèlement au plan des couches. Celles-ci sont presque toujours horizontales, et on les voit, notamment en Angleterre, recouvrir, sans perdre cette situation , d'autres couches inclinées ou contournées dépendant de la formation houillère , dont elles ne sont généralement séparées dans ce pays que par les assises également horizontales de Marne gypsifère et muriatifère et de Grès diversementcoloré [lied mari and netv red sa/id sione des Anglais , Grès bigarré des Français , et limiter sund stein des Allemands) ; les Argiles inférieures du Lias se lient même d'une manière si nuancée avec les assises supérieures des Marnes gypsifères en Angleterre et en France , qu'il semble douteux , au premier aspect , que d'autres formations puissantes, telles que le Qiiade/sandstein et le Miischelkalk des Allemands, puissent cire interposées , d'une manière directe ,

quelque part entre les deux systèmes argileux , ainsi que des géologues célèbres le croient encore; et jusqu'à ce qu'une superposition évidente vienne constater le fait, il paraîtra plus prudent d'admettre que ces dernières formations sont , comme paraît le croire maintenant l'illustre géologue des deux mondes, plus contemporaines et équivalentes du) Calcaire oolilique du Lias que d'une origine antérieure à celle de ces deux dépôts. Dans tous les cas, le Lias nous paraît réunir beaucoup des caractères qui aiment un dépôt lent et tranquille de matières apportées de loin et probablement en partie par des courans continentaux affluant dans la mer, et

LIA

cela d'une manière périodiquement régulière , ce qu'indique d'une part l'absence de matériaux grossiers et pesans et l'état de conservation des

Végétaux terrestres et des Animaux marins, et d'autre part l'alternance de ces si multipliées couches calcaires et argileuses de même nature.

! Sous tous ces rapports , les circonstances qui ont présidé à la formation du Lias sont répétées à plusieurs époques très-différentes de l'âge de la terre, et par cette raison il est très-souvent difficile de distinguer autrement que par une étude détaillée des

Fossiles, et mieux encore par la superposition réelle, le Lias proprement dit de systèmes calcareo-argi-

lieux mis— puissans (fui avec le même ; aspect séparent en plusieurs assises le terrain oolilique en le recouvrant [Oxford

c/ay, Argile de Dives, Kim- .meridge c/aj, Argile d'ilonlleur).

On évalue en Angleterre à près de huit cents pieds la puissance totale du Lias. Les Minéraux qu'il contient sont peu nombreux; le Fer à l'état de sulfure y est le plus abondant ; il s'y

présente en rognons ou nodules dont la décomposition donne lieu à la production de cristaux de Gypse sulfaté, l'oxyde de Fer qui colore fortement un grand nombre de sources ; le Plomb et le Zinc sulfurés, la Baryte et la Strontiane sulfatées sont encore des Minéraux du Lias ; quelques restes de corps organisés s'y trouvent changés en Silex. La Silice à l'état de Quartz s'y voit cristallisée dans quelques cavités; mais les Silex en bancs ainsi que le Grès et le Sable y sont rares.

Les Fossiles du Lias sont très-nombreux et très-variés; presque toutes les couches contiennent des fragments plus ou moins gros de tiges de Végétaux dicotylédons et mono- (cotylédons qui sont changés en Lignites et pénétrés de Pyrites. L'examen de quelques feuilles bien conservées a fait reconnaître la présence de Fougères et de Joncs , Plantes terrestres et marécageuses ; les débris d'Animaux ont presque tous appar-

LIA 347

tenu évidemment à des êtres marins de toutes les classes jusqu'aux Reptiles inclusivement. On cite plusieurs Zoophytes, parmi lesquels une espèce de Turbinolia de Lamarck , cinq espèces distinctes d'Encrines du genre l'entacrinite, dont plusieurs ont été conservées entières , une variété d'Oursins (Cidarites) , une immense quantité de Coquilles univalves et bivalves des genres Ammonite, Nautilus, Bélemnite, Hélicine , Trochus , Tornatille, Mébinie, Modiole, Unio ?

Cardite, Aslarlé, Arche, Cucullée, Térébralulc , Spirifer, Gryphée, Smitre , Peigne , l'Iagiostome , Lime , Perne, etc., parmi lesquelles il faut distinguer comme plus caractéristiques 1 Ammonites Bucklandi , la G/yphoea irtcarva, le F /agios/orna gigantea.

Les zoologistes ont reconnu plus de vingt espèces d'Ammonites qui sont , ainsi que les autres Fossiles , plutôt groupées avec ordre qu'accumulées pêle-mêle dans toutes les couches.

Ainsi , nous avons remarqué dans plusieurs localités l'Ammonite de Buckland très-abondante et presque unique dans un certain banc de Calcaire dont la surface était presque toute recouverte d'une manière régulière par des individus de même dimension , disposés sur le plat et à égales distances; d'autres couches renferment plus essentiellement des Entroques, d'autres îles Bélemnites, d'autres des Gryphées , etc. Bien , nous le répétons , que cette espèce de distribution doive seulement être vue en masse pour paraître vraie, il importe de ne pas négliger cette observation , et nous citerons encore , pour lui donner plus d'importance , l'existence d'une couche d'Argile bitumineuse, tenace, dont l'épaisseur est d'environ deux pieds et demi, qui ne contient presque pas de Fossiles caractérisés et qui paraît comme marbrée, parce qu'elle est remplie de corps finement branchus qu'on ne peut mieux comparer qu'à des espèces de Fucus, quoique ces corps ne se distinguent de la masse que par une couleur plus foncée; nous avons vu

cette même couche sur une grande étendue des côtes de l'Angleterre , sur celles opposées de la Normandie, et dernièrement de

Bonnard Ta retrouvée dans les terrains de la Bour-

fogne , qu'il rapporte avec raison au lias.

On cite encore comme ayant été trouvés dans ce système des becs de Sèches , plusieurs espèces de Poissons , des os et des écailles de Tortues; mais les Fossiles les plus remarquables, ceux qui dans ces derniers temps ont le plus mérité de fixer l'attention et qui ont donné lieu aux recherches des plus habiles géologues , ce sont ces gigantesques Sauriens dont l'organisation totalement étrangère à la nature actuelle , a présenté pour le Lias et pour la classe des Reptiles sous l'investigation des savans anglais, un phénomène analogue et non moins étonnant à celui observé antérieurement avec tant d'art et de persévérance dans le Gypse des environs de Paris et pour la classe des Mammifères par notre plus illustre anatomiste. Ces Animaux antiques et maintenant perdus appartenaient à deux genres bien distincts qui ont reçu les noms d'Ichtyosaure (Ic/ifjosaurus) et de Plésiosaure {Flesio-saurus). Les premiers, les Ichtyosaures, avec les caractères des Reptiles Sauriens, présentaient celui d'avoir quatre membres propres à la natation et disposés de la même manière que les deux membres antérieurs des Cétacés ; organisation qui semble annoncer que ces singuliers Animaux ne pouvaient que nager et non marcher à terre , quoique d'un autre côté pourvus de poumons et non de branchies , ils fussent obligés de respirer l'air atmosphérique.

Parmi les pièces les plus remarquables de leur squelette par leur l'orme anormale , les vertèbres de toutes les espèces peuvent toujours être reconnues lorsqu'on les rencontre isolément ; elles ressemblent à des disques étroits dont les deux faces articulaires sont concaves comme celles des vertèbres de Poissons. On a

LIA

trouvé des caractères pour établir dans ce genre quatre espèces qui diffèrent essentiellement les unes des autres par la forme de leurs dents, par la longueur de leur museau et

Par les proportions de leur taille ; espèce la plus commune, VI. commuais, pouvait atteindre plus de vingt pieds, ainsi que 1'. platyodon, caractérisé par ses dents déprimées ; cependant on trouve un assez grand nombre de petits individus qui ont de un à trois pieds seulement, et que l'on ne saurait rapporter qu'avec doute à ces deux espèces gigantesques dont se distingue encore

Eiairfaitement Y I. tenuirostris par la longueur de son museau , la petitesse de ses dents et le grand nombre de ses vertèbres dorsales et caudales.

Nous avons vu pendant le voyage que nous avons fait en Angleterre, 1 année dernière, le plus bel échantillon qui existe de cette espèce : il était encore en la possession de miss Mary Anning qui a recueilli sur les côtes de Lyme Régis presque tous les Fossiles du Lias qui depuis sont devenus célèbres par les travaux auxquels ils ont donné lieu.

Celte jeune Anglaise, par son zèle et son intelligence , a su créer avec ces objets un commerce aussi utile pour la science qu'il est honorable et lucratif pour elle. Elle nous a permis de prendre un dessin que nous nous sommes empressés de communiquer à Conybeare et Cuvier. L'Ichtyosaure à long museau qu'il représente est presque complet, et il avait au moins douze pieds de longueur , des dents fines et très-courtes sur des mâchoires grêles , étroites , longues de plus de deux pieds. {V- Ichtyosaure.)

Les Plésiosaures , moins rapprochés des Poissons, plus semblables en tout aux Reptiles que les Ichtyo-* saures , n'avaient pas les vertèbres discoïdes de ces derniers , mais ils leur ressemblaient par les quatre membres également organisés pour la natation, à la manière de ceux des Cétacés , quoique présentant des différences notables dans le nombre et

LIA

la forme des os de ces parties ; la forme des vertèbres a permis de distinguer dans ce genre cinq, espèces qui ont été nommées Plesius. trigonits , P. pentagunus, P. carnialus, P. cloLielioddrus et P. recetitor , dont toutes , à l'exception de la dernière , appartiennent au Lias. Le plus remarquable, le mieux connu est le P. dolie/iodeirits découvert par Gonybearc, qui en a fait le sujet de l'une des dissertations les plus importantes du dernier numéro des Transactions de la Société géologique de Londres; ce Reptile, qui, comme Vlechtjos. commit nis , paraît avoir atteint plus de vingt pieds de longueur , avait un col plus long que tout le reste du corps, et composé de plus de trente vertèbres, nombre supérieur à celui des vertèbres du col de tous les autres Animaux; ce col flexible, comme l'est le corps des Serpens , se terminait par une tête très-petite qui présentait les caractères essentiels de celle des Lézards & L'organisation singulière de cet Animal avait, pour ainsi dire; été devinée, d'après de simples fragmens, par Couybeaie, avant que la découverte d'un squelette presque entier trouvé encore à Lyme Régis par miss Mary Anning , soit venue confirmer les savantes conjectures du géologue anglais. Ce beau Fossile, a été dit-on, la somme de cent louis par le duc de Buckingham, a été mis par lui , dans le pur intérêt de la science , à la disposition des membres de la Société géologique de Londres,

pour qu'ils puissent le l'aire dessiner et le décrire. Nous avons eu l'occasion d'examiner avec soin cette magnifique pièce qui occupe un espace de plus de douze pieds de long sur six de large , et nous avons pu reconnaître qu'il fallait un aussi habile naturaliste que le secrétaire de la Société, Tb. Webster , pour mettre autant de soin et d'exactitude que l'on en remarque dans l'exécution du dessin qui a été inséré dans les Transactions de la Société géologique , et dont une copie •beaucoup réduite se voit dans les planches de notre Dictionnaire. Le

LIA 549

plus bel échantillon de la même espèce de Plésiosaures, après celui dont nous venons de parler, est celui que*possède maintenant le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris; nous avons presque été témoins de sa découverte l'aile sur la plage de Lyme Régis par des matelots de ce petit port, qui, après l'avoir extrait avec tout le soin possible, sous la surveillance de miss Mary Anning , venaient de le cédera cette dernière. L'un des premiers à l'examiner , nous nous sommes trovvés heureux de pouvoir ne pas laisser échapper une occasion favorable d'être de quelque utU lilé aux savans de notre pays en faisant hommage au Mu>éum d'Anatomie comparée d'une pièce unique qui aurait pu toujours manquera sa belle collection sans le hasard qui nous a fait devancer les amateurs et les savans anglais. A l'exception du col et de la lête qui manquent, le reste cha corps est presque entièrement conservé, et cette partie a même sur le Fossile du duc de Btickingham cet avantage , que 'les vertèbres dorsales ne sont pas déplacées. N'ayant pas possédé assez à temps ce dernier individu du Pleiiosaurus dolichodcirus , l'auteur des Recherches sur les Ossemens fossiles n'a pu en insérer la description et le dessin

dans le dernier volume de son ouvrage, mais il vient, par anticipation, de joindre ce dessin au discours préliminaire de la nouvelle édition qu'il prépare. (Discours sur les révolutions de la surface du globe, etc., G. Cuvier, 1815, p. 357, pl. ni.)

Tous les Reptiles dont nous venons de parler se trouvent ensemble soit dans les couches solides, soit dans les couches argileuses du Lias, et quelquefois même les portions d'un même squelette sont enveloppées dans des couches de nature différente; les os qui paraissent avoir appartenu à un même individu sont généralement réunis, au point que la découverte d'une seule vertèbre ou d'une seule phalange autorise à rechercher dans le même lieu les autres parties de l'Animal, parce que les recherches ont

5f>r> LIA.

souvent, comme nous l'avons appris de miss Mary Anning elle-même, être couronnées du succès; les os sont brisés ou plutôt comme-écrasés par le poids des masses supérieures, car ils sont rarement usés ou roulés; si l'on en trouve dans cet état sur les plages, il est plus que probable que, détachés des couches qui les renfermaient, ils ont éprouvé l'action moderne des vagues; cependant beaucoup de ces os sont recouverts par de petites Huîtres et de petites Gryllées qui adhèrent fortement à leur surface, observations qui semblent indiquer que les squelettes déposés entiers sur un fond vaseux n'ont été recouverts que lentement par de nouvelles vases, au milieu de laquelle ils ont pu être écrasés par l'accumulation ou le tassement de dépôts postérieurs. Lynceus que nous avons cité déjà plusieurs fois, est une petite ville du Dorsetshire sur la côte sud de l'Angleterre opposée à celle de la Normandie, entre Caen et Bayeux : les falaises

qui dans ce lieu ont plus de oerlît mètres de hauteur à pic sont piesque entièrement formées ..par les assises riibannées du Lias qui supportent les .couches inférieures de la Craie et du JSable-vert , dont elles ne sont séparées sur quelques .points seulement que -par des Soldes oolithiques ferrugineux que l'on regarde comme la représentation de touê ,1a formation 'Oolilhique calcaire. Ce lieu qui a fourni le type des descriptions du Lias est de-veui célèbre par le grand nombre de [Fossiles, et. surtout d'Ichtyosaures et ;de; Plésiosaures quiy ont été trouvés et ' qui enrioliissent, la plupart des collections de l'Angleterre et de Paris ; tel est l'Ichtyosaure décrit par sir/Lverai'd Home et (iguré avec le plus, grand , luxe par Clift sous le nom de lJr:uleo-Saurits ; il appartient au Musée britannique- La Société géologique de Lombes , le Musée des chirurgiens, les collections de l'Université d'Oxfoi l , celles ae l'Académie de Bristol , les cabinets particuliers de Buckland , Conybeare, Jonhslon , Cumberland , de la Bêche , possèdent

LIA

également un grand nombre de squelettes et d'ossemens détachés qui proviennent de la même localité.

Le Lias se présente sur nos côtes avec les mêmes caractères qu'à Lynie Régis , entre Caen et Bayeux , aux environs de Port-en-Bessiu ; les Fulaises de Dives qui paraissent plutôt appartenir à une époque postérieure (Oxford clay) , ressemblent tellement aussi à celles de Lyme que l'on pourrait facilement les rapporter à la même formation , et que peut-être même dans le premier lieu les deux dépôts argileux se trouvenlréunis et en contact immédiat, les couches inférieures du Calcaire oolithique manquant. Les couebes du Calcaire de Vieux-Pont, celles du pavs plat com-

pris entre Carentan et Valognes représentent parfaitement le Lias des environs de Bristol , et ce que l'on a appelé pendant longtemps en France le Calcaire à Gryphées arquées , le Calcaire de Bourgogne, notamment des environs d'Autun et d'Avalon, fournit un autre exemple authentique du Lias en France. V. Tilukain. (c.p.)

LIATRIDE. *Liatris*. bot. piian.

Genre de la famille des Synauthérées, et de la Syngénésie égale, L., établi par Schreber, et que l'on peut caractériser de la manière suivante :

l'involucre est cylindrique ou plus ou moins renflé, composé d'écaillés foliacées, imbriquées sur plusieurs rangées , appliquées les unes contre les autres par leur base , un peu écartées et quelquefois recourbées dans leur partie supérieure; le réceptacle BST plane , offrant des alvéoles superficielles, mais du reste dépourvu de soies et d'écaillés ; tous les fleurons sont réguliers, hermaphrodites et fertiles ; la corolle est tubuleuse, son limbe est étroit, semi-quadrilobé , régulier; le tube staminal est inclus , terminé à son sommet par cinq dents; le style est implanté sur un disque épigynal annulaire; le style est long, grêle, terminé par deux stigmates très-douces et très-grêles. Le fruit est cylindrique , strié , surmou-

LIA

tée d'une aigrette sessile et plumeuse.

Toutes les espèces de ce genre sont originaires de l'Amérique septentrionale. Les espèces des Plantes herbacées, vivaces , élégantes, à racine souvent renflée et bulbiforme. Leur tige est

dressée, généralement simple, ainsi que de jeunes feuilles qui sont éparpillées. Les fleurs sont constamment purpurines, disposées en épis ou en grappes à l'extrémité de la tige. Les espèces de *Liatris* avaient d'abord été placées dans le genre *Serratula*, dont elles ont eu l'aspect tout le port. Nous décrivons ici l'espèce qui a servi de type à ce genre : la *Liatris squarrosa* / Willd., qui a été jusqu'à présent mal décrite même par II. (Jussieu).

Liatris squarrosa, Willd. Sa racine est bulbeuse et ancrée, à peu près de la grosseur d'une petite noix, la lige est dressée, simple, haute en vrac ou un pied et demi, striée longitudinalement et pubescente; les feuilles sont alternes, linéaires, lancéolées, un peu ondulées, pubescentes en dessous et rugueuses au toucher, et offrant une seule nervure longitudinale; les capitules sont pédonculés, solitaires

l'aisselle des feuilles supérieures et formant par leur réunion (6 à 8) une sorte d'épi ou de grappe terminale; l'involucre est ovoïde, composé d'épaves foliacées, imbriquées, linéaires, lancéolées, aiguës, recourbées dans leur moitié supérieure, striées longitudinalement et couvertes de poils rudes; le réceptacle est un peu convexe et très-nu; les étamines sont incluses dans les lobes, plus longues que l'involucre; tous ceux (le plus nombreux) sont fortement recourbés en dehors, caractère qui n'a pu être noté; ceux du centre sont moins nombreux, sont dressés; les divisions du limbe sont linéaires et étroites, velues sur leur face interne « excepté à leur sommet; le tube corollaire est inclus, terminé à son sommet par cinq dents obtuses, et à sa base par dix dents plus courtes; le calice est surmonté d'un disque éperonné saillant, du milieu duquel s'élève un style grêle, terminé par deux

LIB 55i

stigmates linéaires, très-longs et velus. Le fruit est cylindrique, un peu renflé vers son sommet, marqué de stries longitudinales, velu et terminé par une aigrette plumeuse et sessile, un peu plus longue que le tube de la corolle. (a. b..)

* LIATRIDÉES. Liatrideæ. bot.

riiAN. Le professeur Richard, dans la classification du Jardin Médical de Paris, avait proposé ce nom pour un groupe qu'il établissait parmi les Synanthliérées, et qui se composait des genres Tarchonanthus, Vcnwnia et Lialris. Mais le même botaniste a plus tard abandonné cette classification.

(a. il.) ;

LĪAVERD. HOT. i'han. L'un des noms vulgaires de l'Iris Pseudo-Acorus, L. (b.)

LIBADION. bot. riiAN. Syn. de petite Centaurée. V. EuythrÉE. (b.)

LIBANC ou LLVANE. ois. Nom!

vulgaire ou Pélican. ce mot.

(un..z.)

LIBAN IONuuLIBYCE.ikit.piian.

%fai de Buglosse. j/^ . ce mot, (b.)

L I B A N O T I D E. Ubanotis. bot.

piian. Le mot de Ubanotis était cm-' ployé par Tabernxmontanus et par d'autres vieux botanistes pour désigner une Plante que

Linné réunit A Son genre M tharnanta. Plusieurs auteurs modernes ont voulu restituer à ce défmrçr genre le nom primitif de Ubanotis. Haller, Crantz , Scopoli et Laniaick ont nomme ainsi lé type du geurrf , c'est-à- dire \A t/tamanla cretensis. V. Athamaxtiie. (g..n.)

LfBAS. bot.' tuan. (Tl|évcnot.) Syn.' de l'ht.ùm Ilibes , L., dans quelques pallies de l'Olient. V. RILEUM.

* LIBELLA, pois. (Gaza.) Syn. de Squalus Zigxnq. P~. Squale, (b.)

LIBELLES ou ODONATES. INS.

Nom donné par Fabricius à l'une des trois familles d'Iusectes de l'ordre îles INévroptères dont il a fait une classe. Lcicharting , Link et quel-

3 ues autres auteurs ont donné le nom e Libelloides ou Libclluloïdes à loul

55 2 LIB

l'ordre des Névropières, et Latreille a désigné sous le nom de Libellulines, les Insecles que Fabricius a nommés Odonates. V. ce mot et ceux de Li-

EELLULINES , LIBELLULE et AgIIION.

LIBELLULE. Libellula. ins. Genre de l'ordre des Névroptères , section des Subulicornes , famille des Libellulines , établi par Linné, restreint par Fabricius , Latreille et tous les entomologistes > et renfermant les Insectes qui ont pour caractères : ailes étendues horizontalement dans le repos; tête presque globuleuse, avec les yeux très-grands, contigus ou très- rapprochés ; la division mi-

toiyenne de la lèvre beaucoup plus petite ue les latérales qui se joignent en essus par une suture longitudinale , en fermant exactement la bouche.

Ces Insectes diffèrent des iEshnes par la lèvre qui , dans ce dernier genre , a le lobe intermédiaire plus grand et les deux' autres écartés , armés d'une dent très-forte et d'un appendice ,en forme d'épine. Ils s'éloignent des Agrions en ce que ceux-ci ont les ailes élevées perpendiculairement dans le repos; ces deux genres ont toujours l'abdomen cylindrique , tandis qu'il est déprimé dans les Libellules. Leur tête est grosse; leurs yeux sont grands, contigus postérieurement : ou voit entre eux et les antennes une élévation vésiculeuse et trois petits yeux lisses, peu appareus, disposés autour de cette partie élevée; les ailes sont horizontales et étendues; l'abdomen est ordinairement long, déprimé et ayant trois faces comme une épée. Les larves et les.

nymphes ont cinq appendices réunis en forme de queue pointue li l'extrémité postérieure du corps qui est court et déprimé. La mentonnière est voûtée , en forme de casque , avec les deux serres en forme de volets.

On connaît vulgairement les Libellules sous le nom de Demoiselles ; leur corps est en général orné de couleurs assez agréables, et leurs ailes, vues à certains jours , présentent des reflets de toutes les teintes : plusieurs

LIB

espèces les ont.tnême colorées en partie. Vander Linden (Monographia LibelLuliaarum Europœ, Bruxelles, 1 825) en mentionne qua torze espèces ; la plus commune et celle qui peut servir de type au genre , est :

La Libellule déprimée , JLibell depressa, L. , Villers , Oliv. (Écycl. Méthod.), Panz. (Jau/i. Germ., fasc.

88 , n. 22 , mas) , Latr. ; L. Friedrichdalensis, Miüll. ; la Philinte, Geoff.

(mas); l'Eléonore, ejusd. (foem.); Réaumur (Mém., tab. 55, lig. 1, foem.). Son abdomen est large , déprimé, bleu en dessus dans les mâles, olivâtre dans les femelles, et ayant une tache jaune de chaque côté. Les ailes sont transparentes v avec une grande tache d'un jaune brun à leur base et une (petite tache1 oblongue noire au bout. Les membranes accessoires sont blanches. V., pour les autres espèces, Olivier (Encycl.), Latr., Fabr. et Vander Linden (loc. cit.)

LIBELLOLINES.Z,/ '£e//i/// «œ. ins.

Famille de l'ordre des Névroptères , tribu des Subulicornes , établie par Latreille, et comprenant le grand genre Libellule de Linné. Les caractères de cette famille sont : trois articles aux tarsi, des mandibules et des mâchoires cornées , très-fortes et dentées ; abdomen n'étant point terminé par des filets ou par des soies; oïganes sexuels du mâle situés sur le dessous du second anneau abdominal. Ces Insectes sont, dans leur classe, ce que les Hirondelles sont parmi les Oiseaux. Doués d'une trèsgrande force musculaire dans les ailes , ils ont généralement un vol très-rapide pendant lequel ils saisissent les Insectes dont ils se nourrissent; ils sont très-carnassiers, fondent sur leur victime comme les Oiseaux de

firoie , et la dévorent en planant dans es airs. Les formes des Libellulines sont svelles; elles sont ornées de couleurs variées et agréables, et le lissu de leurs ailes ressemble à une gaze éclatante.

Les mœurs des Libellules ont été observées par Degéer, Réaumur , Geoffroy et autres auteurs.

LIB

Il faut que les auteurs ont adopté le genre libellule tel que l'a établi Linné , les caractères qu'ils donnent sur leurs libellules conviennent aussi bien au genre libellule proprement dit qu'aux ailées genres établis par Latreille à ses dépens ; c'est pourquoi nous allons donner dans cet article un exposé succinct des observations de ces animaux.

■ Ces Névroptères ont la tête grosse, arrondie , ou en l'orme de triangle sur; elle porte deux grands yeux saillant sur le vertex; les antennes sont insérées sur le front et derrière une élevation vésiculeuse; elles sont composées , dans le plus grand nombre , «cinq à sept articles ou du moins de trois , dont le dernier est composé et aminci en forme de stylet ; le labre est demi-circulaire et voûté; les mandibules sont très-fortes, dentées, et saillantes; les mâchoires sont terminées par une pièce de la même consistance , elles sont dentées, épineuses et ciliées au côté interne, elles portent chacune un palpe d'un seul article , appliqué sur le dos et imitant la forme des Orthoptères ; la lèvre est aride, voûtée, à trois feuillets ou divisions, sans palpes; on voit dans l'intérieur de la bouche une sorte d'épave ou de langue vésiculeuse et longitudinale. Le corselet de ces Insectes est gros et arrondi, il porte quatre ailes grandes , très-réticulées , muqueuses transparentes; très-brûlantes; quelquefois elles sont horizontales dans le repos, d'autres fois elles sont élevées perpendiculairement ; leurs pieds sont courts, et courbés en arc , et leur abdomen est en général très-allongé, en forme d'épée , (c'est-à-dire aplati en dessus et arrondi en dessous , ou en forme de Baquet) nette plus ou moins cylindrique.

drique. Au- I ?ssous du second anneau sont les > vgenes sexuels chez les mâles ; les ! miellés les ont au dernier anneau ; « i-jssi leur accouplement est-il très -rmarquable et très-singulier. C'est i epuis le printemps jusqu'au milieu y 'B l'automne que ces In-sectes se lii, rent à l'amour - on voit alors les mâ-

TO.ME IX

LIB 353

les chercher des femelles avec lesquelles ils puissent s'unir, et l'on i rencontre souvent sur les Plantes ou eu l'air deux Libellules, dont l'une qui est le mâle vole la première, et a 1 extrémité de son corps posé sur le cou de la suivante qui est la femelle. Quand un mâle veut se joindre à une femelle , il vole autour d'elle et tente toujours de se trouver- au-dessus de sa tête; dès qu'il en est assez près , il la saisit avec ses pales et s'y cramponne fortement, il contourne en même temps son corps pour en amener le bout sur le cou de la femelle , cl il l'y attache de manière qu'elle ne puisse plus se détacher de lui, au moyen des pièces qu'il porte au bout du dernier anneau, et que Vander Linden nomme appendices anales. Quand ces Animaux sont ainsi joints, ils vont se poser sur une branche , et quand la femelle, excitée par les préludes dont nous venons de parler , se décide à céder, elle contourne son corps , le porte sous le ventre du mâle et approche l'extrémité de son abdomen où.

sont placés les organes générateurs du deuxième anneau du mâle, et alors la jonction s'opère. Pendant tout le temps que dure l'accouplement, le mâle tient toujours sa femelle par le cou et ils

cherchent, dans cette position , la solitude. Quelquefois il arrive qu'un mâle jaloux vient les troubler et cherche à débusquer celui qui est attaché à la femelle ; alors le couple importuné par des coups de dents de ce mâle , est obligé de quitter la place, et d'aller, sans se séparer, se poser sur une autre branche. Quand il fait très-chaud , l'accouplement est plus long et ils restent bien plus longtemps ensemble que quand l'atmosphère est froide. Ils restent toujours unis plusieurs heures de suite , et quand ils sont dérangés, ils s'accouplent de nouveau quelques minutes après. i

C'est dans l'eau què les femelles vont déposer leurs œufs qu'elles ne gardent pas long-temps après avoir été fécondées; ils sortent lentement de leur corps par l'ouverture où s'est intro-

LÏB

duit l'organe du mâle , et qui est située près de l'anüs; ces œufs sont réunis et forment une espèce de grappe. Les larves et les nymphes vivent dans l'eau jusqu'à ce qu'elles aient

pris tout leur accroissement et qu'elles soient prêtes à se changer. Elles sont assez semblables aux Insectes parfaits, aux ailes près. Les larves, qui ne diffèrent pas beaucoup des nymphes , parviennent à cet état lorsqu'elles sont encore jeunes, et l'on n'aperçoit dans celles-ci que quatre petits corps plats et oblongs au plus ; ce sont les fourreaux des ailes. Leur tête, sur laquelle on ne découvre pas encore les yeux lisses , est remarquable par la forme singulière de la pièce qui remplace la lèvre inférieure, c'est une espèce de masque recouvrant les mandibules , les mâchoires, et presque tout le dessus de la tête ; il est com-

posé d'une pièce principale, triangulaire, tantôt voûtée, tantôt plate, et que Réaumur nomme mentonnière.

Celte pièce s'article, par une charnière , avec un pédicule ou sorte de manche annexé à la tête. Aux angles latéraux et supérieurs de cette pièce principale, sont insérées deux autres pièces transversales, mobiles à leur base , soit en forme de lames assez larges et dentelées , soit sous la figure de crochets ou de serres. Réaumur a donné le nom de volets à ces différentes pièces. C'est au moyen de cet appareil que les larves et les nymphes attrapent leur proie; elles sont très-carnassières et se tiennent continuellement à l'affût; pour ne pas être découvertes , elles se tiennent cachées à moitié dans la boue , et leur corps en est presque toujours sali.

Aperçoivent-elles un Insecte à leur portée , elles déploient leur menton d'une manière très-preste etsaisissent leur proie avec les tenailles de son extrémité postérieure. Les volets varient selon les espèces auxquelles appartiennent les nymphes et les larves ; ils servent à distinguer celles des Libellules de celles des jEshnes.

Outre ce masque, qui recouvre toute la lête des larves et des nymphes ,

LIB

leur bouche présente quatre dents' qui sont analogues aux mandibules et aux mâchoires de l'Insecte parfait; l'intérieur de leur bouche offre, comme dans ceux-ci, un avancement arrondi , presque membraneux, situé sous les dents, qui est le palais, et que Réaumur appelle langue. Leur corps est plus ou moins court , quelquefois large et déprimé, d'autres fois allongé et cylindrique, l'extrémité postérieure de leur abdomen présente tantôt cinq appendices en forme de feuillets , de grandeur inégale, pouvant s'écarter ou se rapprocher, et composant alors une queue pyrami-

dale; tantôt trois lames allongées et velues , ou des espèces de na-
geoirs. Ces Insectes les épanouissent à chaque instant , ouvrent
leur rectum , le remplissent d'eau , puis le ferment, et éjaculent
bientôt après, avec force , une espèce de fusée de cette eau mêlée
de grosses bulles d'air. C'est par ce jeu que ces Animaux favo-
risent leurs mouvemens.

Le tube digestif va en ligne droite depuis la bouche jusqu'à
l'anus , mais il a trois enflemens que Réaumur regarde comme
trois estomacs L'intérieur du rectum présente, suivant Cuvier,
douze rangées longitudinales de petites taches noires, rappro-
chées par paires , semblables aux feuilles ailées des botanistes.
Vues au microscope, chacune de ces taches est un composé de
petits tubes r, coniques ayant la structure des trachées, et d'où
partent de petits rameaux qui vont se rendre dans six jh grands
trons de trachées principales parcourant toute la longueur du
corps. Les nymphes des Libellulines in vivent dans l'eau pendant
dix ou onze It mois; elles changent de peau plusieurs fois pen-
dant cet intervalle. Les nymphes qui sont prêtes à changer j| de
forme sont reconnaissables à la \ figure des fourreaux des ailes
qui se «; détachent l'un de l'autre, et qui, dans quelques espèces,
changent d{ position. C'est depuis le milieu du printemps jus-
qu'au commencement c{c l'automne que leur dernière meta-

It

LIB

Iviorphose a lieu ; elles sortent alors de l'eau , restent quelque
temps à l'air pour se sécher, ensuite elles vont se placer sur une
branche d'Arkrre ou une lige de jonc , où elles se iramonnent
avec leurs pales en se ilaçant toujours la tête en haut.

h|uelques-unes se mélainorphosent ;uelques heures après être sorties de Veau , d'autres restent un jour entier want de commencer. Les inouvemens aar lesquels elles préparent leur ransformation sont intérieurs, et le rremier effet sensible qu'ils produi- ;cnt est de faire fendre le fourreau sur

corselet. C'est par-là que la Libellée fait sortir la létc et les pales , et cour achever de les tirer de l'envcipppc , elle se renverse la tête en bas I. n'est soutenue dans cette attitude une par ses derniers anneaux qui nnt restés eugagés dans leur anémie couverture et forment une escèce de crochet qui empêche l'Insecte éi tomber. Quand l'Insecte est resté •ssez long-temps dans cette posture, ssc retourne , saisit avec les ciochets m ses pales la partie antérieure de >»n fourreau , s'y cramponne et achè-

d'en tirer l'extrémité de sou corps, aans cet état , les ailes sont étroites , caisses , plissées comme une feuille Arbre prête à se développer; ce cesl que deux heures après qu'elles innt assez solides et développées pour me l'Animal puisse s'en servir et voir. C'est alors qu'on voit ce joli Iuocle s'élever dans les airs avec grâce

légèreté, faire ceul tours et démis sans se reposer, et se livrer eentôt après à l'amour.

1 Linné avait formé, comme nous iivons dit. plus haut , le genre Libel- I le avec les Insectes qui composent

famille dont nous traitons ; dans

Méthode de Fabricius , cette falille forme l'ordre des Odouales Libelles), qu'il divise en trois ■ enres. Réaumur avait senti la nex'ssilé de diviser le grand genre ùibellule, et il l'avait partagé en

•ois divisions; Degéer en fait deux "milles : l'une comprend les Libellées et les jEshncs , et l'autre les

LIB 555

Agrions de Fabricius. Latreille n'a rien changé aux coupes établies par Fabricius, et il partage cette famille en trois genres comme l'a fait cet auteur. Vander Linden , médecin à Bruxelles , vient de publier une Monographie des Libellulines d'Europe dans laquelle il suit exactement la classification de Latreille. Nous devons à l'amitié de ce dernier savant , la communication de ce petit ouvrage qui est fort rare à Paris. L'auteur se sert d'une manière secondaire de deux caractères qu'il a découverts dans ces Insectes : 1°. Les mâles des Libellules et des jEshnes ont trois pièces saillantes à l'extrémité de l'abdomen, qui leur servent à saisir les femelles; ces pièces sont au nombre de quatre dans les Agrions. Vander Linden leur donne le nom d'appendices de l'anús {appendice! anales) comme nous l'avons dit plus haut. 2°. Le bord interne des ailes a, dans plusieurs espèces, une membrane mince, quelquefois colorée et qui n'a jamais de nervures; il la nomme membraule accessoire {membranula accessoria).

L'existence et la couleur de cette membraule accessoire lui sert de caractère pour distinguer les espèces.

Il divise en outre les genres en coupes basées sur la forme des yeux et sur la forme et la couleur des ailes. Presque en même temps que l'auteur dont nous venons de parler, Toussaint de Charpenlier (//o/ie enlorn., etc., Wratislavice , 1825) a publié une Monographie des Libellulines d'Europe , dans laquelle il s'est servi aussi des appendices de la queue pour caractériser les espèces;

il a figuré ces appendices dans une planche assez bien gravée. T'. Libellule , iEsiiNE et AcmoN. (g.)

LIBELLE₁ LOIDES. Libelluloides.

jns. Link et Lecharting donnent ce nom aux Insectes de l'ordre des Névroptères. V. ce mot et Libelles.

LIBER ou LIVRET, bot. puan.

C est la partie la plus intérieure de l'écorce. Le Liber, ainsi nommé par-

LIB

ce qu'il se compose de plusieurs feuillets superposes , que l'on a comparés à ceux d'un livre , est placé entre les couches corticales et les couches ligneuses. Ces feuillets ou laines du Liber se composent d'un réseau vasculaire, dont les aréoles allongées sont remplies d'un tissu cellulaire. Il arrive fréquemment que les diverses couches du Liber sont intimement soudées les unes avec les autres, et qu'elles ne peuvent se séparer. Mais on parvient presque constamment à les isoler en faisant macérer le Liber dans l'eau , qui finit par détruire le tissu cellulaire qui unissait ensemble les lames minces qui le composent. Le Liber est la partie vivante de l'écorce , mais on lui a attribué un rôle qu'il ne joue pas dans l'accroissement des tiges.

On a dit que c'était Lui qui chaque année se changeait, en bois, de manière qu'à chaque printemps il s'en l'orme une couche nouvelle, à mesure que la couche de l'année précédente s'endurcit et devient ligneuse. Li plupart des physiologistes s'appuient sur une expérience de Duhamel, qui paraît inexacte , puisqu 'aucun expérimentateur n'a pu , en la répétant , arriver au même résultat.

Duhamel avait dit que, lorsque l'on passait une anse de fil d'argent dans la couche de Liber, et qu'on ramenait les deux bouts sur l'écorce, le fil d'argent finissait, au bout d'un ou deux ans, par se trouver dans le bois, d'où, l'on tirait la conséquence que ce Liber s'était transformé en Aubier. Mais cette observation est inexacte, car toutes les fois que l'on a réellement engagé le fil d'argent dans le Liber, on l'y a toujours retrouvé à quelque époque que l'on en ait fait l'essai. Ce n'est pas le Liber qui forme le bois, ainsi qu'on l'a généralement dit jusqu'à présent. Mais voici comment a lieu ce phénomène. Chaque année au moment où la végétation recommence, il se forme entre la face interne de l'écorce et la face externe du bois un fluide visqueux et organisé que l'on a nommé Cambium; c'est ce fluide qui est en quel-

LIB

que sorte un tissu cellulaire liquide-, qui forme à la fois chaque année une nouvelle couche ligneuse et une nouvelle lame de Liber. Le Liber se renouvelle et se répare. Ainsi lorsqu'on en a enlevé une plaque sur un Arbre en pleine végétation, et que l'on expose la plaie au contact de l'air, on voit suinter des diverses parties mises à nu, le fluide visqueux nommé Cambium qui s'organise petit à petit et finit par remplacer la plaque d'écorce. V. aux mots Accroissement des Végétaux, Cambium, quelques autres détails sur cet objet. (a. h.)

* LIBERTIE. *Liberlia*. bot. phan Deux genres ont été établis sous ce nom, en l'honneur de mademoiselle Libert de Malmédy, femme véritablement savante et modeste, à qui la Flore

H l'On^HCO /ici l'rtlotT'lKln 1 1 rt I «ï rl/î/.nn.

fi

Française est redevable de la décoa verte d'un grand nombre d'espèces intéressantes ou nouvelles. L'un de ces genres a été fondé par Dnmortier (Observa/. Botanicœ, Tournay , 1825), pour quelques espèces d'Heme/vcal- % lis, telles que *H. cœrulea* , *sindrewsii* , *Japunt'ca* , *corda/a* , dont Trattinnick a fait le genre *Hosla* , et Sprengel le genre 1 *unkia*. Le se cond genre est, celui que Lejeune botaniste distingué, auteur de la Flore de Spa , vient de proposer lc' dans le douzième volume des Noua Acla de l'Académie des Curieux de f la nature de Bonn. Ce genre appar- ' tient à la famille des Graminées , e Ll l'auteur que nous venons de citer lu ;t attribue les caractères suivans : fleuri ^ disposées en panieule simple et pen- s- ' chée; épillets ovoïdes acuminés, com .:' posés de huit à dix Heurs écartées r' Iépïcène bivalve , à valves inégales l' glume à deux écailles , l'extérieui t j" ovale lancéolée , terminée par troi:

soies à son sommet, et offrant sui son bord , de chaque côté, une pelili oreillette membraneuse; écaille su J», périeure ovale, obtuse, ciliée; pa ' '> léolesdc laglumelle oblongues et spa M thulées. Le fruit est allongé et pro fondcinent marqué d'un sillon. C genre se compose d'une seule espèce

LIB

libertia ./frducnriensis , Lejeunc, lue.

l.t.} t. 65. Elle croît dnns le.-; inoisrns , aux environs de Spa. Si l'on :iâmine avec soin le caractère de ce Binre et la ligure que Lejeunc a don- :Je de sa Plante, on verra qu'elle a wsolument le port d'un Brome, et n'elle s'en rapproche aussi beauluup par ses caractères. En effet le xnre *Libertia* ne nous semble être ji'unc espèce de Brome , oit par accient l'arête dorsale a avorté, ce qui i

déterminé l'allongement des trois rsrvures principales au-delà du soinieet de la paillette et la formation de obis soies. Il serait important, avant aadopter le nouveau genre , de savoir la Plante a élé de nouveau re trou ice ou si elle n'est qu'une variélé ac- Jden- telle. (a.R.)

'» LIBIBALTE. rois. On ne conaât plus le Poisson désigné sous ce)om dans Aihéuée comme se troulint dans le Bosphore. (b.)

ILIBIDIBI. bot. phan. Un Cœsalr.nia sert , sous ce nom , à tanner le nir dans quelques cantons de la cerre-Ferme en Amérique. (b.)

'* LIBINIA. Libinia. chust. Genre :â l'ordre des Décapodes , établi pat ceach et réuni par Latrille au genre Uaia. Le Crustacé qui sert de type à :! genre est le JUaia lunutata, Latr., lisso (Grust., pag. 4g, lab. i,fig. 4). ". Mata. (g.)

LIBISTICUM. bot . piian. (Fuchs.) \yn. de Livcche. V. ce mot. (b.)

LIBOT. JMOLL. Lamarcka eu bien misou de ne rapporter qu'avec doute • '. Libot d'Adanson(Voyag. a-uSénég., iag. Q7 , pl. 2) au Patella umbetla oe Linné. Il existe des différences noilibles, si l'on compare la description uu Libot à celle de l'espèce que nous menons de citer; l'une est bleue eu dedans , d'un noir grisâtre en dehors, mndis que l'autre est constamment jdsc. Ce qui a pu produire l'erreur, t'est que, dans sa Synonymie, Adan- Jon cite la fig. ai de la pl. 558 de uister , qui est douteuse , et que les JU- leurs rapportent généralement au

Patella umbella. Le Libot d'Adanson est donc une espèce qui n'a point encore été reconnue. (n..n.)

LIBYCE. bot. pn\N. V. Libanjon.

LIBYTHÉE. *Libythea*. ins. Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Diurnes, tribu des Papillonides nacrés, établi par Fabricius aux dépens du grand genre *Papilio* de Linné, et dont les caractères sont : antennes terminées en bouton allongé, presque en forme de massue; palpes supérieurs très-avancés, en forme de bec ; pâtes antérieures très-courtes et repliées en palatine dans les mâles, ces pales semblables aux suivantes et pareillement ambulatoires dans les femelles. Ces Papillems ont les ailes anguleuses, comme dans les Vanesses; ils tiennent beaucoup des Nymphales par leurs ailes inférieures qui sont, comme dans ces derniers, courbées sous l'abdomen pour lui former un canal dans lequel il se loge; ils s'en rapprochent encore par la manière dont leurs chrysalides sont suspendues ; mais tous leurs pieds sont piopres au mouvement dans les femelles, c! leurs palpes supérieurs fort remarquables par leur longueur. La chenille de l'espèce de France (>. *Cellis*), est , après les premières mues, verte avec le dos plus coloré et marqué d'une ligne blanche longitudinale, sur les côtes de laquelle sont de petites taches noires , distribuées par couples sur les anneaux ; chaque côté du ventre a , eu outre , une ligne semblable , surmontée parfois d'une raie incarnale , également longitudinale ; la lèle est jaunâtre; les pâtes antérieures et membraneuses sont noires ; le corps est légèrement velu ; celle chenille a du rapport avec celles des genres *Pieris* et *Salrys* , elle vit sur le Micocoulier commun {*Celtis attstralis*) , et quelquefois sur le Cerisier. Elle est sujette à être piquée par *Y Ic/ineumon compunctor*.

La chrysalide est ovalc-obluse , presque sans éminenecs angulaires , verte avec quelques traits blancs ; elle se suspend perpendiculairement et par

35S LIC

la queue au bord des feuilles. Ce genre renferme huit espèces dont six sont nouvelles et ont été décrites pour la première fois dans l'Encyclopédie Méthodique, par Godard. La plus connue et celle qui vit en France est: LaLiiiYTHÉE du Micocoulier , L, Cellis, God., Latr.yFabr.; Papilio N.

Celtis, Fabr., Esper (paît. 1 , p. 168, tab. 87, cent. 37, lîg. 2 et 5) ; l'Echancré, Engram. (Pap. d'Eur., t.

1, p. 5 1 3, pl. 1, 5e Suppl. , figi 5 af-bis). Les ailes supérieures ont le bord postérieur très-anguleux, avec une échaucrure très-marquée. Leurs deux faces , ainsi que la supérieure des secondes ailes , sont d'un brun foncé avec des taches d'un jaune orangé ou fauve. On voit près de la côte des premières ailes , et tant en dessus qu'en dessous , une tache blanche ; le dessous des secondes est roussâtre , leurs bords sont arrondis.

Elle habile le Tyrol , l'Italie et le midi de la France. (g.)

LICAMA. mam. On ne sait quelle est l'Antilope désignée par ce nom cafte par quelques voyageurs; on a cru y reconnaître le Bubale. (b.)

LICA1NIE. Licania. bot. phan.

Vulgairement Caligni. Ce genre de la Pentandric Monogynie, établi par Aublet(Guian., I, p. 119, t. 45), a été placé dans la famille des Rosacées, tribu des Chrysobalanées. Schreber en a

changé le nom en celui de *LJedychrea*, et cette substitution inutile a été adoptée par plusieurs auteurs.

Voici ses caractères essentiels : calice muni extérieurement de deux petites bractées, et ayant un limbe quinquéfide ; corolle nulle ; cinq élamines opposées aux lobes du calice ou trois seulement par suite d'avortement, selon Richard , insérées sur l'entrée du tube calicinal ; un seul ovaire dans le fond du calice, surmonté d'un style courbé latéral? Le fruit est une drupe en forme d'olive, charnue, contenant un noyau monosperme.

Une seule espèce, *Licania incana*, Aubl. , constitue ce genre. C'est un Arbuste indigène de la Guiane , à

feuilles oblongues, acuminées, blanchâtres en dessous , à petites fleurs disposées en épis terminaux. (q..N.)

LICAPtIA. bot. phan. Un Arbre de la Guiane a été mentionné sous le nom de *Licaria guianensis* par Aublet(Guian., p. 313, t. 121) qui n'en a pas vu les organes de la fructification. Cet Arbre s'élève à plus de vingt mètres; son écorce est ridée et roussâtre; ses feuilles sont alternes , ovales , acuminées, entières , glabres et pétiolées. Le bois est peu compacte, ja unâtre, et exhale une odeur de rose. Lamarck présume que c'est une espèce de Laurier, (g. .M.)

LICATI. bot. phan. Pour *Licaria*.

y. ce mot.

LICCA et LICEA. pois. L'un des noms vulgaires du Lyzan sur la côte de INice. V. Gastérostée. (b.)

LICE. MAM. La Chienne dédiasse qui porte et nourrit des petits (b.)

LICEA. pois. V. Licca.

LICE \. bot. CT\YPT.(C/iamp/g/ions.) Genre formé par Schiadcr, composé de petites Plantes fugaces, que l'on trouve sur le bois mort et les murs des caves. On les caractérise :

fongosités à péridium membraneux fragile; poussière séminale privée de lilamens , s'ouvrant irrégulièrement en sommet. Deux espèces seulement sont décrites dans la Flore des environs de Paris ; mais onze figurent dans les diverses mycologies. Celle qui a servi de type est le Licea circumeissa , Pers., S vu.

169, Sphærocarpus sessilis de Bulliard, Champ., p. 132, t. 417, fig. 5. Cette petite Plante est friable; elle naît sur le bois mort , d'abord arrondie , jaune, puis brune en dehors, jaune doré en dedans et s'ouvrant en boîte à savonnette , caractère qui lui a valu son nom. Elle se trouve vers la fin de l'automne ; 20 Licée des cônes, Liceasrobilina, A\b. et Schwn" 303, I. 6, fig. 3. Péridiums roux puis bruns, serrés les uns contre les autres , arrondis - oblongs ; ils

il;

■ 'ouvrent irrégulièrement. La poussière est jaune sale, quelquefois blanchâtre. La base des péridiums persiste i[près l'éruption des poussières et ressemble à uu petit guêpier. Cette espèce croît à la surface des écailles des rneux cônes de Sapins. Le genre Licea :ist très-voisin des Tubulina clLyco- ;<fa/a; il appartient à l'ordredesClniin- Wguons angiocarpesde l'ersoon, gasrroinyciens de Link. (a. F.)

LICHAÏNOTUS. mam. (Illiger.) îÿn. d'Indri. V. ce mot. (b.)

LICHE. Lic/u'a. rois. Sous-genre die Gaslérostée. V. ce mot. Il ne faut oas le confondre avec Leicbe , Scymnus , qui est un sous-genre de Squates. (b.)

LICHEN, bot. crypt. Genre Linaaéen devenu la nombreuse 'famille- Iles Lichens. F. ce mot. (u.)

*LICHEN-AGARICUS. bot.

RYPT. [Flypoxy Ions .)^\\chc\\\.a donné cce nom à des Plantes qu'il jugeait

île intermédiaires entre les Lichens est les Champignons. De Candolle a

ndopté le Lichen-Agaric , sous le nnom de Sj.hœria. y. ce mot etXYLA-

RRI A. (A. F.)

LICH EN ASÏRUM . bot. crypt.

Hépatiques.) -Michel i et Linné ont naommé Jungermannia (V. ce mot }

e genre que Uillen, dans son Histoire dJes Mousses, avait appelé Lichenastrirum. V. HÉPATIQUES. (a. F.)

" LICHEN ÉES ou LIKENEES. jns.

Ce nom a été donné à quelques chciinilles de Noctuelles (JV. l'iaxini , SSponsa , jSapia, P/omissa, etc.), par- L'ce qu'elles se îiourissent de Lichen. (Celle du JSoctua Sponsa, Phalène Likke-

née rouge de Gcofiioy , porte le nnom de Lichenée du Chêne. P.
Noc- 1TUEI.LE. (g.)

LICHENOIDES. bot. crypt. {Lichens.) Dillen, dans son llisto-
ria jVuscorum , avait placé sous ce nom tous ■les Lichens crusta-
cés ou à expansions îmembraneuscs , planes ou rameuses.

III réunissait ainsi la presque totalisé des genres connus ,
moins les es-

LIC 35 9

pèces fruticulcuscus et filamenteuses.

Micheli a aussi un genre Lichenoides qui comprend les V erru-
cariaet autres genres voisins des modernes. Enfin Hoffmann a
employé le même mot pour les Lichens à expansions lactniées ;
ainsi les Kainalinées desauteurs sont pour lui des Lichenoides.
Son Lichenuides flammeum est le Dufourea flammeum d'Acha-
rius qui rentre dans notre genre Pycnolhelia, lequel fait partie des
Cénomycées. (a. F.)

* LICHÉNOPORÈ. Lichenopora.

polyp. Genre de Polypier proposé par Defrance, dans le Dic-
tionnaire des Sciences Naturelles , pour de petits corps qu'il n'a
connus qu'à l'état fo>sile , et que nous avons découverts à l'état
vivant sur les masses madréporiques de la Méditerranée. Ce petit
genre e.-t suffisamment caractérisé, et nous ne do tions pas qu'il
ne soit adopté par le plus grand nombre des zoologistes. De-
france assigne les caractères suivans à ce genre : Pol\ pier pier-
reux , fixé, orbiculairc, avec ou sans pédicule, poreux à la surface
supérieure où se trouvent des crêtes ou des rangées rayonnantes
de tubes. Ces pelils Polypiers se rencontrent principalement dans

les sables coquillieis de Hauleville et d'Orglande, département de la Manche, ainsi qu'aux environs de Paris, à Parues , à Mouchy-le-Châtel , à Cliauniont, etc. Ils sont petits, orhieulaires , souvent bordés par une marge lisse, relevée et très-mince, ce qui leur donne de la ressemblance avec un petit plat; en dessous, ils sont presque lisses et offrent constamment des traces de leur adhérence ; l'espèce vivante est constamment fixée par son centre, quelquefois par toute la face inférieure; elle est souvent isolée, d'autres fois groupée, de manière cependant que chaque individu puisse se séparer et se distinguer facilement; nous nommerons l'espèce vivante, LICUÉNOPOREDE LAMOUROUX,

Lichenopora Lamourouxii nous la consacrons à la mémoire du savant professeur de Caen , que la mort r,

LIG

trop tôt enlevé aux Sciences Naturelles qu'il a illustrées dans plusieurs de leurs parties les plus difficiles. Cette espèce qui a les plus grands rapports avec celle que DeFrance a nommée Lichénopore crépu , est adhérente par presque toute sa base à l'exception du bord qui se relevant est libre; il est d'un blanc violâtre , surtout au centre où sont placés les pores lunuleux qui sont disposés les uns à côté des autres de manière à former des rayons assez réguliers qui se dirigent vers le centre; l'intervalle des rangées de tubes est criblé de pores ovales ou arrondis. Ce Polypier n'acquiert pas plus de deux lignes de diamètre. Lichénopore crépu, Lichenopora crispa, Def. , Dict. Scienc.

Nat. T. xxvi, pag. 257. Celle-ci ne se trouve qu'à l'état fossile , aussi bien dans les falunières de Valognes que dans celles des environs de Paris, et notamment à Parhes, à Chaumont et à Mou-

chy-le-Cnâlel ; elle a les mêmes dimensions que la précédente; comme elle, elle est marginée, mais les pores s'étendent jusque sur le bord, ce qui n'a pas lieu dans les Lichénopoi es de Lamouieux ; elle est plus aplatie , les tubes forment un plus grand nombre de rayons , ils sont moins prolongés, l'intervalle des crêtes est plus étroit et ne présente point de pores. Les deux autres espèces qui appartiennent à ce genre sont: le Liciiénopork turbiné, *Lic/ienopura luiblnata*, Def. , qui est pédiculé , et le Liciiénopore des craies, *Liichenopora cretacca* , Def'., qui se trouve sur les Oursins de Meudon , et d'autres corps de la craie. Il est dépourvu de tubes. (d..h.)

LICHENS. bot. crypt. Les Lichens sont , après les Champignons , les Plantes les plus communes de la Cryptogamie. On les trouve sur presque toutes les parois ; les troncs d'arbres, les pierres, les vieux bois, la tei re humide , se couvrent de ces parasites qui, se fixant sur le marbre le plus dur et souvent même sur le 1er, y laissent des traces éternelles

d'une existence passagère. Toutes sont terrestres; un seul genre, très-rap- f pi oché des Hépatiques, l'Endocarpon vit quelquefois sur des roches qui se trouvent dans un état continuel d'irrigation. Les feuilles de plusieurs espèces de Plantes vivaces des climats voisins des tropiques se chargent souvent aussi de Lichens qui les rendent très-remarquables. (V". Squamma-

R1ÉES.)

Uien n'est plus varié que la forme de ces singuliers Végétaux; tantôt ce sont des croûtes imperceptibles , des lignes fugaces; tantôt des folioles élégamment disposées, des expansions arborescentes ou des filamens d'une dimension considérable. Les or-

ganes auxquels les botanistes ont donné le nom de fruit , s'out aussi de forme très-diversifiée ; ou en voit de sessiles et de stipités , de linéaires et d'arrondis , de globuleux et d'aplatis. Ils sont simples ou composés , immergés dans leur support ou superficiels, etc. La couleur que le thalle allecte, est fort rarement la couleur verte; le jaunâtre j Je gris cen ciré, le gris paille, sont les nuances les plus communes. La nature a mis plus de luxe dans les couleurs dont elle a embelli les apothécious; plusieurs d'entre eux sont rouges pourpres ; l'orangé , le jaune , le rose les décorent souvent; placés sur un fond assez ordinairement pâle , ils ressortent 'agréablement et donnent quelquefois à ces petites Plantes une véritable élégance.

Les Lichens sont des Plantes polymorphes , avides d'humidité qui foace leur couleur , d'une consistance jamais charnue, sans racines véritables , n'adhérant aux corps que pour y chercher un support , ne tirant leur nourriture que de l'air, pourvues de parties regardées comme fruits (apothécions) "presque toujours sessiles" , toujours arrondies , ne s'ouvrant à aucune époque de la vie de la Plante, ayant unedurée beaucouppluslougue que celle des Champignons et même que celle des Hypoxylons , douées de la propriété de végéter aussitôt que le

LIG

ichermomètie est au-dessus de zéro, et []que l'air est humide, quelle que soit ilî'ailleurs la saison où ces conditions client lieu.

De ces diveis caractères un seul east absolu , c'i'St la présence d'un llhalle; si quelques espèces en sont pprivées , et ce fait est très-rare , on djoit le regarder comme un véritable avortement

ou bien penser que izetorgaue est d'une telle ténuité que iinos yeux ne peuvent le voir.

En considérant la famille des Liccheus dans son ensemble et avec une scrupuleuse attention, on s'assure bientôt qu'elle est sans limites, et que ses genres, et même ses espèces, sont assez difficiles à trancher:

de là l'embarras d'établir une méthode sans anomalies. Il est remarquable que les familles qui semblent être les (plus naturelles), sont aussi celles qui «semblent se fondre davantage avec les familles voisines; il faut excepter de cette règle les grandes tribus phanérogamiques, telles que les Crucifères, les Synanthérées et quelques autres.

Quant aux Cryptogames et aux Agaves, l'échelle n'est point interrompue et les transitions sont ménagées; les Fougères, par exemple, touchent aux Hépatiques par les Polypodes; les Palmiers et les Cycadées par les Fougères en arbre; les Mousses se fondent avec les Jongfermannies par les Hépatiques; les Algues offrent les Nostoches qui sont des (collemas imparfaits, et certaines Corniculaires sont assez voisines des Couleuvres.

Les botanistes français, d'après De Candolle, ont longtemps rejeté de la famille des Lichens la division des Lycopoxylées, connue sous le nom de Lycopoxylons lichénoïdes, qu'Acharius et les botanistes allemands ont toujours regardés comme étant de véritables Lichens, et cette opinion, très répandue aujourd'hui, est devenue la règle; en effet on donne comme caractère essentiel des Lycopoxylons lichénoïdes de laisser échapper une pulpe séminifère qui reste aussi dans

le conceptacle ; quel caractère est plus vague ? Et lois même qu'il serait constant que cette pulpe s'échappe dans toutes les espèces , outre la difficulté de s'en assurer sur des Plantes au*si petites que les Verrucaires et les Opcgraphes , serait-il possible d'adopter une définition qui devrait rigoureusement faire rejeter de la famille des Lichens le genre Sphærophoron , et quelques autres véritables Lichenées dont les apothécies se comportent comme les conceptacles d'une Hypoxylée? Nous regardons cette question comme jugée, et nous croyons inutile de la discuter plus au long.

Ce n'est guère que vers la fin du siècle passé, et plus particulièrement de nos jours , que l'on a commencé à étudier l'organisation des Lichens; voici en peu de mots ce qu'un examen attentif a démontré de plus positif.

Ou reconnaît à la première vue dans un Lichen deux parties distinctes, dont l'une n'est qu'une modification de l'autre , et qui toutes deux paraissent jouer le même rôle dans la reproduction de la Plante. La plus apparente est le thalle ou fronde composé de deux parties nommées corticale et médullaire ; la première est la couche supérieure, la deuxième la couche inférieure. Dans les Lichens crustacés uniformes cette dernière manque; dans les Collema elle est à peine distincte. Ces deux substances constituent à elles seules le thalle que l'on regarde comme le réceptacle universel des Lichens.

Quelques formes qu'affecte le thalle, qu'il soit plane ou redressé, on ne peut jamais le considérer comme une vraie tige, lledwig a vainement essayé de le prouver. Le thalle est une espèce de ré-

ceptacle général des gongyies ou des apolhécions, ayant la forme d'une croûte ou d'une lige sans qu'on puisse raisonnablement les y comparer. Les apothécions sont des réceptacles partiels de gongjes, et paraissent remplir le rôle que les cou» ceplacles remplissent dans les Fuca-

36a LIC

cées. Ces organes varient beaucoup leurs formes , ils sont carpomorphes, mais il est prouvé qUe ce ne sont point des fruits. On les divise en apothécions vrais et en apolhécions secondaires. Les apolhécions vrais sont au nombre de quinze. F~. plus loin le tableau que nous en donnons, et qui fait connaître les princi-

I)aux caractères qui les différencient ; es apolhécions secondaires ou accessoires sont les cyphelles situés à la partie inférieure du thalle des Stictes, V. ce mot; les pulvinules, espèce de ramifications ou de végétations parasites qui se fixent à la surface supérieure du thalle de quelques Gyrophores et du genre Èiio-derme ; les soredies , petits tas de poussière , composés de gongyles nus. Acharius comptait parmi eux les Céphalodes dont nous croyons devoir faire un apolhécion véritable.

Quoique l'organe carpomorphe des Lichens (l'apolhécioü) ne joue pas le rôle que le fruit joue dans les Phanérogames , il est cependant d'une structure plus compliquée que celle du thalle et doit être, suivant nous, considéré comme une ébauche imparfaite d'un réceptacle séminifère.

La partie la plus importante de cet organe est la lame proligère ; nous avons émis une opinion nouvelle à l'égard du rôle qu'elle est destinée à remplir, W ". Lame proligère; elle paraît former le disque dans les Lichens scutellés, et le nucléum dans les espèces

à apothécions globuleux , etc. Vient ensuite le périlhécium qui se présente sous la forme d'une enveloppe crustacée cartilagineuse, diaphane dans les genres *Porina* et *Endocarpon*. Lorsqu'un apothécion est pourvu tout à la fois de nucléum et de périlhécium, il est appelé *Thalamus*. Enfin on désigne par le nom de *Spora* ou *Taeca* les vaisseaux transparens qui se trouvent entre la lame et le noyau ; on ne peut les découvrir qu'à l'aide du microscope ; ces organes ont fourni au docteur Eschweiler, par les différences de formes qu'ils présentent, l'un des caractères distinctifs de ses genres. Il est probable que la reproduction des Lichens s'opère par les gongyles : ce sont des corps globuleux, opaques, épars dans les différentes parties du thalle et du Lichen , surtout dans la partie corticale et la lame prolifère.

On leur a refusé le nom de séminules , parce que ces noms supposent toujours la fécondation sexuelle. Hedwig a cru voir des sexes dans les Lichens ; il nomme *spennatocystidie* les gongyles qui deviennent transparens

On leur a refusé le nom de séminules , parce que ces noms supposent toujours la fécondation sexuelle. Hedwig a cru voir des sexes dans les Lichens ; il nomme *spennatocystidie* les gongyles qui deviennent transparens

On leur a refusé le nom de séminules , parce que ces noms supposent toujours la fécondation sexuelle. Hedwig a cru voir des sexes dans les Lichens ; il nomme *spennatocystidie* les gongyles qui deviennent transparens

On leur a refusé le nom de séminules , parce que ces noms supposent toujours la fécondation sexuelle. Hedwig a cru voir des sexes dans les Lichens ; il nomme *spennatocystidie* les gongyles qui deviennent transparens

On leur a refusé le nom de séminules , parce que ces noms supposent toujours la fécondation sexuelle. Hedwig a cru voir des sexes dans les Lichens ; il nomme *spennatocystidie* les gongyles qui deviennent transparens

nouveaux, tous fort difficiles à retenir. Que deviendra la science si pour connaître une seule famille du Règne Végétal, il faut étudier 1500 pages de petit texte, et se familiariser avec une terminologie barbare? Quoiqu'il ne soit pas dans notre usage de citer des phrases latines, nous croyons ne pouvoir nous dispenser de transcrire la phrase suivante : elle mettra le lecteur à même de porter un jugement aussi certain que si le livre entier lui était connu ; il verra quels sont les dangers qui menacent la langue botanique, si de telles innovations pouvaient être admises.

ce Paleliaria fusco-lutea. Lecidea, Ach., Syn., p. 42. Blastemate acoly- /o verrucoso chlorogonimicio tephrypheeno, facile in massant chlorophœnait fatiscente; cjmatis plano-convexiusculis marginem excludentibus,

LIG

ttX speirematur ubertate varia, nunc iilute fuscescentibus, nunc /iuidis Ûltusque melanophœnis. »

Les anciens n'ont fait connaître ilans leurs écrits que deux ou trois [Lichens. On les trouve parmi les espèces foliacées et filamenteuses. Ce ne l'ut que fort long-temps après la renaissance des lettres que les Bauliin •ît leurs contemporains ont décrit plusieurs espèces qui, devenues aswez nombreuses, ont été séparées een genres et en sous- genres par COilleu et Micheli- Dillen a quatre genres : 1. Trencella (Collema et Wostoc/i des auteurs); 2. Usnea; 3.

iCoralloides (Cenomyce, Sp/iœrophorron, Stereocaulon, etc.); 4. Lichenoiiies (Lecanora, Parmelia, Sticta, (Gy/vphora, etc.). Son genre Lichen appartient aux Hépatiques; ce sont Mes Marchantes. Micheli n'a que des ■ lious-genres au nombre de

trente-huit ; mais ils sont si bien établis que ■a plupart ont servi plus tard à Hoffmann et à Acharius pour la création de leurs genres.

Adanson , Ventenat , et avant lui Hoffmann dont les travaux sont si justement appréciés des naturalistes , (ont formé des genres qui ont été plus ou moins bien reçus des botanistes; il serait intéressant, mais peut-être trop long d'analyser leurs travaux ; nous allons arriver de suite à Acharius, qui est regardé comme le premier de tous les lichenographes. Personne mieux que lui n'a connu l'organisation des Lichens à l'étude desquels il a voué sa vie entière. On lui a reproché d'avoir lui-même détruit les méthodes qu'il avait élevées, mais en examinant ses ouvrages, on s'aperçoit que ce reproche n'est pas entièrement mérité , car son idée primitive m'a changé que dans les détails et point dans le fond. Nous ne parlerons [point du Prodrômus qui ne doit être [considéré que comme un essai. Sa méthode de Lichens a commencé une réputation à laquelle la Lichenographie universelle a mis le sceau. On trouve çà et là quelques mutations qui prouvent la versatilité des opi-

LIG 565

nions de l'auteur ; ce qui d'abord avait été établi sous-genre dans un ouvrage est devenu un genre dans un autre ouvrage du même auteur, et vice versa ; mais rien n'est mieux circonscrit que les genres qu'il a créés. Son système est entièrement basé sur les considérations suivantes : les Lichens ont des apothécies non formés par leur thalle (Idiothalames), formés par le thalle (Homothalames), en partie seulement formés par le thalle (Cœnothalames) ; ils n'ont point d'apothécies (Athalamas), ils sont

homogènes , hétérogènes et hypérogènes (Composés); enfin leurs formes sont différenciées :

de-là les dénominations de Phymatodes , Discoïdes , Céphaloïdes , Scutellés, Pelles, etc.; de-là les classes et les ordres suivants :

Classe Irc. — Idiothalames.

Ordre Ier : Homogènes.

Spiloma (Coniocarpon, D. C. , Flor.

Fr.); Artkonio; Soluina; Gyalecta; Lecidea; Calyciurn (subdivisé plus tard en quatre genres par Acharius) ; Gyrophura ; Opigrapta.

Ordre II : Hétérogènes.

Graptois; Pteridaria; Endocarpon.

Ordre III : Hypérogènes.

Trypetes; Glyphis; Clitodeclon.

Classe II. CoENOETHALAMIDES .

Ordre Ier : Phymatodes.

Porina; Tiliotrema ; Pyrenula; Variolana; Sagedia; Polysporia.

Ordre II : Discoïdes.

Urceolaria; Lecanora; Pannaria; Borreria ; Cetraria ; Sticta ; Peltidea ; Isophoma ; Roccelia; Evernia; Du-Roi.

Ordre m : Céphaloïdes.

Cenomyce ; Bœomyces ; Isidium ; Stereocaulon ; Sphærophoron ; likizo. morp/ia.

Classe HI. — Homothalames.

Ordre 1er : Scutellés.

Alecloria; Ramalina; Colle/uQ.

364 LIC

Ordre n : Peltés.

Cornicularia; Usnea.

Classe IV. — Athalames.

Lepraria.

Le seul reproche important que l'on puisse adresser à cette sayanle me'thode est de détruire les affinités naturelles.

Depuis quelques années , et postérieurement à Acharius , il a paru plusieurs ouvrages sur les Lichens; presque tous sont dus aux Allemands, dont aucun n'a adopté sans modifications le système d'Acharius.

Nous allons parler des principaux.

Fries , dans les Actes de l'Académie de Stockholm, année 1821 , proposa une méthode entièrement basée sur le thalle; cette méthode , qui n'est point irréprochable, groupe cependant assez bien quelques genres , mais en omet un grand nombre de très-impotans. En voici un extrait :

IV. Hyménotialames

1 . Discoïdes : Biatora , Collema , Parmelia , Feltidea. 2. Céphaloïdes:

Bœomyces , Cenomyce , Slereocauluii, Usnea.

Les genres Alecatoria , Borrera , Ceïraria , Cliiodeclon , Cornicularia , Dufourea , Euernia , Glyp/iis , Nep/trorna , Polystroma , Ramalina , Sagedia , Porina , Solurina , Stereocaulon , Sticta , Urceolaria , ont été omis

ou réunis à des genres voisins; il en est d'autres qui n'ont pas de places déterminées dans le système à cause des affinités qu'ils ont avec plusieurs des sections établies. On peut encore reprocher à cet auteur d'avoir fondé ou conservé plusieurs genres qui ne reposent point sur des caractères solides; tels sont le Pulveraria qui doit rentrer dans le genre Lepraria, le Conioloma fondé sur la variété /2 du Spiluma tumidulum , et qui doit rester dans ce dernier genre; le Coniangium , qui doit toujours faire partie des JLecidea , etc. ,1etc.

Le Systema Lichenurn de Eschwei- 1er, publié en i8a4 , établit aussi des groupes ou des cohortes. Ce botaniste a étudié l'organisation des Lichens en observateur habile et exercé; mais on doit lui reprocher d'avoir cherché ses caractères génériques dans la structure interne, ce qui ayaut nécessité l'emploi du microscope , ne permet pas de l'étudier sans le secours de cet instrument. Ce botaniste ne nous semble point aussi heureux que Fries dans le rapprochement de ses genres ; nous lui reprocherons d'avoir fait trop de sections dans le genre Opegrapka, et de s'être éloigné beaucoup trop d'Acharius qui devrait toujours servir de guide.

Cependant nous nous plaisons à reconnaître que ce lichéno-
graphe est un habile anatomiste, et que sa méthode est ingénieuse. Elle est fondée sur le nucléum qui est nu ou couvert d'un périthécium; la couche médullaire est celluleuse ou filamenteuse.

Cohorte I. — Graphidées.

- Thalle crustacé; apothécion oblong ou allongé, sous-immersé, ridé ou canaliculé.

Diorygma, Leiorreuma, Graphis, Opegrapha, Oxistoma, Scaphis, Leca/iactis, Sclerophyton, Pyrochroa.

Cohorte II. — Verrucariées.

Thalle crustacé; apothécion arrondi, globuleux ou patelluliforme, plane-ouvert.

Variolaria, Porina, Thelotrema, Werrucaria, Pyrenula, Pyrenastrum, Ilijimboria, Urceolaria, Lecidca, Biatoria.

Cohorte III. — Trypéthétiacées.

Thalle crustacé; apothécion de forme diverse, immergé, à verrues saillantes par la substance médullaire du thalle.

Arthonia, Porothelium, Itledusula, Ophthalmodendron, Tylophthalma, Astrothelium, Glypkis, Chiodecton, Comioloma.

Cohorte IV. — Parméliacées.

Thalle foliacé dans un grand nombre d'espèces, rarement crustacé ou gélatineux; la couche corticale supérieure dans les espèces crustacées, intimement jointe avec la couche médullaire dans les espèces gélatineuses; l'apothécion seutelliforme; la lame discoïde, marginée par le thalle.

Lecanora , Col/enta , Cornicularia , iParrnclia , Sticta , Hagenia.

Cohorte V. — Dermatocarpes.

Thalle foliacé , membraneux , couvert par une couche corticale supérieure; apothécion sous-arrondi ou immergé , ostiolé ou libre et manquant de marge.

Sulurina , Dermatocarpon , Gyroipkora , Endocarpon , Capitularia , IPellidea.

Cohorte VI. — Plocaiuéés.

Thalle cylindrique en buisson , (.couvert de toutes parts par une couche corticale; apothécion arrondi, ■ immergé dans le thalle ou libre et entouré de marge.

Iridium, Plocaria, Sphaerophoron, iRoccellti , iitereocauloii , Diifourea.

Cohorte VII. — Usnéacéf.s.

Thalle fruticuloux , quelquefois lacinié , comprimé, couvert de toutes parts par une couche corticale; apothécion scutelliforme, à lame discoïde, marginée par le thalle.

— ' Evcvnia , Cetraria , Usnea.

■ L'un des caractères principaux de

LIC 565

cette méthode se tire de la forme et de la disposition des thèques, ainsi que de l'anneau qui les entoure le plus souvent. Ces organes , regardés comme fructifères , ont besoin d'être gros-

sis deux cents fois pour que leurs formes soient mises à découvert ; il faut ramollir le Lichen et lui rendre sa souplesse, faire des coupes et les soumettre au microscope. On conçoit sans peine ce que cette nécessité présente de difficultés ; elle est telle que le découragement doit en être la suite nécessaire. \

Quelque parfait que puisse être un système, il est toujours artificiel et doit présenter plus ou moins d'anomalies; puisqu'il en doit être ainsi, nous pensons que les auteurs systématiques ne sauraient trop se persuader combien il est important de rendre l'étude de la science facile et de la mettre à la portée de tous les esprits. La méthode de Cassini sur les Syuanthérées , celle d'Eschweiler sur les Lichens , peuvent avoir toutes deux le mérite de l'exactitude; il est douteux cependant qu'elles soient suivies et qu'elles fassent aimer la science.

Depuis Eschweiler , Chevallier a donné, dans son Histoire générale des Hypoxylons , une méthode partielle qui comprend les genres qui figurent dans notre groupe des Verrucariées et des Graphidées. Il nous a semblé que cet auteur était obscur et peu d'accord avec lui-même. Nous examinerons son travail à l'article Verrucariées. fr. ce mot et Potio-

rilÉllÉF.S

C'est de [a méthode naturelle seule que l'on doit attendre le perfectionnement des diverses branches de la botanique. Nous avons dirigé tous nos efforts pour grouper convenablement les genres de Lichens en consei vaut la presque totalité des genres d'Àcharius. Le thalle nous a fourni nos divisions les plus importantes ; l'apothécion nous a servi à établir les genres; il ne fallait rejeter aucun de ces moyens, mais les combiner

tous deux. Un organe isolé ne peut , suivant nous , suffire pour établir une méthode durable. En histoire naturelle comme en morale les idées exclusives entravent la marche de l'esprit humain et rendent toutes les théories vicieuses.

La présence du thalle étant le caractère absolu qui fait reconnaître un Lichen, nous n'avons pas cru pouvoir nous dispenser de le choisir pour première base d'une Méthode. Voici les modifications de formes que cet organe est susceptible d'affecter.

Thalle

Adhérent dans toutes ses parties..

Libre, appliqué ou fixé seulement par une de ses parties.

Difforme.

Figuré en folioles soudées.

A surfaces dissemblables

A surfaces semblables.

Membraneux.

Gélatineux.

Coriace.

Lacinié tendant à s'aplatir.

Ramifié tendant à s'aplatir. | Fistuleux.

à s'arrondir.. | Solide.

Filamenteux. . | J[^]g[^]

On voit que les grandes subdivisions données par ce tableau rappellent les sections du genre Lichen de Linné qui partageait les Lichens en crustacés , foliacés , coriaces , ombiliqués , ramifiés , filamenteux , tirant ainsi du thalle la principale consi-

dération sur laquelle ses sous-genres étaient fondés.

La seconde base de notre Méthode est fournie par l'apothécion dont les formes extérieures sont très-variées.

Nous avons adopté pour leurs différens noms, les noms créés par Acharius.

Nus (Glomerula).

Stipité.

Renfermés dans un I apothécion.

GongyiiiEs;

Globuleux {Mycina, N.}.

Scyphatiforme {Calycia}.

Linéaire {Lirella}.

Hémisphérique (Tubercule)-

Discoïde.

Sessile. /

Sphérique.

lellula).

A bords libres

(Scu/ella).

Cilié [Orbilla). Noncilié^e/ta).

Caché dans le thalle (T/talamia).

Toujours fermé ((cphalodia).

Se déchirant

Marginé.

Immarginé.

Superficiel.

avec l'âge (Cistula).

Cu pulé (Ci/pula).

Turbiné (Turbinaria).

A plis concentriques (Gyroma).

En pales cion ,

combinant les formes princi- huit groupes qui s'enchaînent.
Ce du thalle et celles de l'apothé- sont là les principaux types de
la fait est possible d'établir dix- mille , les grands genres , s'il est
per-

imis d'adopter cette manière de s'ex- [primer. En les disposant
en cercle on i rapproche ainsi les Boéomycées des (Cénomycées.

Les points de contact qui se trouvent entre les Lichens et les
autres ffamilles cryptogamiques , ^îous ont cconduit aux divi-

sions suivantes.

Ordre naturel des Lichens.

f Thalle adhérent amorphe.

a. Apothécion stipité.

§ I. — Faux Champignons.

Apothécion arrondi, charnu.

Boeomycées.

Bœomyces , Achar.

Apothécion creusé", non charnu.

Calycioides.

Calycium , Ach . ; Acolium , N.

(3. Apothe'cion sessile.

% II. — Faux Hypo.rylons.

Apothecion linéaire.

Graphidées.

Arthonia , Ach. ; Heterographa , ?N. ; Enterographa , N. ; Opegrapha , !Ach.; Graphis , Ach.; Sarcographa , ?N. ; Fissurina , N.

Apothécion hémisphérique.

Verrucariées.

* Glyphidées.

Glyphis, Ach.

** Trypéthéliacées.

Chiodeclon , Ach. ; Trypethelium , 'Ach.

*** Porinées.

Parrentaria, N. ; Pyrenula, Ach.; VPorina , Ach. ; Verrucaria , Ach. ; IThelotrema , Ach. ; Ascidium , N.

**»* Thécariées.

T/iecaria, IN.

Genre obscur.

Polyslroma , Ach.

§ III. — frais Lichens.

Gongyles nus.

LIC 36?

Coniocarfees.

Lepraria , Ach. ; Coniocarpon , De Cand.

Apothécion s'évasant en coupe.

VARIOLAINES.

Gassicurtia , N. ; fariolaria , Ach.

Apothécion marginé discoïde.

Lécanorées.

Myrio/rema , N. ; Echinoplaca , N. ; Urceolaria , N. ; Lecidea , Ach. ; Lecanora , Ach.

tt Thalle figuré en folioles soudées.

Squammaiuées.

* Espèces qui croissent sur les écor-

ces, la terre ou les pierres.

Psora, D. C. ; Squammaria, D. C. ; Placodium, D. C.

** Espèces qui croissent sur les feuilles.

Nematoria , N. ; Racoplaca , N. ; Phyllocharis , N. ; Craspedon , N. ; Melanophlhalum , N.; Aulaxina , N.

fit Thalle libre.

* Surfaces dissemblables, œ. Appliqué.

A. Etendu en folioles membraneuses.

Apothécion scutelloïde marginé libre vers les bords.

Pahméliacées.

Par/nelia , Ach. ; Circinaria , N. ; Sticta , Schrcb. ; Plectocarpon , N. ; Delisea , N.

B. Thalle étendu en folioles gélatineuses à l'état humide.

CollématÉes.

Collema.

c. Thalle étendu en folioles coriaces.

Apothécion arrondi, onguiculé, rendorme , attaché par le côté.

Peetigères.

Erioderma , N. ; Solorina , Ach.; Pelligera , N . , Peltidea et Nephroina , Ach.

563 LIC

fi. Thalle fixé au centre.

Apotliécion sous-patellulé à surface rugueuse ou marquée de stries.

Gyrophora , Achar. ; Umbilicaria , Pers.

** Thalle à surfaces semblables.

A. Tendant à s'aplalir , lacinié.

Apotliécion scutelloïde.

Ram ali nées.

Celraria, Ach. ; Roccella, Ach. ; Sorrera , Ach. ; Evertua , Ach. ; Kamalina , Ach.

B. Tendant à s'arrondir.

Filamenteux, traversé par une nerville

Apotliécion scutellé , immarginé , cilié.

TJSNÉES.

Usnea , Ach.

2. Non traversé par une nerville, quelquefois légèrement comprimé.

CoBNICULAIRES.

Alectoria , Ach. ; Cornicularia , Schr. ; Cœnogoniuiſi , Ehreub.

c. Thalle dendroïde.

î. Solide.

Apothécion globuleux émettant une poussière noire.

Sph^uophores.

Isidium , Ach. ; Sphœrophoron , Pers.; StereocauLon.

Fistuleux

Apothécion hémisphérique , charnu.

GÈNOMYCÉES.

Cladonia , D. C. ; 63. Scyphophorus , D. C. ; Pycnothelia , Duf.

Wppèhâix.

Apolhécion arrondi, immergé.

Thalle foliacé, coriace.

§ IV. lotisses hépatiques.

Eiidocarpoi.

Incertæ sedis.

Tricharia.

Nous renvoyons le lecteur aux différens articles que nous avons faits pour chacun de ces genres, afin qu'on puisse connaître à fond les raisons qui ont motivé les modifications apportées dans la Méthode d'Acharius.

Il n'est pas encore possible de donner avec exactitude la géographie botanique des Lichens; comme l'humidité et une chaleur tempérée sont nécessaires au développement de ces Végétaux, on doit en conjecturer que dans les lieux trop chauds ou trop, froids il n'y en a qu'un petit nombre. Il est à remarquer que dans les États-Unis et dans toute l'Amérique septentrionale, les espèces que l'on trouve sont, à peu d'exceptions près, les mêmes que les nôtres. Nous avons fait la même remarque à l'égard des espèces récoltées dans les îles Malouines par Gaudichaud et Durville. Acharius a décrit huit cents. Lichens et plus de cinq cents variétés. Nos travaux sur les écorecs officinales ont augmenté de deux cents espèces ce nombre déjà si considérable; si on ajoute à ce total les espèces décrites, depuis Acharius, dans divers ouvrages isolés, et celles qui se trouvent dans notre collection, et dans les herbiers non moins riches de Delise, Léon Dufour, Bory de Saint-Vincent, Persoon, et dans ceux de plusieurs botanistes étrangers, on peut hardiment porter à deux mille quatre cents espèces, les Lichens qui pourraient entrer dans un nouveau Synopsis, et ce nombre est encore loin de la réalité. Que de pays restent encore à explorer! Que de choses inconnues dans des contrées que l'on croit connaître!

Les Lichens ne sont point sans importance pour l'Homme. La médecine leur doit un médicament précieux dont les effets ne sont plu; contestés. Le Lichen d'Islande ost un puissant analeptique ; on en prépare des décoctions, des pâles, des gelées, des pastilles, un chocolat, et sous toutes ces formes son administration a été suivie d'heureux effets. Ce n'est

ias le seul Lichen qui serve en medeiinc; on a indiqué les *Usnea barbata* i .*flurida* connue propresà faire croître >ss cheveux ; le *Scyphophorus p/.vydaus* contre la coqueluche desenlans; c: *Peltigera ap/itosa* est cinétique; le *V'eltigera canina* a été réputé exclrnt pour combattre la rage. Nous ommes loin de garantir toutes les osrtus exagérées attribuées aux Liliens, mais leur importance n'est pas uulemenl dans les services qu'ils peueent rendre à l'Homme malade; l'art nu terni ni 1er leur doit plus encoie iue la médecine. Plus le» Lichens laraisseul s'éloigner de la l'orme ci usiccée, plus ils sont propres aux usatîs médicaux ; plus ils s'en rapproment, au contraire, plus ils convieniit à la teinture. C'est particulièrement dans le nord de l'Europe qu'ils rrvent à cet usage. Les paysans de Westro^othic sont les premiers ni ont découvert une matière coloi.ule dans la *Lécánore lartarense* ; ils uni employée pendant des siècles à teinture en routje de plusieurs pc- :ss ouvrages laits au tour, qui es1 , mur eux , l'objet d'un commerce >sez lucratif. Ce ne fui que quelle temps après rétablissement de nurs manufactures de drap, qu'ils itt imaginé d'employer ccLichen, et rr suite plusieurs autres , à la teindre des étoiles de laine. Il y a en Anôterreet en Hollande , des fabriques couleurs donl ta matière première ' consiste qu'eu Lichens récoltés i les rochers de la Suède et de la irwège. L'Orseille et la Parelle Auvergne sont deux objets assez pportans .lu commerce fiançais.

Ptfresque tous les Lichens , placés lus l'eau ou à la lumière, <! égatit de i'Oxigèuc comme les feuilles ai, 1res Végétaux. On obvv en rompant le thalle des Liens, que sa substance, de blanche l'elle était, devient verte peut-être r la combinaison de l'Oxigène de ir. Ils passent au jaune, <lans les rrbiers , en vieillissant.

^Plusieurs Lichens fournissent de la mime et un principe amer dont on

TOME !X

LIC 56g

les débarrasse en ajoutant à l'eau des macérations faites à froid , une petite quantité de carbonate de Soude ou de Potasse. C'est la présence de ce mucilage qui les 1 end propi es à servir à la nutrition. Les habitants de l'Islande préparent avec le Celraria Js-landica , un gruau et une farine nommée Jiccllgrœs; en Sibérie on fait avec la Pulmonaire de Chêne, une bière assez agréable. Le Cladonia rangiferina est le pâturage le plus commun, dans les parties les plus septentrionales de l'Europe. Les Lapon* lui doivent la conservation de leur bétail, seule richesse des âpres climats qu'ils habitent. Leurs champs, sans verdure , seraient bientôt sans Animaux, si le Renne ne paissait les Lichens que son instinct lui fait trouver sous la neige ou sur les écorcesdu peu d'Arbresqui semblent végéter à regret sur celle terre désolée. S'il n'est pas prouvé que la terre ait élé créée pour 1 Homme, la nature lui a du moins donné l'intelligence nécessaire pour que la terre devînt son domaine. (a. F.)

* LICHINA. bot. en ypt. {Hydropliyles.^ Agardha formé sous ce nom un genre aux dépens du Giga/tinaAc Lamouroux et du Gelidiumde Lyngbye. Il lui attribue pour caractères :

un tubeicule solitaire percé d'un pore, et il en mentionne deux espèces , Lic/iina pygmœa et confiais.

Nous avons la certitude que ces deux espèces pour lesquelles l'apologue* suédois ne cite point le synonyme de Gigarlitta pygmœa de Lamouroux (E>s.,pl. 4g, iab.4,f. ia-i5 , Plante qu'il renvoie à son Cliondria Kalifurmis, sont cependant la Plante de feu notre ami sous deux formes, et simplement des variétés du Getidium pygmœum de Lyngbye [Ilydropk., p.

4i(5 Fiyus pygmœus * ei £ de Tuiner (pl. -204) qu'Acharius [Prodr. Lic/i. , p. ao8) avait pris pour un Lichen, et nommé Sre-reocaulon conjine. Cette Plante, l'une des plus petites de la classe des Hvdrophytes, n'en est pas moins assez dure et résistante. Elle est très-commuue sur les rochers des

Ô7« LIC

côtes septentrionales deTEiu-opc, aux limites de la haute marée et clans les lieux que ri'alteignentqué durant peu de temps les plus hautes vagues ou la petite pluie qui résulte de leur brisement. Nous 1 avons observée à Belle- Ile en mer formant une zone noirâtre sur les flancs coupés à pic de la côte, aux limites de l'eau. Lesson nous en a communiqué un échantillon rapporté de la Conception , au Chili , qui ne nous semble différer en rien de l'espèce européenne. (b.)

LICIiTENSTEINIA. bot. phan. Deux genres ont été établis sous ce nom par les auteurs allemands.

Wendland a ainsi caractérisé l'un d'eux : calice double, l'extérieur et l'intérieur à trois ou cinq dents ; corolle monopétale, tubuleuse; cinq étamines réunies à leur sommet et plus longues que la corolle ; disque inséré sur le calice; ovaire supérieur à un seul style ; baie renfermant cinq graines. Ce genre, qui appartient à la Peniandrie Monogy r.w , L. , est voisin des Loranthus et ne renferme qu'une seule espèce qui est indigène du cap de Bonne-Espérance.

C'est un Arbrisseau à feuilles opposées, ovales, et à fleurs rouges disposées en bouquets axillaires.

L'autre genre a été constitué par Willdenow dans le premier volume du Magasin des curieux de la nature de Berlin, et caractérisé de la manière suivante : calice nul; six pétales ondulés et canaliculés ; six étamines hypogynes ; ovaire supérieur surmonté de trois styles; capsule triloculaire contenant plusieurs graines attachées aux sutures des valves. Ce genre, de l'Hexandrie Trigynie , se compose de deux espèces qui croissent au cap de Bonne-Espérance. Willdenow leur a donné les noms de *Lichtensteinia* lœ-

vigata et *undulata*.

LICHT. bot. phan. Pour Lyciet.

V. ce mot. (b

LICINE. *Licinus*. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Pentamères, famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques Thoraciques Â établi par Latreille , et ayant pour caractères : dernier article des palpes exlérieurs presque en forme de hache ; antennes point moniliformes ; mandibules très-obtuses à leur ex-', trémité'. Ces Insectes diffèrent des Harpales, el de tous les petits genres que celui des Félonies de Latreille comprend, par la manière dont se terminent leurs mandibules et leurs

Ealpes extérieurs ; l'évasement du ord antérieur de leur tête est un caractère qu'ils n'ont de commun qu'avec les Badistcs el les Dicèles , et qui dislingue ces genres de tous les autres. Les Licines ont la tête assez grosse , aplatie , leurs antennes sont fili-formes, composées d'articles presque cylindriques; la languette est saillante; elle a , de chaque côté du bord supérieur, une oreillette membraneuse et pointue. L'échancrure du menton n'a point de dentelures; le bord antérieur et supérieur de la tête est cintré , le labre est échaucré, ainsi que les mandibules qui sont, tronquées et très-obtuses. Le corselet est aussi large ou presque aussi large que l'abdomen , souvent presque carré avec les angles arrondis; les deux premiers articles des tarsi antérieurs sont dilatés dans les mâles et forment une palette arrondie , garnie en dessous de papilles nombreuses et serrées. Les larves des Licines sont presque semblables à celles des Harpales ; seulement elles sont plus aplaties et plus allongées. On trouve l'Insecte parfait sous les (pierres, et le plus souvent dans les terrains calcaires et élevés. Leur couleur est toujours noire. On peut diviser ce genre en deux sections ; dans la première se rangent ceux qui sont aptères; tel est : Le LtcINE sir.riioinE, L. silphoides , Clairv. (Entom. Helv., t. a, pl.

t£>, b. B.j; Carabus silpfioides , Fabr. Long d'environ huit lignes , noir avec le corselet presque carré, échancré en devant; élytres ponctuées, presque ridées , el ayant chacune neuf lignes imprimées. On le trouve dans plusieurs départemens de la France et

en Allemagne. Parmi les espèces ailées nous citerons :

Le Licine ÉCH ANCRÉ , L. emargi-

■ ia/i/s, Carabus cassideus, Fabr.; Car .•abe échancré, Oliv. (Enloni. T. in , ix" 35, pl. i5, fig. rão). Il se trouve nui environs île Paris el eo Alleninagne. (g.)

LICOCHEs. MOM-. L'un des noms «rulgaires des Lim;iccs. V. ce mot.

LICONDO. BOT.PHAN. (Linschott.) G&nmd Arbre du Congo qui ne peut têtre que le Baobab. F '. ce mol. (B.)

L ICO PUR 12. Licophris. polyp.

LLorsque l'on examine avec soin le i corps auquel Montfort (Oonchil.

>Sysi. T. 1) a donné ce nom, on se il'Jemande pourquoi les auteurs qui ecn ont pailé l'ont toujours conservé pparmi les Mollusques; ce corps a Haut de rapports avec les Orbitolites ilde Ln-mareK qui sont des Polypiers, qqu'il est impossible de les séparer ^génétiquement à moins de le l'aire tsdr le seul caractère des in-égalités qqui se voient dans l'un et qui n'exis- Keni pas dans l'autre; si on l'ait attention en outre au passage insensible ■ides espèces depuis les plus tuberculeuses jusqu'aux plus planes , comme

■ celle des envii'ons de Paris , cl à l'cmbbnrras oii l'on seiait de fixer une llhntc entre elles, on seia forcé de (convenir que le Licopbrc forme l'ex- Itfémité d'une série dont i Oi bitolile (iie Gti-gnon sérail le commencement.

IP ou te cette série doit incontestablerméit appartenir u un seul el même .genre auquel nous renvoyons. V.

LÔbBITOI.ITE. ' (D..H.)

LICORNE. Moiiocros. mam. Les ma tura listes modernes, à peu près d'un .accord unamine, placent la Licorne [presque au rang de ces cires tabu- Ileux que l'imagination des poètes s'est plue à créer, el ne lui supposent [•guère une existence plus réelle qu'au [Griffon , à l'Hippogriffe ou aux merveilleus s Syrèues. Ou a peine en effet à se défendre de cette opinion , quand on se 'appelle que la Licorne ;.u'a été vue par aucun zoologiste, ni

LIC 371

par aucun voyageur dont l'instruction et la bonne foi bien connues missent le témoignage borsde doute ; que les récits qui attestent son existence, n'ont pour la plupart aucune authenticité; que. toutes les prétendues cornes de ce Quadrupède, qu'on a dit avoir découvertes , et qu'on a montrées en divers lieux, se sout trouvées , à l'examen , n'être que des cornes dOrix , ou des dents de Narwhal, et quelquefois même do l'ivoire tourné ; enfin que de nombreuses et actives recherches ont été faites à plusieurs reprises, el toujours sans succès. Cependant la question n'est point encore décidée d'une manière tellement certaine , que nous ne croyions devoir rapporter quelques-uns des nombreux faits qui viennent à l'appui de l'opinion contiaire; opinion qui paraît encore être celle de plusieurs naturalistes très-rcommandables.

L'existence d'un Animal unicorne, ou, comme on peut le dire, ayant ses deux cornes réunies sur la ligne médiane , n'est d'ailleurs pas , comme on l'a dit , anatomiquement impossible; et c'est ce que semblent prouver plusieurs faits propres, soit à nos races domestiques tic Moutons et de Chèvres, soit même au jeune âge de l'Antilope Caama.

Tous les anciens patient de l'existence de la Licorne , comme d'un fait dont il n'y a pas à douter, a Elle a, dit Pline (livre vm , des Animaux terrestres) , la tête du Cerf, les pieds de l'Eléphant , la queue du Sanglier, la forme générale du Cheval ; une corne noire, longue de dc..x coudées, sort du milieu de son front; elle habite le pa\s des ludiens-Orséens , qui lui fout la chasse; mais ou ne peui , dit-on, la prendre vivante. » Au reste les anciens lui attribuaient aussi pour patrie l'Afrique centrale , et regardaient sa corne comme une arme icdoii table , ainsi que nous l'apprennent plusieurs auteurs; et c'est aussi dans l'Asie et dans l'Afrique centrales qu'elle habiterait suivant les rela-

573 LIC

tions modernes. Les Arabes nomment Champ lui r un Animal qui , diton , ressemble à l'Ane, mais qui porte une corne au milieu du front; et la Brebis de Madagascar, de la taille d'une Cbèvrç , a de même une seule corne. On croit aussi généralement dans une grande partie de l'Afrique , comme nous l'apprend Sparrmann dans son Voyage au Cap, à l'existence d'un Animal unicorne qui ressemblerait beaucoup au Cbeval. Le naturaliste suédois ajoute même, d'après un voyageur qu'il nous représente comme instruit et comme très-digne de foi , qu'il exisle dans une plaine du pays des Hollentol.— Clunois, sur la surface unie d'un rocher, un dessin grossièrement tracé, il est vrai , et tel , dit-il, qu'on peut l'at-

tendre d'un peuple sauvage et sans arts, mais oïi l'on reconnaît cependant sans peine la Licorne. Enfin les Holtentols-Cliinois auraient donné au même voyageur des détails sur la cha-ise de cet Animal fort raie, extrêmement léger à la course, méchant et furieux. Si Sparrmann avait vu lui-même ce dessin, et s'il avait appris directement des naturels du pays les détails très-circonstanciés qu'il rapporte, son seul témoignage ne permettrait plus guère de doute.

Un voyageur italien, nommé Barthéina, dit avoir vu à la Mecque, « dans une cour murée, deux Licornes, qu'on lui montra comme de grandes l'aretés; » il en donne une description assez détaillée, et ajoute « qu'elles avaient été données au sultan de la Mecque par un roi d'Ethiopie, comme la plus belle chose et le plus riche trésor qui fût au monde. » (V. Itincrariu de L. de Barthéina, 1517). Suivant un Hollandais, nommé Cloete, une Licorne fut tuée, en 1791, par une troupe de floltentots, à seize journées de Cambado, et à trente journées (en voyageant avec un chariot de Bœufs) de la ville du Cap. Ce Cloete offrait même de fournir une peau de Licorne, si on voulait lui donner une somme qui valût un voyage de trente

jours; et il ajoutait que la figure de cet Animal se trouve gravée sur plusieurs centaines de rochers par les Hottentots qui habitent les bois.

Ainsi se trouve confirmé le fait que rapporte Sparrmann; fait également vérifié par Barr.ow qui dit avoir vu plusieurs fois de semblables figures à côté de plusieurs autres qui représentaient d'une manière parfaitement reconnaissable divers Animaux réels de l'Afrique centrale. Nous pouvons même ajouter ici que Delalande et son compagnon de voyage Verreaux ont pareillement,

dans la même contrée , recueilli divers indices qui tendraient aussi à prouver l'existence de la Licorne; ils l'ont vue figurée en manière d'ornement sur un manche de poignard avec un Singe et un autre Quadrupède ; et plusieurs Hottentots leur ont assuré qu'ils l'avaient eux-mêmes observée.

En (in plus récemment encore , divers documens, recueillis par Férussac dans le Bull. des Se. Nat. (avril 1824, n. 3, p. 37:")), nous sont encore venus à la fois et de l'Afrique et de l'Asie centrales. Un esclave des environs de Koldagi a raconté de son propre mouvement, au voyageur Ed.

Riippel , qu'il existe dans son pays un Animal de la grandeur d'une Vache , mais de la forme svelte de la Gazelle, dont le mâle porte sur le fiout une longue corne droite qui manque à la femelle; cet Animal porterait dans le pays le nom de JNilukma. Cet esclave, qui n'avait jamais été questionné sur la Licorne , a d'ailleurs donné diverses preuves de sincérité ; il a, par exemple, fait une description très-exacte et très fidèle de l'Oie de Gambie. A peu près clans le même temps le major Latlar qui avait un commandement dans les montagnes de l'est du Népaul , faisait constater par un rapport officiel , que la Licorne, Animal regardé comme fabuleux , existe réellement dans l'intérieur du Thibet; et il en donnait une description détaillée. Enfin Ion a envoyé à la Société de Calcutta une grande corne en spirale provenant

LIG

'une Licorne , avec le dessin , la eescription et des observations sur les mœurs de ce Quadrupède , dont tous :ss habilans de li'hotc, que le commerce et la dévotion (Hraduiçent chaque année au Népaul , attestent unanimement l'existence. Ce Quadmpcce

qu'ils nomment Cbiro , habiterait ji contrée boisée connue des indiènes sous le nom de Changdung IV. Gazette du gouver. de Calcutta, Usiat. Jouru., décembre 18j4, et iiûull. Se. Nat. , loc. cil.).

Tous ces témoignages si remarquables , tous ceux nombreux encore, mais moins authentiques, que iuous pourrions ajouter; la manière tiéritablement étonnante dont la plupart s'accordent entre eux pour leurs iiélails, ne suffisent pas sans doute, nomme nous le verrons , pour dénnontrer l'existence de la Licorne , nnais ils montrent du moins qu'on ue doit pas trop légèrement prononcer qu'il ne faut voir en elle qu'un ttre fabuleux. Attribuer uniquement l'amour du merveilleux cette multitude de témoignages en faveur d'un même fait ; regarder comme entièrement fausses et comme dénuées de out fondement des choses attestées île nos jours par les grossiers hatitans de l'Arabie, du Népaul et lu la Cafrerie, après l'avoir été par Uxistote , par Elien , par Pline, n est il'aillcurs nullement possible, nullement laliountl. Aussi la plupart des naturalistes modernes , tout en se refusant à admettre l'existence de la Ljicorne , ont-ils bien senti que quelque chose de réel devait avoir donne naissance à une croyance aussi génétalement répandue, et ont-ils cherché à l'expliquer, pensant bien-qu'une fpinion formée de tant d'éléments divers , pourrait bien être fondée sur "exagération, mais non pas sur le Igensonge seul. De-là diverses cont eclures dont il est important de faire ;on naître les principales.

On voit sur divers monumens égyptiens des ligures de l'Orix dessinées si exactement de profil , qu'une seule corne est appareute , la seconde

se trouvant entièrement cachée par celle qui se trouve du côté du spectateur. N'est-il pas possible que la vue d'une semblable li-gure ait donné l'idée de la Licorne.' Cette conjecture a d'autant plus de vraisemblance que les formes et les proportions qu'on lui attribue, sont à peu près celles de l'Orix , et que ses cornes sont parfaitement semblables à celles de cette Antilope; et elle se concilie d'ailleurs très-bien avec l'hypothèse de Pallas. Cet illustre naturaliste "ayant remarqué (*Spicilegia Zool.*, fasc. xn) que le nombre des cornes n'était pas constamment le même chez les Antilopes , et ayant vu dans la même espèce des individus qui en avaient trois, et d'autres qui n'en avaient qu'une seule, l'a conduit à penser que la Licorne pourrait bien n'être qu'une variété unicorne de quelque espèce de ce genre, et particulièrement de l'U. ix. Sans vouloir donner toutes les preuves qui pourraient venir à l'appui de cette opinion , nous ferons remarquer seulement que tout ce qui a été dit pour démontrer l'existence de la Licorne, se concilie admirablement bien avec elle. La patrie de l'Orix est précisément la région de l'Afrique où l'on suppose généralement qu'elle existerait; et quant aux différences de taille, de couleur et de patrie que lui attribuent quelques-unes des descriptions qu'on en a données , elles s'expliquent très-bien , puisqu'il existe d'autres espèces plus ou moins voisines de l'Orix, comme sont l'Algazel et le Leucorix , et qui peuvent de même par anomalie devenir unicornes. On concevra de même l'observation que nous avons rapportée d'une Licorne de l'Inde à corne en spirale, observation à laquelle son authenticité semblait donner de l'importance. Si en effet les Licornes ne sont que des variétés unicornes d'Antilope , pourquoi n'en existerait-il pas à corne en spirale , aussi bien qu'à corne droite? On a dit, il est vrai, que si la corne

présentée à la Société de Calcutta , avait été une corne d'Antilope, elle eût

374 LIC

elle reconnue pour telle par les membres de cette Société : mais nous croyons qu'on peut répondre à cette objection , la seule qu'on puisse faire. On sait en effet, et c'est Pallas qui l'a remarqué le premier, qu'à la corne , chez les Antilopes qui n'en ont par anomalie qu'une seule, acquiert un développement considérable, et prend une forme et une direction différentes de ce qu'elle a dans l'état normal. Enfin il n'est pas jusqu'à l'extrême rareté de la Licorne qui ne vienne à l'appui de l'hypothèse de Pallas ; l'hypothèse qui réunit tous les caractères de la Licorne, et qui semble nous mettre en droit de conclure qu'il y a très-probablement la Licorne, telle que les anciens l'imaginaient , n'existe pas dans la nature. Nous disons probablement; car tant que la prétendue Licorne n'aura pas été vue elle-même par des naturalistes, tant qu'on n'aura pas bien constaté qu'elle n'est réellement qu'une Antilope anormale, quelque vraisemblable qu'elle puisse être la conjecture de Pallas, on devra toujours la regarder comme un peu hypothétique ; imitant ainsi , à quelques égards , la réserve de son illustre auteur, qui, dix ans après la publication de ses *Spicilegia*, écrivait encore à Sparrmann : « Je suis' depuis longtemps persuadé que les récits des anciens , concernant la Licorne, n'étaient pas dénués de tout fondement, mais que peut-être les Antilopes unicorues, dont j'ai parlé dans les *Spicilegia* , y avaient donné lieu, ou que jadis lorsque l'intérieur de l'Afrique était plus fréquenté par les voyageurs européens , ils connaissaient quelque autre espèce particulière d'Animaux unicorues , qui nous sont à présent inconnus. »

Le Narwhal a aussi , par comparaison , été nommé Licorne de mer.

(is. G. ST. -il.) LICORNE, vois. Nom donné quelquefois aux Balistes du sous-genre Monacanthé. fr. Baxiste. (b.)

LICORNE. Jflo/ioce/vs. moll. De

Blainville , dans le Dictionnaire des Sciences Naturelles ^ T. xxvi, attri-, bue la création de ce genre à Monli'ort; cependant nous trouvons dans .

la Philosophie Zoologique de La-, marck le genre Mo/iuce/vs, établi dans, la lamille des Purpuracées , enti c les Pourpres elles Concholcpas où est sa place naturelle. Nous le retrouvons , dans l'Extrait du Cours , dans la famille des Purpurifères , sous la même dénomination et dans les mêmes nippons. Monlforl a dû puiser à cette source pour la formation.de ce genre dont il a traduit le nom eu français et changé la dénomination de Mono~ ceros en celle d' Unicomus. Ce genre, extrait des Pourpres, a ensuite été adopté par le plus grand nombre des couchyliologues. Olivier, Férussac , de blainville l'onladmis commesousgenre des Pourpres dont il piéscnte la forme générale et la columelle aplatie. Voici les caractères que lui donne Lamarek : coquille ovale; ouverture longitudinale se terminant inférieui ement par une échancrure oblique ; une dent conique à la base interne du bord droit. Le seul caractèie important qui sépare ce genre des Pourpres est la. dent conique, constante , plus ou moins longue , qui se voit à la base du bord droit. Cette «lent , dont on ne connaît pas le mode de formation, pourrait être produite, à ce que pense de Blainville, par l'organe de la génération , dont le passage est vers cet endroit. Cette idée pourrait se confirmer, car

les Licornes ne sont pas les seules Coquilles qui aient une saillie sur le bord droit. Nous en avons reconnu une presque semblable ou du moins très-analogue dans trois espèces du genre *Umbinella* Lamarek, et un véritable ' Fuseau rapporté dernièrement par l'expédition de la corvette la Coquille présente ce caractère aussi constamment et d'une manière aussi tranchée que les Licornes. Ce caractère, s'appliquant à plusieurs genres!

devient beaucoup moins certain pour celui qui nous occupe, et pourrait apporter de la confusion dans divers

genres, si on voulait en faire une application exacte et rigoureuse. On l'aurait donc rencontré par *Monoceros* les Coquilles qui, avec les caractères les Pourpres, ont de plus une dent sur le bord droit. Ce genre est peu nombreux en espèces; Lamarck en Mérit cinq, et Brocchi une fossile de l'Italie.

Licorne tuilé. , *Monoceros umbilicata* , L'Ank. , Anim. sans vert. T.

Wir , abt. n. 2; Encycl. , pl. 366 , fig. h , a , b ; Buccinum *Monoceros* , Brug. , L'Dict. Encycl., n. 11 ; Martini , Couc. d'Hist. Nat. T. m, pl. 69, fig. 761; Fawanne, Conch. , pl. 27, fig. d , 1. On trouve cette Coquille , la plus commune du genre, figurée dans le magnifique ouvrage de Martini; une autre espèce que Lamarck y a rapportée légalement , s'y voit pl. 50 , c Si on les compare avec le soin nécessaire , on voit qu'elles appartiennent à deux (espèces très-distinctes, et la seule figure qui représente la Licorne tuilée (dans cet ouvrage est celle de la planche 10 , c. C'est une Coquille ovale à spire courte, composée de quatre (Cinq tours dont le dernier est très- ; grand. Us sont couverts de côtes transverses , couvertes d'écaillés serrées , ce qui rend la coquille rude au

toucher, Elle est de couleur brun fauve, plus ou moins foncée, selon les Individus; en dedans elle est blanche; sa columelle est arquée comme dans les Pourpres, et aplatie de même. A la base de la lèvre droite se voit une dent courbée, grande, pointue, dont la base assez large se continue en dedans par une écharpe saillante. C'est dans les mers Méditerranéennes que se trouve cette Coquille, qui a quelquefois jusqu'à trois pouces de longueur.

Les autres espèces sont le *Munoceros mungulium*, Lamk., Anim. sans vert. T. vu, p. 410, n. 1; Eneyelop., pl. 4, a, b, qui est extrêmement rare; le *Munoceros striatum*, Lamk., loc. cit., n. 3; *Munoceros Nautilus*, Euescl., pl. 56, fig. 5, a, b; le *Munoceros glabratum*, Fuchs., loc. cit., n. 4, et Encycl., pl. 36, fig. 5, a, b, espèce fort remarquable et recherchée,

LIU

et le *Munoceros crassilabrum*, Lamk., loc. cit. jil- 5; Encycl., pl. 96, fig. 2, a, h Brocchi a nommé, dans sa Conchyliologie suisse-pennine, pl. 4, fig.

12, *Buccinum Munae* / uintes, l'espèce qui se trouve fossile dans le Plaisantin. (U. H.,

* LICORNET. rois. Espèce du genre *Pison*. F. ce mol. (B.)

LIGULA. bot. PHAN. Thunberg {Act. Hulm., 1782, p. 84) a établi ce genre qui appartient à la famille des Palmiers et à l'Hexandrie monogynie. Dans son *Général Pahnaruin*, Martius l'a ainsi caractérisé : lieu des scissiles, hermaphrodites, enveloppées de plusieurs spathes incomplètes; calice à trois divisions pro-

fondes ; corolle à trois pétales légèrement soudés ; six ctamines réunies à la base en urcéole ; ovaire Iriloculaire surmonté d'un style simple et de deux- stigmates; drupe mouospernie; embryon latéral Ce genre ne renferme qu'une seule espèce que Rumph (Herb. Amb., 1 * t. 9) avait décrite et figurée sous le simple nom de *Lie* 11 al a ; Lamarck en a fait une espèce de *Corjpa*. Cette Plante (*Licuala spinosa* , Thunb.) a une tige courte et grêle , formée d'un bois très-dur. Ses frondes sont terminales, palmées-radiées , à pétioles épineux et à pinnules frangées. Elle croît dans les Indes - Orientales et principalement dans les Moluques.

LIDA- BOA Y A., bot. v.h.ks. L'un des noms de pays chez les Malais à *Aloe fera*, L., espèce du genre *Aloë*. (b.)

LIDBECK. IE. LUBecUa. .bot.

rii. \N. Genre de la famille des Synanthiées , Gorymbifères de Jussieu , et de la S\ ngénésie superflue , L. , établi par Bergius (Description t. Pl. Cap. , p. 506, t. 5, f. 9) et adopté par Cassini qui lui attribue les caractères suivants : involucre formé de folioles un peu inégales, disposées irrégulièrement sur trois rangs, appliquées, oblongues-lancéolées , coriaces, glabres et ciliées sur les bords ; réceptacle hérissé de poils inégaux ; fleurs du

376 LID

disque nombreuses , régulières, hermaphrodites , ayant un ovaire oblong, muni de côtes longitudinales et de deux bourrelets, l'un à la base, l'autre au sommet , dépourvu d'aigrette, et surmonté d'un nectaire très-élevé, épais , cylindrique , sur lequel le style est articulé. Les fleurs de la circonférence sont disposées sur un seul rang , en languettes et neutres ; elles possèdent seulement un rudiment d'ovaire long et membraneux. Les botanistes

ne se sont accordés ni sur les caractères de ce genre, ni sur sa composition. Leurs descriptions ne sont souvent qu'une suite d'erreurs copiées servilement les unes sur les autres, et ce que plusieurs ont nommé *Lidbeckia* oûTail l'assemblage de quelques espèces sans affinités. Ainsi les (leurs de la circonférence ont été décrites comme femelles, l'involucre comme monophylle, le réceptacle comme absolument nu , etc., etc.

L'organe nommé nectaire par Cassini était généralement considéré comme un des articles du style qui était censé en posséder deux dont l'inférieur était plus court. En rectifiant ces erreurs, Cassini a placé dans le *Lidbeckia* A 'abord le *JL. nectina*/a , *Berg.*, et *lei. lubata*. Willd. , qu'il a nommé *L.* , qui/i queluba. Ce genre avait été confondu avec le *Cotula* par Linné.

Willdènow admit sa distinction, mais il y réunit le *Cotula turbinata* , *L.*, type du genre *Cenia* de Connerson et de Jussieu. C'est un genre semblable que Lama¹, ck, dans ses *Illustrations des genres*, constitua sous le nom de *Lancisia* autrefois proposé par Poulédéra pour une autre Plante du genre *Cotula*. Ce dernier nom a été encore appliqué par Pei soon au vrai *Lidbeckia* ; mais il en a séparé le *Cenia*.

Les *Lidbeckies* appartiennent à la tribu des *Antliémidées* de Cassini. Ce sont des Plantes herbacées, à tiges simples ou peu rameuses , à feuilles pinuatilides ou quinquélobées , et à Heurs imitant celles des *Chrysanthèmes*. Elles croissent au cap de Bonne-Espérance. (Q--no

LIE

LIDMEE. ma m. On ne sait quelle est l'Auiliopé que le voyageur bhaw entend désigner sous ce nom. (b.)

* LIEBERKUHNIINE. Lieberkahna.

bot. phan. Genre de la famille des.

Synanthérées , Corymbifères de Jussieu , et de là S[^]ngénésie supeiflue, L., éta'oli par Cassini qui l'a ainsi caractéjisé : involucre composé de folioles#mbriquées , oblongues lancéolées, membra-neuses et étalées dans leur partie supérieure; réceptacle plane et nu; calathide radiée ; fleurons du centre peu nombreux, herma-phrodites , ayant une corolle ordinairement labiée, a lèvres' inté-rieure profondément divisée en deux , et àlèvre extérieure divisée en trois au sommet ou jusqu'à la moitié ; fleurons de la circonfé-rence femelles, ayant une corolle à tube long et à languette longue, large et terminée par deux ou trois dents. L<\s akènes sont très- allongés, amincis de bas en haut , surmontés d'une ai-grette de poils nombreux, inégaux et très-légèrement plumeux. L'auteur de ce genre le place dans la tribu des Mutisiées entre les genres Leria et Leibnilzia dont il ne diffère que par de faibles ca-ractères. Il est seulement compose des deux espèces suivantes : i° Lieberkuhna bracteata, Cass. , ou Perdicium piloselloides , Vahl , Jet. Soc\ nat. Hafn. T. il, p. 38, tab. 5 ; j° L. nadipes, Cass., ou Tussi/ago pumila , Swartz , J'ior. Ind. Occid., vol. 5 , p. i550. Ce sont de petites Plantes herbacées dont la première est indigène des environs de Montévidéo et la seconde des hautes montagnes de la Jamaïque. (g..N.)

LIÈGE, bot. chim. Celle couche épidermoïde du bois d'une es-pèce de Cliène (V. ce mol) a été examinée chimiquement par Che-vreul qui l'a traitée successivement par l'Eau et par l'Alcohol. In-dépendamment de plusieurs principes colorans, de l'Acide gal-lique , des substances résineuses et de quelques Selsà'basede Fer

et de Chaux , il y a découvert deux substances particulières qu'il a nommées

LIE

i irine et Subériue. La première lislallise en petites aiguilles blanmes , offre quelques rapports avec la ire , mais s'en distingue essentiellement en ce que, mise dans l'eau bouilimte, elle se ramollit sans se liuuéicr et qu'elle se précipite au fond du use. Elle ne paraît pas susceptible iélre dissoute par l'eau de Potasse, ta Subériue e^t le tissu propre du liège. Par l'action de l'Acide nitrimé , cette substance produit un ccide particulier qui a reçu le nom :: Subérique. F. Acioe. (O..N.) (On appelle Liège des Antilles ou oîis de Liège, une espèce de Bom~ ux. V. Fromage». (b.)

ILIÉGE FOSSILE ou DE MON- AGNE. min. L'un des noms vulitires de l'Ashesté. (b.)

ILĪEN. reft. ont. Espèce du gen- Gouleuvre. V. ce mol. (b.)

'* LIEN -SIEN. bot. piian. V.

UiMFSIS.

ILIERNE. îîot. ni an. L'un des noms ikjgaires de la Clématite des baies.

1LIERRE. Hedera. bot. fiian.

cure placé par Jussien dans la failille des Caprifoliacées , mais qui urne le type d'un ordre naturel »u veau que nous avons nommé l'édéracées. V. ce mot au Suppléient. Ce genre offre les caractères uvans : le calice est turbiné, adhéut, terminé par cinq dents Irèsi-uries; la corolle se compose de mq pétales lancéolés , ses-

silcs , aux, étalés ou rabattus; les eialincs, au nombre de cinq, sont cessées; leurs antbères sont cordirrmes , obtuses, à deux loges. L'oirc est semi-iufère, à cinq loges ititenant chacune un seul ovule qui ît de la partie la plus supérieure la cloison et est renversé. Le style l: court, cylindrique, simple, terné par un stigmate à cinq lobes à iine marqués. Le fruit est globui\ , charnu , pisil'orme , couronné rr les dents du calice , contenant iiq petits noyaux osseux et mono- .ermes. Ce genre se compose d'uu

LIE 577

petit nombre d'espèces , enviroi huit, dont une seule est partout commune en Europe; une autre vient des Canaries, une troisième de Ceylan, elles cinq autres ont été observées dans l'Amérique méridionale, particulièrement à la Jamaïque. Mais il est tiès-probable que, parmi ces espèces, quelques-unes doivent être rapportées à un autre genre , et particulièrement à Y sialia.

Les espèces de Lierre sont, en général, des Arbrisseaux grim-pans, à feuilles alternes, entièresou lobées , et à (leurs petites, blanchâtres , disposées en cimes ou en panicules. Parmi ces espèces , nous croyons ne devoir parler ici que de la plus commune.

Lierhe grimpant , Hetlera Hélix, L., Bull., t. 1 33 , Arbrisseau sarmenteux et grimpant, s'élevanl en s'accrochant sur les Arbres , les vieilles murailles et pouvant acquérir daus les provinces méridionale» de l'Europe une grosseur considérable. Aiusi, parmi ceux qui existent à la promenade dcl Prdto à Florence, on en trouve qui n'ont guère moins d'un pied de diamètre. Uory de Saint- Vincent nous dit eu avoir vu de presque aussi gros dans nos provincesseptentrionales , particulièrement contre un mur de jardin , sur la route de JBaycux à Porl-en-Bessin , côtes du

Calvados ; il a remarqué qu'aucun Lichen ne croît sur l'écorce du Lierre , même des plus vieux individus.

C'est au moyen de petits suçoirs ou radicules courtes et serrées , naissant de tous les points de la surface en contact avec les corps étrangers, que le Lierre s'accroche et s'élève sur les Arbres et les édifices. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, d'une figure très-variée. Ainsi ,elles sont quelquefois cordiformes , entières : quelquefois à deux , trois ou cinq lobes plus ou moins profonds ; toujours velues et luisantes. Leurs fleurs sont petites , verdâtres , disposées en cimes ou ombelles simples. Les fruits sont globuleux , périspermes, ombiliqués , noirs ou jaunes suivant les variétés.

LIE'

Le Lierre, comme nous l'avons dit , croît naturellement dans toutes les contrées de l'Europe. Il se plaît de préférence dans les bois couverts et humides. Cet Arbrisseau, emblème de l'amitié , produit un fort joli effet dans les paysages. On le plante aussi fréquemment le long des murs, dont il cache la nudité par son feuillage toujours vert. Dans les contrées méridionales , et particulièrement dans le Levant, on extrait des vieux troncs de Lierre, au moyen d'incisions pratiquées à leur écorce, une substance grisâtre, gomme-résineuse, connue sous le nom de Gomme de Lierre.

Les fruits du Lierre sont légèrement purgatifs ; quelques médecins en ont prescrit l'usage dans l'ictère, l'hydropisie. Les feuilles sont employées pour entretenir sur les cautères une fraîcheur agréable. (a. R.)

On a étendu le nom de Lierre à des Végétaux qui n'appartiennent pas à ce genre ; ainsi l'on a appelé •

Lierre aquatique ou d'eau , le *Lemna trisulca*. ^ . Lenticule.

Lierre du Canada, le *il/uts Toxicodendron* , L .

Lierre a cinq feuilles , le *Cissus quinquefolius* , L.

Lierre terrestre, le Glécome.

f. ce mot. (b.)

LIEU. pois. L'un des noms vulgaires du Gade Pollack. F. Gade. (b.)

*LIEURE. bis. Syn. vulgaire du grand Coq de Bruyère. F~. Tétrás.

(dr..z.)

LIEVPtE. *Lepus*. maM. Ce genre, l'un des plus remarquables , des plus naturels et eu même temps des plus nombreux en espèces de tout l'ordre des Rongeurs, présente un caractère très-digne d'attention , et qui lui est propre, dans ses incisives supérieures au nombre de quatre; les inférieures sont, comme à l'ordinaire , au uombre de deux seulement. Il y a six molaires de chaque côté à la mâchoire supérieure, et cinq seulement à l'inférieure. Ces molaires, sans racines , sont à la supérieure, deux fois environ plus lar-

LIE

ges que longues; l'antérieure est un peu moindre que les suivantes , et la postérieure est encore beaucoup plus petite; elles

ont toutes leur couronne divisée en deux parties par une ligne transversale, excepté l'intérieure qui présente seulement sur son bord plusieurs festons, et la postérieure qui est tout-à-fait simple. A la mâchoire (inférieure , les molaires ont , comme à la supérieure , leur couronne divisée en deux parties; mais elles diffèrent en ce qu'elles sont aussi longues que larges. Les incisives sont longues, larges, aplaties en avant. Des quatre incisives de la mâchoire supérieure, les deux principales sont longues, fortes, divisées sur toute leur longueur par un sillon profond, en deux parties bombées dont l'externe est la plus large; enfin , taillées en biseau à leur face postérieure. Les deux autres incisives sont beaucoup plus petites et placées immédiatement derrière les deux antérieures*, elles sont arrondies , mais un peu plus larges que longue*. Une autre observation l'oît remarquable est celle de l'existence momentanée de six incisives chez les jeunes individus. « Les Lapins , dit Geoffroy Saint-Hilaire (Système dentaire des Mammifères et des Oiseaux) , naissent et meurent avec quatre incisives, mais non pas avec les quatre mêmes.

Ils naissent avec la première et la seconde paire, puis, c'est-à-dire quelques jours après, arrive une autre paire, une troisième paire de dents.

Ces nouvelles dents finissent par acquérir un volume, et par prendre .

en s'approchant de très-près et pai derrière de la première paire , une direction qui provoque et qui décide la chute de la dernière paire intermédiaire. La chute de celle-ci ne se fait toutefois point sans un engagement sans une sorte de lutte. Les deux paires de dents sont momentanément en présence; il y a coexistence, durant quelque temps, des dents qui vont tomber et de

celles qui arrivai pour en prendre la place. LesL rpin ont donc six incisives durant une pc

LIE

te période qui est de deux à cinq ujsr. Dans ce moment de leur exisaice, ils ajoutent ainsi à bien d'autis rapports qu'ils ont avec les Kanitroos , un caractère de plus , le l'ême nombre de dents incisives. »

ILes membres antérieurs, plus grêles i beaucoup plus courts que les posuieurs , sout terminés par cinq iiiigts armés d'ongles robustes , assez Migs et un peu aiqués; le troisième)i)igt est le plus long; le pouce , qui voit vers le bas du métacarpe, et pose par sur le sol , est très-petit ; Wn ongle est d'ailleurs semblable à illui des autres doigts. Les membres intérieurs sont tétradacty les. Tous les)oigls dans toute leur étendue, et èènie la plante et la paume, sont couvris de poils comme le reste du inrps , caractère remarqué par les idciens , et qui a valu à une espèce M genre le nom de Disypode. La iijcue, ordinairement très-velue, est uuitc, et même quelquefois, comme nez le Tapeti , presque nulle. Les '•cilles, presque nues en dedans et ouvertes de poils ras en dehors , sont èès-mobiles et très-grandes-; la lèvre ippérieure est entièrement fendue sur ligue médiane, et l'intérieur de bouche est recouvei t de poils , cakclère bien remarquable, et q :i n'a us échappé non plus à Aristole et ux anciens. Les yeux sont assez irands et latéraux , et les narines sont Xfoites, plus laiges en dehors qu'en «dans; on voit à leur partie supé- •eure un repli transvers.il qui peut , n s'abaissant, recouvrir leurs orices. Il y a généralement de six à ilix namelies, et elles sout les unes pecuralcs, les autres abdominales. Le il ièvre et le Lapin en ont l'un et l'auredix, dont quatre seulcinent sont l'ectorales. Les diverses parties du mal ali-

mentaire sont très.-développées, et le cœcu m a surtout ud vomie considérable; il est plusieurs)>is aussi grand que l'estomac, et sa àivilé e>t divisée par une valvule spinale qui correspond à des él-
 range- Mcns assez nombreux. INous ne parlons pas ici des or-
 ganes génitaux du

LIE 579

mâle, déjà décrits dans l'article Génération de noire savant collaborateur Dumas. Nous remarquerons seulement que la verge est dirigée en arrière comme cela se voit aussi chez beaucoup d'aulresRongeurs; legland est tantôt cylindrique comme chez les Lièvres proprement dits , et tantôt mince et recourbé en alêne , comme chez les Lagomys. Mais nous devons arrêter un peu plus long-temps notre attention sur les organes femelles. Le corps de l'utérus est séparé en deux cornes fort allongées , dont chacune a son orifice particulier dans le vagin ; ou plus exactement, et comme l'a dit Geoffroy Saint- Hilaire, le corps est petit, rudunentaire , à peu près nul ; tandis que les cornes ont au contraire acquis un développement Considérable. Sous ce rapport , comme le remarque ce naturaliste, les orgaues sexuels de l'espèce humaine et ceux du Lapin sont aux deux bouts de l'échelle. Le corps de l'utérus est en effet très-volumineux, et les cornes sont très-rudimentaiieschez la femme. Cette disposition de la matrice chez les femelles de ce genre explique très-bien comment la supci létation est possible chez elles, c'est-à-dire comment elles peuvent concevoir lorsqu'elles sont déjà pleines. Aristote, qui avait connaissance de ce fait , dont il parle dans plusieurs passages, en avait même cherché une explication. La femelle du Dasypode, dit-il , est sujette à la superfétation , à cause

de la grande abondance du sperme du mâle, abondance qui se manifeste par la quantité de poils dont il est couvert.

f LiÉvnrs proprement dits , Lepits.

Le genre Lièvre , si l'on en sépare quelques espèces, les Lagomys, qui doivent former un genre à part , que nous décrirons à la fin de cet article, forme l'un des genres les plus naturels de l'ordre des Rongeurs. On retrouve constamment chez eux , non seulement les caractères principaux, mais même beaucoup d'autres qui n'ont qu'une importance bien secon-

380 LIE

claire, et particulièrement ceux" de coloration. Toutes les espèces sont d'un gris roussâtre tiqueté ; l'œil se trouve toujours compris dans une tache, le plus souvent blanche, mais toujours plus pâle que les parties environnantes. Nous désignerons pour ah réger, sous le nom de tache oculaire, cette tache dont nous aurons à parler dans la description de chaque espèce. La queue est toujours s blanche en dessous, le dessus étant noir , si ce n'est dans quelques espèces comme chez le Lapin d'Amérique , et dans l'espèce à laquelle nous donnons le nom de Lièvre à queue rousse.

A l'exception de la gorge qui est ordinairement de la couleur générale du corps, des membres antérieurs, le dessous du corps est ordinairement blanc, les oreilles sont tou-

!" ours noires à leur extrémité. Le péage est très-fourmi et se compose de

Boils soyeux et laineux fort abondans.

a plus grande partie de la tête n'est couverte que de poils soyeux; la nuque et le derrière du col n'ont au contraire que des poils laineux , très-courts et doux au toucher : cette partie, dont l'étendue est variable, est généralement d'une couleur uniforme et différente de celle des parties voisines.

L'eu d'espèces sont aussi fécondes que celles de ce genre. Susceptibles d'engendrer dès la première année, les femelles ne portent que trente jours environ et mettent bas plusieurs petits qu'elles allaitent pendant trois semaines. Ces petits naissent couverts de poils , et , contre l'opinion des anciens , les yeux ouverts.

Plusieurs espèces se creusent des terriers plus ou moins profonds ; et toutes sont des espèces nocturnes. Nous n'insisterons pas sur leur timidité qui «est devenue proverbiale, et que notre inimitable La Fontaine a si bien peinte : timidité qui tient probablement à l'extrême susceptibilité de l'appareil de l'audition. Tout le monde connaît également l'extrême agilité de ces Animaux et leur grande facilité pour le saut. Au reste ils sa-

vent aussi employer la ruse pour éviter la poursuite du chasseur et dérouter les Chiens. On en a vu souvent, par exemple, se réfugier au milieu d'un troupeau de Brebis , comme s'ils savaient n'avoir rien à en redouter. Certaines espèces de ce genre habitent les bois et la plaine; d'autres les montagnes et les pays sablonneux.

Elles se nourrissent toutes de diverses substances végétales , et chacun sait combien le goût de leur chair varie suivant la nature de celles-ci. Les individus qui vivent sur les bords des étangs, dans les plaines basses et dans le fond des bois , de même que ceux qu'on élève en domesticité, ne valent ordinairement pas

ceux qui habitent les montagnes, les lisières des bois ou les vignes. Les Grecs et les Romains faisaient grand cas de la chair de ces Animaux ; les Orientaux l'estiment au contraire fort peu, et elle était même défendue dans la loi de Moïse qui supposait possible chez eux la rumination. Le commentateur d'Arislote , Camus, a donné comme des preuves de cette proposition , la ressemblance qui existe entre les organes de la génération des Lièvres et ceux des thrainans , et l'existence en Norwège de Lièvres cornus. On a en effet plusieurs fois prétendu avoir vu, et on a été jusqu'à figurer de prétendues cornes de Lièvres. Mais une chose plus remarquable , est l'idée d'un Allemand qui a été conduit dans ces derniers temps à croire que le Lièvre devait ruminer , par l'opinion qu'il avait, que le coecum est une poche destinée à un genre particulier de rumination. Cette singulière opinion le porta à faire des observations sur des Lapins, et il aurait vu ces Animaux rendre des déjections d'une nature particulière qu'ils reprenaient ensuite pour les remâcher et les avaler de nouveau.

Les espèces qui composent le genre des Lièvres proprement dits , présentent tous les caractères que nous avons indiqués , et se distinguent particulièrement des Lagomys par leurs longues oreilles , par leur queue , par

LIE

longueur de leurs membres de dere , par l'imperfection de leur elauule, cl par l'espace sous-orbitaire ecé en réseau dans le squelette. Ces pièces sont très-nombreuses , et rtvent, à cause de leur grande ressemblance, difficiles à distinguer. Ou uine généralement le nom de Laus à ceux qui ressemblent à no- Lapin par leurs

oreilles un peu foondies et plus courtes que dans le lté du genre. Les autres conservent iinom de Lièvres.

Lie Lièvre commun , Lepus ti- Hus , L. , est l'espèce la plus co-
nee de celte première section. H se uuve dans presque toute l'Eu-
rope mpérée, et même, dit-on, dans Kiè-Mineure et dans la Syrie.
Il est néralement fauve roussatre , avec ddessous du corps blanc;
la 'partie eerne du membre postérieur est un roux moins vif et
quelquefois tsàue gris; le membre antérieur, ccol , la poitrine, les
joues claut-att It traire roux. Les oreilles, variées de ux, de noir,
de fauve et de blanc , lit blanches à leur partie externe et m. res à
leur extrémité. Le dessous de lèteest blanc; la tache oculaire est
r.nche ou blanchâtre, et va de la 166 de l'oreille à la narine; la
nues et le dessus du col sont d'un ux plus ou moins vif: la queue,
tneheen dessous, noire en dessus,

longue de trois pouces environ, i voit assez fréquemment des
Lièss entièrement blancs par l'effet de nmaladie albinc. Cette es-
pèce, qui

se creuse pas de terriers , vit :ilaire ; et. comme le remarque .
Cuvier (dans son article Lièvre,

Dictionnaire des Sciences Natu- IJés) , « c'est peut-être à cet
insect que l'on doit attribuer la Iilé dont jouit son espèce entière,
(disque le sociable Lipin est demi partout domestique. » Nous ne
vous pas devoir parler de la chasse I Lièvre que tout le mon de
connaît,)i|ui se trouve décrite partout ; nous Marquerons seule-
ment qu'on déiit annuellement un nombre contérable de ces
Animaux, et que

l'espèce est cependant toujours extrêmement nombreuse.

Le *Lepus ruJicaudatuH* , N. Nous nommerons ainsi une nouvelle espèce envo\ éc tout récemment du Bengale parle célèbre voyageur Duvaucel , et qui ressemble beaucoup au Lièvre commun. Elle se distingue néanmoins très-facilement par sa queue plus longue, et rousse en dessus au lieu d'être noire , par sa tache oculaire moins prononcée et sa joue d'un roux très niélangé de noir, par son poil beaucoup plus uide, et par sa laille un peu moins considérable. Le Muséum nS possède de cette espèce qu'un seul individu dont les oreilles sont en mauvais état; nous avons seulement pu reconnaître que la tache noiie de leur extrémité est assez étendue. Ses mœurs nous sont entièrement inconnues.

Le Moussr.L, *Lepus nigricollis*, Fr. Cuv. , Dict. des Se. Natur. Le dessus du corps est roux tiqueté , avec les flancs , les cuisses , la portion la pl us antérieure et la portion la plus postérieure du dos, d'un gris pareillement tiqueté, en sorte que la partie rousse se trouve entourée de gris ; la queue, blanche en dessous, est d'un gris un peu brunâtre en dessus. Le membre antérieur est roux en dehors; la gorge et la partie inférieure de celui de derrière , sont d'un roussatre clair. Le dessus de la tête est roux tiqueté; le dessous étant blanc, comme celui du corps, et les joues grises. L'oreille, blanche à sa base, est roussatre par derrière , avec son extrémité d'un brun noirâtre. Enfin , le dessus du col et la nuque sont d'un noir brunâtre, cette tache se prolongeant sur le milieu du dos , et formant presque un collier entier.

Celte espèce, de la taille d'un gros Lapin , â été découverte au Malabar par Leschenault. Elle habile aussi plusieurs autres par-

ties de l'Inde, et particulièrement Java , d'oii elle a été envoyée par Duvaucel et Uiard.

Le Li iivHE d'Egypte , *Lepus .T.gyry tius* , Gcoff. St.— Hil .
Cette espèce est presque entièrement fauve en dessus;

LIE

son pelage est seulement tiqueté en quelques endroits , comme sur la tête; la gorge, la poitrine et les membres sont aussi de cette couleur. Le dessous du corps, de la tête et de la queue est blanc ; la queue est noire en dessus; les oreilles sont d'un roux brunâtre, avec leur extrémité noirâtre; le dessous des doigts est brun, et la tache oculaire , qui va de l'oreille à la narine , est d'un fauve trèsclair. Celte espèce, de la taille du Lapin, mais dont les oreilles sont proportionnellement plus longues que chez le Lièvre lui-même, a été découverte en Egypte par Geoffroy Sain t-Hilaire.

Le Lièvre du Cap , *Lepus Capensis* , L. Quoiqu'il ait été réuni à L'espèce précédente par G. Cuvier et par Desmaiesl, nous croyons cependant avec Geoffroy Saint-Hilaire et Ff. Cuvier, qu'il doit en être distingué. Il est généralement d'un gris un peu roussâtre , avec la gorge et les ineinbi es roux, et le dessous des pieds brun. Le dessous du corps et de la queue est blanc ; le tour de l'œil et le dessus de la tête n'étant que blanc roussâtre: le dessus du col est grisâtre ; le bout du museau est roussâtre , et l'oreille d'un gris brun piqueté de roussâtre , avec l'extrémité noire; la queue est noire en dessus. Celte espèce, de la taille du Lièvre, est trèsremarquable par ses oreilles et ses membres extrêmement allongés. Dclalaude en a rapporté du Cap plusieurs indivi.lus.

Le Lièvre des rochers , *Lepus saxatilis* , F. Cuv., Dict. des Se. Nat., a la même patrie et à peu près les mêmes proportions que le précédent; mais sa taille est un peu moindre. Il est roussâtre en dessus, gris roussâtre sur les membres, gris sur les flancs et la gorge; le dessus du col est d'un roux vif, ainsi qu'une portion des oreilles dont l'extrémité est noire, avec la partie interne d'un gris piqueté de noir et de fauve; la tête est aussi à peu près de cette couleur ; la tache oculaire est d'un gris cendré; le dessous de la tête , du

LIE

corps et de la queue est blanc; le dessus de la queue est noir , et le dessous des pattes est brun. Delalande , qui a découvert au Cap cette belle espèce, et qui l'a rapportée au Muséum, nous a appris qu'elle est rare , et vit dans les montagnes.

Le Lièvre variable, *Lepus variabilis*, Pall. , est une des espèces les plus remarquables à cause des changemens de couleur qu'il subit selon les saisons. En hiver , il est entièrement blanc, avec le bout de l'oreille noir , et les deux couleurs de son pelage sont alors précisément celles qui se retrouvent chez presque; toutes les espèces qui blanchissent en hiver, comme sont 1 Hermine parmi les Mammifères le Lagopède et le Tétràs des Saules parmi les oiseaux. En été, il est en dessus d'un gris fauve, avec les membres d'un roux pâle uniforme , la gorge d'un blanc roussâtre,, et le dessous du corps , de la tête et; de la queue entièrement blancs. L'oreille est blanche à sa partie externe, avec le bout noir et le bord jaune , et le tour de l'œil est blanc; la queue , blanche en dessous , est noire en dessus. Un fait qu'il est important de remarquer , est la manière irrégulière dont les changemens périodiques de couleur paraissent s'opérer; les uns étant

déjà en partie blancs sur le corps, tandis qu'ils sont encore roux, sur les pâtes, et réciproquement; d'où, il résulte que ces Animaux présentent sous le rapport de leur coloration, une multitude de variations. Cette espèce, dont la fourrure d'hiver est assez répandue dans le commerce, mais n'est pas très-estimée, habite tout le nord de l'Europe, ainsi que les Alpes et le Groenland. Pallas, qui a donné une excellente histoire de cette espèce (F. G. G. G.), dit qu'on ne trouve pas de Lièvres variables conservant en été leur pelage blanc. Il paraît cependant qu'il en existerait dans le Groenland. Le même naturaliste a au contraire trouvé en Russie une variété qui ne blanchit en hiver que fort incomplètement; c'est celle qu'il a désignée sous le nom de *Lepus hybicus*.

LIE -

jjC LTÈvnF. glacial, *Lepus glar*.

: Us, , Suppl. au Voy. du Cap.

rrry. iNous ne connaissons cette espèce que par la Faune américaine de l'Irlande, qui la caractérise ainsi :

Liage blanc ; oreilles noires à l'extrémité, plus longues que la tête ; glcs toi ts, larges et déprimé». Les .mes sont d'un gris blanchâtre, et

femelle met bas huit pelils à la i-s. Cette espèce, à laquelle on doit M.t-étie rapporter le Lièvre variable du Groenland, habite également cette contrée.

ILe Tolai, *Lepus Tolai*, Pal 1.

du empruntons à Pallas les détails ne nous allons donner sur cette espèce encore peu connue. Elle ressemble beaucoup, pour la

taille et les iopoi lions , à notre Lièvre et au itcvi e variable; mais sa tête est plus ulongue, plus comprimée, plus . ioilc Le dos et la tête soul mêlés !! gris et de brun pâles, le dessous h corps étant blanc, et le des. ous du ii'1 jauuâtïc. Les oreilles ont le bord itp-jéiiienjr noir, et les membres sont mulâtres; la queue est noire en desns ei blanche en dessous. Le Tolaï unservc eji biver le même pelage :

uulcmenl ses couleuis deviennent i us pâles dans celle saison. Il babile : Sibérie , la Mongolie , la Ta i tarie ,

se trouve jusqu'au Thibet. Il diffèli beaucoup du Lièvre variable par 's habitudes. Quand, par exemple, 11 lui fait la chasse, il court droit savant lui , et ne tarde pas à se réfu- * er , soit dans des fentes de rochers , mit dans d'autres cavités. Le Lièvre .niable fait, au contraire, de noinireux détuiis, fuyant à la manière te notre Lièvre. Le Tolaï , nommé >trr Cuvier Lapin de Sibérie, tient en 'uclqc sorte le milieu entre la sec- "on des Lièvres el celle des Lapins, cous passons maintenant à l'histoire ee celie-ci.

Ile Lapin ordinaire, *Lepus Cuniulus* , L. Celle espèce, originaire l'Espagne, mais maintenant répan- 'ttie dans loutes les parties ch-uides nu tempérées de l'Europe , et presque artout où le» Européens ont formé

LIE 585

des élablisscmens , est généralement d'un roux-grisâtre tiquelé, avec les pâtes et le derrière du cou roux , et le dessous du corps, de la tête et de la queue blanc. Les oreilles , grisâtres eu dehors , sont en dedans d'un roux tiquelé ; elles ont un liséré noir à la partie supérieure. Le Lapin, quoique fort semblable au Lièvre parles couleurs de son pelage, est une espèce bien distincte, et

dont les mœurs sont même très-différentes. Sa fécondité est plus grande encore, et il élève ses petits dans un terrier qu'il se creuse. Les pelils ne sortent que lorsqu'ils sont déjà Irès-forls et tout-à-fail en état de se suffire à eux-mêmes. Alors même ils s'en éloignent fort peu, et se font un nouveau terrier près de celui où ils sont nés. Le Lapin a été partout réduit en domesticité; aussi l'espèce présente—telle un nombre considérable de variétés. On trouve des individus gris, de blancs, de noirs et de jaunes. Chez d'autres individus, ces diverses couleurs se trouvent mélangées. On nomme Lapin riche une variété remarquable par sa couleur d'ardoise plus ou moins foncée, et Lapin d'Angora une autre variété dont le poil est très-long et très-doux.

Le Lapin des sables, *Lepus arena~nus*, N. Nous nommerons ainsi une nouvelle espèce découverte par Delalande dans les sables du pays des Hottentots : elle est en dessus d'un gris-cendré tiqueté, avec les membres, la gorge, les lianes, le tour de l'œil et le bout du museau roux. La tache du derrière du cou est grise et fort petite; le dessous de la tête est d'un blanc roussâtre, et le dessous du corps est blanc; la queue, pareillement blanche en dessous, est noire en dessus. Les oreilles sont de même couleur que chez le Lapin, seulement avec une tache noire plus étendue à son extrémité. Cette espèce, d'un quart plus petite que notre Lapin, ressemble beaucoup, par les couleurs de son pelage, au Lièvre du Cap, dont elle diffère au contraire beaucoup par ses formes.

384 LIE

Le Tapeti, Azzara, *Lepus Brasiliensis*, L., a le dessus du corps varié de roux et de noir, le derrière du col d'un roux vif, le dessous de la tête et les oreilles d'un roux brunâtre, la joue d'un

roux noirâtre, et la tache oculaire fauve. La poitrine est ioussatre ; le dessous de la tête est blanc , et cette couleur se prolonge en tache jusqu'au-dessous de l'oreille ; le dessous du corps est aussi de cette couleur. Mais le caractère le plus remarquable est l'extrême brièveté de la queue , qui paraît nulle et se confond avec le poil des cuisses. Cette espèce, de la taille de notre Lapin des Sables, habite l'Amérique méridionale. Elle vit dans les bois , et se réfugie sous les troncs d'Arbres, sans se creuser de terriers.

Le Lapin d'Amérique, *Lepus americanus*, Gmel.; L. Hudsonius, Rail., habite l'Amérique septentrionale, et ressemble beaucoup au précédent par les couleurs de son pelage; mais il en diffère par sa queue longue environ de deux pouces, et roussâtre en dessus ; et par ses membres plus allongés. Ses oreilles, qui sont aussi plus longues, sont roussâtres et lissées de noir, et ses pales, surtout les postérieures , en grande partie blanches. Sa taille est d'ailleurs égale à celle du Tapeti avec lequel il a été confondu par plusieurs auteurs, et par Cuvier lui-même. Plusieurs naturalistes ont dit que cette espèce blanchit en hiver; selon Warden , elle devient seulement blanchâtre, au contraire de son Varying-Hase qui devient entièrement blanc.

Le Lapin de Virginie , *Lepus Virginianus*, Harlan, Faun. Amér., p. 196. C'est ce même Varying-Hase de Warden. Harlan le caractérise ainsi : brun - grisâtre en été, blanc en hiver, avec le tour des yeux de couleur fauve-rougeâtre dans tous les temps. Les oreilles et la tête sont presque de même longueur, et la queue est très-courte. C'est , dit Harlan, probablement de cette espèce que parle Lewis dans sa Notice des Animaux du pays du Missouri, lors-

qu'il dit qu'une espèce de Lièvre Variable existe communément dans la baie d'Hudson , la province de New-York, la Virginie, la Pensylvanie, etc. (y. Journal de Ph. et de Métf. de Boston, t. 11 , p. 2.) Au reste , le: Lapin de Virginie nous est encore trop imparfaitement connu , pour que nous ne conservions aucun doute sur son existence réelle , comme espèce distincte.

Lièvres fossiles.

On a trouvé dans la caverne de Kirkdale quelques os appartenant à une espèce de ce genre, et particulièrement un calcanéum , quelques os du métatarse , une portion de mâchoire inférieure , etc. Ces fragmens viennent d'une espèce très-voisine de notre Lièvre , si ce n'est de notre Lièvre lui-même. (V. Cuv. , Oss.

Foss. , T. v). On a trouvé aussi dans les brèches osseuses de Cette, de Gibraltar et d'Uliveto près de Pise(/^ . Cuv., Oss. Foss, T. iv), plusieurs osseimens appartenant aussi à ce genre. Ainsi on a trouvé dans celles de Gibraltar une mâchoire venant d'une petite espèce de Lapin; dans celles de Cette , un grand nombre de fragmens venant, les uns d'une espèce de la taille et de la forme de notre Lapin sauvage, les autres d'une espèce d'un tiers plus petite; et enfin, dans celles d'Uliveto, une' mâchoire qui ne présente, comme une portion des osseimens de Cette, aucune différence avec notre espèce commune ; « ce qui , au reste , comme le remarque l'illustre auteur des Recherches sur les Osseimens fossiles, ne prouve pas davantage pour un lieu que pour l'autre une identité d'espèce. »

ff Lagomys ou Pika , Lagomys.

Pallas a le premier distingué des Lièvres proprement dits tes trois petits Animaux qui constituent ce genre; et il en avait formé

(G lires , p. a 8), sous le nom de Lcpores ecaudati, une section à part, dont Cuvier »

l'ail depuis avec raison un genre sous

LIE

mom de Lagomys. Leurs princiiiux caractères sont d'avoir les oreil- 55 petites , les jambe.-, à peju près égas³, le trou sous-orbitaire simple, les aîvicules presque complètes , et la jaeue nulle. Le sillon de leurs grands incisives supérieures, est beau-ii'up plus prononcé encore que chez 5S Lièvres , de sorte que chacune telles paraît double. Les molaires , uniine Fr. Cuvier l'a constaté, ne unt qu'au nombre de Cinq de chaiue côté, à chaque mâchoire, la esnt postérieure des Lièvres venant «manquer. Au reste , nous avons dit wmbien elle est petite et de peu (.importance dans ce genre lui-mèlee. Lnlin la dernière molaiee incicure n'a sa couionne formée que i.une seule surface elliptique, sans meun sillon, et les membres sont uus courts que chez les Lièvres, jjus les Lagomys ont été trouvés i. Sibérie.

ILe Suxgan , Lcpus pusillus , Pâli., //.,p. ôi ; Lagomys pusillus, Des m.

unis déci ivons celle espèce ainsi que *> suivantes d'après l'allas. Sa taille tt de six pousse-, neuf lignes, cl son liage très- doux , très -fourni , ti csmg , est mélangé de brun et de gris, iec l'extrémité des pieds d'un jauri Ire paie, le dessous dn corps d'un «ne sale , et la goi ge , les lèvres et niez tout-à-fait blancs. Les oreilles oeu près triangulaires sont bordées I blanc. Ce petit Animal vit soitalet si retiré qu'on le prend très- Oicilement , et qu'il est même très ire de le voir, malgré les cris aigus I l'il fait entendre au coucher et au | 'er du i-oleil , et quoiqu'il décèle [Hsi sa pré-

sence. Il habite le plus roivent la lisière des bois , et se nouripai li-
culièrement îles fleurs, des milles et de l'écorce du Cj/îsus supijs,
du Robhiia frulescens et du Ce- ■sus pumila, ainsi que du Pom-
mier itvage.

LLe Pika., *Lepus alpi/ius* , l'ail., ùr. , p. 45 ; *Lagomys alpinus*,
Uesm . , | généralement roux-jaunâtre avec ^elques longs poils
noirs ; le dessus (corps est d'un fauve pâle , le tour

LIL

de la bouche cendré , le dessous des pieds bruns , et les oreilles
rondes et de couleur brune. Sa longueur est de neuf pouces sept
lignes. Celte espèce très-commune, et très-connue des chasseurs
de Sibérie , n'avait échappé aux recheiches des naturalistes avant
Pallas, que parce qu'elle habite les montagnes les plus escaipées
et les rochers les plus inaccessibles, choisissant toutefois des
lieux boisés , humides/, et oii elle trouve en abondance de
l'herbe. Ces Animaux vivent soit dans desteriirs qu'ils se
creusent, soil dans les fentes des rochers, soit même dans des
troncs d'Arbres. Ils vivent tantôt -deux ou plusieurs ensemble ,
tantôt, au contraire , seuls.

Vcis le milieu du mois d'août, ils préparent et font sécher avec
grand soin pour leur provision d'hiver, de l 'bel ne et des feuilles
qu'ils entassent ensuite', et mettent à l'abri , soit sous des ro-
chers, soit dans des troncs d'Aibres. IL se réunissent ordinaire-
ment plusieurs pour ce travail, et proportionnent la quantité de
leurs provisions au nombic îles individus (pii doivent s'en nour-
rir. Les tas qu'ils forment ainsi ont souvent la bailleur d'un

huinme , et un diamète de plus de huit pieds. Cel instinct admirable, ce soin -de l'avenir ont rendu ces petits Animaux célèbres dans toutes les contrées qu'ils habitent. Au reste, il ai rive souvent que leur travail presque incroyable, et la peine immense qu'ils se sont donnée pour la préparation cl le transport d'une aussi grande quantité d'berbag.s, sont tout-à-fail perdus pour eux ; car ce» amas sont, à cause de leur hauteur, très- fréquemment découvert-, par les chassciirs qui vont à la recherche de la Zibeline, et fournissent alors à la nourriture de leurs chevaux.

L'Ogoton, JLi'pus Ogolona, Pall. , p- 5g; Lagomys Ogolona, Desm. , est généralement d'un gris pâle , avec les pieds jaunâtres et le dessous du corps blanc. Les oreilles sont ovales ; on remarque à leur base quelques poils blancs. Celle espèce , un peu

386 LIE

plus grande que le Sulgan , se trouve particulièrement au-delà du lac Baillai , dans la Mongolie el dans les montagnes pierreuses de la Sélenga.

Elle sort rarement pendant le jour.

Son cri esl un sifflement très-aigu , qui se distingue très-facilement de celui du Pika et de celui du Sulgan.

Elle se nourrit d'écorce d'Aubépine et de Bouleau, mais surtout de diverses Plantes qui croissent dans les sables , et d'une espèce de Véronique qui végète même sous la neige. Com- • me l'espèce précédente , elle fait des provisions pour l'hiver, formant des tas de forme hémisphérique d'un pied environ de hauteur. On en voit dès le mois de septembre une grande quantité ; mais

au printemps , lors de la fonte des neiges, tous ont disparu, et il reste à peine quelques débris.

Ce petit Animal fait, dit Pallas , la principale nourriture du ChatManul.

Il a aussi pour ennemis diverses espèces d'Oiseaux de proie diurnes et nocturnes , et plusieurs petits Quadrupèdes carnassiers , comme l'Hermine.

Lagomys fossiles.

Cuvier (Oss. Foss. T. iv) a décrit divers ossements fossiles de Lagomys trouvés dans les brèches osseuses de Corse et de Sardaigne. On a trouvé dans les premières un crâne ressemblant beaucoup à celui du Pika; cependant l'orbite du Lagomys fossile est plus grande et le crochet de la base antérieure de l'arcade zygomatique plus saillant. Dans celles de Sardaigne on a trouvé des dents et des portions de mâchoire annonçant une espèce plus grande que l'Ogolon , mais un peu moindre que le Pika et le Lagomys fossile de Corse.

Il était naturel de soupçonner qu'elle ne différait pas de cette dernière ensevelie dans une île voisine; mais il n'en est rien. Les parties supérieures de la tête ne sont pas semblables, non plus que le trou sousorbitaire ; et l'arcade zygomatique n'est pas inclinée de même.

Outre les Lagomys, on avait enco-

LIG

re placé parmi les Lièvres quelques Animaux encore peu connus , et qui doivent être rapportés à des genres bien différens.

Tels sont le Cuy , petit Animal du Chili , de la taille d'un petit \Rat, à queue presque nulle, qui airaitbien les deuls des Lièvres, mais qui n'a que quatre doigts aux pieds de devant , el qui en a , au contraire, cinq à ceux de derrière; le Pampa, qui paraît être, comme l'a reconnu Desmàrest, un véritable Agouti {V. Ciloromys); et le Viscache, Quadrupède fort répandu dans l'Amérique méridionale, et qui n'a, comme le Pampa, que quatre doigts en avant et trois en arrière [V. Viscache). Enfin l'Hélamys du Cap a reçu le nom de Lièvre sauteur, et l'Alagtaga celui de Lièvre volant.

Le Lièvie des Indes paraît êlie le Gerbo (F»; pour tous ces mots, Gerboise.), et le Lapin d'Aroé est le Kangaroo Filandre. (y. Kangtjboo.)

(is.g. ST.-H.) LIÈVRE, moix. Nom vulgaire et marchand d'une fort grande Porcelaine , le *Cyprœa testudinaria* , L. (b.)

LIÈVRE DE MER. rois, moll.

On a indifféremment donné ce nom à des Poissons tels que le *Blennius ocellaris* et le Cycloptère Lump, ainsi qu'aux grosses Aplysies. V. ces mots.

LIEVRITE. min. (Werner.) V. !

Fer calcahé-siliceux.

LIGAMENT, zool. conçu. On appelle ainsi en analomie les parties g blanches , tendineuses el résistantes qui servent à unir les os entre eux et r à solidifier lès articulations. Ce mot a également été employé en conchy- L liologie pour désigner la partie qui réunit el maintient les deux valves \ des Conchifères. C'est

dans ce dernier sens seulement que nous entendons ce mot. V. Coquille. (d..ii.) j

LIGAN. iNS. C'est une espèce d'A- F beille indéterminée de la grandeur de celles d'Europe , qui fait son nid dans les Arbres creux aux Philippines.

lig

* LĪGANS. nĒPT. satjr. Le grand Lézard africain de quatre pieds de

I Ion s? mentionné par Barbet comme un manger délicieux pour les nègres ,

i est peut-être quelque Iguane, dont le nom serait une corruption de Léguan. (g.)

LĪGAR. sicn.L. Nom donné par . Adanson (Voy. au Sénégal, p. i 58, pl.

10, (ig. 6) à une Coquille du genre 'Turbo, Turritelle de Lamarck ; c'est I la Turritella terebra de cet auteur.

* LĪGATULE. uoT. cuypt. Nom] proposé par Bride] pour désigner en I fiançais son genre Desmatôdon qui m'a pas été adopté. V. Tmchôstomk.

LIGĪTFOOTIE. Ligàtfootia. bot.

ipiian. Genre établi par l'Héritier {(Sertum Angl. , p. 4) pour la Lubelia itenella, L., Mant., ou Campa/iUla vtènella , L., Suppl. Ce genre diffère ides Campanules par les caractères esuivans : le calice est adhérent par sa lbase avec l'ovaire, divisé supérieurement en cinq lanières ; la corolle test monopétale à cinq divisions très-

| profondes , ce qui lait que la co-olle jparaît formée de cinq pétales ; les Staminés, au nombre de cinq, ont Heurs filets élargis et comme squamimilorines. L'ovaire est semi-infère, à ttiois ou cinq loges contenant un Hfland nombre d'ovules. Le style est tpmple , terminé par un stigmatte à (trois ou cinq lobes étoiles. Le fruit eest une capsule couronnée par les IJobes du calice, à dois ou cinq loges cet s'ouvrant en trois ou cinq valves.

L'Héritier (lue. cit.) figure deux es- Ipèces de ce genre : Lightfootia uxicucteoides , t. -i , ou Lvbclia tcnella, L , ffiant. , qui croît au cap de Bonnel'Espérance , et Lightfootia sitbulata , U. 5 , également du Cap.

Il y a encore plusieurs autres genres JJghijbotla. Ainsi Screiber a lait, !«ous ce nom , un genre de Rubiacées TOui doit être réuni au Ro/it/e/e/ia.

IUn autre genre JAgklfootia a été établi parSwarlzl. Il est voisin du Proc- Ifia. Mais le genre de l'Héritier doit

seul retenir le nom du botaniste Ligblfoot, à cause de son antériorité.

Il sera donc nécessaire de donner un autre nom au gem e de Swai tz. (a. b.)

UGIE. Ligia. ciust. Genre de l'ordre des Isopodes, sect'on des Terrestres , famille des Clopoi t ides , établi par Fabricius aux dépens des Clopoites de Linné, et ayant pour caractères : antennes latérales ou apparentes , terminées par une pièce composée d'un grand nombre de petits articles; extrémité postérieure du corps ayant deux pointes fourchues j quatorze pales semblables, onguiculées, attachées par paiies aux sept premiers segmens du coips;

queue composée de six segmens garnis en dessous de dix lames ou écailles disposées par imbrication sur deux rangs longitudinaux. Fabricius avait placé d'abord l'espèce la plus connue de ce genre avec ses *Cymothua*; et ce n'est que dans le Supplément de son Entomologie systématique qu'il l'en a distinguée. Quoi qu'il en soit, les Ligics sont faciles à distinguer des Aselles, des Idolées, des Spéroïnes, etc., par leurs antennes dont les inlei médianes sont très peu apparentes, tandis qu'elles le sont beaucoup dans tous ces genres. Elles s'éloignent des Lilioscies, des Cloportes et des Poicellions, par des caractères de la même valeur et par les appendices de l'extrémité postérieure du corps. La bouche des Ligics est composée d'un labre, de deux mandibules, d'une languette et de deux paires de mâchoires. Le labre, presque membraneux, en demi-ovale transversal, un peu voûté au milieu, est fixé au bout de l'extrémité antérieure de la tête, qui représente une espèce de surlabre ou de chaperon transversal. Les mandibules, qui sont crustacées, sont beaucoup plus épaisses à leur base, robustes, comprimées et brusquement arquées. Le côté interne de leur extrémité est élargi, concave dans son milieu, avec la pointe supérieure comme écailleuse, noirâtre, et divisée en quatre dentelures obtuses.

588 LIG

ses. La mandibule gauche diffère de la droite par ses dentelures qui sont plus prononcées. La languette est située immédiatement en dessous et dans l'entre-deux des mandibules; elle se compose de deux pièces réunies en demi-cercle. Les deux mâchoires supérieures sont presque membraneuses, dirigées obliquement et convergeant ensemble; elles sont divisées jusqu'à la base en deux pièces allongées et étroites, presque linéaires, com-

primées, et dont l'une supérieure et un peu plus interne; celle-ci es! plus petite et terminée par quelques longs cils réunis en faisceau pointu et dirigé brusquement en manière de crochet, vers l'extérieur de la bouche. Cette division représente, en quelque sorte, le palpe fia gel li for me des pieds-mâchoires des Crustacés Décapodes; l'autre division est écailleuse et dentelée à son extrémité supérieure, avec quelques cils au-dessous sur le bord interne. Les mâchoires suivantes sont membraneuses, en forme de valvules qui emboîtent la face postérieure des mâchoires précédentes, leur bout est arrondi et snns dentelures. Les deux piedsmâchoires sont membraneux, trèscomprimés , pareillement concaves sur leur face antérieure ou interne et divisés en six articles; le premier est beaucoup plus grand , en forme de carré long , de sorte que les deux premiers articles étant contigus l'un à l'autre, et par une ligne droite, au bord interne, imitent une sorte de lèvre; leur extrémité supérieure et interne se prolonge comme une division labiale ; les autres articles composent, par leur réunion , une pièce triangulaire ou conique ; oblusément dentelée au côté interne, et munie extérieurement de quelques petites épines géminées ou ternées. On pourrait regarder cette pièce comme représentant un palpe inséré près de la base extérieure de la dilatation terminale de celte fausse lèvre. Telles sont les parties qui composent la bouche des Ligies; à l'exemple de Latreille, nous avons un peu insisté

LIG

sur leur organisation parce que Fabricius n'avait' donné que des descriptions très-incomplètes de ces organes. Les Ligies ont la tête emboîtée dans une échancrure du premier segment du corps; elle est en forme de cône transversal. Les yeux sont assez

grands, arrondis, concaves et composés d'un très-grand nombre de facettes hexagones; les antennes sont insérées sur une ligne transversale à la partie antérieure de la tête et près de la base du chaperon ; elles sont très-rapprochées et semblent partir d'une base commune ; les latérales ou extérieures sont sétacées , de la longueur de la moitié du corps dans l'espèce commune , de six articles , la plupart cylindriques, dont les deux premiers sont courts , et les trois derniers allongés ; le sixième ou le terminal est le plus long, composé, dans cette même espèce , de treize petits articles et terminé insensiblement en pointe. Les antennes moyennes s'insèrent au côté interne des précédentes , elles sont très-petites, filiformes , de deux articles comprimés, dont le dernier est obtus. Les segments du corps sont beaucoup plus larges que longs , au nombre de treize ; dans les derniers, l'angle antérieur se prolonge en arrière , en manière de pointe ; les pattes sont portées par les sept premiers segments antérieurs ; elles sont insérées sur les côtés inférieurs du corps , et elles ont çà et là quelques petites épines ; elles sont composées de six articles dont le premier se dirige vers la poitrine et forme ensuite, avec le suivant , un coude ou un angle. Le dernier article des pattes est écaillé , pointu au bout avec une petite dent au-dessous. Les dernières pattes sont un peu plus longues et vont en arrière. Ce que l'on nomme la queue chez les Crustacés, est formé par les six segments postérieurs ; ils sont plus courts que les précédents , excepté le dernier qui est presque carré, avec le bord postérieur arqué , arrondi au milieu, échancré et unidenté de chaque côté; il donne alla-

LTG

i clic à deux styles, plus ou moins longs, dirigés en arrière, et compo- : ses chacun d'une pièce comprimée , • tranchante sur les bords , et ayant . à l'extrémité deux pointes coniques, ; allongées et presque égales; l'inté- : rieure est seulement un peu pl.:s longue , et offre à son extrémité un très—] petit article allant en pointe. Ou voit : sur la surface inférieure de chacun i de ces six segmens , deux feuillets i membraneux , transparens, qui sont i en triangle curviligne , et servent de 1 nageoires et de branchies. Les feuillets de la paire supérieure sont plus jpetits. Les deux suivans , dans les i mâles, portent à leur hase interne <et inférieure , un appendice membraneux, long et linéaire. Quoique les ILigies soient très-communes sur nos icôtes , leurs mœurs nous sont encore iinconnues ; nous savons seulement (qu'elles fréquentent assez les embouchures des rivières et des fleuves, et (qu'elles se cachent sous les pierres (Ou les amas d'objets et de Plantes irejetées par la mer. filles se roulent ssur elles-mêmes ainsi que les Cloporttes , auxquelles elles ressemblent sous [beaucoup d'autres rapports; elles sont ttrès-agiles , grimpent avec facilité sur lies rochers et sur les constructions ■ maritimes dans les endroits hutrtides, «et si elles aperçoivent le moindre (danger elles se laissent tomber en irepliant lcuis pâtes sous le corps (qu'elles mettent en boule. L'e>pècc la plus commune sur nos "côtes et que l'on trouve aussi sur celles de L'spafgne , est :

La Ligik océanique, L. océanien, IFabr., Latr. ((Jrn. Crusfl et Ins.', ILeach.; Oniscus océaniens, Linn.;Cloiporte océanique, 01 iv. , Baster(Subst.

m, lab. i3, fig. 4); IJgia oceanica , IPcnnant (Zool. HislJ T. jv, lab. i8, tfrg. 'i). Antennes extérieures de moittié plus courtes que le corps, ayant Heur dernier segment composé de ttreize articles;

styles de la queue à epeu près égaux entre eux, et aussi [Jongs que cette queue. Corps long da'cnviron un pouce , jaunâtre. On ppeut rapporter à ce genre, les Onis-

LIG 089

eus assimilis, Linu., Baster.; Oniscus agi lis, Panz.; Oniscus kypnoi -uni , Gu- Vier, etc., etc. (g.)

LIGNEUX, bot. chim. Fourcroy donnait ce nom , que DeCandolle a proposé de remplacer par celui de Lignine qui est plus correct, à un principe immédiat formant la base de tons les corps Ligneux. Il est incolore, inodore, insipide, plus dense que l'Eau, en fila mens ou fibres trèsflexibles et d'une grande ténacité. Ce principe résiste à la plupart des a gens chimiques; il est parfaitement insoluble dans l'Eau soit à froid soit à chaud, dans l'Alcohol , l'Elher, les huiles fixes et volatiles. Les Alcalis et le Chlore, lorsqu'ils sont étendus de beaucoup d'Eau, ne lui font éprouver pre-.qu'aucune altération. Pour l'intelligence des phénomènes que ce corps présente lorsqu'il est soumis à l'action de l'Acide sulfuriqu¹, de l'Acide nitrique et du Feu , il est nécessaire d'en connaître la composition. Selon Gay-Lussac et Thénard, le Ligneux du Chèue est formé :

d'Oxigène 4i , 78; de Carbone 62, 55; d'Hydrogène 5, 69; ou de Carhone 5a, 55, d'Hydrogène et d'Oxigène dans les piopo: lions nécessaires pour foi mer l'Eau 47, 47. Cet le composition est très-analogue à celle del'Acido acétique ainsi qu'à celle de plusieurs autres principes végétaux ; mais pourtant quelle différence dans leurs propriélés physiques! Quoi de moins analogue en apparence que du bois et de l'Acideacétique! Pour expliquer cette différence de propriétés que présenleni des substances dont la com-

position est près pi'idenlique, Gav-Lussac a émis l'hypothèse , qu'un arrangement de particules différent dans les deux corps est la seule cause des propriétés qui les distinguent l'un de l'autre. Là théorie de Gay-Lussac sur la composition des corps organiques est aussi très-favorable à l'explication des changemens ou transformations que ces corps subissent par les agens chimiques. Eu" effet , si les éléinens qui composent les corps orgauiques

590 LTG

sont en proportions telles qu'on puisse considérer ceux-ci comme formés d'Eau , d'Hydrogène carboné ou d'autres combinaisons binaires unies à du Carbone oa à d'autres corps simples ou combinaisons de corps simples , on conçoit que la plus Jégère soustraction ou addition d'une de ces combinaisons binaires devra faire varier la composition et les propriétés des corps organiques. C'est ce qui résulte des curieuses expériences de Braconnot de Nancy, relatives à l'action des Acides sur le Ligneux. En traitant à froid dans un mortier de verre, par l'Acide sulfurique concentré, du Ligneux pur tel que des vieux chiffons de toile de chanvre, ce chimiste a obtenu une masse mucilagiueuse tenace , exempte de matière charbonneuse et qui était soluble dans l'Eau. Après avoir neutralisé l'Acide par de la craie ou mieux par de la litharge , il a filtré , fait évaporer la liqueur, et le résidu était une substance à laquelle il a donné le pom de gomme artificielle , nom impropre, selon Chevreul , puisqu'elle ne produit point d'Acide saccholaclique. Cependant cette substance a entièrement l'aspect vitreux , le goût fade et inodore de la gomme arabique. Elle rougit la teinture de Tournesol , mais l'Acide qu'elle renferme n'est pas le sulfurique , puisque sa solution n'est pas précipitée par les Sels de baryte. Si l'on fait bouillir, pendant dix

heures , la substance gommeuse en question dans l'Acide sulfurique étendu , on la transforme en sucre et en un Acide que Tliénai d présume être de l'Acide hyposulfurique uni à une matière organique , et que Braconnot a nommé végéto-sulfurique. Le sucre a une grande ressemblance avec celui de raisin. Il cristallise en petites lames réunies en globules ; sa saveur est fraîche et franche; il se dissout dans l'eau et dans l'Alcool bouillant, et se convertit en Alcool au moyen de la levure; 100 parties de Ligneux donnent j 14,7 de sucre. L'Acide nitrique agit aussi à l'aide de la chaleur

LTG

sur le Ligneux, de manière à produire une substance blanche qui semble à celle obtenue par l'Acide sulfurique. La Potasse caustique, chauffée avec le Ligneux , le ramollit et le dissout presque instantanément; et si l'on étend d'eau cette solution, on peut en précipiter par l'Acide sulfurique une substance que Braconnot a nommée l' mine' artificielle. Celle-ci, après avoir été lavée et séchée, est noire comme du charbon, très-fragile, peu sapide, inodore, insoluble dans l'eau froide , mais soluble dans l'eau bouillante qu'elle colore en brun. Elle se conduit avec les bases solubles comme un Acide faible.

Le Ligneux, distillé dans une cornue, donne lieu à un dégagement d'eau , d'Acide acétique, d'huile empyreumatique , d'Acide carbonique , et d'Hydrogène carboné. Le résidu est du charbon qui a la forme du Ligneux et dont la quantité est de 18 (à 19 parties pour 100.

Les usages du Ligneux sont fort, importants dans l'économie publique.

C'est ce corps qui réuni en couches j nombreuses et concentriques dans ^ les Aibres dicolyédons , et en fi- { br.es disséminées dans les Monoco— lyldous , constitue le bois propre à la confection des ouvrages de charpente, de menuiserie , etc. , etc. V.

Bois. Le Ligneux des Plantes herbacées , disposé en faisceaux longs, flexibles, faciles à séparer du lissu cellulaire adjacent , sert à fabriquer les cordes et les fils dont ou compose les tissus. J'. particulière- »

ment les mots Chanvre, Lin et <-< Piormium. L'emploi secondaire de te ces tissus pour la fabrication du pa- » pier.cst tellement connu que nous k ne croyons pas devoir en parler ici. k Les singulières transformations dont t Braconnot a montré que le Ligneux « est susceptible augmenteront proba- j< blement un jour les avantages d\$ l.

cette substance pour la société. (g..N.) t

* LIGNIDIUM. bot. crypt. {Cham- i pignons.) Ce genre établi parLink se ;• présente sous forme de conceptacles [

LIG

gglobuleux portés sur une membrane féalée; ilssontsimples ,> membraneux, ■ irrégulièrement déchirés, renfermant ddc flocons adliérens , distincts des ssporidies ou séminales qui sont réuîmies. Il est voisin des Pilocarpii/m , iStro/igyliurn , Enteridium et Dipli- Utfcerium; il figure dans la série des MVlycéto-déens , ordre des Gastiomyccictis. Deux espèces sont décrites par les auteurs ; ce soin : i o Le Lignidium imuscicula que Fries a fait connaître idans ses Observations mycologiques cet qui forme sur

plusieurs Hypnites de petites taches blanchâtres de (quatre à six lignes de largeur; 2° le *Leptogium flavum* qui est le type du genre (Link, *Lich. Mag.*, p. 24, T. m, fig. 107); il naît sur le bois mort; ses conceptacles sont gris-jaunâtres à l'extérieur; les flocons intérieurs jaunies; les séminules brunes. (a. F.)

* LIGNINE, bot. CHIM. (De Cantoille, *Théorie Elém. de la Botanique*.) Syn. de Ligneux. /". ce mot.

LIGNIPERUE. Ligniperda. ins.

?Nom donné par Piallas (*Spicilegium Zoologicum*) au liostiche Tarière, f.

UBOSTHICUI!. (G.)

LIGNITE, oéol. En parlant de la Houille (/". ce mot), il ne nous a pas paru possible de séparer entièrement l'histoire de ce dernier combustible «le celle du Lignite ni de celles de l'Anthracite et de la Tourbe, parce que toutes ces expressions, sans être synonymes, ne désignent cependant, à dire vrai, que des modifications, l'état charbonneux, auquel ont passé les substances végétales enfouies à des époques plus ou moins reculées, sous les couches dont la terre s'est successivement enveloppée depuis l'existence des corps organisés. Pour le minéralogiste le Lignite pourrait être uniquement tout noir foncé, d'un noir plus ou moins foncé, quelquefois d'un brun clair, brûlant avec flamme, sans beaucoup de fumée, sans se boursoufler et se prendre en une masse, comme le font la plupart des Houilles, sans se fon-

dre et couler comme le font les Bitumes , répandant une odeur désagréable, acre et piquante, présentant essentiellement dans son tissu l'organisation fibreuse du bois, et laissant enfin pour résidu, après la combustion, une cendre pulvérulente , assez semblable, par son aspect et sa composition , à celle des Végétaux; quel que soit d'ailleurs le gisement du combustible , ainsi caractérisé ; le Lignite alors pourrait se rencontrer dans le même lieu , dans la même couche , dans la même masse avec de l'Anthracite, de la Houille et de la Tourbe; mais d'un autre côté , pour le géologue , qui tient moins compte des variétés de forme, de couleur, de propriété des substances , que de la place qu'elles occupent dans le sein de la terre , le Lignite pourrait être, au contraire, toutes matières charbonneuses quels que soient leurs caractères extérieurs, mais qui sont propres exclusivement à certains terrains , tandis qu'il regarderait comme Anthracite , comme Houille , comme Tourbe , des matières quelquefois semblables aux premières, et seulement distinctes par leur gisement ; il résulte de ces deux manières de voir que le Lignite, considéré minéralogiquement, serait toute autre chose que le Lignite considéré géologiquement, et que la même expression deviendrait commune à deux idées très-distinctes, inconvénient grave, auquel on se proposerait imparfaitement de remédier, en distinguant l'espèce minéralogique de l'espèce géologique , si toutefois encore le mot espèce pouvait être ici employé pour ne signaler dans un cas que certains modes d'altération d'une même substance, et dans l'autre que les diverses circonstances de gisement de cette substance altérée de plusieurs manières ; nous sommes loin de penser que l'on puisse en agir ainsi , parce que nous croyons qu'on ne saurait trop attacher d'importance à conserver aux mots, tou-

jours la même valeur, surtout dans l'étude des différents branches de l'histoire Naturelle

ôgi LIG

turelle, qui sont trop intimement liées entre elles, pour que le langage scientifique ne doive pas rigoureusement être le même pour toutes. Or quelle parité, quel rapport d'idée pourrait-on établir entre ce que l'on appelle une espèce de Mammifère, d'Oiseau, de Plante, de Minéral, qui sont des corps finis et caractérisés par leur forme, leur organisation, leur composition, avec ce que l'on appelle a, par exemple, l'espèce géologique du Lignite qui comprendra la collection de diverses nuances d'altération, subies par les Végétaux trouvés dans le sein de la terre, depuis telle couche jusqu'à telle autre couche presque arbitrairement !

Les coupes, les divisions facilitent, il est vrai, l'étude, mais la géologie est une science de généralités qui, comme la physiologie, repousse par sa nature l'emploi de toute nomenclature trop systématique; elle se compose essentiellement de faits et d'observations qu'il est plus nécessaire de coordonner et lier entre eux, qu'il n'est utile de les isoler, et qui ne peuvent, dans tous les cas, être distribués méthodiquement dans différents ordres, des genres et des espèces distinctes, comme on peut le faire pour des êtres et des corps nombreux, tels que des Oiseaux, des Insectes, des Plantes, des Minéraux, etc., qu'il s'agit de distinguer les uns des autres. L'inconvénient que nous venons de signaler, celui de prendre dans une acception toute différente le mot Lignite, existe réellement, ainsi que l'on peut s'en convaincre en étudiant les ouvrages des minéralogistes comparativement à ceux des géologues, et nous croyons que pour l'éviter il faut d'une part ne pas vouloir désigner sous ce nom une espèce minérale douée de

propriétés et de qualités particulières, et par conséquent caractérisée d'une manière précise , et que d'une autre part on ne doit pas non plus comprendre sous cette dénomination , ol comme espèce géologique , tous les charbons fossiles qui se rencontrent dans certaines cou-

LIG

ches de la terre exclusivement; en conservant au mot Lignite le sens consacré par l'usage , dans le langage habituel des géologues, quelqu'arbitraire , quelque peu philosophique qu'il paraisse, on ne s'expose pas du inoinsà donner des idées fausses, comme il peut arriver qu'on le fasse si l'on cherche à couvrir le vague qui ne peut être réellement dissipé , par une apparence d'exactitude et de précision qui n'est que trompeuse. Nous entendons, d'après cela, par Lignite, avec la part des géologues : 1 ° les bois et les Plantes carbonisés dans le sein de la terre, qui ont conservé leur forme originelle ou au moins l'organisation ligneuse, dans quelques formations qu'ils se rencontrent ; 2° les couches régulières , les amas constans ou accidentels de matière charbonneuse¹, pure ou mélangée, dont l'organisation végétale peut n'être plus aperçue dans toutes les parties, mais qui se rencontrent dans les terrains de formation postérieure à celle des terrains homogènes bien caractérisés (V . Houille). Quoique pouvant se rencontrer dans presque tous les terrains , chacune des diverses variétés principales de matière charbonneuse prédomine cependant dans des systèmes de couche dont l'âge est différent , et la distinction minéralogique des charbons de terre désignés d'après leurs caractères extérieurs^ leurs propriétés et leurs usages par les noms d'Anthracite , de Mouille , de Lignite et de .Tourbe , s'accorde assez bien, d'une manière générale , avec

l'ancienneté de formation et les circonstances de gisement de ces variétés. Ainsi l'Anthracite appartient principalement aux plus anciens terrains de transition; la Houille moins ancienne abonde dans les premiers terrains secondaires. Le Lignite, déjà commun dans les derniers de ceux-ci, paraît plus exclusivement propre aux terrains tertiaires dont les assises les plus modernes renferment la Tourbe proprement dite. Voigt paraît être le premier qui, sous le rapport géologique, ait cherché à faire bien res-

LIG

((sortir l'accord de certains caractères (extérieurs des Lignites, avec leurs teiscmens, et qui ait proposé de les séparer des Houilles proprement dites. Cette distinction, bonne comme considération générale, admise par Werner, qui désignait les Ligniites, sous le nom de lignunkuhle, dont il distinguait plusieurs variétés, adoptée et établie en France, par DuRoi et Alex. Brongniart, est maintenant généralement reçue; ce dernier savant qui a fortement appuyé sur la nécessité de la distinction, a proposé dernièrement, comme résultat de ses observations sur cet important sujet, de classer tous les gisements de Lignites connus sous quatre types principaux que l'on désignerait, suivant lui, par les dénominations de : 1° Lignite du Lias; 2° Lignite de l'île d'Aix; 3° Lignite; soissonnois; 4° Lignite superficiel.

Le Lignite du Lias comprendrait non-seulement les bois fossiles carbonisés que renferment les couches calcaréo-argileuses, incluant les esau Calcaires oolitiques, mais aussi ceux qui contiennent non moins fréquemment les dépôts de même nature qui séparent la grande formation des Calcaires du Jura en plusieurs groupes, ou qui la recouvrent, tels que les Argiles de Dives (Olivet clay), les Argiles de Hontliur (Américain clay). Le

Lignite de cette période qui commence après le dépôt du Calcaire alpin et s'ari è'.e à celui des sables ferrugineux et sables vei ts [Irun et Green Sand) 'exclusivement, se trouve le plusori diiii- reir.ent en fragmens disséminés • ou en petits amas qui sont visible- ;meut les débiis de Végétaux muiinicolylédones et dicotylédones, p.» nui [lesquels on a reconnu quelques feuiille.idc Fougères; presque toujours les i morceaux isolés et qui paraissent savoir été fracturés et hulottes avant Heur enfouissement sont pénétrés de -sulfure de Fer, et souvent leur surlacce est recouverte par de grande- Huîtres ou de petites Grypliées qui y «Adhèrent fortement. Les bancs soli- >;dcs de Calcaire marneux en reulcr-

LIG Sgô

ment moins que les couches argileuses ; on ne connaît aucune exploitation importante de ce Lignite, dont les usages sont presque nuls.

Le Lignite de l'île d'Aix, ainsi nommé d'après le gisement bien constaté, sur les côtes de Bretagne, piès de Rochel'ort, de bois caihonisés en amas et même en couches dans les sables qui séparent le terrain ooliti— que de la Ci aie, réunirait naturellement tous les dépôts de la même époque, qui sont n ès abondans sur les côtes sud de l'Angleterre , notamment dans le sable ferrugineux d'HastingS, où le Lignite se trouve le plus fréquemment en bancs réguliers , considéi ables , qui alternent plusieurs fois avec ceux de Grès et d'Argile, à la manière des charbons de terre auxquels il ressemble par les caractères extérieurs, et par les exploitations auxquelles il donne lieu. Ce Lignile est souvent accompagné de cristaux de Quartz hyalin qui tapissent les fis.Mires, et des cavités qui paraissent avoir été pi aliquées dans le bois dont il provient , par des larves ou des Vers marins, sont remplies de Silex

Calcédoines. Le Fer : ulluré se (encontre avec lui de même qu'avec le Lignite du Lias, et l'on a recueilli notamment à l'île d'Aix, au milieu des amas de bois , et dans les couches sableuses et marneuses ui les enveloppent , des nodules 'une matière résineuse, brune ou d'un jaune orangé, qui, d'après l'analyse qui en a été faite , parait contenir beaucoup moins d' Acide succinique, que n'en contient le succin des loi mations supérieures à la Craie»

Presque toutes les tiges reconnaissables dans le Lignite de l'île d'Aix, annoncent des Végétaux dicotylédones, dont quelques-uns au milieu de la masse charbonneuse ont été changés en Silex. On a reconnu dans le même lieu de véritables J'utus; les lossiles caractéristiques sont marins ; mais ils se trouvent plutôt dans les couches supérieures au Lignite qu'avec celui-ci même; ce sont des Béleinnites, des Nautilés {N. triangu-

384 LIG

laris), des Sphérulites , les Ichthiosarcolttes de Desmarest , les Gryphœa Aquila et Columba , le Pecten.

quinqi/ecusla/us , etc., et quelques ossemens qui paraissent avoir appartenu à des Reptiles et des Poissons.

Le Lignite soissonnois, postérieur a la Craie , mais antérieur au Calcaire grossier parisien et peut-être même en partie du même âge , appartiendrait presque'exclusivemenl , d'après Brongniart , à l'époque de la formation de l'Argile plastique qu'il faut regarder comme la plus importante pour la production des Lignites, puisque le savant dont nous analysons dans ce moment les opinions particulières, croit devoir rapporter à la même époque , non-seulement toutes les couches carbonifères qui

donnent lieu à de nombreuses exploitations dans les vallées de l'Aisne, aux environs de Soissons et de Laon, auprès de Château-Thierry, d'Epernay, etc.; tous les dépôts de combustibles charbonneux du bassin de Paris, et qui ont été découverts à Auteuil, à Marly, à Mantes', à Dieppe, mais encore une grande partie des gîtes puissans de charbon de terre, exploités depuis long-temps dans le midi de la France, comme de véritable Houille, tels que ceux des mines de Saint-Paulet près du Pont-Saint-Esprit, de Mimet, de Saint-Savournin, Gréasque, Gardannes, La Cadière, Fuveau, Peynier, Roquevaire, Martigues, etc., dans le département des Bouches-du-Rhône, entre Marseille, Aix et Toulon, ceux des mines d'Étrembert en Savoie; tous les charbons exploités dans la grande vallée de la Suisse qui sépare le Jura des Alpes; tels que ceux de Vernier, près Genève, de Paudex, de Moudon, près Lausanne, de Saint-Saphorin, près Vevey, de Kœpplnach près Horgen sur le lac de Zurich, d'Onnengraben, près du lac de Constance, etc., depuis qui font tous partie du grand amas de roches d'aggrégation, connu sous le nom de Molasse, et dont la formation paraît en effet correspondre à celle de notre Argile plastique pari-

LIG

sienne jusques et y compris peut-être même celle de notre Gypse à ossements.

Le Lignite soissonnois aurait donc pour caractère principal de former «> souvent des couches puissantes qui se alternent avec des Grès, des Sables et des Argiles, et de se présenter sur une grande étendue, dans les terrains qui sont immédiatement supérieurs à la Craie; il est souvent trié—Wangé avec ces Argiles et ces Sables, (j) de manière que l'on ne saurait recon-

naître dans le tissu de toutes ses parties une organisation végétale; il semblerait être, au contraire, le plus souvent comme la plupart des Houilles, le G produit de la trituration de parties A charbonneuses qui n'auront été transportées et déposées qu'après cette opération; il renferme du Succin dans lequel l'Acide succinique est en une quantité notable, du Mellite, du Bitume, du pétrole, et parmi les Minéraux proprement dits du Zinc et du Fer sulfuré, du Gypse en cristaux, de la Chaux carbonatée, de la Strontiane sulfatée, du Silex agatè, du Quartz hyalin. Les fossiles végétaux et animaux qui l'accompagnent sont très variés et très-abondants; parmi les premiers on n'a pas reconnu de Planètes marines, mais des Plantes terrestres très continentales ou marécageuses, comme point de Fougères, ni de tiges ni de (feuilles de Plantes semblable* à celles, qui caractérisent les véritables Houilles; les grands Végétaux y sont ordinairement croisés et couchés dans tous les sens; bien que dans plusieurs localités on cite des troncs d'Arbres volumineux qui ont conservé une position verticale. Les Animaux observés dans les divers gîtes de Lignite soissonnois, ne sont pas en moins grand nombre que les Végétaux.

\J Antliracotlierium de Cuvier (Recherches sur les ossements fossiles, T. m, p. 098), des os de Mastodontes et une tête de Castor, ont été trouvés, le premier dans les Lignites de Cadibona, et les autres dans le Lignite de Kœpl'nach, près Horgen sur le lac de Zurich. Les Mollusques re-

LIG-

Lucilles se rapportent presque tous à des Animaux des eaux douces, et quelques-uns à des Animaux marins; ces uns et les autres se voient quelquefois mêlés dans les mêmes couches, :

tandis que d'autres fois des lits, uniquement remplis de Coquilles d'eau douce, alternent à plusieurs reprises avec des lits d'apparence imai me (Soissonnois). Parmi les Coquilles d'eau douce on a distingué cinq espèces de Planorbes , autant de Paludines , des Planorbis , des Ménétries, des Ménélopsides , des Néritines , des Aknécyles , des Cyprènes , et parmi les Coquilles marines des Cérithes , des Wmpullaires , des Huîtres.

La dénomination de Lignite superficiel de Brongniart , serait réservée à tous les liamens ou amas de bois charbonneux , plus ou moins altéré , qui, sans avoir les caractères de la Tourbe (ce mot), seraient plus modernes que le Lignite soissonnois, fût même que tous les bancs solides (des derniers dépôts d'eau douce des terrains parisiens , ceux enfin qui forment seulement partie des couches meubles superficielles et dont les bois accumulés dans Pile de Chatou , près de Saint-Germain-en-laye , ceux du Port-à-l'Anglais sur les bords de la Seine au-dessus de Paris , peuvent donner un exemple: ces Lignes forment des amas quelquefois considérables d'Arbres entiers accumulés les uns sur les autres au milieu d'un limon sablonneux , qui renferme des Coquilles d'eau douce, des débris d'Insectes aquatiques et d'Animaux (terrestres , des fruits , etc., assez semblables à ceux qui existent maintenant sur le sol environnant, mais souvent aussi des ossements de grands Mammifères, dont les espèces qui existent plus sur ce même sol , circonstance qui donne à ces dépôts un caractère antédiluvien et qui autorise à les regarder comme d'une origine «intérieure à l'état actuel du globe.

Après avoir indiqué d'une manière générale quels sont les phénomènes géologiques de la distribution des matières charbonneuses plus nouvelles

que la Houille , dans les divers strates de l'écorce de la terre , nous devons tracer quelques-uns des caractères principaux qui ont engagé les minéralogistes à reconnaître, parmi les Lignites , plusieurs variétés , dont les propriétés méritent d'être connues, parce qu'elles font rechercher ces variétés pour des usages dont quelques-uns sont très-importans pour les arts et l'agriculture. Ces principales variétés sont :

Le Lignite picifume , PecUolhle des Allemands, qui, comme l'indique son nom , a l'aspect luisant de la Poix ; la structure fibreuse du bois paraît à l'extérieur de quelques fragmens , mais le plus souvent cette structure a disparu et le Lignite ne présente plus qu'une masse compacte qui donne, en se cassant, des surfaces conchoïdes.; quelquefois il se divise en feuillets ou bien en fragmens parallélipédiques à la manière de quelques variétés de Houille dont il est difficile de le distinguer, d'autant plus que sa couleur est le noir luisant et qu'il brûle avec facilité et sans répandre l'odeur désagréable de la plupart des autres Lignites.

C'est cette variété que l'on exploite dans les mines de Provence , que nous avons, d'après Brongniart, rapportée au Lignite soissonois, dans celles de la Suisse, dans les Ais dénués à Ruette , dans la vallée de l'Iun en Autriche , à Cadibona dans le golfe de Gènes , à Sarzane en Ligurie , etc. A cette même variété appartient le Jayet que sa dureté , sa couleur noire foncée, sa texture dense et homogène rendent susceptible de prendre un beau poli et d'être taillé sur une meule pour être transformé en objets d'ornemens, tels que des boutons , des pendants d'oreilles , des colliers , des chapelets , des rosaires , etc., et en général des parures de deuil. Le Jayet se rencontre en fragment ou en nodules dans le

Lignite piciforme commun , et peut-être avec toutes les autres variétés de Lignite, mais accidentellement; les exploitations des environs de Lloquvnr x

366 LIG

Marseille et Toulon ; celles de Balestat d'ins les Pyrénées, de Saint-Colomb, Peyral et la Bastide, sont, en France , celles qui fournissent le plus de Jayet au commerce , et qui en ont fourni une assez grande quantité à une époque où la mode faisait rechercher les bijoux de cette espèce. Les mines de Saint-Colombe qui ont employé jusqu'à 1 200 ouvriers , n'en occupent plus maintenant qu'environ 150.

L'Espagne, la Saxe, la Prusse, ont des mines de Jayet dont on fait le même usage qu'en France. Quelques auteurs, et notamment Voigt et Brongniart , rapportent à la variété de Lignite piciforme, le Candel Coal ou charbon chandelleries Anglais , quoique l'on assure que cette sous-variété existe dans les couches des terrains houilliers de Newhaven (V.

Houille compacte).

Le Lignite ternit , d'un noir plus ou moins foncé, mais toujours terne, répandant en brûlant une fumée épaisse et presque toujours acre et fétide, présente une structure , tantôt massive, tantôt schisteuse, mais rarement ligneuse ; il est le plus souvent en couches et souillé par des matières terreuses et des sables. Les exploitations de Sainte-Marguerite, près Dieppe ; la plupart des gîtes du Soissonnois, les mines de Piolenc , dans le département de Vaucluse , de Leipsick en Allemagne, celles de Tœpflitz et des environs de Carlsbad en Bohême, fournissent des exemples de cette variété de Lignite , dont les principaux usages sont de plu-

sieurs sortes ; lorsqu'il est en masses solides , qu'il n'est pas par trop imprégné d'infiltrations pyriteuses , il peut servir pour faire cuire la Chaux et pour toute opération analogue ; lorsqu'il manque de cohérence , et que les Pyrites qu'il contient se décomposent facilement à l'air, on l'emploie pour fabriquer des sulfates de Fer et d'Alumine; on le répand encore sur les terres pour les amender (Sainte-Marguerite, Soissonnois); une sous-variété qui est terreuse, pulvérulente , d'un brun noir, que l'on

LIG

trouve principalement à Brulh, et qui dans le commerce est connue sous le nom de terre de Cologne , est employée dans les peintures grossières.

On distingue bien encore plusieurs autres variétés Sous les noms de Lignite fibreux, cylindroïde, bacillaire, mais elles sont de trop peu d'importance sous les rapports géologiques et techniques, pour que nous devions nous arrêter à les décrire ici.

LIGNIVORES ou XYLO PEA- GES. iNS. Duméril donne ce nom à une famille de l'ordre des Coléoptères qui correspond à celle que Latreille nomme Longicornes. V . ce mot. (g.)

LIGNONIA. bot. puân. Le genre Paypayrola d'Aublet a reçu de Scopoli ce nouveau nom qui a été adopté par Roemer et Schultes. Jussieu et Lamarck se sont contentés de modifier la dénomination primitive en celle de Payrola. F. ce mot. (g..n.)

LIGTU. bot. piïan. Nom de pays devenu scientifique pour désigner une espèce du genre Alstroemeria. , ce mot. (b.)

LIGULA. int. V. Ligule.

LIG UL AIRE. *Ligularia*. bot.

PHAN. Genre de la famille des Synanthérées, Corymbifères de Jussieu, :

et de la Syngénésie superflue, L., établi par H. Cassini (Bulletin de la Société Philom., septembre 1816) qui l'a ainsi caractérisé : involucre cylindracé, formé de folioles égales, disposées sur un seul rang, contiguës, libres, appliquées, oblongues, lancéolées, aiguës au sommet, membraneuses sur les bords; à la base de l'involucre on observe une ou deux bractées linéaires subulées; réceptacle plane absolument nu; calathide radiée, dont les fleurons du centre sont nombreux, hermaphrodites, ceux de la circonférence sur un seul rang, en languettes et femelles; corolles des Heurs femelles portant à la base quelques longs filets qui sont des rudimens d'étaini-

LIG

ices; ovaires supportées par un léger lodilicelle, oblongs, striés, glabres, couronnés d'un bounelet au sommet, surmontés d'une aigrette composée de poils légèrement plumeux. Les styles ont leur partie supérieure et la face extérieure des stigmates hérissés de papilles; les bourgeons stigmatiques sont confondus en une seule masse, à l'exception de la base où ils sont partagés par un léger filon. Ce genre a été placé par son auteur, dans la tribu des Adénostycées, entre les nouveaux genres *Sensrillia* et *Celmisia*. Il se distingue des *Sineraria* par la présence des bractées qui se trouvent à la base de l'involucre, par les étamines rudimentaires de ses fleurs femelles, et par ses caractères du style. L'espèce que Cassini considère comme type de ce nouveau genre, est le *Sineraria alba*, L. Celle qui se trouve en Sibérie,

lia us le Levant et sur les montagnes iJe l'L'uopc australe. Cassi-
ni soupçonne en outre que le Cùicraria cas-)n'ca de Marschall est
une seconde sspèce de Ligularia.

Un autre genre de Plantes a été norme sous le nom de Ligula-
ria par iDuval (Plantes grasses du jardin li.Alençon, p. u). 11 avait
pour type ee Saxifraga sarmentosa , Willd. ; mais Haworth ne l'a
considéré , avec

uste raison , que comme une section Il u genre Saxifrage. V. ce
mol.

Rumpb s'était autrefois servi du mot Ligularia pour désigner
la Plance nommée par Linné Euphurbia ne-

iifulia. (G..N.)

LIGULE. Ligula. int. Genre de \Vers intestinaux de l'ordre des
Cescoïdes. Caractères : i° ayant le développement complet, corps
aplati, continu , très-long , parcouru sur ses :leux laces par un
sillon longitudinal ::t médian ; point de tête ni d'organes génitaux
visibles; u" après I entier léveloppement , corps aplati, conli- 111 ,
très-long; tête munie île deux 1 ossettes latérales très-simples ;
ovaires formant une ou deux séries longitudinales , avec des lem-
nisques sail-

LIG 5f)7

lans (organes génitaux mâles) situés sur la ligne médiane. Pal-
las confondait ces Animaux avec les Tœnias, et Linné avec les
Fascioles. L'organisation des Ligules est d'une extrême simplici-
té. Lorsque l'on examine celles qui vivent dans les Poissons, ou ,
d'après l'hypothèse de Rudolpbi, celles dont le développement
n'est pas complet, il semble que l'on ait sous les yeux une bande-

lette d'Albumine coagulée, dont la surface plus ou moins i idée est parcourue sur cliacunc de ses faces par un sillon longitudinal et médian. Que l'on dissèque cette masse , qu'on la soumette à la macération , qu'on (in examine des portions minces au inicrof-scope , quelques recherches que l'on puisse faire, on ne trouve toujours qu'une substance blanchâtre , assez firme, sans fibres, vaisseaux ou oiganes quelconques. Cependant les Ligules, même en cet état , sont des Animaux vivans dont les mouvemi'iis sont très-sensibles. Lorsqu'on les met dans l'eau , elles se meuvent de diverses laçons cl nagent à la manièi e de Sangsues. La portion que l'on regarde comme la tête est en général plus épaisse et plus pointue que la postérieure ; on ne peut y apercevoir rien qui ressemble à des suçoirs ; les plis y sont plus réguliers que sur le reste du corps ; les bords sont épais, plissés, et souvent ondulés. Même dans cet état, les Ligules parviennent à de grandes dimensions; on en a observé de plus de trois pieds de long et d'un demi-pouce de large. L'organisation de ces grands individus n'était pas plus apparente que dans les plus petits.

Il n'est pas rare de trouver dans les intestins des Oiseaux aquatiques des Ligules absolument semblables à celles des Poissons , c'est-à-dire dont la structure n'est pas plus complexe; souvent aussi elles présentent, dans une étendue plus on moins grande , une série d'ovaires liès-distincts. Ces ovaires ont la forme d'un petit sac et sont placés très-près les uns des aulres sur une ou deux rangées Ion-

398 LIG

gitudinales qui occupent loujours le centre du corps; chaque ov;iire paraît communiquer à l'extérieur par une petite ouverture, et toutes ces ouvertures sont placées du même côté. Rudol-

phi a observé sur le *Ligula sparsa* , un petit corps cylindrique sortant par l'ouverture de chaque ovaire. Il le regarde comme l'organe génital mâle. On distingue facilement la présence des ovaires dans les Ligules, par une ligne brune longitudinale plus apparente du côté où sont placées les ouvertures de communication avec l'extérieur. Du côté opposé, on aperçoit ordinairement sur la ligne médiane, une bandelette très-étroite ; un peu saillante , limitée de chaque côté par un petit sillon. Ses œufs sont ovalaires, de couleur brune, et très-nombreux. La plupart des Ligules des Oiseaux sont marquées antérieurement de lignes transversales, rapprochées, régulières; quelques Ligules paraissent véritablement articulées dans cette partie; le reste du corps est ou irrégulièrement ridé, ou tout à fait lisse.

Bremser a observé sur une Ligule trouvée dans le Cormoran commun (*Ligula interrupta*) une lèvre distincte où l'on remarquait une fossette linéaire sur chaque côté; ces fossettes ressemblaient à celles des *Bothriocéphales* solides et noueux; la tête était très-mince, presque triangulaire et aiguë en avant. Nous avons trouvé dans le même Oiseau une Ligule qui offrait également à son extrémité antérieure deux fossettes linéaires. C'est la seule espèce où l'on ait encore remarqué ces organes. Si l'on excepte les ovaires et les suçoirs de l'extrémité antérieure , la structure des Ligules des Oiseaux est la même que celle des Ligules des Poissons. Ces seules différences d'organisation entre les Ligules des Poissons et celles des Oiseaux, la circonstance d'habitation constamment dans l'abdomen chez les Poissons , dans l'intérieur des voies digestives chez les Oiseaux aquatiques ; de plus , une observation singulière relativement aux *Bothrio-*

céphales solides et noueux (V. ces \ espèces) , ont porté Rudolphi à avancer ; que les Ligules étaient destinées ! par la nature à passer une partie de leur vie dans les Poissons; que là, elles étaient entièrement dépourvues d'organes génitaux, et par conséquent infécondes; que, parvenues dans les voies digestives des Oiseaux qui s'étaient nourris de Poissons affectés de Ligules , elles y préparaient un nouveau degré d'accroissement , leurs organes génitaux se développaient, et qu'elles pouvaient alors se multiplier , par germes. Cette hypothèse , quoique fondée sur des faits d'observation exacte, paraît fort étrange, et, si elle est l'expression d'une loi de la nature relative à ces êtres, c'est une nouvelle singularité ajoutée à toutes celles que nous présentent les Vers intestinaux. Il paraît certain égale-

ment que les Ligules des Poissons , arrivées à une époque de leur existence , sortent de l'abdomen de ces Animaux en s'insinuant entre les muscles du dos et en perforant la peau.

L'on a dit que l'on a vu des Ligules encore vivantes dans des Poissons bouillis et servis sur table; c'est une exagération d'observateurs superficiels et peu scrupuleux. Il n'y a pas d'êtres vivans qui puissent résister à l'action prolongée de Peau bouillante.

D'ailleurs, la vie des Ligules est assez fugace; elles ne lardent pas à mourir lorsqu'on les place dans l'eau à une température modérée. Les Ligules ont été trouvées dans l'abdomen des Poissons qui vivent passagèrement ou habituellement dans l'eau douce, et particulièrement les espèces du genre Cyprin. On les trouve également dans les voies digestives des Oiseaux aquatiques et piscivores. On a trouvé une Ligule dans les intestins grêles d'un Veau marin nourri depuis quelque temps avec des Brèmes. Il existe dans un lac du royaume de Naples nommé Lago Lucino , une es-

pèce de Cyprin voisin du Barbeau , et que l'on nomme dans le pays Lasca et Lascagna. Ce Poisson contient assez

LIG

néquemment des Ligules rnpportées itili *Ligula simplicisslma* par Rudol- >!)hi; on uomine ces Vers *Macaroiini* Matti. On les mange avec délices.

Les espèces de Ligules sout peu idombreuses et assez difficiles à distinguer euti e elles. Leurs différences ppécifiques ne consistent guère que llaus la position des ovaires, pour i-elles qui en sont pourvues. Quant inX autres , Rudolphi les réunit louées sous le uoin de *Ligula simplicisiima*. (e. d..l)

* LIGULE. *Ligula.coyicn*. Lamarck UVait d'abord donné le nom de Donalille, el ensuite celui d'Ans pliidesme i un genre que Montagu {Test. Brit.

M. 22) avait antérieurement établi cous le nom de Ligule; il était juste, loar l'antériorité, de conserver celui Ile Montagu i c'est ce que Férussac a l'ait dans ses Tableaux systématiques.

£è genre , sur lequel Férussac a don- :oé quelques détails à l'article Am- Midesmi: de ce Diciounaire , a été 'Macé par cet auteur dans la famille Iles Maclracées , à l'imitation de LamarctË. Blamvdlle , en faisant une £Oois-division des Lucincs, aurait dû uussi en rapprocher les Erycines qui •»nt , avec elles , beaucoup d'analogie; mais on voit d'après la citation des ligures faites par Blainville, qu'il connaissait peu ce genre, puisqu'il (•envoie à la planche 283 , fig. 1 , a ,)) , c , de l'Euc\clopédie , qui présente .ia Lucine lactée de Lamarck, laquelle test le type du genre *Luripes* de l'oli. ILali cille , dans son dernier ouvrage, <oin de conlondie

les Aniphidesmes avec un autre genre, en fait une famille à part sous le nom d'Amphidesmites. Il y joint, avec quelque réserve, les genres *Listera*, *Lyonsia* et *Cryptodon* de Turton. Cette nouvelle famille de Latreille est la huitième de la première section du quatrième ordre.

Lamarck décrit seize espèces d'Amphidesmites, desquelles il faudra retrancher quelques-unes qui sont des *Stomatopoda* qui appartiennent à d'autres genres. Férussac a fait voir à

LIG 399

L'article *Amphidesme* que les *Amphidesmes lactea* et *lucina* de Lamarck étaient une seule et même Coquille, la *Tellitia lactea* de Linné, qui se trouve encore dans le genre *Lucina* sous le nom de *Lucina lactea*. L' *Amphidesme douvillei* a la plus grande analogie, quant à la charnière, avec la *Croissella glabrata*; elle devrait donc se placer plutôt avec elle qu'avec les autres *Amphidesmes*. Sowerby, dans son *Général*, a manifesté une Opinion différente, c'est-à-dire qu'il a placé et l' *Amphidesme douvillei*, et la *Crassallia glabrata* dans le genre *h*] *ry* ci ne auquel elles servent de type. Cette opinion, que nous n'adoptons pas, prouve cependant l'analogie de ces deux Coquilles. Il est à présumer, d'après cela, que les autres espèces ont besoin d'être examinées avec une nouvelle attention, puisque dans les six premières trois doivent en être ôlées. Les *Amphidesmes* ont beaucoup d'analogie avec les *Erycinæ*; nous pensons même qu'il sera convenable de les réunir lorsqu'un plus grand nombre d'espèces vivantes d'*Erycinæ* seront venues à la connaissance des zoologistes. La principale différence entre ces genres, c'est que dans les *Erycinæ* le ligament interne est placé entre les deux dents cardinales, tandis que dans les *Amphidesmes* ou *Ligules* les dents cardinales^ sont placées à

côté de la fossette. Voici les caractères que Lamarck assigne à ce genre : coquille transverse, inéquilatérale, subovale ou arrondie, quelquefois un peu bâillante sur les côtés; charnière ayant une ou deux dents et une fossette étroite en gouttière pour le ligament intérieur ; ligament double, un externe court, un autre interne fixé dans les fossettes.

Ligule panachée, *Ligula variegata*, *Amphidesma variegata*, Lamk., Anim. sans vert. T. v, p. 480, u° 1 ; *Amphidesma variegatum*, Sow. (The Genera of Recent and Fossil Shells, 9^e cahier, fig. 1) ; *Tellina*, Encyclop. pl. 291, fig. 5. Coquille ovale, oblongue, mince, peu convexe, d'un

400 LIG

blanc pourpré ou violâtre, présentant des taches de rouge brun, irrégulières, comme écrites; toujours un nettement transversalement; les stries sont très-fines et se perdent vers les broquets qui sont petits, à peine sifflans. En dedans, cette Coquille offre une grande tache d'un rouge brun foncé qui diminue insensiblement vers les bords qui sont; lisses; Il y a sur chaque valve deux dents cardinales fort petites; l'impression du manteau a une échancrure très-, p. rotonde comme dans les Tellines, et sur le côté postérieur on remarque un pli sinueux comme dans ce dernier genre. (d..u.)

LIGULE. *Ligula*- bot. P. UAN. On donne ce nom, dans les Graminées, à la petite lamelle ou languette qui naît du sommet ou bord libre de la gaine de la feuille. Quelquefois la Ligule est formée par des poils. Ce petit organe fournit assez souvent d'excellens caractères pour distinguer certaines espèces. (a. r.)

* LIGULÉE (corolle), bot. phan.

Cette sorte de corolle s'observe dans la famille des Synanthérées ; c'est quand la corolle inopéталè commence par un tube et qu'elle va ensuite en s'élargissant et formant une languette plane et latérale, comme dans toutes les Chicoracées et dans les fleurs de la circonférence dans les Radiées; la fleur qui offre une semblable corolle est appelée un demifleuron, (a. R.)

LIGURITE. min. Viviani a remarqué une substance verte, transparente, à cassure vitreuse, disséminée dans une Roche talqueuse des bords de la Stura, en Ligurie. Cette substance , d'après l'examen qu'en a fait Vauquelin , ne serait qu'une modification du Titane silicéo-calcaie.

Elle est formée, suivant Viviani , de Silice , 57,45 ; Alumine , 7,36 ; Chaux, 2,50; Magnésie , 2,56; Oxyde de Fer , 5,00; Oxyde de Manganèse, 0,50. Elle est plus dure que la Chrysolithe orientale, et sa pesanteur spécifique est de 3,4g. (g. del.)

LTG

LIGURIUS. min. (Exode, chap.

28, vers. 19.) L'une des douze pierres qui ornaient le tabernacle du grandprêtre Aaron, et que l'on croit être la même chose que le Lyncurius. V.

ce dernier mot. (g. del.)

LIGUSTICUM. bot. phan. V. Li-

VÈCHE.

LIGUSTRO T DES . bot. phan. (Linné.) Syn. de Volkamérie. V. ce mot.

LIGUSTRUM. bot. phan. r.

Troène.

LIGDUS. moll. (Montfort.) V.

Ruban, Agathine et Hélice.

LIKENEE. ins. V. Licienée.

LILACEES. bot. phan. Ventenat (Tabl. Règn. Végét. , 2, p. 306) appelait ainsi une famille naturelle de Plantes qu'il formait avec les genres de la famille des Jasminées ayant le fruit capsulaire. Tels sont les genres Nyctanthes , IMac , Fontanesia, Fraxinus. Mais cette famille ne diffère par aucun caractère des Jasminées. V. ce mol. (a. r.)

LLLjEA. bot. phan. F. Lilée.

LILAK. bot. phan. Pour Lilas. F~.

ce mot. (b.)

* LIL ALITEE, min. f. Lépidotee.

LITHE.

LILAS. Syringa, L. bot. phan.

Z</7ac, Tourn. Genre de la famille des Jasminées et de la Diandrie Monogynie , L. , qui se compose d'un petit nombre d'espèces, mais qui toutes sont des Arbrisseaux d'un port élégant que l'on cultive dans les jardins , surtout à cause de l'odeur suave que répandent leurs fleurs. Les Lilas ont leurs feuilles opposées, entières, pétiolées, dépourvues de stipules; leurs fleurs violettes tendres, disposées en grappes rameuses ou en tiges redressées.

Leur calice est monosépale , turbiné , à quatre dents très-courtes ; leur corolle est monopétale, légulière, hypocratériforme , à tube allongé , un peu ren lié dans sa partie supérieure, à limbe offrant quatre lobes étalés et obtus, et

légèrement concaves. Les étamines , au nombre de deux, sont sessiles dans la partie supérieure du tube , qu'elles ne dépassent pas. L'ovaire est à deux loges contenant chacune deux ovules pendans. Le style est simple, terminé par un stigmate profondément biparti et à divisions linéaires et subulcés. Le fruit est une capsule allongée , comprimée , à deux loges contenant chacune une seule graine plane et s'ouvrant en deux valves naviculaires , emportant chacune la moitié de la cloison.

Lilas commun , *Syringa vulgaris* , L. » Cet Arbrisseau élégant , que nous cultivons en si grande abondance dans nos jardins, est originaire de l'Asie et du Levant. Il fut introduit vers 1564 en Allemagne par Guiljard-Ghislen de Busbecq, ambassadeur de Ferdinand Ier , empereur d'Autriche, auprès du sultan Soliman II. Ce fut Mattheole qui , dans ses Commentaires sur Dioscoride, en parla pour la première fois et en donna la première figure. Le Lilas peut s'élever à une hauteur de dix à douze pieds et quelquefois même au-delà. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales , aiguës , très-molles, glabres sur leurs deux faces.

...es (leurs sont d'une, couleur violette Extrêmement claire, nuance que l'on désigne sous le nom de couleur lilas.

Ils forment des thyrses dressés , uniques , composés d'un très-grand nombre de fleurs serrées , et elles répandent une odeur extrêmement suave. On a des variétés à fleurs roses et

d'autres à fleurs d'un blanc très-pur. Quelquefois les feuilles sont variées de blanc ou de jaune.

Jet Arbiisscau ne craint pas les hivers les plus rigoureux de nos climats. Il est extrêmement rustique et tient presque également bien dans toutes les espèces de terrain et à toutes les expositions. Ses fleurs s'épanouissent en général dès les premiers jours du mois de mai, et sont dans notre climat l'annonce du printemps.

On multiplie le Lilas par tous les procédés possibles ; ainsi par graine ,

TOME IX

LIL 401

par greffe , par marcottes et surtout par éclats.

Lilas de Perse, *Syringa Persica*, L. Cette espèce , originaire des mêmes contrées , est beaucoup plus petite que la précédente dans toutes ses parties. Sa tige s'élève à une hauteur de trois à quatre pieds. Ses rameaux sont grêles, effilés, tombants; ses feuilles sont lancéolées , entières; ses fleurs, plus petites, formant des grappes beaucoup plus grêles. Il y a une variété à feuilles laciniées et pinnatifides, que l'on désigne Quelquefois sous le nom de Lilas à feuilles de Persil.

LilasVarin, *Syringa Rothomagensis*. C'est une simple variété obtenue à Rouen en 1777 par Varin , jardinier habile, qui dirigeait le jardin botanique de cette ville. Elle provient de graines de Lilas de Perse à feuilles laciniées. C'est la même variété que l'on a

nommée en Angleterre *Syringa sinensis*. Elle tient le milieu entre le Lilas ordinaire et le Lilas de Perse.

Elle forme un Arbrisseau buissonneux et touffu , de cinq à six pieds d'élévation. Ses feuilles sont cordiformes , allongées ; ses fleurs, trèsgrandes, forment des grappes moins bien fournies que celles du Lilas commun ; mais d'une couleur plus vive. Lorsque cette variété est bien conduite , elle forme des touffes d'une beauté surprenante. Ceux qui existent dans les parterres du Jardin du Luxembourg font chaque année l'admiration de tout Paris pendant le mois de mai.

On a quelquefois appelé Lilas de tenue , *Y IJyacinthus JtJuscari* , et *Y Hyacini/tus monstrosus* , L. , et Lilas des Indes, le *Melia Azcdarach*.

LILEE. *Lilœa*. bot. khan. Genre de la famille des Joncaginées et de la Monœcie Monandrie, L., établi par Bonpland (Pl. œquin. 1 , p. 221 , t.

63) pour une petite Plante aquatique originaire des environs de Santa-Fé de Bogota dans la Nouvelle-Grenade, qu'il a nommée *Lilœa utbulata*.

Elle a en quelque sorte le port d'un Joug, c'est-à-dire qu'elle forme

une touffe de feuilles cylindriques , subulées , engainantes par leur base.

Les fleurs sont monoïques. Les mâles forment des chatons ovoïdes , allongés , composés d'écaillés imbriquées en tous sens, à l'aisselle de chacune desquelles on trouve une seule étamine. Les (leurs femelles sont de deux sortes; les unes forment des épis

ovoïdes , allongés, longuement pédonculés , composés d'une trentaine de fleurs sessiles, comprimées, rapprochées et imbriquées. Ces fleurs , entièrement dépourvues d'enveloppes florales, se composent d'un ovaire comprimé , à une seule loge et à une seule graine, d'un seul style court, et d'un stigmate capitulé. Les autres sont solitaires, distinctes, presque sessiles , et naissant du collet de la racine. Celles-ci sont ovoïdes, allongées, élargies vers leur sommet où elles se terminent par deux appendices la-mel-leux qui forment un bord incomplet. Le style est excessivement long et capillaire. Le fruit est un aliène contenant une graine dressée , composée d'un embryon monocotyléddn recouvert par un tégument propre, mince et membraneux.

LILIACÉES. Liliaceœ. bot. phan.

Nous avons déjà dit à l'article Asphodélées , que les deux familles naturelles de Végétaux désignées par Jussieu sous les noms de Liliacées et d'Asphodélées devaient être réunies eu une seule, qui retiendrait le nom de Liliacées , comme étant le plus ancien et le plus généralement connu.

En effet , ceux qui compareront dans le Gênera Plantarum , les caractères assignés à ces deux familles , s'apercevront facilement qu'ils se ressemblent tellement, qu'il est presque impossible de saisir entre eux la moindre différence qui soit de quelque importance. Cette difficulté tient non pas à la manière dont les caractères de ces deux groupes sont tracés, mais à l'organisation des genres qui les composent, laquelle n'offre pas de différences propres à l'établissement de deux familles. En effet, la struc-

ture du calice est la même ; les examines sont en même nombre et insérées de la même manière ; l'ovaire le style et le

stigmate, enfin le fruit et la graine présentent une même organisation. Cependant nous convenons que pour un œil exercé il existe quelque différence de port, d'aspect extérieur entre les Liliacées et les Asphodélées, et que leur mode de germination n'est pas absolument semblable. Ainsi dans les Asphodélées, le cotylédon reste engagé dans l'intérieur de la graine et tient à la gaine qui enveloppe la gemmule au moyen d'un prolongement filiforme.

Ce mode de germination est en effet celui qu'on observe le plus fréquemment dans les Asphodélées, mais néanmoins tous les genres de cette famille ne germent pas de cette manière, par exemple le *Vellheimia*. Et d'ailleurs, cette différence dans la germination lorsqu'elle n'est pas liée à une différence d'organisation, peut-elle être regardée comme suffisante pour former deux familles naturelles ? Nous ne le pensons pas, et à l'exemple de Ventenat, nous croyons ne devoir former qu'une seule famille des Liliacées et des Asphodélées de l'illustre auteur du *Générarium Plantarum*.

Les Liliacées forment une vaste famille de Plantes monocotylédones, à étamines périgynes dont les genres *Lis*, *Tulipe*, *Aloès* et *Asphodèle*, peuvent être considérés comme les types. Ces Plantes, qui font l'ornement de nos parterres par la beauté et l'éclat de leurs fleurs, et souvent par l'odeur suave qu'elles répandent, varient singulièrement dans leur port. Ainsi quelquefois leur racine est surmontée par un bulbe dont la forme et l'organisation varient beaucoup, ainsi qu'on peut le voir en comparant le bulbe écailleux du *Lis* avec le bulbe presque solide de certaines *Tulipes* ; dans une foule d'autres genres, la racine est dépourvue

de bulbe et se compose de fibres capillaires ou plus ou moins volumineuses. Les feuilles sont quelquefois i

mules radicales, planes ou cylindrique* et creuses , ou épaisses cl charnues. La tige, loi «qu'elle existe, est rénéialement simple, mai* le plus i*uvent les fleurs tout portées sur une hampe nue, simple ou rameuse, «s fleurs varient beaucoup dans leur i.-andeur et leur disposition. Ainsi Mfilôï elles sont solitaires et terminais, tantôt disposées en épis plus ou lioius allongé* , pi tu ou moins <!enss, tantôt elles forment des grappes nmeuses ou des ombelles simple, uoujours ces fleurs, qui sont se-siles || pédonculées , seul accompagnées lleui base d'une bractée et quelqucii is enveloppées dans une spatbe ■ l'tnjWîée d'une ou de plusieurs foikles. J^e calice est coloré et j>étalide , formé de six sépales, tan ôt nlieiemerit distincts, tantôt fcoud -s Mfemble pat leur base , ou même irns une partie plu* étendue de uur longueui , de mariieie a ce qu'ils rTOient un tube plu* ou moins altiigé , ainsi qu'on le remarque dans >t jîIiji-a , le-> LutUennlia , TrUottlû , ell/tiumia , etc. Ces six sépale* sont ■hposé* *ur deux rangées, de nuère que liois -ont inléiieurs et in's extérieurs; le plus souvent ils uni égaux et la fleur est régulière , r renient ils sont inégaux et la fleur tt irrégulière. Les é lamines sont au ■ m lu c île six- Leurs ii-lets sont giê- II Ou élargis à leur base, quelque- ?s bifide* ou tn- lides à leur sommet, unadelpbes dans le L'yanetla Camsit. L'insertion est le plus -soutint péngy nique, c'est-à-dire que BleK -ont attachéssur b-s sépab-s, ulôt vers leur base, tantôt veis i»r milieu ou ver* leur partie supéuie; mais dans un assez grand 1 tnbre de genres, ces étamines sont

• :n 1 éel lement h vpogv moues , c'est- 1 lue qu'elle* ne sont nullement in— i ées sur le reliée, c e^t ce que l'on

- >ei ve dans les Lis, les Aloës, les

- ilx, le Tritoma , etc. L'ovaire c->t f litiëicment libre, sessilcau fond de r fleur, à trois cotes et à trois loges, r ntenant chacune un nombre va- -i due d'ovules toujours dispo és en

LIL 403

deux rangées longitudinales. Dans le Vtlllieimia , il y a deux ovules *eulement dans chaque loge. I>e style eft simple, inaïqué de Iroi* sillons longitudinaux ; il manque quelquefois, et alors le sligrnaje est sébile. Celuici est toujours à trois lobes plus ou moins maïqués. Le Luit est libre et CUPère , quelquefois ebarnu , ina:s le plus souvent sec et déhiscent, ovoïde, ou globuleux , à trois côtes plus ou moins saillantes, séparées par des sillons longitudinaux , à trois loges, contenant ordinairement plusieurs graines et s'ouvrant en trois valves septiléics sur le milieu de leur face interne. Les gi aines , dont la forme vaiie, sont recouvertes d'un tégument tantôt noir etciuslacé, tantôt simplement membraneux. Elles contiennent dans un endoqierrne blanc et charnu , un embiçon cylindrique, axile, et dont la radicule corres|>ond au bile. Cet embryon est quelquefois contourné sur lui-même , ainsi qu'on l'observe dans le* Aulx par exemple.

Les genres qui corn|iosent cette famille sont assez, nombreux, ainsi que le montrera rémunération suivante :

Fleurs en épi; racines fibreuses; calice tubiileux

slletris, L. ; f eliheirnia , Gloditsh; TriUUna, Curtis; Alo'é, L.

() II. Fleurs en épi ; racines fibreuses; calice à cinq divisions profondes.

Anl/tericurn , L. ; Phalangiurn , Tourn.; Asphodehu t L. ; Yucca, L.; Sly\iandra , L. ; iSowerbœa, Smith; Jjaxmannia , Brow. ; Barya, Labill.; Jo/t/iso/ia, lir.; Xani/ton hrea, Smith; strthru-
podtuin , R . Br. ; Chlorophytum , Kerr. ; Coetia. R. Br.; Tricory-
«e,K. lir.

§ III. Fleurs en épi; racine bulbeuse; calice tubuleux à sa base.

Basi/œa,3uis. ; llyacinlhus, Tournefôrt; Muscari, Toum. ;
F/wrmilim , Foi st.; M assort ia , Tliunb.; Lacfunalia , Jacq.

d IV. Fleurs solitaires, en épi ou en ombelle ; racine bulbeuse ;
calice à six divisions.

404 LIM

Cjanella, L. ; Albuca, L.; Sçilla, L. ; Ornithogalum , L. ; ALlium
, L. ; Liliium , L. ; Tu/ipa , L. ; Eryihronium , L. ; Methunica , Juss.
; Uvularia , L. ; Fritiliaria , L. ; J/rapeiialis , Juss. (a. n.)

LILIAGO. bot. phan. Les anciens botanistes donnaient ce nom
à diverses Liliacées. Cordus l'avait appliqué particulièrement à
une Plante dontTournefort fit son genre Plialangium et que Lin-
né plaça parmi les sluthericum ; ce mot ne fut plus employé que
comme spécifique. P. Pha- 1.ANGÈR.E. (g..n.)

LILIASTRUM. bot. phan. Tournefort avait formé, sous celle dénomination proscrite par Linné , un genre que ce dernier naturaliste réunit aux Anthericum , mais qui , selon Jussieu , doit faire partie du genre Phalangium. V. ce mot. (g..n.)

LILIO-ASPHODELUS. BOT.(Tournefort.) Syn. d'Hémérocalce. V.

ce mot. (ii..N.)

LILIO-H YACINTHUS. bot. phan. Sous ce nom générique , qui n'a pas été adopté, Tournefort avait séparé des Scilla, les espèces à bulbes écaillés-

leUSCS. V. SciULE. (G..N.)

LILIO-NARCISSUS. bot. phan.

Tournefort nommait ainsi un genre dont les espèces ont été placées par Linné parmi les Amaryllis. V. ce mot. (g..n.)

LILIUM. bot. phan. V. Lis.

LILIUM LAPIDEUM. polyp. Les anciens oryctographes ont donné ce nom à Véncrinites moniliformis de Müller. V. Encrinures. (e.d .l.)

LILLOIS. MA M'. Variété de petits Chiens qui provient du croisement du Doguin et du Roquet. (b.)

LIMACE. Liimax. moll. Animaux Mollusques gastéropodes de la famille des Limaciens de Lamarck, dans l'ordre des Pulmonés terrestres. Les Limaces, comme les Hélices, furent connues des anciens; Aristote et Pline les mentionnèrent; d'autres auteurs, tels que Ray, Murait, Har-

LIM

(1er, Piedi, Swammerdam, cherchant, j; par une étude plus approfondie, à j éclairer l'histoire des Limaces et des m Limaçons, donnèrent sur leurs „ mœurs, leur accouplement et leur j, anatomie des détails curieux qui |, ne furent pas toujours exempts |s d'erreurs. Lister, dans son Synop- (j sis, donna, d'après Redi, plusieurs a planches oii des détails anatomiques sont représentés. D.ins leur indica-)| tion, on remarque plusieurs er- 1, reurs que le grand Swammerdam,,} dont les travaux sont antérieurs, ne j commit pas. Lister fut le seul de son s, époque qui rattacha les Limaces à son i système général de conchyliologie; o les autres auteurs jusqu'à Bruguière, ne les mentionnèrent pas, ou les éloi- c gnèrent des Mollusques, dans la clas- \t se des Vers nus; en un mot, ne les |j regardèrent pas comme voisines des ^ Hélices. Nous devons en excepter ce- .

pendant d'Argenville, qui pinça les; Limaces à la lin de ses Coquilles terrestres qui iont, à la fin de son sys- • terne., une partie séparée. Nous en t excepterons également Miiller qui, dans son Histoire des Vers terres- , 1res 'et fluviatiles, commença ses Testacés, par les Limaces qu'il fil | suivre des Hélices et dont il décrivit un assez bon nombre d'espèces 1 Linné, dans son Système, ne suivi pas le bon exemple de Miiller; i .

établit, comme on le sait, trois clas- j ses dans les Vers : les Intestinaux, les Mollusques et les Testacés. Ce fut dans la classe des Mollusques, avei L les Tétails, les Uoris et les Aplysies que fut placé le genre Limace, lors ■ que les Hélices, qui ont par l'organisation tant d'analogie avec elles, fu- j rent portées parmi les Testacés à côt des Nériles et des Turbos. Les auteur qui suivirent le système linnéen à 1 lettre, comme Bruguière et les au teurs an-

glais du même temps, adoptèrent entièrement cet arrangement défectueux. Cuvier, qui, dès 1798, proposa dans son Tableau élémentaire d'histoire naturelle d'heureux changemens dans la classe des Mollusques, plaça les Limaces en tel

les Gastéropodes, mais les tint encore assez éloignées des Hélices. Lamarck, dans son Système des Animaux sans vertèbres, suivit l'opinion de Cuvier. Le défaut de coquille des Limaces fut la cause de l'erreur dans laquelle tombèrent aussi bien Linné et Bruguière que les deux savans zoologistes que nous venons de citer.

Draparnaud, dans son Histoire des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France, fut le premier qui reproduisit l'opinion de Müller, c'est-à-dire qu'il remit, à l'exemple de ce savant, les Limaces près des Hélices.

Lamarck ne manqua pas de saisir cet heureux rapprochement; aussi voyons-nous que, dans sa Philosophie zoologique, il rapprocha sa famille des Linéens de celle des Coelomacées, et qu'ainsi se trouvèrent beaucoup mieux en rapport les deux genres Limace et Hélice. De Roissy, «dans le Buffon de Sonnini, ayant (presque entièrement adopté le premier système de Lamarck, laissa les Limaces avec les Mollusques nus, ce par conséquent fort loin des Hélices. Il faut dire que l'ouvrage de Roissy est antérieur de plusieurs années à la Philosophie zoologique, et que se publiant dans le même temps que l'ouvrage de Draparnaud, son savant sauteur n'aurait pu profiter des travaux de ce dernier. Comme nous l'avons fait remarquer, Cuvier, après avoir éloigné les Limaces des Hélices, fit voir, par son excellent Mémoire anatomique sur ces deux genres, qu'il existait à peine des différences suffi- : sans pour les séparer à l'avenir,

quoi- (qu'en apparence ils fussent forl'dissemblables. Cuvier, ayant reconnu dans les ttravaux des premiers naturalistes des (erreurs et des lacunes , entreprit , imalgré les travaux deSwammerdam

sur le même sujet , de reudre comiplètement l'anatomie de ces Mollusiques en donnant de meilleures figu- : res que ses devan- ciers, ainsi qu'une (description anatomique très exacte et ;plus complète. Cuvier a rendu un

grand service à la science. D'après 'Cela, il est facile de penser (pic la

LIM 405

nouvelle opinion de Cuvier dut recevoir son application dans la classification qu'il proposa dans le second volume du Règne Animal. Nous trouvons , en effet , les Limaces dans les Pulmonés terrestres , à côté des Hélices , et il établit le passage des deux genres par les deux sous-genres Testacelle et Parmacelle qui ont des coquilles rudimentaires , comme au reste Lamarck l'avait fait dans l'Extrait du Cours, quoiqu'il conservât toujours les Li- maces et les Hélices dans deux familles et dans deux sections diffé- rentes , mais voisines. Cet arrangement resta le même dans sou grand et dernier ouvrage sur les Animaux sans vertèbres. Férus- sac , dans ses Tableaux systématiques , adopta entièrement l'opi- nion de Cuvier; seulement, au lieu de faire des Limaces et des Hélices des genres , il en fit des familles. Il sépara aussi du genre Limace les Arions sur la simple différence d'un porc muqueux à l'extrémité du corps.

Ce genre , ce nous semble, ne saurait être adopté autrement que comme sous -genre ou comme une simple section dans le

genre. Notre opinion à cet égard est conforme à celle de Blainville, dans son article Mollusque du Dictionnaire des Sciences Naturelles. Latreille, dans son dernier ouvrage intitulé : Familles Naturelles du Règne Animal, a rapproché, à l'exemple de Cuvier et de Férussac, les Limaces des Hélices, quoiqu'il en ait fait, comme ce dernier, deux familles dont l'arrangement offre des différences de peu d'importance. {V. Pulmonés et Nu-

D1L1MACES.)

Le corps des Limaces étant très-

contractile, doit être d'une forme très-variable; cependant on lui reconnaît une forme ovale, allongée, plus obtuse antérieurement que postérieurement, ou il se termine en pointe carénée, quelquefois arrondie.

Le dos des Limaces est bombé, convexe, plus que demi-cylindrique, plus épais antérieurement où l'on remarque un disque charnu, épais, ovale, plus ou moins grand, plus ou

406 LIM

moins fortement séparé du reste de la peau, et sous lequel la tête peut se rétracter. Cette partie se nomme cuirasse. La face inférieure de la Limace est entièrement plane; elle est aussi grande que l'Animal et lui sert à la progression; ce pied débordant un peu sur les côtés le corps de l'Animal, et surtout en avant; à sa jonction avec la tête, on remarque un sillon assez profond qui le sépare. Quoiqu'un peu renflée, la tête se distingue fort peu du reste du corps; elle porte deux paires de tentacules contractiles; ils sont cylindriques et terminés par un renflement. Le renflement de la première paire est seulement transparent, celui de la paire

supérieure laisse voir un point noir qui est l'œil. Ils sont, sous le rapport de la structure et de la manière dont ils se contractent, absolument semblables à ceux des Hélices. La bouche est placée en avant, et en dessous de la tête, c'est une ouverture infundibuliforme, plissée dans son contour et qui présente à la lèvre supérieure une dent cornée, solide. Sur le côté droit du corps se voient trois ouvertures : la première, assez peu apparente, en général, est placée à la base du tentacule droit; elle se voit sur une sorte de bourrelet; elle donne passage aux organes de la génération. La seconde, beaucoup plus grande, est placée dans une échancrure du bord du bouclier du côté droit; elle donne passage à l'air qui entre ou sort de la cavité branchiale.

La troisième ouverture est fort petite; elle est percée sur le bord antérieur de l'orifice de la respiration; c'est la terminaison de l'intestin ou l'anus.

La peau des Limaces est chagrinée, rugueuse, très-semblable à celle des Hélices; elle est fort épaisse, très-sensible, très-contractile, continuellement enflée par une humeur muqueuse, abondante, qui sort d'une grande quantité de cryptes muqueux dont un plus considérable et plus enfoncé, placé à l'extrémité postérieure, en donne une quantité assez notable dans plusieurs espèces. Tou-

LIM

tes les Limaces n'ont pas ce crypte, ce qui a porté Férussac à distinguer comme genre celles des Limaces qui le présentent. La locomotion s'opère, dans les Limaces, de la même manière que dans les Hélices. Les muscles, disposés sous la peau, y forment une couche dont il n'est point facile de distinguer les faisceaux.

Cette couche musculaire est plus épaisse à la face inférieure , où est le pied, que partout ailleurs. Outre ce système musculo-cutané des Limaces, elles offrent encore des muscles propres au mouvement de certaines parties. C'est ainsi que la masse buccale, les tentacules et la verge en ont qui leur sont particuliers. Les tentacules sont des cylindres creux, formés

Car la peau revêtue en dedans de fibres musculaires , circulaires. La contraction de ces fibres suffit probablement pour produire l'allongement de ces parties; leur contraction s'opère par un muscle longitudinal qui part du grand muscle médian de l'Animal, se bifurque, envoie une partie de ses fibres au tentacule supérieur et l'autre à l'inférieur. Ce muscle contient le nerf optique dans son milieu ; il s'insère en s'épanouissant un peu à l'origine du développement des tentacules. Les muscles propres de la masse buccale ont une disposition entièrement semblable à celle des Hélices, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs muscles courts, assez épais, qui sont destinés à la mastication. Ils se réunissent à un long faisceau musculaire, qui est destiné à retirer en arrière et sous le bouclier toute la tête et ses dépendances. Nous parlerons du muscle propre de la verge lorsque nous décrirons les organes de la génération. La bouche est assez grande; elle est armée à son bord supérieur d'une dent cornée qui diffère de celle des Hélices en ce qu'elle n'est pas dentée; la partie inférieure présente une langue épaisse, allongée , munie d'une plaque assez dure; dans la cavité buccale, et de chaque côté, aboutissent les canaux excréteurs des glandes salivaires. Ces glandes, dans

LIM

Les Limaces , sont beaucoup plus lourdes que dans les Hélices. De la bouche naît un œsophage fort étroit , très court, qui se

rende bientôt en un vaste estomac qui présente un cul- sac à
 •-on extrémité postérieure, □'est vers cet endroit que viennent li-
 bouir les canaux biliaires qui sont ibrt considérables ; cet esto-
 mac , dans na position naturelle, se dirige d'aivant esa airièrect
 de droite à gauche; l'in- Icesliu est beaucoup plus étroit; il naît
 (postérieurement de l'estomac; il fait pplusieuis circonvolutions ,
 accompagné et enveloppé des lobes du l'oie. Il .•■ se replie en
 avant pour se terminer , ccomme nous l'avons vu , piès de l'oiri-
 ficc pulmonaire. Le foie est fort Cgrand , divisé en deux lobes ,
 l'un (Ûroit et l'autre gauche et postérieur.

(Celui-ci contient l'ovaire. Les orifioces descanaux biliaii es-
 sont si grands, ■ idit Blainville, qu'il suffit d'insuffler ll'esiom.ic
 pour gonder tous les lobes lhép.i tiques avec la plus grande
 faccilité.

Le système de la circulation se fcompose d'artères et de
 veines- Le ecœur est placé presque sur le milieu ide la cavité du
 poumon ; il est enveloppéd'uu péricarde qui adhère à la (paroi
 supérii'uite de celte cavité. La (Coquille que renferme la cuirasse
 est (placée de manière à protéger cet or- ;gaue , puisqu'elle est si-
 tuée immédiaitemenl au -dessus. Le coeurest ovale , ' et sa pointe
 se dirige en arrière et en (dessous. L'oreillette s'y insère par sa
 iface supérieure.- Celle-ci a la foi me (d'un croissant dont les
 pointes s'ei tendent en avant et rassemblent toui tes les veines p.
 limonaires qui y aboutissent au bord exteine et convexe.

'On n'a point encore découvert de valvules à l entrée de l'aorte.
 Ce vaisseau important se distribue d'une minière presque sem-
 blable à celle des Hélices. Il n'y a même de différence sensible
 que dans la position du second tronc qui se rend au foie , à l'in-
 testin cl aux autres viscères. Ce changement de position est dû à

la manière dont les organes de la Limace sont rassemblés», au lieu d'être

LLM 407

portés dans une coquille spirale. Cuvier fait observer que la couleur des artères de la Limace est d'un beau blanc de lait, ce qui les fait reconnaître facilement, et produit l'effet «l'une injection des plus délicates.

Quand on examine par dedans l'enveloppe générale de la Limace, dit Cuvier dans son excellent Mémoire, on voit de chaque côté un grand vaisseau longitudinal qui grossit en avant. Il reçoit beaucoup de branches de l'enveloppe même, et l'on voit sur sa longueur des trous par lesquels il lui en vient des viscères; les trois principaux sont tout-à-fait à sa partie antérieure. Ces deux vaisseaux sont les deux veines caves; ils embrassent chacun de leur côté le contour de la cavité pulmonaire; dans tout ce cercle par lequel la cuirasse ou manteau se joint au dos proprement dit, il en part, dans ce cas, une infinité de petites branches, qui sont les artères pulmonaires et qui donnent naissance à ce beau réseau dont la cavité de la respiration est tapissée; réseau qui reproduit à son tour des veinules, lesquelles aboutissent toutes, en dernière analyse, dans l'oreillette du cœur.

Le réseau vasculaire dont nous venons de parler tapisse la cavité pulmonaire qui est presque ronde; il couvre démailles à peu près semblables les parois de cette cavité, à l'exception de l'endroit occupé par le péricarde. Le bouclier et la plaque osseuse qu'il contient, dans le plus grand nombre des Limaces, sont placés au-dessus de cette cavité, de manière à la protéger. Sa lace inférieure est formée par une sorte de cloison musculeuse qui la sé-

pare des viscères , et que l'on a comparée à un diaphragme. Nous avons dit précédemment où était placée l'ouverture qui fait communiquer la cavité pulmonaire à l'air atmosphérique. Cet orifice est susceptible de contraction et de dilatation , suivant les besoins de l'Animal. Il paraît que les mouvemens sont produits par les muscles communs de la peau, car jusqu'à

408 LIM

présent personne n'a décrit de fibres propres pour les opérer. Les radicules veineuses qui naissent du réseau pulmonaire se réunissent, d'après Cuvier, en plusieurs troncs qui aboutissent séparément dans l'oreillette, cequia déterminé, sa forme en croissant. D'après'Blainville , elles formeraient un seul tronc qui se rendrait isolément à l'oreillette. Cuvier nomme organe de la viscosité et Blainville organe de la dépuration urinaire un organe qui entoure le péricarde et forme autour de lui un cercle presque complet. Il est revêtu au-dehors d'une membrane lisse et grisâtre à l'intérieur. Il est composé d'un grand nombre de lames très-minces qui adhèrent aux parois par un de leurs bords ; le canal excréteur fait le même contour que l'organe lui-même; il s'adosse au rectum pour sortir à côté de lui sur le bord de l'ouverture de la respiration.

Les organes de la génération diffèrent peu , en général, de ceux des Hélices; cependant ceux-ci ont de plus les vésicules multifides et la poche du dard. Dans la Limace ils se composent, i° d'un ovaire situé dans le lobe postérieur du foie dans lequel il est presque entièrement caché ; il est granuleux , et on en voit naître par des radicules un canal ou oviducte d'abord très-mince et très-étroit , reployé sur lui-même un très-grand nombre de

fois. Son diamètre augmente insensiblement en se rapprochant de l'organe que Cuvier nomme matrice.

2°. Cette matrice dont les parois sont épaisses, est boursouflée et composée intérieurement de cellules assez régulières qui sont remplies d'une abondante viscosité. Après plusieurs inflexions, le testicule se change en un canal plus étroit, cylindrique, à parois lisses, épaisses, et qui se renfle un peu avant de se terminer dans le cloaque. 5°. Une sorte de vessie ou un sac à une seule ouverture se voit à côté du canal déférent du testicule; ses parois sont épaisses; elles se rétrécissent en un col très-court qui s'insère dans le canal déférent, peu

LIM

avant qu'il n'entre dans la cavité commune de la génération. Cette petite poche, dont on ignore les usages, B

est habituellement remplie d'un fluide »

de jaunâtre et épais. Ces différentes parties constituent l'appareil femelle de la génération. Nous ferons remar-

quer que l'organe que Cuvier nomme à

matrice, Blainville le désigne sous le

nom de seconde partie de l'oviducte

ou de testicule. L'appareil mâle est

composé d'un testicule peu différent

de celui des Hélices; il est pourvu

d'un canal déférent qui, au point où il

la matrice et l'oviducte se réunissent, qui se joint intimement à eux ainsi que le C testicule. Un organe granuleux, en 1)1 forme de bande blanche, se remar- PI que le long de la matrice et l'accom-! (l pague en grossissant; cette partie que et Blainville compare à l'épididyme, se la prolonge au-delà de la portion bour- q' soufflée de l'oviducte. C'est seulement 1(dans cet endroit qu'où en voit naître i un canal qui, d'après de Blainville, » se recourbe en se prolongeant assez l! loin pour aboutir à la base de la ver- d ge. La verge est plus courte que dans 1 l'Hélice, elle est plus large en arriè- l re qu'en avant, où elle s'amincit peu p à peu. Elle est creuse dans toute sa j longueur; elle forme par conséquent a un long sac dont les parois assez r épaisses sont musculaires ; les fibres j

qu'on y remarque sont annulaires; |
ces fibres annulaires ont le même usa-»]
ge que celles des tentacules, c'est-à- {
dire que lorsque le pénis entre en ac- |
tion , il sort en se renversant et se re- j
tournant absolument comme les tenta- (

cules; il est fixé à sa base par un muscle t épais, assez court, qui lorsque les organes de la génération et surtout la verge ont rempli leurs fonctions, la retire en dedans et en la retournant , agissant de même que le muscle rétracteur des tentacules. Ce muscle s'insère postérieurement sur la cloison charnue que nous avons vu précédemment séparer la cavité respiratrice de la cavité viscérale.

Le système nerveux ne différant pas essentiellement de celui des Hélices, nous renvoyons à ce mot pour les dé-

LIM

aails que nous en avons données. On iJoit sentir cependant que la distribution de quelques filets a dû se trouver légèrement modifiée dans les Hélices par la position des viscères.

Les organes des sens chez les Limaees paraissent être aussi peu actifs que chez les Hélices. Le loucher y est également d'une grande délicatesse.

[La vue semble nulle , quoique mvammerdam ait trouvé toutes les Parties qui constituent l'œil. Elles sont dépourvues de l'audition; mais Hlcs goûtent et elles odorent, puisqu'elles sont

attirées par une nourriture qui leur plaît et qu'elles se rassemblent en assez grand nombre sur les Plantes ou les matières qu'elles préfèrent. Cependant le goût doit être assez ibbtus, si on ne juge d'après l'état de la langue et d'une partie de la bouche qu'elles sont cornées. Les Limaces, comme les Hélices, cherchent en automne un abri contre le froid ; elles paraissent y être moins sensibles que les Irlélices, car on en voit encore lorsque Moules celles-ci ont disparu ; elles s'enfoncent dans la terre, se cachent dans les vieux murs, et elles paraissent préférer les vieux troncs d'Arbres [pourris dans l'intérieur desquels il y a de l'humus produit de leur pourriture. Arrivées dans l'endroit qu'elles jugent convenable, elles se couvrent autant qu'elles le peuvent dans le sens de la longueur; quelquefois elles le sont au point de présenter une forme presque hémisphérique. Elles passent l'hiver dans un état presque incomplet d'engourdissement ; cet état cesse insensiblement à mesure que la chaleur revient, et elles sortent de leurs trous lorsque déjà les Plantes ont commencé à pousser. C'est aussi à cette époque, vers le commencement de mai, que les Limaces s'accouplent. On n'a point encore de détails suffisants sur leur accouplement. Les anciens avaient eu connaissance de [quelques-uns des faits qui y sont relatifs, puisque Rœderer, et, d'après lui, Lillier, ont figuré des Limaces dans ce moment. Depuis il n'y a eu que les observations encore incomplètes de

LTM 409

Werlich; elles sont insérées dans l'Isis de Oken, et Férussac, dans son grand ouvrage, les a rapportées dans leur entier. Nous ne pouvons les reproduire ici, mais nous engageons beaucoup les naturalistes qui sont à portée de faire ces sortes de recherches

d'observer le plus exactement possible l'accouplement des Limaces ; c'est un fait très-intéressant et qui manque encore pour plusieurs points. Les Limaces pondent peu de temps après l'accouplement, ordinairement à la fin de mai ou au commencement de juin. Elles déposent leuiseufs, qui sont jaunâtres et arrondis, dans des endroits abrités du soleil; elles en placent quelques-uns dans le même endroit et vont chercher un autre lieu pour en déposer quelques autres. Ces œufs, d'abord assez transparens , deviennent opaques à mesure que \\ mbiyon qu'ils lenfeimenlse développe; il sort de l'œuf plus ou moins promptement, suivant l'état de chaleur de l'atmosphère.

Les Limaces habitent toutes les régions de l'Europe et l'Amérique septentrionale. On en trouve aussi aux deux extrémités de l'Afrique ainsi qu'à la Nouvelle-Hollande. Les espèces de Limaces sont fort difficiles à distinguer entre elles, quoiqu'elles soient en moins grand nombre que les Hélices; elles se confondent facilement par des nuances insensibles de couleur et de forme du corps. Les travaux sur ce genre et sur l'établissement des espèces manquent encore d'un point capital , c'est la connaissance anatomique de l'organe excitateur qui pourra seule servir définitivement à leur distinction. Swammerdam , le premier, d'après les habitudes des Limaces, les avait distinguées en deux groupes : les domestiques et les agrestes. Blainville maintint ces divisions en les désignant par les noms de Limaces rouges et de Limaces grises.

Férussac proposa un nouveau genre pour les Limaces rouges , et conserva le nom de Limace pour les grises. Outre le caractère bien sensible du point niuqueux des Limaces,

rouges , elles présentent encore d'autres différences assez notables , c'est ainsi qu'elles ont toujours la peau uniformément colorée, que l'extrémité du corps n'est point sensiblement carénée comme dans les Limaces grises; enfin elles manquent de l'organe excitateur, ce qui suppose, comme l'observe Blainville , un mode différent d'accouplement. Ces différences seront plus facilement appréciées , en consultant l'article Arion de ce Dictionnaire ou Férussac a indiqué les espèces qu'il y rapporte.

Nous conservons néanmoins l'opinion de Blainville , et nous divisons comme lui le genre Limace en deux sections. L'article Arion de Férussac est la première. Nous allons indiquer les principales espèces de la seconde après avoir donné les caractères généraux du genre : Animal ayant le corps ovale-oblong , complètement gastéropode ; la peau partout fort épaisse , mais surtout à la partie antérieure du dos, où elle forme un écusson plus ou moins circonscrit ou bouclier coriace contenant dans son épaisseur un rudiment de coquille plus ou moins évident ; cavité pulmonaire située au-dessous de l'écusson et ayant son orifice plus ou moins avancé sur le bord droit; anus au bord postérieur de cette ouverture ; terminaison des organes de la génération par une ouverture commune située à la racine du tentacule antérieur droit. (Blainv.)

Limacæ cendrée , *Limax cinereus*, Lin., Gmel., pag. 3100, n 4; Drap., Moll. terrest. et fluv. de la France; Lamk, Anim. sans vert. T. vi, p.

40, n. 3 ; *Limax antiquorum*, Fér. , Hist. des Moll. terrest. et fluv., p. 68, pl. 4, fig. 1 et 4, et pl. 8, a, fig. 1.

Limace tachetée, *Limax variegatus*, Drap., lue- cit., p. 127, n. 9; *Limax Jlavus*, Lin., Syst. Nat., p>g.

3 102, n. 7; *Limax variegatus*, Fér., loc. cit., pl. ft, fig. 1 à 6.

Lim ace aoreste, *Limax agrestis*, Lin., Gmel., p. 3101, n. 6; Lamk., Anim. sans vert., loc. cit., n. 4; Drap., loc. cit., pl. 9, fig. 9; Fér.,

LIM

loc. cit., p. 73, pl. 5, fig. 7 à 10. s;

Limace des forêts, *Limax sylva- * ticus*, Drap., lue. cit., pl. 9, fig. 10; I1 réuss., Tab. du genre Limace dans *

1 Hist. des Moll. terrest. et fluv., p. ■

Limace Jayet, *Limax Gagates*, u Drap., loc. cit., pl. 9, fig. 1; Férus., loc. cit., p. 76, pl. 6, fig. 1, 2.

Limace marginée, *Limax margi- |t natus*, Drap., loc. cit., pl. 9, fig. 7; |« *Limax ma/ginatus*, Lin, Gmel., p. 15 102, n. 10; Roissy, buff. de Sonni- 10 ni, tom. b cle.^ Moll., p. 182. (n. n.) o1

' LIMACE GOKGE DE PIGEON. * bot. CRYPT. Paulet donne ce nom à 1T un Agaric de sa famille des Glaireux, qui paraît être *Yylgaricus clypeatus*,

LIMACE PIERREUSE ou LI- J M ACE DE MER. polyp. et moll. t INom vulgaire d'une variété du Ma- a clrepora pileus, L., dont Lamarck a jj l'ail son Fougia *Limacina*. F'. Fongie. On a aussi appelé les Aplysies et j(les Doris *Limaces* de mer. (e.ls.l.) f

*LIMACELLE. *Limacella*. moll. n Genre que Blainville a établi pour un Mollusque de la famille des Lima- :t cincs qu'il a eu occa-

sion d'observer dans la collection du Muséum Britannique. Quoique ce Mollusque ait la forme des Limaces , il en diffère cependant en ce que le pied est -séparé du manteau par un sillon qui fait tout le tour du corps. Voici les caractères que Blainville a donnés à ce genre dans son article Mollusque du „ Dictionnaire des Sciences Naturelles : corps allongé , subcylindrique , pourvu d'un pied aussi long et aussi large que lui, dont il n'est séparé que par un sillon, enveloppé dans une ,■ peau épaisse , formant à la partie antérieure du dos une sorte de bouclier protecteur de la cavité pulmonaire dont l'orifice est à son bord droit; les orifices de l'appareil générateur distans; celui de l'oviducte a la partie postérieure du côté droit , et communiquant par un sillon à la terminaison de l'organe mâle située à la racine du tentacule droit. La seule

LIM

comme de ce genre avait d'abord été nommée par Blainville Lt-

ti'AC ELLE LACTESCENTE, Lilliacella

tactescerisJ maU dc-puis, il lui a substitué le nom du Limacelle d'El- <oit , Limacella Elfurtiana, espèce qui n'est ni décrite ni figurée.

La singularité des caractères de cet Animal a paru telle à Blainville , lui a ajouté l'observation suivante que nous extrairons textuellement.

Cette combinaison de caractères nous paraît si anormale, que nous doutions réellement que nous ayons bien observé le Mollusque sur lequel nous avons établi ce genre. » (d..h.)

* LIMACES. Limaces, moll. Famille de Mollusques gastéropodes uiulmonés, terrestres, déjà établie xius le nom de Limaciens (f ' . ce naot) par Lamarck, à laquelle Férusaac , en y faisant des changemens >ssez notables, a donné le nom de Limaces. Cette famille, qui fait partie l«c l'ordre d< s Géophiles de cet auteur , est divisée de la manière suiran te :

A. Entièrement cuirassées; tentacules contractiles.

TÉTHACÉHES

Vaginule, Philomique , Eumèle , fiféronicelle.

B. Cuirassées antérieurement; quatre tentacules rétractiles.

Limacelle, Arion, Limace , Parnnacelle.

c. Unitestacées avec cuirasse sans :collier.

Plecti ophore.

D. Unitestacées , sans cuirasse avec Spllier.

Testacellc.

L'arrangement decet'e famillecon- Muit insensiblement des Limaces aux .jimacons par l'intermédiaire des Heclrophores et des f estacclles qui ivoisinent les Héliearious et les Vitrides. Cet ordre nous semble le plus •naturel, et nous l'adopterions de pré 1 erenec à tout autre s'il ne conteuait Huelques genres très-incertains de

LIM 4n

Rafinesque. Nous renvoyons pour plus de détails aux différents genres qui entrent dans la composition de cette famille. (d.h.)

LIMACIA. bot. PHAN. Ce genre de Lourcuro (77 Cochin. ,
édit. Villd.

2 , p. 7b i) a été réuni au *Cocculus* par De Candolle (Syst. Fe-
get. Mat. i , p.

.626) qui a donné le nom de *Cocculus Limacia* à l'unique es-
pèce dont il était composé. Jussieu (Atin. du Mus.

d'Hist. iNatur., vol. XL, p. 151) avait indiqué ce rapproche-
ment en établissant que les genres *Epibaterium* de Foishr et Li-
macia de Loureiro étaient identiques. Or les deux espèces A' Epi-
baterium font aussi partie des *Cocculus*. f. ce dernier mot.

Le nom de *Limacia* a encore été donné par Dietrich au *Rurnea*
de Poiteau. (g..N.)

* LIMACIENS. moll. Famille établie par Lamarck, dans la
Zoologie philosophique , pour le-> genres Onchide , Limace, Par-
macelle, Vitrine et Testacelle. Lamarck a reproduit la même fa-
mille, sous le même nom et sans aucun changement , dans l'Ex-
trait du Cours, ainsi que dans les Animaux sans vert. T. vt, pag.
42. En consultant les mots suivans Limaçons, Limacelles, Li-
maces, Limacines et l'limonées , on aura une idée suffisante des
changemens apportés à cette famille par les divers auteurs.

LIMACINE. *Limacina*. moll. Cuvier (Kè{n. Anim. T. 11) a ci été
pour cet Animal , très-voisin des Clous, un genre qu'il a nommé
ainsi Lamarck, en l'adoptant , a fait sentir que ce nom , en rappe-
lant l'idée d'une Limace , ne pouvait convenir . puisque la Lima-
cine est pourvue d'une coquille spirale , régulière. Blainville a

changé ce nom pour celui de Spiratelle que nous adoptons et auquel nous renvoyons. (n..H.)

* LIMACINES. Limacina. moll.

Famille établie par de Blainville (article Mollusque du Dict. des Sciences Nat.) , pour les Hélices et les Limaces des auteurs. Blainville a été con-

4ia LIM

duità la réunion de ces deux familles, probablement par la difficulté de placer plutôt dans l'une que dans l'autre, certains genres qui, par les transitions qu'ils présentent, laissent dans le doute à l'égard de la famille à laquelle ils doivent appartenir; Blainville a distribué de la manière suivante, la famille des Lirnacins.

f Le bord antérieur du manteau renflé en bourrelet et non en bouclier ; une coquille.

Ambrette , Bulime , Agatline , Clausilie , Maillot qui comprend les genres Fartule et PrertigO; Tomogère, Hélice.

ff Le bord antérieur du manteau élargi en une espèce de bouclier ; coquille nulle ou presque membraneuse.

Vitrine qui renferme les genres HelicoLimax et Hélicaron, Férus. ; Testacelle, Parmacelle, Limacelle , Limace, Onchidie qui comprend le genre Véronicelle, Blainv-. P". tous ces mots.

* LIMACODE. Limacodes. ins.

Genre de l'ordre des Lépidoptères , famille - des Nocturnes , tribu des faux Bombyx , établi par Latreille (Fam. Natur. du

Règn. A-nim.), et répondant à une sous-division de la première division des Bombyx de cet auteur(Ge/ze/\ Crust., elc.,t.4,p. 21g).

Les caractères de ce genre sont : antennes peu ou point pectinées dans les deux sexes; ailes en toit; chenilles rampantes, ayant les pieds écailleux rétractiles; les membraneux suintant une liqueur gluante. Latreille rapporte à ce genre les Hepialus, Testudo, Asellus et Bufo de Fabricius et plusieurs autres. (g.)

LIMAÇON, mole. C'est sous cette dénomination que Férussac a réuni en famille, les genres qui pour la plupart constituent la famille des Colimacés de Lamarck. ce mot. Cependant il y a des différences notables, puisque le genre Hélice de Férussac , à lui seul , renfermait presque tous ceux des Colimacés de Lamarck. Voici de quelle manière cette famille est

LİM

distribuée dans les Tableaux systématiques des Animaux Mollusques :

A. Une cuirasse et un collier. Témacères. Hélicarion, Fer.; Hélicolimace , Fér.

b. Un collier sans cuirasse.

DicÈRES.Verligo, Parlule./7". ces t mots.
(d..h

LIMAÇONNE. ins. (Goedart.) La P chenille du Bombyx fascelina de Fabricius. (b.) i'

* LIMAÇONS, moll. Cette expès- !

sion , synonyme d'Hélice dans le plus „ grand nombre des auteurs , a pour- .

tant été employée par d'autres d'une |, manière plus générale pour désigner f toutes les Coquilles enroulées, soit > marines , soit terrestres , dont la for- ' me, plus ou moins globuleuse, pré- | sentait quelques rapports avec celle des véritables Hélices. D'Argenville

■ ést un de ceux qui la généralisèrent le j plus. Aduuson l'appliqua à la pre- „ mière section de ses Coquillages univalves sous le nom de Limaçons uni- j valves; il y rangea douze genres divi- | sés en cinq familles ; l'une d'elles , la .] troisième , comprend le genre Lima- | çon qui ne renferme que des Coquil- l les véritablement terrestres , lorsque tous les autres genres de la section J des Limaçons ne comprennent que des Coquilles d'eau douce ou marines. Les auteurs plus modernes, en ' conservant le mot de Limaçon , le restreignirent beaucoup, et ue l'appliquèrent plus qu'aux seules Coquil- jj les terrestres. (d..h.)

* L1MACTIDM. bot. crypt. , ' (Fries.) F~. Agaric.

LIMACDLE. rois. ross. Luid pa- i

raît désigner sous ce nom une sorte n de Glossopèlre. V. ce mot. (b.)

LIMANDE, pois. Espèce du genre

Pleurouecte. V. ce mot. (b.) 11

LIMAS, mole. Vieux syn. français \

de Limace. V. ce mot. (b.) j

LIMAX. moll. V. Limace.

LIMBARDE. Limbarda. bot. phan. jj

Genre de la famille des Synauthé- »

IM

t'écs , Cory mbifères de .Tiissicu, el de ii Syngénésie superllue, L., établi »ar Adanson, et adopté par H. Cassini |i[ui l'a ainsi caractérisé : involucre presque hémisphérique, formé du folioles membraneuses , imbriquées , ntièrement appliquées , nullement ii ppendiculées, linéaires-lancéolées et fOriaces ; réceptacle large, plane, marqué de fossettes , et hérissé de papilles; calalhides radiées dont les fie m s centrales sont nombreuses, régulières , hermaphrodites, celles de la circonférence nombreuses , disposées à pneu près sur un seul rang, en languettes et femelles; anthères pourvvues à la base de longs appendices su- lbulés et découpés; akènes oblongs, (•cylindriques , hérissés de longs poils,, 'surmontés d'une aigrette com posée de [poils légèrement plumeux. Ce genre fiait partie de la tribu des Inulées, «section des Inulées prototypes de Cas- <sini. Il a été constitué aux dépens des llttula , et ne diffère de ce dernier çgenre que par la structure de l'involucre qui est surmonté d'un appendice étalé et foliacé dans les vraies Hnulcs. Le Limbanla tricuspis , Cas- 'sini, ou Imila critk-moides , L., est Ile type du genre. C'est un Arbuste irameux , garni de feuilles linéaires , (épaisses , charnues, persistantes penidant l'hiver , tridentées au sommet, (flans l'aisselle desquelles

naissent de | petits faisceaux de feuilles disposées i en rosette et appartenant à un raimeati non développé. Les calatliids ■ sont jaunes et solitaires au sommet ■ des rameaux. Cette Plante n'est pas rare sur les bords de la Méditerranée. On mange ses feuilles confites dans le vinaigre. Cassini réunit avec doute, au genre Limbanla, VInula viscosa à Uesfontaines. (g..n.)

LIMBE. Limbus. bot. pn an. D.ms un calice inonosépale ou une corolle monopétale , on donne le nom de Limbe à la partie évasée qui olfre les divisions. Le Limbe est surtout distinct quand le calice ou la corolle sont tubuleux à leur base. Ainsi dans la corolle du Lilas, du Jasmin, etc.,

LIM 4i5

le tube est la partie inférieure rétrecie el cylindrique, le Limbe est la partie plane et étalée, qui présente quatre ou cinq lanières. P'. Calice el Corolle. (a. r.)

LIM BI LITE ou LIMBITE. min.

(Saussure, Journal de Physique, T.

m.iv, p. 24i). Substance d'un jaunebrunâtre, assez tendre, fusible en émail noir, et disséminée en grains irréguliers dans les lavesde la colline de Limbourg , en Brisgau. Elle a beaucoup de rapports avec la Chusite du même auteur , trouvée dans la môme roche basaltoïde , elqui n'en diffère que par sa fusibilité en émail blanc. Haiiy et la plupart des minéralogistes n'ont vu dans ces substances que des altérations de l'Olivine ou Péi idot granuliforme. (g.del.)

LIMBORCHIA. bot. phan. (Scopoli.) Syu. du Coutoubea d'Aublet.

P*. ce mot. (g..n.)

LIMBOBIA. bot. cuypt. [Lichens.) Genre établi par Acharius [Act. de Stockholm, 181 i", p. 2<*b; qui l'a ainsi caractérisé : conceptacles noirs ou gris en forme de petites coupes , dont le bord est découpé et irrégulier, semblables à une couronne. Ils ne sont point slipilés comme les Caly— cium dont ils se rapprochent beaucoup par le reste de l'organisation ; le thallus forme une croûte trèsmince, uniforme, adhérente aux bois et aux écorces d'Arbres. La place de ce genre, parmi les Lichens , n'est pas sans objection, car, scion des naturalistes dont l'autorité est trèsrespectable, il serait mieux classé parmi les Urédinées de la famille des Champignons.- En le considérant comme appartenant aux Lichens, notre collaborateur Fée l'a réuni , ainsi que le Coniocybe et le Cjphelium. d' Acharius, en un seul genre, qu'il nomme Acoiutm. Persoon {Act.

/fêter., 1810, p. 11) a décrit et figuré l'espèce principale sous le nom générique de Schizo.vylum. (g..n.)

LIME. Z./'ma. conçu. Ce genre, créé par Bruguière dans les planches de l'Encyclopédie, n'avait point été ca-

4i4 LIM

ractérisé par lui; Lamarck , dans ses premiers travaux , lui imposa , le premier , les caractères génériques , et depuis il fut admis par la plupart des zoologistes. Bruguière avait placé ce genre à la suite des Peignes , et c'est avec eux en effet qu'il a le plus de rapport. Lamarck , dans le Système des Animaux sans vertèbres , 1801 , le mit également en rapport avec ce génie et les Houlettes. Lorsque cet auteur établit des familles parmi les Mollusques dans sa Philosophie zoologique, il comprit dans celle des Bvssi-

fères la Lime , la Houlette et d'autres genres qu'il sépara des Peignes qui furent placés dans la famille des Ostracés. Cet arrangement resta absolument le même dans l'Extrait du Cours publié en 1811 ; mais dans son dernier ouvrage il apporta quelques changemens , institua la famille des Peclinides qu'il forma d'une partie des genres de ses Ostracés et des Byssifères de l'Extrait du Cours , et rétablit ainsi les rapports naturels des Limes avec les Peignes , les Houlettes et les Plagiostomes. Cuvier , Règne Animal , conserva le genre Huître à peu près tel que que Linné l'avait fait. Les Limes, les Peignes , etc. , s'y trouvèrent compris à titre de sous-genres.

Férussac n'adopta pas, à cet égard , le sentiment de Cuvier ; il préféra l'opinion de Lamarck; il admit la famille des Pectinides , et le genre Lime y fut compris. Blainville , dans son article Mollusque du Dictionnaire des Sciences Naturelles, admit par le fait la famille des Pectinides de Lamarck , en lui donnant le nom de Subostracés; il la réforma en en éloignant deux genres : celui de la Lime y resta. Latreille conserva / l'opinion de Cuvier en élevant au titre de famille le genre Huître de ce zoologiste; il le divisa en deux tribus, dont la seconde répond assez bien aux Peclinides de Lamarck : c'est dans cette tribu des Ostracés que se trouvent les Limes.

D'après ce que nous venons d'exposer, il est facile de voir qu'il n'existe que deux opinions sur le genre qui

LIM

nous occupe. Doit-il rester dans les Ostracés ou faire partie des Pectinides ? Toute la question est là ; si on considère les différens caractères des Limes , et si on les compare à ceux des

Peignes, on leur trouvera beaucoup plus de rapports qu'avec les Huîtres. Si, avec Poli, on s'attache plus spécialement à l'Animal, on lui trouvera bien des rapports avec les Huîtres et les Avicules ; mais on lui en trouvera plus encore avec les Peignes. La coquille des Limes s'éloigne certainement beaucoup de celle des Huîtres proprement dites ; elle est régulière, solide, non foliacée, non adhérente, si ce n'est par le byssus que porte l'Animal. Elle a des oreillettes cardinales comme les Peignes ; seulement elles sont plus courtes, et le ligament est placé de même dans une suture cardinale triangulaire. La principale différence entre ces genres, différence que Latreille a parfaitement saisie, puisque c'est sur elle qu'il l'a séparé en deux familles voisines, est l'existence du byssus dans les Limes, lorsqu'il manque presque toujours dans les Peignes. Nous croyons que Latreille a donné à ce caractère trop d'importance, et nous conservons l'opinion de Lamarck, en laissant ce genre dans la famille des Pectinides. Poli, dans son bel ouvrage des Testacés des Deux-Siciles, a donné l'analogie d'une espèce de Lime que l'on trouve assez fréquemment dans la Méditerranée, - il lui a reconnu tant de ressemblance avec l'Animal de l'Avicule qu'il n'a pas cru devoir les séparer en deux genres.

Dans sa méthode, ces deux genres réunis forment celui qu'il nomme Glaucodermes ; il ne peut être admis tel qu'il est ; car la différence entre les coquilles seules est si grande, qu'elle a suffi depuis long-temps à tous les auteurs pour les séparer.

Voici de quelle manière Blainville caractérise ce genre : corps médiocrement comprimé, subsymétrique, enveloppé dans un manteau, fendu dans presque toute sa circonférence, très-finement frangé sur ses bords et

LI.M

LIM

4if.

uns aucun indice de siphon; bonne entourée de lèvres frangées et de ?UX p lin s d'appendices labiaux ; un >l i udice abdominal (le pied, rudiiçntaire avec un bvssus. ("oquille vvale, plus ou moins oblique, presxic équivalve , subauriculaire, tèulièremment bâillante à la partie antérieure du bord inférieur; les somlets antérieurs et écarté.-. ; charnière uucale , longitudinale-, san^ dents; jgament arrondi, presque extérieur, mséié dans une excavation de chaque •îalvc ; impression musculaire cenalc , partagée eu trois parties disinctes. Les espèces de ce genre sont oeunombreuses : Lamarck en donne \ vivantes dans différentes mers, il Défiance en cite onze espèces fos- ILles, parmi lesquelles il y en a quelrues-unes de douieuscs par la cl i fliuullé qu'on a de les dégager , pour a plupart, de la pierre duie qui les nnveloppe. Parmi les Coquilles du eenrel'lagiostome, il y en a plusieurs uui sont également douteuses à cause ce leur mauvais état de conservation aabiiuel. Comme dans les l'Iagiostoues il ne doit pas y avoir de bâillénent pour le passage d'un Inssus , outes les fois que le côté antérieur ■.es valves est caché ou cassé , il est impossible de décider le genre. Cela sst si vrai que le Hagiostome semiuunairc , que l'on rapporte comme jype du genre , est pourtant une véritable Lime, comme nous en sommes certains d'après un individu bien conservé de notre collection. La Co- [jjiii le nommée par Sowerby {Minerai ■?onc/tology , pl. i 5a) , Lima gibbosa, n'est point une Lime; car , possédant Musieurs individus de cette espèce, t'es deux valves réunies et dans un aarfait état de conserva-

tion , nous «louons affirmer qu'il n'existe pas le moindre bâillement entre les valves pour le passage d'un byssus. Il est donc nécessaire de la rapporter parmi les Plagiostomes. On voit par ces observations combien il importe d'examiner avec soin et sur des individus qui offrent un bon état de conservation les caractères génériques.

Lime commune , *Lima squamosa* , Lamk.; *Ostrea Lima* , Gmel., n° 85 , Chemnitz, Conch. T. vu , tab 68, fig. 65i; Encyclop., pl. 2116, fig 4; D'Argenville , Conch. , pl. 24 , fig. e.

Lime subéquilatérale, *Lima aglacialis* , Lamk. ; Anim. sans vert. T. vi, pag. 157, n. 3; *Ostrea aglacialis*, L. , Gmel., n. 96; Khorr, Yergu. T. vi, tab. 56, fig. 5; Encyclop., pl. 206, fig. 2 et 3.

Lime enflée, *Lima inflata*, Lamk., Anim. sans vert., lue. cit., n. 1; Lister, Syniup. Cuic/i., tab. 177, fig. 14; Encyclop., pl. 206, fig. 5. (d..ii.)

* LIME. moll. V. Canceuxaire.

LIME. bot. pu ax. Ce mot qui est syu. de Limon, désigne aussi quelquefois le Phalaïs aspera ou Alpiste rude et un Cynusurus. (b.)

LIME-BOIS Xylotrogi. ins. Tribu de l'ordre des Coléoptères, section des Penlamères , famille des Serricornes, division des Malacodermes , à laquelle Latreille donne pour caractères (Fain. Nat. du Règn. Anim.):

corps toujours long, étroit et ordinairement linéaire , avec la tête presque orbiculaire ou presque globuleuse , dégagée ou distincte du corselet par un étranglement brusque, en forme de col. Les mandibules sont courtes, épaisses et dentées. Les antennes

sont filiformes ou amincies vers le bout. Les tarses sont filiformes, leur pénultième article est rarement bilobé Les élytres sont quelquefois très-courtes. Le nom français de Lime-Bois a été établi la première fois par Cuvier qui, dans son Tableau élémentaire de l'Histoire Naturelle des Animaux, traduit ainsi le mot Lymexylon qui désigne, dans Fabricius , un genre de Coléoptères.

Duméril (Zool. Anal.) donne le nom de Buine-Bois, aux Insectes de cette tribu. Sous la forme de larve, ces Insectes vivent dans le bois et le percent dans tous les sens; ils sont quelquefois très-nuisibles aux bois x de constructions navales qu'ils gâtent entièrement (P. Lymexylon). La-

416 lm

treille divise cette tribu en cinq genres, ce sont les genres Atractocère , Hylécoète , Lytnexylon , Cupès et Rhysode. V. ces mots. (g.)

LIMÉNITIS. ins. Fabricius a formé sous ce nom un genre de Coléoptères diurnes qui comprend le Papillon du Peuplier, le Papillon Sibylle et quelques autres analogues. F.

Nymphale. (g.)

LIMEOLE. Limcum. bot. phan.

Ce genre , de la famille des Portulacées et de l'Heptandrie Diginie , L. , est ainsi caractérisé : calice à cinq folioles ovales, acuminées, membraneuses sur les bords ; corolle à cinq pétales égaux , ovales , obtus , plus courts que le calice; sept élamines non saillantes , à filets dilatés et cornés à la base ; ovaire supère , globuleux , surmonté de deux styles à stigmates obtus; fruit spérique divisible en deux parties que Gaertner regardait comme des

graines nues , et qui sont hémisphériques , scabres en dehors , concaves à leur face intérieure. Le *Lirneum africanum* , L. , est le type du genre. C'est une Plante qui a le port de la Corrigiole et qui croît dans l'Afrique orientale et australe. Une seconde espèce a été ajoutée par Linné fils qui lui a donné le nom de *L. aphyllitum* auquel Thunberg a substitué celui de *L. capense* , parce qu'il nommait une autre espèce nouvelle *L. æthiopicum*.

Le *L. humile* de Forskahl est la même Plante que l' *An-drachne telephioides* , L. (g..n.)

* LIMETTIER. bot. phan. On donne ce nom à une des sections du genre Oranger. V. Oranger, (a.r.)

* LIMIA. bot. ni an. Ce genre, établi par Vandelli , rentre dans le *Vitex* de Linné. V. ce mot. (g..n.)

LIMICOLES. *Limicolæ*. ors. IUiger a formé sous ce nom une famille des Oiseaux qui vivent dans les terres limoneuses ; tels sont les Courlis , les Bécasses , les Barges , etc. (G..N.)

LIMICULA. ois. Nom scientifique substitué par Yieillot à celui de Li-

LIM

mosa, imposé par Brisson au genre f| Barge. V. ce mot. (g..n.) i

* LTMIRA.VEN.BOT. phak. L'Ar- " bre de Madagascar désigné sous ce " nom par Flacourt , nous paraît être a un Fromager, *Bombax*. (n.) 11

* LIMNACÉS. moll. De Blainville J a nommé ainsi la famille des Lim- L| néens de Lamarck. fr. ce mot. i

(D..H.) jj,

* LIMNADIE. Limnadia. crust.

Genre de l'ordre des Phyllopo des , famille des Aspidiphores de Latreille s (Fam. Nat. du Règn. Anim.), établi ie par notre collaborateur Adolphe Bron- n gniart qui lui donne pour caractères : a corps entièrement renfermé dans un a test bivalve; deux yeux rapprochés; t quatre antennes, deux petites sim- i pies, deux grandes divisées en deux |j| branches; vingt-deux paires de pâtes. v Ces Crustacés diffèrent des Apus par >, la forme du test, et par leurs grandes ji antennes qui manquent dans ces der-)(niers; ils s'éloignent des Branchipus j par la présence du test , par la posi- ,, tion des yeux , les antennes bifides et \ le nombre double des pates. Les Da- B phnia s'en distinguent facilement par leur tête saillante hors du test ; et , les genres Cypris , Cythérée et Lyn-

cens en sont suffisamment distingués s par la forme de leurs antennes et le j nombre des pates. Cependant quelques espèces de Lyncées s'en rapprochent par leurs formes extérieures. Ce genre avait été confondu par Hermann fils, avec les Daphnies, et il en avait donné une courte description sous le nom de Daphnia gigas.

Adolphe Brongniart en a rencontré un grand nombre d'individus , et ayant remarqué qu'ils différaient par beaucoup de caractères du genre dans lequel Hermann les avait placés , il les a étudiés avec soin et a établi le genre qui nous occupe. Le corps des Limnadia est entièrement renfermé dans un test bivalve, ovale, transparent, jaunâtre, lisse et n'offrant que quelques zones parallèles à son bord lisse; l'Animal contenu dans ce test est allongé et recourbé à sa par-

LIM

la partie postérieure ; sa tête n'est pas séparée du reste du corps. Les yeux, situés à sa partie antérieure, ne sont pas sphériques, mais leurs cotés internes sont presque plans, tandis que les côtés externes sont très-convexes ; ils sont très-rapprochés, contenus dans une même protubérance ! la tête est composée d'une infinité de petits globules inégaux qui reviennent chacun un nerf envoyé du cerveau. Au-dessous des yeux et sur la ligne moyenne, on voit une crête saillante qui offre de chaque côté une petite antenne simple, élargie à son extrémité et crénelée sur ses bords ; une en dehors se trouvent deux grandes antennes aussi longues que la moitié du corps, d'abord simples

composées de huit articles et ensuite divisées en deux branches, chacune formée de douze articles. La bouche est située en dessous de ces antennes et composée de deux mâchoires et de deux mandibules. Les mâchoires forment par leur réunion, une sorte de bec ordinairement relié sous la tête ; les mandibules sont inflées en forme de poire, arquées

tronquées à leur extrémité inférieure ; leur partie supérieure est séparée au sommet de la tête derrière ; yeux, tandis que les deux extrémités planes se rejoignent à l'entrée

la bouche et sont réunies par un bord antérieur. Ces mandibules saisissent les aliments d'une manière remarquable, en exécutant chaîne, autour des points d'insertion même d'un axe, des mouvements circulaires qui augmentent et diminuent alternativement l'angle compris entre les deux extrémités planes

elles terminent inférieurement. On voit à la partie supérieure de la tête un petit appendice vasculaire droit

incolore , dont l'usage est inconnu, i : corps ou tronc de ces Crustacés se [impose de vingt-trois anneaux dont

i vingt-deux premiers portent chacun une paire de pattes branchiales;

- dernier segment forme la queue iiri est terminée par deux filets di-

rgens. Les pattes se divisent à une

LIM 417

petite distance de leur insertion en deux branches dont l'une, interne, porte quatre appendices branchiaux très-ciliés , et 1 autre, externe, est simple; avant de se diviser la patte présente à sa face externe, un appendice cylindrique, légèrement renflé et qui paraît avoir un canal dans son milieu. Cet appendice est recouvert par un long filet qui, dans les onzième , douzième et treizième paires de pattes, s'étend beaucoup dans la cavité qui se trouve entre le dos de l'Animal et la carène du test, et après lesquels les œufs adhèrent. Les dix premières pattes sont , à peu près , de la même longueur et égales aux grandes antennes ; les suivantes diminuent rapidement jusqu'aux dernières qui sont très-courtes. Le cerveau est situé à la partie antérieure de la tête sous les yeux , il s'étend entre les bases des deux grandes antennes et embrasse une petite partie de l'œsophage ; il est réniforme , grumeleux , grisâtre; sa convexité donne naissance aux deux nerfs optiques; on ne peut distinguer ni cordon nerveux ni aucune autre partie du système nerveux. Le tube digestif est simple dans toute son étendue, et n'offre ni cœcum ni vaisseau bilieux ; il est seulement renflé dans son milieu , commence entre les deux mâchoires , passe sous le cerveau, se porte en arrière et se courbe

encore une fois pour suivre la direction du corps. Le vaisseau dorsal , placé entre l'intestin et le dos , se termine dans la tête. A la partie antérieure on trouve un autre vaisseau assez considérable qui s'étend entre le canal intestinal et la base des pales. Adolphe Brongniart pense que c'est le tronc pulmonaire. Les œufs de ces Crustacés sont situés dans l'intérieur du corps, sur les côtes du canal intestinal et dans le premier article des pattes jusqu'à la base de ce canal récurrent dont on a parlé en décrivant les pales. Ils sont arrondis , transparents et d'une grosseur variable , et ils ne sont pas réunis en masses , mais épars. Beaucoup d'individus of-

TOME IX

418 LIM

front, en outre, une masse d'œufs très-considérable , agglomérés dans la cavité du test ; ces œufs sont beaucoup plus développés que les autres , jaunâtres', et ont tous une partie enfoncée soit au centre soit à l'un des bords ; ils adhèrent tous par des filaments très-déliés aux filets des dernières pâtes. Ces œufs ainsi placés sortent de la cavité du test par deux routes différentes ; quand l'Animal est tranquille il les pond un à un par la partie antérieure du coips où ils arrivent peu à peu à l'aide du mouvement des branchies ; ils sortent alors en dessous des mandibules; quand au contraire l'Animal est inquiet ou placé dans un espace qui ne lui convient pas , il les rejette en masse par la partie postérieure du test. Ce qu'il y a de plus curieux à éclaircir dans l'histoire de ces Animaux , c'est leur mode de génération.

Surplus de mille individus qu'Adolphe Brongniart a observés à Fontainebleau , il n'en a pas trouvé un seul qui n'ait des œufs soit sur le dos soit dans l'intérieur du corps. On ne peut expliquer ce phénomène qu'en supposant que ces Crustacés sont susceptibles de fournir plusieurs générations par une seule fécondation ; alors il faudrait penser que la génération qui existait lorsqu'Adolphe Brongniart les a trouvés à Fontainebleau , n'avait pas besoin d'être fécondée et consistait uniquement en femelles ; ou bien on pourrait les regarder comme hermaphrodites avec fécondation mutuelle ou avec fécondation propre. On ne connaît pas les matières dont se nourrissent ces Crustacés ; ceux qui ont été conservés vivans , étant privés de toute nourriture, ont mangé leurs œufs. Ils nagent sur le dos , comme la plupart des Éntomostracés , mais d'une manière continue comme les Âpus et non par sauts comme les Daphnia. Leurs grandes antennes paraissent être leur principal organe de natation , leurs pales ne remuant que pour remplir les fonctions de branchies. Ils changent de peau assez souvent. La seule

LIM

espèce connue jusqu'à présent est : , La Limnadié u'Hermann, Limita- y dia Hermannii , Ad. Br. (Ann. du Mus. d'Hist. Nat., t. 6, pl. i3); Vaph«\ nia gigas, Herm. (Mém. Aptér., p. \j, i34, t. 5); elle est longue de quatre1 lignes, d'une couleur blanchâtretransparente, (g.)

LIMJNjEA. Moll. Genre formé par \ Poli pour les Animaux des Mulettes et ' des Auodontes. V. ces mots. (d.h.) •

LIMNANTHEMDM. bot. fhan. b Pour Limnanthus. /^.cemot. (g..n.) j

LIMNANĬHUS. bot. fhan. Sous »

ce nom , Necker (Elem. Bot. , n. 65i) [avait rétabli le génie JVymp/ioides de e Tournefoit, réuni par Linné à son ?

Menyanthes ; mais le nom de ViLlar- ?

sia , substitué par Gmelin , ayant été li admis par plu>ieurs auteurs et no-1, tammeutpar Ventenat, R. Brovvn et'1 De Candolle, c'est au mot Villarsie que seront exposés les caractères J génériques. (g..n.) *

LIMNEE. Limnea. moll. Et non Lyninêe. Genredela famille des Pulmonés-aquatiquesde Cuvieret de celle i des Liinnéensde Lamarck, définitive- 1.

ment établi et caractérisé par ce der- . niei zoologiste. Aucun des conchyliologues qui ont précédé Lamarck n'a pensé à faire des Limnées un genre séparé ; ainsi après avoir été confon- . dues, tantôt avec les Hélices, les [Bulimes, et plus généralement avec ' les Buccins, dénomination qui leui fut consacrée par Lister, Geoffroy, Miiller, etc.; elles furent enfin rassem5 blées sous de bons caractères dans le Système des Animaux sans vertèbres ; ou doit s'étonner que les naturalistes, 1 qui précédèrent cette époque, n'aient !

pas senti la nécessité de ce genre , cai i Millier, Geoffroy et Lister lui-même J qui connaissaient l'Animal, ne pou- l!l vaient, sans rompre les rapports les j plus évidens , les ranger parmi les autres Coquilles soit terrestres soit marines. Bruguière surtout qui avait *r commencé à opérer quelques réfor- J1 mes dans le système linnéen, pouvait ■ mieux que personne établir ce genre ; mais entraîné pas le caractère trop

ugue qu'il n'ait imposé aux Bullees, il y confondit les Limnées com-); c beaucoup d'autres Coquilles rrangees à ce genre. Le genre Limnée créé , Draparnaud le premier .mdopta , et ce savant, qui joignait à une connaissance exacte des Molnsques , un esprit judicieux qui lui ni faisait saisir les rapports , ne nanqua pas de rapprocher les Linieées des Fhyses et des Planorbes, ce mie Lamarck n'avait pas fait dans)»n premier ouvrage. Cet illustre nauralistene tarda pasà sentir In justesse cî l'idée de Draparnaud; aussi peu c3 temps après l'époque que nous tenons île mentionner, dans l'Extrait un Cours, il rapprocha , comme Cuitër l'avait aussi indiqué, les Limoées des autres Puimonés aquatiques, à 'autres zoologistes, tels que Blaiui lie et Férussac, adoptèrent entièrement cette manière devoir. Les rapcorts qui unissent les Limnées aux pâtres genres voisins sont donc justes uuisqu'après quelque divergence tou- ■ .-sles opinions se sont réunies en une :eule, celle de Draparnaud. Les Limrces sont des Coquilles lacustres, gcccrali-ment minces, suhvitrees, assez nagiles , qui se plaisent sui tout dans ■ ss eaux stagnantes où souvent elles !! multiplient considérablement. Les imnées habitent toutes les régions ce la terre vers les pôles , comme i>us la zôme torride el dans les deux lémisphèi es. L'Animal observé dénis long- temps a été nnatomisé par invier, dont i'excetlent travail est :iséié parmi les Mémoires des Angles du Muséum. Blainvide en ' t aussi la dissection , el ses recbertaes confirment celles de Cuvier; ifin nous-mêmes l'avons également liiite et nous avons vu tout ce que 'îs deux anatomistes avaient d'abord observé. Nous allons entrer dans uclques détails abrégés sur la strucnre de ces Animaux. Le corps des limnées, contenu dans une coquille !lus ou moins allongée , souvent vvalc, ventrue et toujours en spirale,

rend lui-même ces diverses formes avant l'espèce ; il ressemble en

LIM 419

cela à tous les autres Mollusques trachélipodes auxquels celui-ci appartient, il remplit ordinairement complètement la coquille , quelquefois même il a de la peine à y être entièrement contenu ; il est pourvu d'un large pied ovale , lié par un pédoncule au reste du corps; il s'y insère sous le col et le manteau qui l'enveloppe aussi bien que la partie antérieure de son corps, se fixe à l'insertion du pied en prenant plus d'épaisseur vers son bord libre; la tête est large, non séparée du reste par un col pourvu de deux tentacules contractiles; les yeux non pédonculés y sont insérés à la base; au côté interne ces tentacules sont triangulaires , épais , peu allongés. Un voile charnu, échancré dans le milieu , forme deux larges appendices , un de chaque côté, ce qui donne beaucoup d'ampleur à la tête; la bouche est antérieure, mobile, et la masse est obtuse , considérable , elle prend des formes assez différentes; Cuvier dit qu'elle a de la ressemblance avec une bouche humaine , Blainville qu'elle a la forme d'un T renversé ; cette bouche est armée de deux dents ou mieux d'une dent divisée en deux parties par une échancrure moyenne; au fond s'aperçoit une langue charnue très-grosse, et au-dessus l'ouverture de l'œsophage; celui-ci peu renflé est accompagné de deux glandes salivaires dont les canaux excréteurs aboutissent aux parties latérales de la bouche; il continue à s'avancer sans augmenter de volume et parvient à un estomac très-charnu, très-épais , comparable pour la structure au gésier d'un Oiseau ; l'intestin qui en sort est gris, d'une grosseur uniforme et assez long; il fait plusieurs grandes circonvolutions dans le foie, reçoit à l'orifice pylo-

rique les vaisseaux biliaires, et se termine à l'anus; le foie est très-grand , grenu , il occupe la presque totalité des tours de spire. La cavité de la respiration est plusprofondément enfoncée que dans les Hélices , et son orifice extérieur en diffère aussi par une languette

420 LIM

qui peut le boucher et qui se contourne en gouttière dans le temps de la respiration ; du reste elle a beaucoup de ressemblance avec celle de ces dernières pour la distribution des vaisseaux. Le système veineux et artériel pour la circulation générale ne présente rien de particulier ; ils sont en tout analogues à ce qui se remarque dans les Mollusques du même ordre. Les organes de la génération ont également beaucoup de ressemblance avec ceux des Hélices , et sont presque aussi compliqués; ils se composent d'un organe mâle et d'un organe femelle; l'organe mâle comprend deux parties : un organe excita leur qui sort au-dessous du tentacule droit à la base duquel vient aboutir un canal déférent qui prend son origine au testicule. L'organe femelle se compose d'un ovaire, d'un oviclucte , d'une poche à viscosité, et d'un orifice extérieur. L'ovaire est grauuleux, jaunâtre, accolé au foie avec lequel il remplit les premiers tours de spire; il en naît l'oviducte, conduit membraneux , d'abord assez large, contourné plusieurs fois, se rétrécissant ensuite beaucoup; il traverse une partie du foie , gagne le testicule à travers lequel il passe pour gagner ensuite le renflement cylindrique ou la poche à viscosité; elle est plissée transversalement et assez régulièrement ; elle est destinée à recevoir les œufs et à les invisquer de matière glai-reuse avant qu'ils ne puissent être pondus; le renflement se termine à un canal plus étroit qui reçoit celui d'une petite poche ou

vessie dont l'usage ne paraît pas encore bien connu; peu après, il aboutit à l'orifice extérieur qui se voit très profondément placé à l'endroit où le pédoncule des pieds se réunit au corps. Les deux orifices de la génération se trouvant fort éloignés, cela nécessite de la part. des Limnées un mode d'accouplement singulier qui n'est pas le même que celui des Hélices ; dans ce genre deux individus suffisent; ici il en faut trois , celui du milieu agissant lui seul comme mâle

LIM

et comme femelle, les deux autres n'agissant que comme mâle ou comme femelle seulement. Souvent à ces deux individus viennent s'accoupler d'autres, ce qui quelquefois constitue de fort longues traînées flottantes à la surface des eaux , dont tous les individus agissent à la fois comme mâle et comme femelle excepté les deux des extrémités. Le système nerveux* beaucoup de ressemblance avec * celui des autres Mollusques trachéli-1 podes ; l'anneau œsophagien ou le' cerveau est composé supérieurement 1 de deux ganglions réunis par un tronc médian transversal , inférieure- ' ment de trois autres ganglions dont'1 les deux latéraux sont intimement1' liés aux deux premiers; de ces gan- 1 glions parlent des filets dont la dis-* tribution générale ne présente rien f de particulier; elle est semblable à ce a qui existe dans les Mollusques du même ordre. Les Limnées sont génè- 1 ralement de couleur brun-foncé ou (brun-verdâtre ; leur peau lisse sans >' tubercules, nielle et visqueuse, pa- t raît plus sensible encore que celle pi des Hélices ou des Limaces , car au moindre attouchement elles se con- itractent, rentrent toutes leurs parties pi dans la coquille, et devenant d'une ^ pesanteur spécifique plus considéra- t?

ble, elles tombent au fond de l'eau; o comme elles sont forcées de venir respirer l'air en nature, elles ne peuvent rester très-long temps au fond de l'eau, mais pour revenir à la surface elles sont obligées de ramper sur le fond jusqu'à ce qu'elles atteignent le bord, ou de ramper le long des tiges des Plantes aquatiques, ce qu'elle ne font avec assez de rapidité; lorsqu'elle; p.

sont à la surface, elles se tiennent 1. dans une position renversée, la face : inférieure du pied dirigée en haut! La coquille en bas plongée dans l'eau \ Il paraît que dans cette position l'Animal peut ramper à la surface de l'eau; on suppose alors qu'une couche très-mince de liquide sert de [point d'appui aux efforts musculaires de son pied, mais cela est difficile à concevoir, car on sait que l'eau n'est pas

LUI

Il ne peut servir de point d'appui pour produire des mouvements que lorsqu'elle est frappée promptement par une surface assez large, et cette condition nécessaire à la natation est loin de se rencontrer ici. Voici les Caracaras qui conviennent à ce genre :

mimosa ovale, plus ou moins spiral; les bords du manteau épaissis sur le dos; le pied grand, ovale; la tête courbée de deux tentacules triangulaires, aplatis, au front; les yeux sessiles au côté interne de ces tentacules; bouche avec deux appendices filiformes considérables, et au-dessus une dent supérieure bifide; l'orifice de la cavité pulmonaire en forme de fente, percé au côté droit, et bordé intérieurement par une sorte d'apophyse annulaire pouvant se plier en gouttière; orifices des organes de respiration

nération distans ; celui de l'oviluucle à l'entrée de la cavité pulmonaire ; celui de l'organe mâle sous le tentacule droit (blainv.). Coquille iliblongue, quelquefois turriculée , à ifpire saillante; ouverture entière, élus longue que large; bord droit Tranchant; la partie inférieure remonl.ant sur la columclle et y formant un joli très oblique eu rentrant dans l'ouvverlure; point d'opercule. Les espèces de ce genre sont très-difficiles à Caractériser; on ne peut se servir que (Ides proportions des diverses parties (Idn test, pour celles dont les Anirmaux ne sont pas connus ou pour les Ifossiles; ou doit recourir aux Animaux Uorsqu'il est possible de le faire , ce cqui présente d'autres difficultés que ttous les observateurs ne sont pas à imême de vaincre. Nous ne citerons ipas parmi les espèces de ce genre la ILimuée columnaire, que l'on a re- (connu êtie une Coquille terrestre que iFéru^aca placée dans la section des Agathines.

Limnée des Étangs , *Limnea stagnalis*, Lamk., Anim. sans vert. T.

vi , pag. îftg , n. 2 ; *Hélix stagnalis* , Linné, Grnel, pag. 3657, n. 128; Bncciniurnstagnale, Miill.; Verm., p.

i5a , n. 027 ; *Limneus stagnalis*, Drapar., Mol 1., pl. 2, fig. 38 cl 3G-,

LILM 4ai

Favanne, Conchil.,pl. 61, f. 16: Eucycl., pl. 45g, fig. 6, a, b. Coquille la plus commune et la plus grande du genre, qui se trouve abondamment dans nos étangs et nos rivières; elle est ovale, aiguë, composée de sept tours dont le dernier est très-grand et subanguleux supérieurement ; die est mince, transparente?, de couleur cornée , subslriée longitudinalement ; la spire est conique,

tiès-aiguë, l'ouverture est grande, évasée; la columelle se joint au bord droit par un très-gros pli; longueur , plus de deux pouces.

Limnée des marais, *Limnea palustris* , Lamk., Anim. sans vert. T.

VI, pag. 160, n. 3; Hélix fia gi lis , Gmel, pag. 568, n. 129; Hélix palustris , ibid. , pag. 3658, n. 151 ; Hélix Corvus, ibid., pag. 5665, n. 25; *Lymneus palustris*, Drap., Moll., pl.

2 , fig. 40, 41 et 42 , et pl. 3, fig 12.

LIMNEENS. moll. Cette famille fut créée par Lamarck , dans l'Extrait du Cours de zoologie, 1811.

Il y avait réuni le genre Conovule , que depuis il en sépara avec juste raison. Les genres qui la composent aujourd'hui sont réunis par de trèsbons caractères, tirés principalement de l'organisation de l'appareil de la respiration. (Quoique vivans dans l'eau, les Animaux de ces genre» sont obligés» de venir à la surface respirer l'air qui porte son influence sur un réseau vasculaire semblable à celui des Colimaçons. V. Hélice.

Les anciens auteurs donnaient le nom de Buccins, à la plupart des Coquilles qui sont placées aujourd'hui dans cette famille. Lister donnait aux Lianobes, le nom de Pourpres, et il les avait assez bien circonscrits; cependant Linné rangea indistinctement les Planorbes et les Limnées parmi les Hélices , ce qui réunissait dans le même genre des Animaux fort différens et des Coquilles d'un aspect qui devait laisser peu de doute sur leur origine. Millier, en créant le genre Planorbe , a rempli une indication très-juste; aussi tous les cou-

chylologues , excepte les savans anglais, qui se sont tenus à la lettre de Linné , l'ont adoptée. On doit s'étonner, après la création de ce premier genre, que personne n'ait songé à établir une coupe pour les Limnées qui se trouvaient dans le même cadre d'observations; et Miiller, qui avait si judicieusement séparé les Planorbes , confondit celles-ci avec les Buccins. Biuguière les retira des Hélices de Linné, les rangea dans son genre Bulime, où elles n'étaient pas mieux placées , et où elles restèrent jusqu'à l'époque où Lamarck , dans le Système des Animaux sans vertèbres , créa le genre Limnée , qu'il éloigna d'abord des Planorbes, mais qu'il en rapprocha bientôt après. Dans l'intervalle , un genre très-analogue aux Limnées , qui avait été créé depuis longtemps par Adanson , sous le nom de Buline , fut reproduit par Draparnaud, sous celui de Physa, qui fut généralement adopté. Les trois genres Limnée , Physa. et Planorbe , constituent aujourd'hui pour Lamarck, la famille qui nous occupe , ayant reporté aux Auricules les Conovules qui ne s'en distinguent pas suffisamment comme genre. Cuvier n'a point adopté cette famille ; cependant les trois genres qui la constituent, ont servi de base au groupe des Pulmonés aquatiques dans lequel il a réuni plusieurs genres, dont l'organisation n'est point encore bien connue. Férussac adopta la famille des Limnées de Lamarck. Il y groupa plusieurs genres nouveaux et bien incertains de Rafinesque , et y ajouta le genre Ancyle de Geoffroy , c'est même le seul changement im-

portant que ce savant ait apporté dans les Limnées. Lamarck avait placé les Ancyles parmi les Calyptraciens, il est vrai avec toute la réserve convenable pour un genre aussi peu connu , quant à l'organisation de son Animal. Il y avait été conduit , sans doute , par l'analogie des formes du test. Quelques considéra-

tions sur ce genre que Férussac donna à l'article Ancyln de ce Dictionnaire nous portèrent à adopter son opinion dans

LIM

notre ouvrage sur les Coquilles fossiles des environs de Paris avant la publication de l'important article Mollusque du Dictionnaire des Sciences Naturelles par Blainville.

Ce savant zoologiste émet une opinion fondée sur des observations nouvelles qui confirment l'opinion de Lamarck, puisque les Ancyln se trouvent reportées parmi les Scutibranchies, dans la première famille des Otidés qui renferment les genres Haliotide et Ancyln qui précèdent la famille des Calyptraciens. Blainville , dans l'article précité , a changé le nom de Limnéens pour celui de Limnacés. Elle renferme, comme dans l'ouvrage de Lamarck , les trois genres Limnée , Physe et Planorbe.

V. ces mots et Ancyln. (d..h

LIMNESIUM. bot. phan. (Siegesbeck.) Syn. de Knautia ; (Cordus) de Gratiola; (Daléchamp) de petite Centaurée , Erythraea. (h.)

LIMNETIS. bot. phan. Le genre de Graminées ainsi nommé par Persoon est le même que le Spartina de Schreber ou Trachynotia de Richard.

Le nom de Spar/ina étant le plus ancien doit être préféré. V. Spahine.

LIMNIA. bot. phan. Syn. de Claytonia sibirica ,L. (b.)

* LIMN1CHUS. ins. Genre de Coléoptères établi par Ziegler et trèsvoisin des Byrrhus. Nous ne connaissons point ses caractères. La principale espèce est le Limnic/ius sericeus de Duft, Byrrhus pygmeus de Sturm.

Il se trouve en Autriche. (g.)

LIMNIÏES. min. Pierres sur lesquelles on voit des ligues sinueuses qui , selon Léman (Dict. de Déterville), "ressemblent aux traits d'une carte de géographie. (B.)

•LIMNIDM. conch. Oken, dansson Système général de Zoologie, p. a36, a proposé ce genre pour YUnio pictorum. On sent bien qu'un tel démembrement n'a pu être adopté. V . Mu-

LETTE. (D..II

LIMNITJS. ins. Nom donné par

LIM

Illiger à un genre de Coléoptère que Latreille avait déjà établi. K . Elmis.

* LIMNOBIE. Limnobia. ins. Genre de l'ordre des Diptères, famille des Némocères , tribu des Tipulaires , éla • bli par Meigen et ayant pour caractères : trompe fort courie , avec deux grandes lèvres.; point de petits yeux lisses; pâtes longues - dernier article des palpes guère plus long que le précédent , sans divisions articulaires apparentes; antennes sétacées, simplement velues , entièrement moniliiformes depuis le troisième ou le quatrième article ; le premier de ces articles très- sensiblement plus long que

le suivant ; surface des ailes glabre; longueur des quatre premiers pieds peu 'différente. Meigen, dans ses premiers ouviages, avait donné à ce genre le nom de *limonia* , et Latreille l'avait employé dans son *Généra* , le Dictionnaire d'Histoire Naturelle et dans tous ses autres ouvrages. Ce n'est que dans ces derniers temps (*Fam. Natur. du llègn, Anim.*) qu'il l'a ébagné à l'exemple de Meigen. Cet auteur ayant plutôt égard à la forme des antennes qu'à celle des palpes , a rapporté à sou genre *Limnobiahi* *Tipula rUosa* de Linné , que Degéer figure et qui est placée par Latreille avec son genre *1Jedicia* {V.

ce mot). Nous pensons , avec ce dernier, qu'il faut en séparer cette espèce et celles qui lui sont analogues, et restreindre le genre *Limnobic* aux espèces qui ont les palpes terminés par un article simple. En adoptaut les genres *lirioplera* et *Trichocera* de Meïgen que Latreille réunissait (Dict.

d'Hist. Nat.Jau genre *Limonie* en en faisant des divisions, nous laisserons donc dans le genre *Limnobie* les espèces qui composent sa_ première division et nous traiterons des deux autres genres à leur lettre ou au supplément.

Les *Limnobics* se distinguent des genres *Cténopbore* , *Pédicie* , *Tipule* et *Néplirotome* par les palpes qui sont terminés par un article grand et compose de nœuds ou de petits arti-

LIM 4a3

cles, tandis qu'il est simple dans les premiers; elles s'éloignent des *Trichocères* et autres genres voisins par les antennes qui n'ont pas plus de dix articles dans ceux-ci , et par d'autres caractères tirés des pâtes , des ailes, etc. Ce sont des *Diptères* qui ont les formes générales des *Tipules* et qui vivent comme elles dans

les lieux bumides et ombragés. Degéer a donné des détails fort curieux sur les mœurs d'une espèce de ce genre {*Limnobia replicata*). Sa larve vit de feuilles de Mousse qui se trouvent dans l'eau , et ressemble à une chenille épineuse; son corps est long d'environ un pouce et large d'une ligne et demie; il est cylindrique et sans pâtes, et composé de onze anneaux; la tête est très-petite ; elle offre deux antennes et deux yeux noirs ou taches qui les représentent.

Les mandibules sont dentelées , et la lèvre inférieure porte deux petits palpes. Quand on l'inquiète, elle roule son corps en cercle. Elle se fixe sur les Plantes au moyen de quatre crochets écailleux placés dans une cavité du dernier anneau du corps; et quand elle veut changer de place, elle s'accroche par les dents et ensuite par ces crochets, et avance ainsi en pliant son corps comme le ferait une chenille serpentante. La nymphe flotte à la surface de l'eau ; elle est allongée, presque cylindrique, d'un brun tirant un peu sur le vert; plus pâle en dessous; parsemée de petits points noirs avec des bandes plus obscures. Cette nymphe porte au-devant de son corselet deux cornes allongées , tubulaires, qui sont les organes de la respiration; elle a toujours soin de tenir leurs extrémités hors de l'eau, afin de respirer, et si on la retourne, et que ses cornes ne soient plus placées ainsi , elle se démeut et se courbe de diverses manières jusqu'à ce qu'elle ait repris sa première position. Le dernier anneau de l'abdomen et même plusieurs autres présentent des crochets qui servent à cette nymphe pour s'accrocher aux tiges des Mousses et autres Plantes

aquatiques. L'Insecte parfait éclot six jours après que la larve a passé à l'état de nymphe. Il sort par une, fente qui se fait au-devant du corselet sur la tête et sur une portion de la poitrine. Les Limnobies sont trèscommunes au printemps dans les prés et au bord des fossés et des rivières. On en trouve beaucoup aux environs de Paris. La plus commune «St :

La Limnobie peinte , *Limnolia picta* , Meig. ; *Tipula picla* , Fabr. , Schell. (Dipt., t 58, fig. i). Antennes noires, avec le dernier article fauve; corselet cendré; abdomen jaunâtre, avec trois lignes noirâtres ; ailes cendrées avec des lignes annulaires dans leur milieu et des taches marginales noirâtres.

La Limnobie a ailes pliées , *Limnolia replicata*, dont nous avons parlé plus haut, est décrite par Linné et Fabricius. Degéer l'a figurée dans son Histoire des Insectes , T. vi, p. 20. K. , pour les autres espèces , Fabricius et surtout Meigen.

LIMNOBION. *Limnobium*. bot.

pu an. Genre de la famille des Hydrocharidées, établi par le professeur Richard , dans son travail sur cette famille (Mém. Inst. Se. Phys. 1811, p.

72), pour *Hydrocharis Spongia* de Bosc. Ce genre offre les caractères suivans : les fleurs sont dioïques, réunies dans une spathe pédonculée, diphyllé et multiflore. Le calice est à six divisions très-profondes et étalées ; les trois intérieures sont pétaïoïdes , plus longues et plus étroites. Dans les fleurs mâles , les étamines , au nombre de neuf, sont monadelphes et à anthères linéaires ; dans les fleurs femelles on trouve trois appendices courts, placés chacun en face des divisions intérieures; les stigmates, au nombre de six , sont bipartis.

Le fruit est une péponide ovoïde, polysperme , renfermant des graines obovoïdes à tégument couvert de fibrilles.

Ce genre se compose d'une seule «spèce, *J. immobium* Basai, Rich. ,

LIM

/oc. cit., t. 8 ; *Hydrocharis Spongia*, Bosc , Ann. Mus. , 9 , p. 396 , t. 30. C'est une Plante aquatique originaire des lieux tourbeux de la Caroline inférieure. Ses feuillus sont pétiolées , radicales, subcordiformes , entières, marquées de cinq nervures longitudinales. Les feuilles inférieures sont remarquables par le grand développement du tissu cellulaire de leur lace inférieure qui forme une sorte de coussinet spongieux propre à soutenir ces feuilles à la surface de l'eau.

LIMNOCHARE. *Limnocharis*.

abachn. Genre de l'ordre des Trachéennes , famille des Hydrachnelles, établi par Latreille aux dépens du genre *Hydrachna* de Millier. Ce genre se distingue de celui d'*Hydrachne* par ses palpes qui sont simples , tandis qu'ils ont un appendice mobile dans ce dernier genre. Tous les autres caractères sont les mêmes dans ces deux genres, et leurs mœurs sont parfaitement semblables aussi.

L'espèce qui sert de type à ce genre est 1! *Acarus aquaticus*, L.; *Acarus aquaticus holosericeus* , Deg. (Ins., 7, ix, i5, 20) j *Trombidium aquaticum*, Hermann(Mém. Apt.,i, 11)./^ . Hy-

DBACHNE et HYDRACHNELLES. (g.)

LIMNOCH ARIDE. *Limnocharis*.

bot. phan. Genre établi par Humboldt et Bonpland (Pl. Aiquin.) , adopté par le professeur Richard qui l'a placé dans sa nouvelle famille des Butomées. Ses fleurs ont hermaphrodites, pédonculées, disposées en sertule ou ombelle simple et enveloppées dans une spathe polyphylle. Le calice est à six divisions très - profondes ; trois extérieures vertes minces , et trois intérieures colorées, pétaloïdes et plus grandes. Les étamines sont au nombre d'une vingtaine, entourées d'un grand nombre de filaments stériles. Les pistils varient de six à vingt réunis au centre de la fleur. Ils sont dressés, allongés, terminés en pointe recourbée au sommet, uniloculaires , contenant un grand nombre d'ovules attachés à un

LIM

réseau vasculaire , qui tapisse la paroi interne de l'ovaire. Le fruit est également allongé , sec , indéhiscent , contenant îles graines recourbées en forme de fer à cheval et recouvertes d'un tégument propre strié transversalement. L'embryon a également la forme d'un fer à cheval.

Cegenre se compose de deux espèces originaires de l'Amérique méridionale CesontdeuxPlantes aquatiques, vivaces , ayant les feuilles radicales et engainantes; des fleurs blanches ou jaunâtres , disposées en sertule ou ombelle simple au sommet d'une hampe. L'une , *Limnoc/iaris Plumierii* , Rich. , loc. cit. , t. 10 et 19 , n. 1 , est le *Limnoc/iaris emarginata* , Humb. etBonpl., Pl. yEqû, t. 34, ou *slisma flava* , L., déjà mentionné dans le Catalogue de Plumier sous le nom de *Darnasonium maximum Plantaginis folio* , t. 10). Elle croît à St.- Domingue et sur le continent de l'Amérii-que méridionale. L'autre , *Limnoc/iaris, Humboldtii* , Rich., loc.

cit. , t. 19 , f. 1, est le *Stratiotes nymphoides* , Willd. , Sp , 4, p. 821. lia clé trouvé par Humholdt et Bonpland aux environs de Caracas. (a. r.)

LIMNOPEUCE. bot. phan. (Vaillant.) V. Hippunis.

LIMNOPHILE. *Limnophila*. bot.

Filan. Genre de la famille des Scrophularinées et de la Didynamie Angio-permie, L., établi par R. Brown (Prodr. 77. Nov.-Holl. , 44a) pour l'*Holtonia indica*, L., et auquel il donne les caractères suivans : calice tubuleux , à cinq divisions égales; corolle infundibuliforme; limbe à cinq lobes égaux; étamines didynames incluses ; anthères rapprochées et réunies par paires; style terminé par un stigmate dilaté et oblique; capsule biloculaire, à deux valves biparties, la cloison étant formée par les bords rentrants des valves. La *Limnophila gratioloides* , L. Brown , loc. cit., est une Plante qui croît dans les lieux aquatiques. Ses feuilles sont opposées, profondément incisées, souvent tripartites et semblant en quel-

LIM 4*5

que sorte verticillées. Ses fleurs sont axillaires , pédonculées et accompagnées de deux bractées. Elle croît non-seulement dans l'Inde , mais à la Nouvelle-Hollande. (a. r.)

LIMNORIE. *Limnoria*. cnusT.

Genre de l'ordre des Isopodes , section des Aquatiques, famille des Cymothoadées (Latr., Fam. Nat.), établi par Leach , réuni aux Cymothoas de Fabricius par Latreille (Règn. Anim.) et adopté par ce dernier (Fam. Nat., etc.) avec ces caractères : corps cylindro-linéaire : yeux grenus et formés de petits yeux lisses (ocelles),

rapprochés. Les quatre antennes insérées sur la même ligne, de la longueur, au plus, de la tête, de quatre articles; tous les pieds simplement propres à la marche; dernier segment abdominal grand, subovoïde bicaudé. Ce genre se distingue du genre *Cymothoa* proprement dit par la tête qui est plus étroite que le premier segment dans ce dernier et par ses yeux qui sont peu apparents. La seule espèce connue de ce genre est :

La LIMNOHIE TÉRÉBRANTE, L. te-

relans, Leach. Elle est longue d'environ une ligne à une ligne et demie du pied anglais. Son corps est cendré, avec les yeux d'un noir tirant un peu sur la couleur de poix. On la trouve en quelques parties des côtes d'Angleterre, où elle se loge dans les trous qu'elle fait. V. *Cymothoa* et *Cymothoides*. (g.)

L I M O D O R E . *Lirnodorum* . bot.

phan. Orchidées, Juss., Gynandrie Monandrie, L. Ce genre, établi par Tournefort et adopté par la plupart des botanistes, renferme un très-grand nombre d'espèces qui, d'après les travaux des auteurs modernes, doivent aujourd'hui être réparties en plusieurs genres distincts. Le type de ce genre et l'espèce qui a servi à son établissement est le *Lirnodorum abortivum*; c'est donc surtout d'après cette espèce que doit être tracé le caractère de ce genre. Toutes celles qui

Jr ont été réunies et qui n'offrent pas les mêmes signes caractéristiques de-

4aG LIM

vront être portées dans d'autres genres. Or voici ces caractères tirés de 1 espèce que nous avons nommée tout à l'heure. L'ovaire

n'est pas tordu en spirale. Les trois divisions externes du calice sont semblables , dressées et presque conniventes ; les deux intérieures et latérales sont plus étroites ; le labelle est sessile , di essé , entier, terminé à sa base par un éperon plus ou moins allongé. Le gynostème est très - long , semi -cylindrique , c'est-à-dire plane sur son côté antérieur et convexe postérieurement ; l'anthère est terminale, operculiforme, contenant deux masses polliniques, piillacées , agglutinées entre elles du côté interne. Le stigmate est placé immédiatement au-dessous de l'anthère.

Tels sont les caractères des véritables Limodores. Ils ne conviennent qu'à un très-petit nombre de celles qui y ont été placées. Ainsi plusieurs doivent être mises parmi les Blelia. V. ce mot. D'autres ont formé le genre Geodorum de Jackson. Quelques autres ont servi à l'établissement des genres Calypso , Calapogon , etc. Ainsi, parmi les espèces du genre Bletia , on a placé les Limodorum Taidervillœ , L. ; L. altum, L.purpureum , L. Dans le genre Geodorum , on trouve les Limodorum 7iutans , L. recuruurn. Le Limodorum bulbosurn forme le genre Calypso , et dans le genre Calapogon , R. Brovvu a placé le Limodorum tuberosum et quelques autres espèces analogues.

Tue Limodorum abortium , Willd., Sp. , Orchis abortiva , L., qui forme le type du genre , est une grande Plante vivace qui croît dans les forêts ombragées et montueuses ; sa racine se compose de grosses fibres cylindriques et charnues; sa tige, haute de deux à trois pieds , porte des feuilles très - courtes , embrassantes et presque semblables à des écailles.

Les fleurs sont d'un pourpre obscur , formant en petit nombre un épi à la partie supérieure de la tige.

Dans le Prodrome de la Flore du Napaul , Don a décrit sous le nom de

LIM

Limodorum roseum une espèce nou- |"

velle qui a beaucoup de rapports avec 1

l'espèce précédente. (a. r.) '

LIMON, bot. I'han. Fruit du Li- \

monier. V. ce mot. (b.) j

LIMON, oéol. P\ Matière et « Terrain.

LIMONELLIER. bot. phan. Pour

Limonie. F~. ce mot. (b.) ^

* LIMONH. ois. (Flacourt.) Les \ Tourterelles et les Pigeons à Mada-j g&scar. (B-; ?

LIMONIA. iNs. etBOT./^ . Limonie. ii

LIMON IASTRUM. bot. phan. 1

(Heister.) Syn. de Statice monopetala. I

fB.) F

* LIMONIATIS. min. Il est im- I possible de reconnaître quelle Pierre, o semblable à son Smaragdus, le com- ^ pilateur Pline entendit désigner sous 1 ce nom. (B.) o

LIMONIE. Limo/iia. ins. Nom

donné par Meigen et par La treille li

aux Diptères qu'ils ont nommés de- j puis Limnobie. V. ce mol. (g.)

LIMONIE. Limonia. bot. phan. ^ Ce genre, établi par Linné, fait partie de la famille des Aurantiées. Dans) son travail sur cette famille , Correa S de Serra a retiré plusieurs des espèces o qui y avaient été rapportées pour en t faire des genres nouveaux qui ont été d généralement adoptés. Ainsi le Li- ij monia monophylla forme le genre ; Atalantia, le Limonia penlaphylla B et L. arborea le genre Glycosmis, et |, le Limonia trifoliata le genre Tripha- ,, sia. Les espèces qui forment aujour- f: d'hui le véritable genre Limonia of- p fient les caractères suivans : le cali- ^ ce est à quatre ou cinq divisions pro- j, fondes ; la corolle se compose de E quatre ou cinq pétales sessiles; les élimines sont libres et distinctes, f rarement au nombre de quatre à (| cinq , plus souvent en nombre dou- l ble des pétales. Le fruit est une baie pulpeuse à quatre ou cinq lo- < ges monospermes. De Candolle , clans le premier volume de son Prod/vmus systemaiis , rapporte à ce

LIM

; genre onze espèces , la plupart originaires de l'Inde et de la Chine. Ce .soutdes Arbres ou des Arbrisseaux .souvent munis d'épines, ayant des t feuilles simples, trifoliées ou pinnées, ides fleurs blanches ou roses, exhalant une odeur suave analogue à celle des i autres Arbres de la même famille.

Parmi ces espèces nous ciieions la .Limonia acirfissima , L., Lamk. , III., it. 353, f. i, originaire de l'Inde, ;mais qu'on cultive également en . Amériique. C'est un Arbrisseau élé- : gant et toujours vert , dont les feuil- 1 les sont impai ipinnées et les fleurs '

blanches disposées en panicules courtes et axillaires. Ses fruits , qui sont : jaunes et globuleux, répandent une i odeur très-suave qui approche beaucoup de celle de l'An is. Leur pulpe i est très-acide et très-agréable. On en ! fait des boissons rafraîchissantes , ou i on les confit au sucre. (a. n.)

LIMONIER, bot. phan. On appelle ainsi une division du genre Oran- ; ger , que l'on désigne plus commui néinent sous le nom de Citronnier. P'. 1 Ouangeh. (a. n.)

* LIMONITE. min. (Hausmann , Manuel de Minéralogie, t. i, p. a85.) Substance noiie, opaque, à cassure

i conchoïdale , ayant l'éclat de la cire et donnant une poussière d'un jaune

>d'ocre ; médiocrement dure : pesant spécifiquement 2,603. Au chalumeau, sa couleur n'éprouve aucun changement remarquable; par un feu prolongé , elle fond sur les bords en une scorie noirâtre. Par la calcination, elle donne une poussière rouge. Elle paraît être une combinaison ou ttu mélange de Fer limoneux et de Fer phosphaté représenté par les proportions suivantes : hydrate de Fer , 74,009; phosphate de Fer, 24,870; oxide de Manganèse, i,5; total , 100.679. On la trouve avec le Fer limoneux commun (Thoneisenstein) en petites masses ou en lits très-min-
■ces dans les terrains d'alliivion.

(g. del.)

LIMONIUM. bot. i'ïian. On a beaucoup disserté pour savoir quelle

LIM 427

était la Plante ainsi nommée par Dioscoride. Les uns ont voulu que ce fût la' Pyrole [*Pyrola rotundifolia*, L.) , d'autres le liela sylvestris ; quelques-uns le *Senecio Doria*. Mais la plupart des botanistes s'accordent pour le *Statice Lirnonium*, L , dont Tournefort avait fait un genre sous le nom de *Limonium*. V. *Statice*.

LIMOSA. ois. (Brisson.) Syn. de Barge. V. ce mot. (u-)

LIMOSELE. *Liniosella*. bot.

piian. Ce genre , de la Didyramie Angiospermie , L. , avait été désigné par Vaillant sous le nom de *Vlantaginella*. Jussieu l'avait placé parmi les Primulacées, mais il a été rapporté aux Scrophularinées par De Candolle et R. Brown qui en ont ainsi exprimé les caractères : caliceà cinq divisions peu profondes , égales; corolle campanulée , à tube court et à cinq petites divisions égales; quatre étamines presque égales, quelquefois réduites au nombre de deux ; stigmate capité ; capsule à deux valves séparées par une cloison parallèle et incomplète. Ce genre renferme des Plantes herbacées , très-petites , ram-

fiau les et qui croissent dans les localités marécageuses. Leurs feuilles sont fasciculées , à pétioles dilatés et presque engainans à la base. Les fleurs sont solitaires et portées par des hampes. On n'en connaît qu'un très-petit nombre d'espèces, dont la plus remarquable, *Limoietta aquatica* , L. , croît dans les lieux inondés de l'Europe. On la trouve fréquemment aux environs de Paris et surtout à Bondy. (g..N.)

LIMULE. *Limulus*. crest. Genre de l'ordre des Xyphosures de Latreille (Fam. Nat du Règne Anim.), que cet auteur rangeait (Règne Anim par Cu- ■ vier) dans son ordre des Branchiopodes, section des Pœcilopes; ce genre a été établi par Millier; il a pour

caractères, suivant Latreille : point desiphon; la base des pieds (ceux du céphalothorax ou de la division antérieure du corps) qui, les deux derniers exceptés,

4a8 LI1VI

servent à la locomotion et à la préhension, est hérissée de petites épines et fait l'office de mâchoires. Test dur, divisé en deux boucliers offrant en dessus deux sillons longitudinaux , et recouvrant tout le corps, qui se termine postérieurement par une pièce très-dure, ensiforme et mobile.

Le corps des Lunules est divisé en deux parties : la première ou l'antérieure, que Latreille nomme céphalothorax , est recouverte par un bouclier lunulé débordant , et portant deux yeux très-écartés l'un de l'autre, entre lesquels Cuvier a observé trois petits yeux lisses rapprochés ; au-dessous de la carapace dont nous venons de parler , sont insérés , sur une saillie conique , en forme de bec ou de labre, deux corps semblables à deux petites serres de Crabe , didactyles ou monodactyles, selon les sexes, composées de deux articles que Latreille considère comme les antennes et que Savigny assimile à la seconde paire de pieds-mâchoires des Crustacés , ainsi qu'aux mandibules des Arachnides , et auxquels il donne le nom de mandibules succédanées , ou fausses mandibules. A la suite de ces antennes se trouvent six paires de pieds , dont les deux derniers réunis forment un grand feuillet portant les organes sexuels, et dont les dix autres sont libres , et tous , à l'exception des deux premiers, didactyles. Ces pieds sont composés de six articles : le radical , ou la hanche , est hérissé de piquans ou épines dont le nombre est très-considérable aux deux ou trois premières

flaires de pieds. Ces articles tiennent lieu de mâchoires ; l'article suivant , ou le premier de la cuisse , offre aussi quelques épines. La dixième paire de pieds diffère des autres par divers caractères , et surtout par les hanches , qui ne sont point maxillaires, et par l'extrémité antérieure du dernier article de la jambe, qui se termine par quatre petites lames mobiles , droites, allongées , pointues , égales et rapprochées en un faisceau longitudinal; la partie extérieure de cette même extrémité de la jambe donne attache

LIM

au dernier article , qui est terminé , comme les autres, par deux doigts mobiles qui diffèrent un peu des précédents. Le pharynx débouche entre les hanches de toutes ces pâtes ; l'oesophage se dirige en avant , l'estomac des Limules étant situé, comme dans les Crustacés décapodes , vers le bord antérieur du test. La seconde partie du corps des Limules , ou la postérieure , est recouverte par un bouclier qui a , en dessus , la forme d'un trapézoïde échancré postérieurement, avec les bords latéraux armés d'épines mobiles et alternantes; en dessous et dans un creux en forme de boîte presque carrée, sont cinq paires de feuillets ou de larges pieds natatoires , dont la face postérieure est garnie de branchies. L'anus est placé à la racine de la pointe qui termine le corps cette pointe est cornée , très-dure droite , trigone, très-pointue et souvent armée, sur le dos, de petites dentelures ; elle s'insère dans une cavité , au milieu de l'échancrure postérieure de la seconde pièce du test , et elle est articulée avec elle par le moyen d'une tête dont les deux côtés sont dilatés et appuyés sur deux saillies de cette pièce. Le cœur, comme dans les Stomatopodes , est un gros vaisseau garni , en dedans , de colonnes char-

nues régnant le long du dos et donnant des branches des deux côtés; un œsophage ridé, remontant en avant, conduit dans un gésier trèscharnu , garni intérieurement d'une veloutée cai lilagineuse toute hérissée de tubercules, et suivi d'un intestin large et droit. Le foie verse la bile .dans l'intestin par deux canaux de chaque côté. Une grande partie du test est remplie par l'ovaire dans les femelles , et par les testicules dans les mâles.

L'Ecluse et Bontius sont les premiers naturalistes qui aient mentionné et figuré des Limules; Millier les confond avec les Jpus; Fabricius les en a distingués, mais il les a placés dans son ordre des Kleistagnathes ou Décapodes brachiures de Latreille; enfin Lamarck, ayant

LIM

conservé le nom de Limule au genre Jpus , appelle Polyphème le genre dont nous traitons. Ces Animaux vivent dans les mers des pays cliaml; pendant l'été ils viennent le soir,

J presque toujours par couples , sur es plages .sablonneuses ou marécageuses. La femelle, qui est plus grosse, porte sur son dos le mâle , sans que celui-ci y soit en état d'accouplement ni violemment attaché : leurs mouvemens sont fort lents et très -cii-conscrits, ci lorsqu'ils marchent, on ne voit aucune des pales ; dès qu'on les touche , ils s'anêtent et relèvent leur queue pour se défendre. Ils restent toute la nuit à moitié bois de l'eau , et ne cherchent à se sauver que quand ils sèment que le danger commence à être imminent. Leur queue est trèsredoutéedans l'Inde et en Caroline, parce qu'on est dans l'opinion que la piqure est venimeuse; les sauvages se servent de cette pointe en guise de fer de flèche. La chair des Limules est bonne à manger , et leurs œufs

■ sont très-rélicies ; on sert sur les tables , à la Chine et au Japon , l'espèce qui lui est propre , et qui arrive , avec l'âge , à une longueur de deux pieds. Ces Animaux se trouvent dans les mers des deux Indes , depuis l'équateur jusqu'au quarantième degré de latitude ; ils sont communs dans le golfe du Mexique , sur les côtes de Caroline , aux Moluques et dans les mers du Japon et de la Chine. Les Américains appellent ces Crustacés Kitig- Krab ; les nègres des bonis de la mer se servent du test pour puiser de l'eau ou pour d'autres usages domestiques. On connaît quatre ou cinq espèces de ce genre ; nous citerons :

Le Limule Poltphème, *L. Poljphemus* , Fabr. , Linn ; *Limulus Cyclops* , Fibr. (jeune) ; *Limulus Po-lyphemus*, Linn.; *Limulus Suwerbii*, Leach (Zool. Miscell., pl. 84). Il varie, selon l'âge, pour la taille et la couleur. Les vieux sont d'un brun noirâtre, et les jeunes d'un jaunâtre qui tire sur le brun. L'arête du milieu du dos a, sur chaque pièce du test,

LIN 4ag

trois épines ; le stylet , formant la queue , est à peu près de la longueur du corps. Cette espèce se trouve sur les côtes sablonneuses d'une grande partie de l'Amérique.

Les Limules sont rares à l'état fossile; jusqu'à présent on n'en a trouvé que dans certaines couches d'une antiquité moyenne , à Solenhofen et Pappenheim. La seule espèce connue et à laquelle Desmarest a donné le nom de *Limule de Walchi* , *Limulus Walchi* , dans son Histoire Naturelle des Crustacés fossiles, p. 109, tab. 11, fig. 6 et 7 , est le Cancer perversus de Knorr et Walch (Monum. du déluge, T. 1 , p. 156 , pl. 14). Elle ne diffère des espèces vivantes que par le rebord de la première pièce de la carapace ,

qui est arrondi, au lieu de former un angle aigu devant la bouche , et par d'autres caractères tirés de la forme et des épines du test. (g.)

LIN. *Linum*. bot. phan. Genre de la Penlandi ie Pentngynie , L. , d'abord placé dans la famille des Caryopl. liées , mais qui forme aujourd'hui le type d'un ordre naturel nouveau nommé Linac^es. V. ce mot. Le genre *Lin* se compose d'un très-grand nombre d'espèces. Ce sont des Plantes herbacées , ou de petits Arbustes à feuilles alternes, très-rarement opposées , entières ; leurs fleurs , terminales et diversement disposées , sont jaunes , bleues ou blanches; leur calice est régulier, formé de cinq sépales incombans : leur corolle est comme campanulée, composée de cinq pétales ongiculés entiers, d'aboi d incombans et tordus en spirale avant leur épanouissement ; les étamines , au nombre de cinq, sont monadelphes tout-à-fait par leur base , et offrent entre chacune d'elles un petit appendice filiforme , qui semble être un filament d etamine avortée ; l'ovaire est légèrement stipité , globuleux , à six ou dix loges quelquefois incomplètes, c'est-à dire communiquant ensemble deux par deux, à cause de l'imperfection de trois ou de cinq des cloisons : chaque loge,

450 LIN

conlienl un seul ovule attaché à la partie supérieure de la loge et renversé. Les styles sont au nombre de trois à cinq , terminés chacun par un stigmate allongé; le fruit est une capsule globuleuse, à six ou dix loges complètes ou incomplètes et monospermes , s'ouvrant en trois ou ciuq valves qui se séparent presque toujours en deux; les graines sont généralement ovoïdes , comprimées , lisses, composées d'un tégument propre , d'un en-

dospenne généralement mince et d'un embryon ayant la même direction que la graine.

Les espèces de ce genre sont assez nombreuses: De Gandolle, dans le premier volume de son *Prodrornus systematis*, en étiu-
mère cinquante-six.

Ces espèces croissent, pour la plupart, sur les bords du bassin méditerranéen; plusieurs se trouvent dans l'Amérique méridionale et l'Amérique septentrionale, et quelques-unes en Afrique et au cap de Bonne-Espérance. Ce genre est surtout fort intéressant à cause d'une de ses espèces, le Lin usuel, dont nous allons parler ici avec quelques détails.

Lin usuel, *Linum usitatissimum*, L. C'est une Plante annuelle, originaire du plateau de la Haute-Asie, mais abondamment cultivée, depuis un temps presque immémorial, dans les diverses contrées de l'Europe, où elle est devenue indigène. Sa racine est grêle, pivotante, poussant une tige simple, cylindrique, d'un, de deux ou de trois pieds de hauteur, seulement rameuse vers son sommet, et tout-à-fait glabre, ainsi que les autres parties de la Plante. Les feuilles sont éparses, sessiles, lancéolées, aiguës, très-entières, marquées de trois nervures longitudinales, et d'un vert glauque; les fleurs sont d'un bleu tendre, terminales au sommet des ramifications de la tige; les étamines et les stigmates sont au nombre de cinq, et le fruit est une capsule globuleuse, environnée à sa base par le calice et contenant des graines ovoïdes, comprimées, lisses et luisantes. Cette Plante offre un très-

grand intérêt et est l'objet d'une culture extrêmement soignée , à cause des fibres de sa tige, avec lesquelles on fait les tissus de fil les plus fins et les dentelles les plus précieuses. On cultive cette Plante dans deux intentions , ou pour obtenir ses graines

qui sont employées en médecine et dans les ails, ou pour obtenir la filasse de ses liges. Dans le premier cas , les soins du cultivateur doivent tendre à choisir les variétés qui produisent le plus grand nombre de capsules, et, dans le second , celles dont les tiges sont les plus longues.

On distingue un assez grand nombre de variétés de Lin dans les pays où ce Végétal est cultivé ; les principales sont les suivantes : 1°. Le Lin froid ou grand Lin est celui dont les tiges acquièrent la plus grande hauteur et qui donne un très-petit nombre de capsules. C'est la variété la plus précieuse et celle que l'on préfère dans plusieurs contrées de la Flandre , de la Belgique , et même aux environs de Lille , où la récolte d'un hectare planté de cette espèce se vend quelquefois jusqu'à 6,000 et 7,000 francs.

20. Le Lin chaud ou Têtard , beaucoup moins élevé que le précédent.

Sa tige est rameuse et porte un grand nombre de capsules; aussi doit-on le préférer quand on a pour but principal la récolte des graines.

5°. Enfin on nomme Lin moyen une variété qui tient le milieu entre les deux premières , c'est-à-dire qu'elle s'élève un peu moins que le grand Lin et donne un peu moins de capsules que le Têtard. Cette variété est surtout cultivée dans les provinces méridionales.

En général , la culture du Lin est assez chanceuse et demande de grandes précautions. 11 lui faut un terrain substantiel et fertile , frais, mais non trop humide ; les engrais doivent y être abondants et renouvelés à chaque récolte. Il faut préparer le terrain

à deux labours fréquents. On sème le Lin à deux époques différentes , comme on fait pour le Blé , c'est-à-

LIN

dire avant et après l'hiver ; ce qui forme le Lin d'hiver et le Lin d'été : il n'est pas indifférent de choisir l'une ou l'autre de ces deux époques. Ainsi, • dans un pays chaud et dans un terrain un peu sec et sablonneux , on fera bien de semer le Lin avant l'hiver , afin que les pluies de l'automne soient profitables au développement de la semence; au contraire, dans les pays un peu froids et dans les terrains très-substantiels, on pourra, sans inconvénient , attendre la fin de l'hiver. Le choix de la semence est une chose fort importante; les agronomes s'accordent généralement à reconnaître qu'elle dégénère lorsqu'on la sème plusieurs années de suite dans le même terrain : on doit donc la renouveler chaque année- , et la tirer des pays où l'on sait qu'elle est la meilleure pour le terrain où on la doit cultiver et pour le but qu'on se propose*. Celle qui vient du nord de l'Europe est généralement la plus estimée; cependant il est des cultivateurs qui ne renouvellent pas leur semence , et qui néanmoins obtiennent , chaque année, de belles récoltes. Mais, pour arriver à ce résultat, il faut avoir le soin de choisir, dans chaque variété que l'on cultive , les graines les plus grosses et les plus saines : par ce moyen , on peut se dispenser de changer de semence; ce qui est une économie pour le cultivateur. Il faut noter ici que , comme la graine de Lin est très-huileuse , elle s'altère et se rancit rapide-

ment, et ne peut être conservée plus d'une année lorsqu'on veut la faire servir de semence. Le Lin se sème comme le Blé, c'est-à-dire à la volée. Le terrain doit avoir été disposé par planches un peu bombées. La quantité moyenne de semence est d'environ vingt-cinq livres pour dix mille pieds carrés de terrain. On brise les mottes et on herse de même que dans la culture des Céréales.

Lorsque le jeune plant commence à pousser, il faut le sarcler avec soin et fréquemment , parce que , sans cette précaution , il serait bientôt

LIN 45t

étouffé par les mauvaises herbes , qui poussent avec plus de rapidité. Dans les temps de sécheresse et dans les localités où cela est possible, il n'est rien de plus avantageux que de pouvoir arroser le Lin par le moyen des irrigations. Lorsque le Lin est parvenu à sa maturité, époque variable suivant les localités et le temps où a été fait le semis, et que l'on reconnaît au dessèchement des tiges et des feuilles et à l'ouverture spontanée des capsules , il faut commencer la récolte : celle-ci se fait en arrachant à la main et par poignées les tiges de Lin , dont on fait de petites boîtes qu'on laisse quelque temps sur le terrain , en ayant soin de les placer debout ; mais il ne faut pas les y laisser trop longtemps, pour ne pas perdre la graine qui tombe des capsules en s'ouvrant. Il faut battre ces tiges sur de grands draps; les graines se détachent très-facilement. Quelquefois on bat le sommet des tiges sur un banc, avec un maillet de bois , qui brise les capsules et met les graines à nu. Cette graine doit être ensuite vannée et criblée , pour la débarrasser de tous les fragments de capsules qui y sont mélangés.

Les tiges du Lin doivent être rouies et préparées comme celles du Chanvre; on les fait ensuite sécher, et on les peigne pour obtenir la filasse.

Les graines de Lin sont fort usitées en médecine. Outre l'huile grasse qu'elles contiennent en abondance , ces graines renferment aussi un mucilage extrêmement visqueux et épais : leur décoction est éminemment émolliente; elle convient dans tous les cas d'irritation interne et externe. On fait, avec ces graines réduites en farine, des cataplasmes émollients très- fréquemment usités.

Pour extraire l'huile des graines, il faut d'abord attendre trois ou quatre mois , parce qu'on a remarqué qu'elle y était plus abondante au bout de ce temps qu'au moment où elles viennent d'être récoltées ; on les passe ensuite à un moulin qui en extrait l'huile. Celle-ci est employée à dif-

43a LIN

férens usages ; ainsi , on peut s'en servir pour l'éclairage. On l'emploie beaucoup dans la peinture à l'huile , parce qu'elle jouit de la propriété de se sécher assez rapidement.

Une autre espèce de Lin encore intéressante, c'est le Lin vivace ou Lin de Sibérie , *Linum perenne* , L. Il ressemble beaucoup au précédent ; mais ses racines sont vivaces , et la partie inférieure de ses tiges finit par devenir ligneuse. Cette espèce , originaire de la Sibérie , est cultivée , dit-on , en Suède et dans quelques parties de l'Allemagne ; mais , en France, on ne la voit guère que dans les jardins. Cependant sa culture pourrait offrir de grands avantages ; car elle réussit très-bien dans les terres maigres et sablonneuses : Lullin de Châteauneuf l'a cultivée avec succès aux

environs de Genève. Selon Bosc , la méthode la plus avantageuse serait de la placer par lignes et d'éloigner les touffes d'environ trois pieds les unes des autres. On pourrait planter entre chacune d'elles des Choux , desNavets, oud'aulres Légumes. On a remarqué que, lorsque le Lin végète à l'ombre , sa filasse est pl us fine ; néanmoins on prétend qu'elle ne vaut pas celle du Lin annuel. Quelques auteurs ont dit que le Lin de Sibérie ne dure que trois ans ; nous pouvons assurer qu'il en existait autrefois plusieurs pieds dans le jardin de la Faculté de médecine de Paris , qui ont duré plus de dix ans. ?

Il croît en France un assez grand nombre d'espèces de Lin , qui quel-

3 uefois offrent des fleurs très-grandes, 'une belle couleur jaune ou bleue :

tels sont , par exemple , le Lin campanule et le Lin de Narbonne. On cultive quelquefois dans les jardins une très-belle espèce , *Linum trigynum*, Bonpl. , Pl. rar. de Mal m. , 38 , t. 17. C'est un Arbuste assez élevé, originaire des Indes-Orientales. Sa tige est dressée, rameuse, ligneuse dans sa partie inférieure ; ses feuilles sont elliptiques et mucronées au sommet; ses fleurs sont jaunes, trèsgrandes , groupées à l'aisselle des

LIN

feuilles. Cette espèce se cultive dans la serre.

A l'exemple de Gmelin , les botanistes modernes font un genre distinct du *Linum Radiola*, L. , sous le nom de *Radiola*. V. ce mot. (a.r.)

On a quelquefois étendu le nom de Lin à des Plantes qui n'appartiennent pas à ce genre, et même à des êtres qui ne sont pas du domaine de la Botanique ; ainsi l'on a appelé :

Lin d'Amérique , V *Agave americana* , L.

Lin étoile, le *Lysimachia Stella ta* , L.

Lin incombustible , l'Asbeste ou Amianthe.

Lin de Lierre ou maudit , la *Cuscuta*.

Lin de Marais ou de Prés , les *L inaigrettes*.

Lin maritime ou de Mer, des *Fucus* et des *Confei ves*.

Lin sauvage, M *Anthinium Pelisserianuiç*. (b.)

LIN DE LA NOUVELLE-ZÉ- LANDE, bot. ehan. Nom vulgaire du *Phormium tenax*. V. *Phormion*.

LINACÉES. *Linaceœ*. bot. pean.

Petite famille de Plantes qui s e compose du seul genre *Linum* de Linné, auparavant placé dans la famille des *Caryophyllées*. Ce petit groupe se distingue par les caractères suivans :

son calice est persistant , à trois , quatre ou ciuq divisions profondes , imbriquées latéralement. La corolle se compose de quatre à cinq pétales onguiculés à leur base , tordus en spirale avant l'épanouissement de la fleur. Les étamines , au nombre de quatre à cinq, sont monadelphes à la base de leurs filets , entre chacun desquels on trouve assez souvent un petit appendice subulé , qui semble être un filet d'étamine avortée. Les anthères sont a deux loges introrses, s'ouvrant par une suture longitudi-

nale , el attachées presque par leur base. L'ovaire est globuleux, sessile, à six , huit ou dix loges , dont

LIN

la moitié sont séparées par des cloisons incomplètes partant de l'axe central , mais n'atteignant pas jusqu'aux parois: chaque loge contient un seul ovule suspendu. Le fruit est une capsule globuleuse , souvent terminée par une petite pointe formée par la base du style : cette capsule offre autant de loges monospermes que l'ovaire ; elle s'ouvre , par son sommet , en quatre ou cinq valves ,

qui se partagent ensuite chacune en eux. Les graines sont, en général , lisses et luisantes ; leur tégument propre est légèrement charnu à sa face interne, et recouvre un embryon avant la même direction que la graine, c'est-à-dire dont la radicule correspond au hile.

Les Linacées , qui sont des Plantes herbacées , annuelles ou vivaces, ou de petits Arbustes à feuilles alternes , excepté dans une seule espèce (*Euphorbia cathartica* , L.) , se distinguent surtout des Caryophyllées , qui ont les feuilles opposées, par la structure de leur ovaire et de leur capsule , et par leurs graines dépourvues d'endosperme. Cette petite famille forme en quelque sorte le passage entre les < Caryophyllées , les Malvacées et les Géraniacées. (a. n.)

LINAGROSSES. rot. phan. Syn.

d'Eriophore. A', ce mot. (B.)

LINAIGRETTE bot. ru an. Quelques botanistes français ont employé ce nom pour désigner le genre *Eriophora*. V. ce mot.

(b.)

LIN .VIRE. *Linaria*. bot. m an.

(Ce génie de la famille des Scrophulariées et de la Didymie Angiospermie, L. , fut établi par Tournefort, et réuni par Linné aux *Scrophulariaceae*. Constaté de nouveau par tous les botanistes modernes , il présente les caractères suivants : calice irrégulier , à cinq divisions; corolle monopétale, munie d'un éperon à la base; limbe bilabié, la lèvre supérieure bifide, l'inférieure trilobée; la gorge fermée par le palais (partie moyenne de la lèvre supérieure); quatre étamines didymes naines,

TOME IX

LIN 4.15

incluses, avec une cinquième rudimentaire; anthères à lobes écartés ; stigmate obtus; capsule ovée , déhiscente par le sommet. Ce genre se compose d'un très- grand nombre d'espèces dont la plupart sont indigènes du bassin de la Méditerranée.

Quelques-unes croissent dans l'Amérique septentrionale et dans les régions tempérées de l'Amérique méridionale. Ce sont des plantes herbacées ou rarement ligneuses, à feuilles alternes: les inférieures quelquefois opposées ou verticillées. Les fleurs sont assez élégantes , accompagnées de bractées, disposées en épis, ou solitaires dans les aisselles des feuilles. On en trouve de toutes les couleurs; mais le plus souvent elles sont jaunes, et parfois blanches, bleuâtres ou légèrement purpurines. Parmi celles qui sont les plus répandues en France, nous citerons, comme espèce

fondamentale, la Linaire vulgaire, *Linaria iilgaris*, Laink. , ou Jn-thirrinum *Linaria*. L. Elle a des feuilles lancéolées , linéaires el une tige dressée : les Heurs foiment de beaux épis de fleurs jaunes qui terminent les tiges. Ce fut sur cette Plante que Linné observa le phénomène intéressant de la régularisation des fleurs, phénomène qu'il désigna sous le nom de Pélorie. F. ce mot. Mais cet accident (si toutefois l'on doit nommer ainsi l'état normal de la fleur) se présente bien plus fréquemment sur la \ *Linaria spu-ria* qui croît abondamment dans les champs cultivés de l'Europe. Si , quelque temps après la moisson , on observe les fleurs de cette espèce, on en trouve une giande quantité qui offrent tous les intermédiaires entie la fleur personnee et la fleur parfaitement régulière, et cela souvent sur le même individu. Il semblerait que ce phénomène est déterminé par les altérations que la Plante a subies de la part des hommes par les travaux de la culture, ou de celle des Animaux qui broutent et mutilent cette Linaire jusque près de sa racine.

Mœnch a constitué sous le nom

LUS

à'Etatine, un genre aux dépens des Linaircs , et dont le L. Elatine est le type. Ce genre n'a pas été adopté.

LINARIA ois. Nom scientifique du Sizcrin. V. Gros-Bec. (b.)

* LINCK.IE. Linckia. bot. cryft.

(Chaodinées.) Le nom de Linckia avait été imposé par Miche-li aux Nostochs, quand ce savant sentit qu'on devait les séparer

des ĩremelles. Mais Vaucher ayant adopt   un nom sp  cifique donn   par Linn   pour nom g  n  rique, celui de Micheli se trouvait sans emploi. Les algologues modernes l'ont appliqu      des Plantes dont les filamens simples, termin  s en pointe cili  re, partant et divergeant d'un centre commun, sont ou du moins paraissent inarticul  s, marqu  s tout au plus de macules , de forme irr  guli  re dans leur int  rieur, et formant, au milieu du mucus qui les environne, des corps h  misph  riques et irr  guli  rs , g  latineux, mais d'une certaine solidit  . Les Linckies ont de grands rapports~avec les Ch  tophores, et n'en diff  rent que parce que leurs filamens ne sont pas rameux , et que des articulations n'y sont pas distinctes. Peut-  tre ces caract  res ne sont-ils pas r  els, et de meilleurs instrumens que ceux que nous poss  dons pourraient un jour les faire dispara  tre. De Candolle en faisait des Batrachospermes. Lyngby e, qui est cependant un observateur exact , a , malgr   les caract  res impos  s par lui-m  me au genre dont il est question , compris parmi les esp  ces qu'il y admet des Plantes qui ne peuvent y demeurer. Telles sont ses Linckia Zoster  e, ceramicola et puncliformis , trop visiblement articul  es pour n'  tre pas des Ch  tophores. V. ce mot.

Nous citerons comme exemple les esp  ces suivantes : Linckia atra , Lyngb. , Tent. , p. 155 , t. 67 , d. 1 , 2, 3, 4; Linckia piridis , Lyngb., loc. cit. , t. 67 , d. 5 , 6 , 7 , toutes deux parasites des C  ramiaires dans les eaux de la mer; et le Linckia

LIN

dura , Lyngb. , loc. cit. , p. 197 , t. 67, qui habite les eaux douces.

Les deux Plantes que Lyngbye regarde comme des variétés de" cette dernière sont évidemment des espèces que nous avons examinées et caractérisées, (b.)

LINCONIE. *Linconia*. bot. phan.

Genre de la Penlandrie Digynie , établi par Linné {Mant. , p. 147), dont la place est encore incertaine dans la série des ordres naturels , mais que De Candolle [Prodr. Syst. 2, p. nb) rapproche de la famille des Bruniacées. Voici ses caractères : l'ovaire est infère , couronné par le limbe du calice qui est à cinq dents obtuses; la corolle se compose de cinq pétales concaves, persislans , insérés au sommet du tube du calice et alternant avec ses dents; les cinq élamines sont persistantes et placées entre les pétales; l'ovaire est à deux loges contenant chacune deux ovules; il est surmonté de deux styles filiformes, divergens, et devient un fruit composé de deux coques membraneuses, monospermes, terminées par les styles persistons , ets'ouvrant par leur côté interne; les graines sont ovoïdes.

Les espèces de ce genre sont peu nombreuses ; ce sont de petits Arbustes, ayant le port des Bruyères, des feuilles roides, subulées et comme verticillées , et des fleurs agrégées.

Ce genre, dont Swartz a le mieux fait connaître l'organisation , se rapproche beaucoup du genre *Staavia*. Des quatre espèces qui le composent, trois croissent au cap de Bonne-Espérance, savoir : *Linconia alopecuroidea*, L. ; *L. thymifolia* , Sw.; et *L. cuspidata*. Ces deux dernières espèces avaient été placées parmi les Z? ioi/72aparThunberg. La quatrième, *Linconia Peruviana* , Lamk. , qui croît au Pérou et dont on ne connaît pas le fruit, n'appartient

probablement pas à ce genre. De Candolle présume qu'elle pourrait être une espèce du genre *Margyricarpus*.

LIN

LLNDÈRE. *Lindera*. bot. piian.

Thunberg {Flor. Japon., p. 145, 1.

21) a établi ce genre qui appartient à l'hexandrie Monogynie, L., mais dont les caractères n'ont pas été assez bien établis pour qu'on ait pu le placer convenablement dans la série des ordres naturels. La seule espèce dont il se compose a été nommée par Thunberg *Lindera umbellata*. C'est un Arbrisseau dont la tige est garnie de rameaux alternes, flexueux, glabres, très-étalés; les feuilles ramassées au sommet des rameaux sont pétiolées, ovales-oblongues, pointues, entières, vertes et glabres en dessus, velues et pâles en dessous. Les fleurs sont petites et disposées en ombelles simples, solitaires et terminales; chacune de ces fleurs est dépourvue de calice; la corolle est à six pétales obtus et jaunâtres; les six étamines ont leurs filets insérés sur l'ovaire et plus courts que la corolle; l'ovaire est supérieur, ovale, glabre, surmonté d'un style droit à deux stigmates réfléchis; le fruit est capsulaire et à deux loges. Cet Arbrisseau croît au Japon sur le mont Fukonno, où il fleurit dans les mois d'avril et mai. Les Japonais le nomment *Kuronosji*, et fabriquent avec son bois des bios- : Scs molles pour se nettoyer les dents.

Adanson avait donné le nom de *Lindera* à un genre d'Ombellifères, formé sur le *Myrrhis daucoides* de Morison ou *Chærophyllum coloratum* (de Linné. (G.N.)

LINDERNIE. *Lindernia*. bot.

iniAN. Ce genre de la famille des iScropbularinées , et de la Di-
 dynamique : Angiospermie , L. , est ainsi caractérisé : calice à cinq, quatre
 divisions pres- ■ qu'égales; corolle tubuleuse, à deux lèvres,
 dont la supérieure est très courte et échancrée , l'inférieure tri-
 lobée ; quatre étamines didymes, dont les deux inférieures ont
 le filet denté et plus long que l'anthère ; Style unique surmonté
 d'un stigmate échancré; capsule biloculaire, à deux valves sépa-
 rées par une cloison parallèle et portant un grand nombre

LIN 45 :i

de graines. Ces caractères , qui ont été tracés par Linné et mo-
 difiés par Jussieu , ne conviennent absolument qu'au *Lindernia*
pyxidaria, petite Plante à feuilles opposées et à fleurs axillaires,
 qui croît dans les localités aquatiques de certaines contrées d'Eu-
 rope et de l'Amérique septentrionale. H. Brown (*Povdr. Fl.*
Nov. holland. , p. 440) a fait entrer dans ce genre trois espèces de
 la Nouvelle-Hollande qui présentent quelques différences dans la
 structure de la corolle, dont la lèvre supérieure est rétrécie et l'in-
 férieure baccinée à la base , et dans les anthères qui sont sou-
 dées deux à deux. Il a exclu des *Lindernia* le *L. diandra* de
 Swartz et le *L. japonica* de Thunberg. Depuis cette indication,
 Kunth [Nov.

Gen. et Sp. Pl. æquin., n. 11, p; 369) a réuni la plante de Swartz
 au genre *Herpestis*. f. ce mot. (G.N.)

* LINDLEYE. *Lindleya*. bot.

PH&N. Genre de la famille des Rosacées , établi par Kunth (in
 Humb.

Nou. Gen., 6, p. i>5c)) et caractérisé ainsi : fleurs hermaphrodites; calice turbiné à la base; limbe à cinq divisions; corolle de cinq pétales insérés à la gorge du calice ; disque annulaire portant 1rs étamines, également inséré à la gorge du calice ; étamines au nombre de quinze à vingt, ayant les anthères lancéolées, biloculnifèè , recourbés brusquement à leur base; l'ovaire est libre et à cinq loges contenant chacune deux ovules collatéraux , fixés par un point un peu au-dessous de leur sommet, et pendans; les styles, au nombre de cinq, sont terminés par autant de stigmates renflés en massue; le fruit est une capsule recouverte par le calice, ovoïde, pentagone, ligneuse, à cinq sillons et à cinq loges s'ouvrant en cinq valves , portant chacune une des cloisons sur le milieu de la face interne: chaque loge contient une ou deux graines , membraneuses et comme ailées sur leurs bords.

Ce genre est très.-voisin du *Vauquellifia* , autre genre nouveau établi

LIN

par notre savant collaborateur. Il forme en quelque sorte le passage entre les Spiréacées et les Pomacées, et se compose d'une seule espèce , *Lindleya JfJespioides* , Kuutli , /oc.

cit. , 6, p. 207, t. 562 bis. C'est un Arbre qui a le port de notre Pommier et qui est très-rameux. Ses feuilles sont épaisses , simples , entières, crénelées , accompagnées de stipules péliolaires et géminées ; ses fleurs sont blanches, pédonculées, auxiliaires et solitaires vers le sommet des rameaux. Cet Arbre est très-commun au Mexique. On le trouve à une hauteur de onze cents toises au-dessus du niveau de la mer, et ses fleurs s'épanouissent en mai. (a.r.)

LINDPIDJI. bot. phan. Nom javanais d'une petite espèce de Palmier qui paraît être un /liera ,et qui croît dans quelques forêts de Java , particulièrement au canton presque désert et volcanique appelé Bagnia-Vaugi.

LINDSEE. Lindsœa. bot. crypt.

(l 'ou gères.) Ce genre établi par Dryander dans le 5e volume des Transactions de la Société Linnéenne de Londres, a été décrit par Smith {in A et. Taurin. 5, p. 4i 3) et par la plupart des botanistes, avec les caractères suivans : sores disposés en une ligne continue et parallèle au bord de la fi onde ; incluse linéaire , continu , attaché du côté du disque , libre extérieurement. Ce genre avait été confondu anciennement avec les Adianlhum, dont les fructifications sont disposées en masses distinctes et sont couvertes /par des membranes lunulaires attachées au bord de la fronde, et qui s'ouvrent du côté du disque. On a décrit un nombre assez considérable d'espèces toutes indigènes des contrées intia-tropicaies des deux continens. Plusieurs de celles qui ont servi de type p.our l'établissement du genre ont été publiées sous Je nom générique à! Adianthum , par Aublet, et croissent dans la Guianc ; telles sont les Lindsœa sagittata , falcata et Guiancensis. Les autres ha-

LIN

bitentprincipalemenlles Indes-Orientales, les îles de Frauce et de Mascareigne , la Nouvelle-Hollande , etc.

Leurs frondes ont des nervures qui partent de ia base des pin-nules , et se bifurquent plusieurs fois , ou , en d'autres termes, qui sont plusieurs fois dichotomes. (g..n.)

LINE. MAM. V. EcUBEUIL COM- MUN. •

* LINÉAIRE, zool. rot. Cet adjectif s'emploie indifféremment en zoologie ou en botanique pour exprimer la figure en forme de ligne de quelque partie d'un Animal ou d'une Plante. On dit conséquemment d'une feuille qu'elle est linéaire. Ce mot est souvent devenu spécifique. (b.)

LINETTE. pois. L'un des noms vulgaires du Trigla Hirundo. V. Trigle. (c.)

* LING. pois. L'un des noms de pays d'une variété allongée de Morue. V. Gade. (b.)

* LINGALINGAHAN. bot. phan.

(Camelli.) Probablement Y Acalypha spiciflora. (b.)

* LINGHIROUTS VAHON-RA- NOU. bot. ru an. (Flacourt.) Probablement un Agave ou un Aloës dont la racine passe pour un excellent vermifuge à Madagascar. (b.)

*LINGO. bot. phan. (Rochon.) Liane de Madagascar employée dans la teinture des pagnes. C'est probablement le Nauclea citrifolia de Lamarck. (b.)

LÎNGOUM. bot. phan. C'est le nom sous lequel Kumphius {Amb. , 2 , tab. 70) décrit le Pterocarpus Draco , Arbre d'oii découle le Sang Dragon, f. Ptérocarfe. (a.r.)

LINGUA CERVINA. bot. phan. bot. crypt. (Fougères.) V. Langue de Cerf. (b.)

LINGUARD et LINGUE, rots.

Nom vulgaire d'une Lotte et du Gade Morue. (b.)

L1NGD ATULE. Linguatula. int.

Genre de Vers intestinaux établi par

LIN

Fraëlich et adopté par Lamarck : il renferme quelques Animaux dont la tête est munie de plusieurs suçoirs.

Zeder, et après lui Rudolphi , oui appelé ce genre Polyslome. ff-, ce mot.

Schrank a également décrit sous le nom de Lingualula quelques Entozoaires que Rudolphi rapporte aux genres Filaire et Trichocéphale. y .

ces mots et Amulaire. (e. n.t.)

LINGUE, fois. y. Linguabd.

- LINGUELLE. Lingueila. moll.

C'est à Blainville que l'on doit rétablissement de ce genre, pour un Mollusque nu de l'ordre des Infér.ibranches, dansun mémoire donlou trouve l'extrait dans le Bulletin de la Société Philomatique , et reproduit en partie à l'articleLiNGUF.Li.r.du Dictionnaire des Sciences Naturelles. Le seul Animal que Blainvdle ait observé est conservé dans la collection du Mn- , sé u m britannique. Ce sa vanta ca rac térisé ainsi le genre qu'il (orme actuellement : corps nu , ovale, très-déprimé, linguilorme; le manteau débor-

■ fiant le pied de toutes parts, si ce n'est antérieurement, ou la tête est à dé-

■ couvert et pourvue de deux paires de tentacules dont une supérieure et l'autre labiale; les organes de la

: respiration en forme de lamelles obliques, n'occupant que les deux tiers] postérieurs du manteau ; l'anus inférieur est situé au tiers postérieur «lu

■ côté droit; l'orifice des organes de la (génération dans un même tubercule ;au tiers antérieur du même côté. Ce îgenre ne se compose jusqu'à présent «que d'une seule espèce. Blainville U'a nommée Lincuixle d'Ei.iout, .Lingueila Eljbrtiana ; elle est figurée i dans le douzième cahier des planches <du Dictionnaire des Sciences Naluirelles. Sa longueur est d'un pouce et (demi environ; elle est ovale, trèsi déprimée surtout eu arrière ; le pied «est un grand disque charnu qui oc- «cupe tout le ventre ; le manteau qui • est fort ample le déhorde tout autour ; «c'est sous le bord saillant et libre de c ce manteau que se trouvent les brani-chies, formées d'une série de lames

LIN 437

très-fines , serrées , obliques, qui ne commencent qu'au tiers antérieur du manteau ; la tête est très-grosse, cour- ' bée en dessus , placée entre le pied et le manteau où elle fait saillie ; elle est limitée en avant par une ligne demicirculaire; le manteau la recouvre en partie, mais il n'y adhère que sur la ligne médiane; de chaque côté de celte adhérence , se voit en avant un tentacule creux à son extrémité, comme pédiculé au-dessous et plus vers la bouche ; on voit de chaque côté un autre tentacule qui est labial ; la boucheovalaire , transverse , offre de gros plis convergens; au-

dessus se voit une lèvre épaisse , bombée dans la ligne médiane, finement denteléect comme festonnée Blainville n'ayant pu disséquer l'Animal , ou ignore s'il est pourvu de mâchoires , et on ne connaît rien de son organisation intérieure; cependant d'après la description on est à même de fixer les rapports des Linguelles qui , quoique différentes pour plusieurs points des Phillidiens, doivent pourtant se placer non loin d'elles dans le système.

LINGCISDGES. Latreille désigne ainsi (Hist. Natl. gén. et particulière des Ins. T. 11 , p. 107) une division de ses Insectes écnlés dont l'exlrémité de la lèvre inférieure forme une langue distincte. Cette division comprend les Hyménoptères. V. ce mol. (g.)

LliVGULE. Lingula. moi.l. Séba avait figuré depuis long-temps la Lingule complète avec son pédicule , mais il l'avait considérée comme une espèce d'Anatife; ce qui est cause, probablement, du peu d'attention que l'on donna à sa citation , car Linné et Gmelin après lui, n'ayant vu sans doute que des valves séparées de cette Coquille , en firent une Patelle. Rumphius , par les mêmes motifs que Linné, se trompa également; il pensait que c'était l'osselet de quelque espèce de Limace , ce que Favanne avança aussi d'après lui. Chemnitz, qui vit la Coquille complète , la plaça

458 LLN

parmi les Piniics : il ignorait probablement l'existence du pédicule , sans quoi il n'aurait pas commis une pareille erreur, tiruguière fut le premier qui établit un genre particulier pour cette Coquille qui était restée long-temps incertaine entre des familles et des genres irès-différens.

Bruguière avait établi ce genre dans les planches de l'Encyclopédie, mais il ne put le caractériser, la mort l'ayant enlevé aux sciences avant qu'il eût pu achever son ouvrage. Ce fut Lamarck qui, le premier, caractérisa ce genre dans le Système des Animaux sans vertèbres. Cuvier, auquel nous empruntons la plupart de ces détails, lit l'anatomie de ces Mollusques, et les trouva si différents des autres Acéphales qu'il fit alors pressentir qu'il serait nécessaire d'en faire un ordre à part avec les Orbicules et les Térébratules, ce que Lamarck ne tarda pas à réaliser dans sa Philosophie Zoologique en établissant la famille des Brachiopodes qu'il composa des trois genres que nous venons de mentionner. Félix de Roissy, dans le Buffon de Sonnini, suivit l'idée de Cuvier et de Lamarck, mais il alla plus loin qu'eux en réunissant aux trois genres des Brachiopodes les Cirrhopodes des auteurs, c'est-à-dire les Anatifes, les Balanes, Coronules, etc., qui, certainement, s'en éloignent d'une manière notable. Lamarck, dans l'Extrait du Cours, laissa la famille des Brachiopodes composée telle qu'elle se trouvait dans la Philosophie Zoologique. Cuvier (Règne Animal) laissa également les Brachiopodes composés des mêmes genres.

Lamarck, dans son dernier ouvrage, n'apporta non plus aucun changement à la famille des Brachiopodes, et le genre Lingule la terminant, se trouve le dernier des Acéphales, et par conséquent sur la limite de ceux-ci et des véritables Mollusques. Férussac, dans ses Tableaux Systématiques, proposa quelques changements dans les Brachiopodes ; il les distribua en plusieurs familles parce qu'il y joignit les genres Cranie,

Théridée et Magas; il aurait pu y réunir , ce nous semble , les Spiri-i féres de Sowerby. Blainville , dans son article Mollusque , du Dictionnaire des Sciences Naturelles , fit aussi de grands changemens dans -Celte famille. Outre les trois genres de Lamarck et de Cuvier , ainsi que ceux admis par Férussac, on y trouve, à litre de divisions des Térébratules, les genres faits à leurs dépens par Sowerby, et, de plus, les genres Strophomène de Rafinesque, Plagiostome, Dianchorel Podopside. Blainville , dans l'opinion où il est que les Lingules sont fort voisines des Patelles, quant aux points principaux de l'organisation , termine la classe des Céphalés par celles-ci, et commence la classe suivante , les Acéphales , par les Lingules, voulant ainsi établir un passage presque insensible entre ces deux classes par ce rapprochement qui paraît singulier. La- Ueille , dans ses Familles Naturelles, a divisé les Brachiopodes en deux ordres et en plusieurs familles; dans le premier ordre , les Pédonculés, on trouve une première famille , les Équivalves , ne comprenant qu'un seul genre, qui est celui de la Lingule; la seconde famille , les Inéquivalves, se compose aussi d'un seul genre, les Térébratules. Le second ordre , les Sessiles , ne renferme qu'une seule famille établie sous le nom de Fixivalves; elle se compose des genres Orbicule , Cranie , et avec doute , des genres Radiohte et Sphérulite. En examinant la famille des Ostracés du même auteur, on retrouve plusieurs des genres que Blainville avait fait entrer dans les Brachiopodes , tels que Producte , Podopside, Dianchore, Plagiostome; cette vacillation fait voir que ces genres ont besoin d'être examinés avec tout le soin nécessaire pour décider de leur véritable place. Blainville , qui a eu occasion d'observer l'Animal delà Lingule, au Muséum Britannique, ne se liouvcpas entièrement d'accord avec la description faite par Cuvien Le point le plus capital est ce qui est

LIN

relatif au cœur. Cuvier a reconnu deux de ces organes, et Blaiuville pense que ce que Cuvier a considéré comme deux coeurs, n'était autre chose que deux oreillettes qui aboutissaient à un ventricule médian qui donnait naissance à une artère-aoi te; ceci n'est, nous croyons, qu'une présomption foudée sur une analogie qui peut tromper. Il nous semble , comme le dit Blaiuville lui-même, que le fait est assez important pour avoir besoin d'être vérifié.

Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails anatomiques d'organisation des Lingules. Ces détails sont aujourd'hui connus de tout le monde , depuis la publication de l'excellent Mémoire de Cuvier , dans le premier volume des Annales du Muséum; nous y renvoyons avec toute la confiance que doivent inspirer les travaux d'un aussi célèbre zoologiste. Voici les caractères que l'on doit donner aujourd'hui à ce genre : coquille subéquivalve , aplatie , ovale , oblongue , tronquée à son sommet, un peu en pointe à sa base, élevée sur un pédicule charnu , tendineux, fixé aux corps marins; charnière sans dents: Animal déprimé, ovale, un peu allongé , compris entre les deux lobes d'un manteau fendu dans toute sa moitié antérieure ou céphalique, et portant des branchies pectinées , adhérentes à la face interne; bouche simple, ayant de chaque côté un long appendice tentaculaire , cilié dans tout son bord externe, et se rétractant en spirale dans la coquille. On ne connaît encore qu'une seule espèce vivante de ce genre; il est rare de la rencontrer avec son pédicule qui est quelquefois fort long. Sowerby , dans son Mineral Conchology , a rapporté à ce genre des Coquilles fossiles dont il a fait trois espèces, et qui pourraient bien n'être que des variétés d'une même espèce ,

comme l'observe très judicieusement Défiance. Il serait aussi possible que ces petites Coquilles, assez mal figurées, appartenissent au genre Moule, et fussent des espèces

LIN

jeunes ou dont les crochets seraient médians.

LINGULE AXATINE, Lillgllla À ' HCl-

tina, Lamk. , Anim. sans vertèbres, T. vi, p. 58, n. 1 ; Séba , Mus. T. m, pl. 16, fig. 4; Patella uriguis , L., 1^{re} édil. , u. 55 ; Cuvier , Annales du Mus. T. 1, p. 66 ; toute la planche qui est en regard; Éncyclop. Méth. , pl. 550 , fig. 1 , a , b , c.

Les espèces fossiles de Sowerby sont :

Lingule mytiloïde , Lingula mytiloides. {Mineral Conchology , pl. 19, fig. 1,2.)

Lingule mince , Lingula tenuis , ib. , fig. 5.

Lingule ovale, Lingula ovalis , ib. , pl. 19 , fig. 4. (D.H.)

LINKIE. Linkia. bot. piian. Ce nom a été donné par Persoon (Enchirid., 1 , p. 219) au genre Desfontainia de U\ Flore du Pérou. Il existait, en effet, deux genres dédiés au célèbre professeur du Jardin du Roi , et admis sous les noms de J'onlanesia et de Louichea. y. ces mots. Celui qui fait le sujet de cet article a été placé dans la famille des Solanées et dans la Pentandrie Monogynie, L. ; on lui assigne les caractères suivans : calice à cinq divisions profondes , linéaires, lancéolées; corolle campanulée dont le tube est pentagone ; cinq étamines à anthères sagittées ; ovaire supérieur surmonté d'un seul style; baie à cinq loges polyspermes.

L'espèce qui a servi de type à ce genre est le *Linkia spinosa*, Pers., *Uesjbnlainia spinosa*, liuiz et Pavon, qui croît dans les grandes forêts du Pérou.

C'est un Arbrisseau de trois à quatre mètres de hauteur, très-rameux, à feuilles opposées, ovales, dentées, à fleurs solitaires portées sur des pédoncules axillaires. Les habitants du Pérou en forment des haies vives; ses fleurs, d'une belle couleur rouge, lui donnent une certaine élégance.

Ses feuilles ont une saveur amère et teignent le papier en jaune. Une seconde espèce a été décrite et figurée par Humboldt et Bonpland (fiantes

440 LIN

équinoxiales, T. t, p. 157, t. 45) sous le nom de *Dcsfotilai/ia splendens*.

Elle croît sur les hautes montagnes du Pérou. (o. n.)

LINLIBRtSIN. bot. l'h.vn. Même chose que *Julibrisin*. F[. ce-mot. (b.)

LINNEE.Z//«rtøerz. bot. ph an. Genre de Plantes dédié par Gronovius à l'immortel auteur du *Syste/na Naturæ*. Ce génie fait partie de la famille des *Caprifoliacées* et de la *Pentandrie Monogynie*, L. 11 se compose d'une seule espèce, *Lmnœa borealis*, L.

C'est une petite mais élégante Plante vivace, ou plutôt un petit Arbuste rampant et étalé sur le sol. Sa tige est très-grêle, cylindrique, rameuse, assez longue, étalée; ses rameaux sont reïres-sés, velus, ainsi que la tige, les feuilles, et en général toutes les parties vertes de la Plante. Les feuilles sont opposées, courte-

ment pétiolées, ovales ou elliptiques, dentées seulement vers leur partie supérieure, d'un vert clair. Les fleurs sont placées au sommet des rameaux qui s'allongent et sont nus, dans leurs trois quarts supérieurs; ils se divisent supérieurement en deux pédoncules grêles, terminés chacun par une seule fleur. A. la base des deux pédoncules on trouve deux petites bractées subulées et opposées, l.e calice est adhérent avec l'ovaire. Son limbe se composi?

de cinq divisions linéaires , dressées.

La corolle est monopétale , en cloche allongée , à cinq lobes oblus ; les étamines , au nombre de quatre, sont incluses et un peu inégales. L'ovaire , qui offre trois loges , contenant chacune deux ovules suspendus , est surmonté d'un stigmate un peu renflé et à trois lobes peu marqués. Le fruit est une petite baie globuleuse, couronnée par le limbe du calice.

Cette petite Plante , d'un port charmant, croît dans toutes les régions boréales de l'Ancien et du Nouveau- Continent. On la trouve dans les Alpes; elle est très- commune en Allemagne; elle vient également dans l'Amérique septentrionale, aux îles Aleutiennes , au Kamtschatka, en

LIN

Sibérie , etc. On la cultive dans les jardins de botanique, mais on l'y conserve difficilement. (a. h..)

LINOCARPUM. bot. than. Micheli (Gênera, t. 21) donuait ce nom générique à une Plante que Linné réunit aux *Linum* , mais que les botanistes modernes regardent comme un genre distinct ,

sous le nom de *liadiola* , qui lui avait été imposé par Rai. V. *Radiola*. (g..N.)

LINOÇIERA. bot. rn.AN. Genre de la famille des Jasininées et de la Diandrie Monogynie , L. , établi par Vahl (Enumer., 1 , p. 46) qui l'a ainsi caractérisé : calice à quatre dents ; corolle à quatre pétales ; deux étamines à anthères sessiles ; ovaire supérieur surmonté d'un seul style; baie sèche, à deux loges monospermes. Ce genre a été décrit par Swartz dans son *Frodromus* sous le nom de *Thouinia* , qui ayant été appliqué à d'autres Plantes, n'a pu être conservé pour le genre dont il est ici question. Jussieu et Lamarck le regardent comme congénère du *Chionanthus*, avec lequel il n'offre qu'une légère différence dans le fruit. Il se compose de trois ou quatre espèces indigènes des Antilles et des Indes-Orientales.

Celles qu'on doit considérer comme types sont : 1° *Linoçiera ligustrina* , Vahl, ou *Tàoui/ia ligustrina*, Swartz, Prodr. C'est un Arbrisseau qui croît dans les lieux arides de la Jamaïque.

On dit que cette espèce a été également trouvée à la Nouvelle-Hollande. 20. *Linoçiera latifolia* , Vahl et Gaertn. fils, Carpol., l. 216 ; *Chiunantkus domingensis* , Lamarck. Elle habite l'île de Saint-Domingue.

LINODESMON. bot. fhan. 'Gesner.j Syn. de *Cuscuta*. V. ce mot.

LINODRYS- bot. pfia-n. (Dioscoride. ; C'est-à-dire *Lin-Chéne*. Une *Germandrée* qui pourrait bien être le *Teucrium Charnoedrys* des botanistes modernes. {n.)

LINOIDES. bot. niAN. (Dillen.) Syn. de *Lintirn Radiola*, L. (b.)

LIN

LINOPHYLLUM. isot. phan. Nom donné par les botanistes anciens à plusieurs Plantes dont les feuilles étroites rappelaient celles de quelques espèces de Lin ; tel est le Thesium Linophyllum , L. , etc. (a. n.)

LINOSOSTIS. bot. ph an. Même chose qu'Hermubotane. V. ce mol.

tu.)

LINOSPARTUM. bot. phan. Ce nom, appliqué par les anciens au Stipa ienacissima , est donné par Adanson au Lygeum Sparrum , L.

LINOSÏRIS. bot. phan. Espèce du genre Chrysocome. f. ce mot.

LINOTTE, ois. L'une des espèces les pjus communes du genre Gros- Bec , qui s'élève fort bien en domesticité , et dont les chants sont presque aussi agréables que ceux du Serin. V . Gros-Bec. On appelle Linotte plusieurs autres espèces du même genre. (n.)

LINSCOTSIA. bot. phan. (Adanson.) Syn. du genre Limeum de But'— mann et Linné, f. LimÉoLE. (g..N.)

LINSENERZ. min. C'est-à-dire Minerais lenticulaire. Nom donné par Blumenbach au Fer hydraté globuliforme, et par Werner au Cuivre aiséuiaté en octaèdres obtus, (g. tel.)

LINTERNUM. mot. phan. (Cœsalpin.) Syn. d'Alaterne. f. ce mot.

LINTHURIE. Unthuris. moix.

Montfort, dans la Conchyliologie systématique , T. i , p. a54 , propose sous ce nom un genre de Coquilles cloisonnées dont il a donné la figure à sa manière, c'est-à-dire avec des additions, et qui ne peut raisonnablement se rapporter qu'au genre Cristellairc de Lamarck. F. ce mot.

LINLM. bot. phan. f. Lin.

LINÏPHIE. Linyphia. auachn.

Genre de l'ordre des Pulmonaires , famille des Aranéides, section des Dipneumones , tribu des Orbitèlrs ,

LIN 4ii

établi par Latreille, et ayant pour caractères : mâchoires carrées , droites , presque de la même largeur ; yeux disposés de la manière suivante:

quatre au milieu, formant un trapèze dont le côté postérieur plus large est occupé par deux yeux beaucoup plus gros et plus écartés ; les quatre autres groupés par paires; une de chaque côté, et dans une direction oblique.

Ces Arachnides diffèrent des P/iolcus par les yeux et par la forme du corps ; elles s'éloignent des Ulobores par les quatre yeux de devant qui sont placés à intervalles égaux dans ces dernières ; enfin, des caractères de la même valeur les distinguent des Tétragnathes et des Epeïres. Les Linyphies vivent sur les buissons , les Genévriers , les Pins ou bien les fenêtres et les coins de murailles; ellss y construisent une toile horizontale pendue entre les branches , si c'est sur un arbre, minre et dont l'étendue varie à raison de la proximité ou de l'éloignement des points d'attache. Pour la maintenir parfaitement horizontale , elles tendent

par dessus des fils perpendiculaires et obliques qu'elles fixent aux lieux environnans. L'Animal se tient ordinairement au milieu de sa toile, dans une position renversée, ayant le ventre en haut; un Insecte a-t-il le malheur de se laisser engager dans ce filet, la propriétaire accourt, le perce avec ses mandibules à travers la toile, et ensuite y fait une déchirure afin de le faire passer et de le sucer, ce qu'elle fait sans l'envelopper de soie, l'Insecte étant mort ou affaibli par l'effet «lu venin. Les mâles ressemblent si peu à leurs femelles qu'on ne les croirait pas de la même espèce; ils se trouvent toujours placés dans la même toile que les femelles, pendant le mois de septembre; leurs pales sont beaucoup plus grêles et plus allongées; leur abdomen est aussi beaucoup plus long; leurs palpes sont terminés par un gros bouton qui se sépare en deux quand on le presse, et présente deux pièces rull-cuses en forme de valves de Coquilles, du mi-

44a LIN

lieu desquelles on voit sortir d'autres pièces; on y remarque surtout des pièces en forme de crochet et un tuyau court et annelé. Les mâles sont bien plus heureux que ceux des Epeïres et des autres Araignées, puisque, d'après Degéer, ils sont reçus par leurs femelles qui ne font aucun mouvement qui puisse leur donner sujet de craindre potir leurs jours. Les deux sexes, au moment de l'accouplement, sont dans une position renversée, le ventre de l'un vis-à-vis le thorax de l'autre; ils entrelacent leurs pâtes, et le mâle introduit le bouton de l'extrémité de ses palpes dans l'ouverture sexuelle de la femelle, et l'y laisse une ou deux minutes; puis le relire et recommence le même jeu avec ses deux palpes alternativement. Pendant tout ce temps, son ventre a un mouvement de vibration. A l'époque de la ponte, le ventre des fe-

nelles grossit beaucoup; le cocon dans lequel elles mettent leurs œufs est composée d'une soie lâche; elles le placent auprès de leur toile; les œufs sont d'un rougeâtre tirant sur le jaune; ils ne sont point agglutinés entre eux. Ce genre se compose de plusieurs espèces. La principale et celle qui a fourni à Degér les observations que nous venons de rapporter , est :

La L^{IN}YPHIE TRIANGULAIRE, Li-

nyphia triangularis , Latr. , Walck.

(Hist. des Aranéides , fasc. 5 , tab. 9 , la femelle); // ranea resupina sylvestris, Degér. Les yeux sont placés sur des taches noires; le tronc est d'un brun roussâtre clair , avec trois lignes noires; l'abdomen est ovale, court ou presque globuleux, avec une bande brune , marquée de petites taches blanches, découpée sur les bords le long du milieu du dos; elle est longue de six à sept millimètres , et fait son nid dans les bois.

Elle est fort commune à Paris, au bois de Boulogne. (g.)

* LINZA. bot. crypt. (Hydrophytes.) Espèce du genre Ulve. V. ce mot. (Eo

* LINZE. polyp. Guettard (Mém.

T. iv, p. 140) nous dit que « c'est un genre de corps marins composé de fibres longitudinales qui se ramifient et forment par leurs ramifications des mailles ; qui est membraneux et parsemé de petits trous visibles seulement à la loupe. »-Il n'a pas été adopté par les naturalistes. (e. d.l.)

LION. mam. Espèce du genre Chat.

V. ce mot. On a étendu le nom de ce Carnassier , qualifié de roi des Animaux , à un Léopard, à un Crustacé de la Méditerranée du genre Galathœa , au Cougar qu'on appelait Lion d'Amérique, au Miriméléon (Lion des Fourmis), au P/wca julata (Lion marin) , aux larves des Hémérobes (Lion des Pucerons) , etc. (b.)

LIONCEAU, mam. Les jeunes Lions des deux sexes. (b.)

LION DENT. Leontodon. bot.

piian Ce genre , de la famille des Synanthérées , Chicoracées de Jussieu , et de la Syngénésie égale , L. , présente les caractères suivans : involucre campnnulé, composé de folioles inégales, irrégulièrement imbriquées, appliquées , oblongues ou lancéolées; réceptacle marqué de petites fossettes plus ou moins profondes ; calathide formée de demi fleurons en languettes, nombreux et hermaphrodites; akènes oblongs , surmontés d'un bourrplet et d'une aigrette composée de paillettes et de poils soyeux. Linné réunissait à ce genre le Taraxacum , que Tournefort en avait séparé et qui en a été de nouveau démembré par les botanistes modernes.

Le nombre des espèces de Liondents s'élève à plus de quinze , parmi lesquelles nous citerons comme les plus communes en France les Leontodon automnale , L. hostile et L. hispidum de Linné. Presque toutes sont indigènes de l'Europe et surtout de la région méditerranéenne. (g..n.)

LIONNE, mam. La femelle du Lion. V. ce mot et Chat. (b.)

* LIOPHLÉE. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères , tribu des Curcu-

lioniles , établi par Lalrcille (Fani.

Nul. du KègD. Anim.) el dont nous ne connaissons pas les caractères. (G.)

LIORHYNQUE. *Liorhynchus*. int.

Genre de l'ordre des Némaloïdes. Caractères : corps élastique , cylindrique ; tête dépourvue de tubercules, munie d'une trompe rétractile et lisse. Ce genre , établi par Rudolphi , ne renferme que trois espèces dont deux sont imparfaitement connues, peut-être même devrait-il être supprimé ou au moins rétabli avec d'autres caractères. Dans son Synopsis, Rudolphi ne se dissimule point que ce genre est très-artificiel ; il n'a pas jugé à propos cependant de rien changer à ce qu'il avait institué dans l'Histoire des Entozoaires : la plupart des auteurs l'ont adopté tel qu'il est; nous suivrons son exemple. L'Animal sur lequel ce genre a d'abord été fondé est un petit Nématoïde long de deux ou trois lignes et pas plus gros qu'un cheveu ; Rudolphi l'a trouvé une seule fois et en abondance dans les intestins grêles d'un Blaireau ; personne ne l'a retrouvé depuis. Tout ce qu'il put observer, c'est que cet Animalcule avait un intestin de couleur noirâtre et que sa tête était munie d'une trompe courte et lisse qu'il faisait rentrer et sortir , et au moyen de laquelle il se fixait aux villosités des intestins. On rapporte à ce genre un autre Ver trouvé dans l'estomac d'un Phoque et décrit avec peu de détails, comme un Ascaride, par Millier et Fabricius. Gmelin et Zeder en ont fait un Echinorhynque. Il est douteux à quel genre il appartient véritablement. Enfin Rudolphi rapporte encore aux Liorhynques un Ver trouvé par Zeder dans l'estomac de l'Anguille. Ce dernier auteur le nomma d'abord *Coezia inermis* , ensuite *Cochlus inermis*, et la description qu'il en a donnée est loin d'être exacte.

Celle qu'en a donnée Rudolphi dans le Synopsis (p. 307) est beaucoup meilleure ; il regrette de n'avoir pu observer ce Ver vivant. Nous l'avons trouvé deux fois et en abondance

dans l'estomac d'Anguilles pêchées dans l'Orne; nous l'avons observé vivant; ayant étudié son organisation autant qu'a pu le permettre la délicatesse de ces Animaux , nous pouvons ainsi ajouter quelques observations à celles de Rudolphi. Les plus grands que nous ayons vus ont un pouce de longueur et leur diamètre égale celui d'un fil de grosseur moyenne ; ils sont blancs , rigides et difficiles à casser; leur grosseur est à peu près égale dans toute leur étendue; ils sont néanmoins un peu atténués à leurs extrémités. La peau est couverte d'anneaux nombreux , très-finement et très -élégamment denticulés en arrière ; dans les quatre cinquièmes postérieurs de l'Animal , les anneaux forment à peine une saillie sur la peau , mais en avant où ils sont plus écartés et moins nombreux, ils sont beaucoup plus saillans et leurs denticules plus évidentes; ils jouissent également d'une plus grande mobilité. Lors des mouvemens de l'Animal, on les voit s'écarter et se rapprocher continuellement. Ils forment des anneaux complets et non des tours de spirale, comme l'a cru Zeder, qui pour cela avait nommé ce Ver Coc/dus. Nous n'avons pu découvrir de fibres musculaires dans l'enveloppe cutanée; mais l'analogie de mouvement et de ressemblance avec les autres in-ématoïdes ne permet pas de douter qu'il n'existe deux plans de fibres , un extérieur transversal , l'autre sous-jacent et longitudinal.

Au-devant du premier anneau antérieur se trouve la tête ou si l'on veut la trompe. Elle est de forme conique , tout- à-fait lisse , nue et très-mobilité; on la voit s'allonger en pain de sucre ou se rac-

courcir et prendre une forme hémisphérique; mais elle ne rentre point dans le corps comme la trompe des Lchinorhynque- ; elle n'est point rétractile , mais seulement contractile. La bouche , très-petite ouverture arrondie, punctiforme , située à l'extrémité antérieure de la tête, n'a point de lèvres, comme l'a cru Zeder et après lui

Rudolphi. La queue des femelles est droite et terminée par une papille très-aiguë ; celle des mâles est roulée en spirale et son extrémité est plus obtuse. L'intestin s'étend sans courbures de la bouche à l'anus; il est d'abord très-étroit et dans la partie antérieure de la cavité vésicale que les organes génitaux ne remplissent

point; il ne paraît point adhérent; on en voit suivre les mouvements de la tête; il s'élargit ensuite et vient, après s'être rétréci de nouveau, se terminer à l'anus , petite ouverture transversale placée à peu de distance de l'extrémité postérieure. Les mâles sont moins longs que les femelles, et , toutes proportions gardées , beaucoup plus grêles. La verge (apiculum) est unique, courbée, longue, cylindrique , et sort à une très-petite distance de l'extrémité postérieure; nous n'avons pu distinguer si c'est par l'anus ou par une ouverture particulière.

Nous n'avons pu voir non plus les replis de la peau en forme d'ailes que Rudolphi dit exister sur les parties latérales de la queue et entre lesquels la verge ferait saillie. Nous n'avons rien aperçu qui pût en faire soupçonner l'existence, et cependant nous avons examiné au moins une vingtaine de mâles. L'organe génital mâle extérieur se compose d'une vésicule séminale peu longue et d'un conduit préparateur plus gros que la vésicule à son origine et qui finit en s'amincissant d'une manière insensible. Ces

deux parties se distinguent l'une de l'autre par un rétrécissement très-prononcé; réunis, ils ont à peine deux fois la longueur de l'Animal et forment plusieurs replis autour de l'intestin. Les organes génitaux de la femelle sont disposés comme dans tous les Nématoïdes. Nous n'avons pu apercevoir extérieurement de valve ; elle est sans doute cachée par le repli d'un des anneaux, mais en ouvrant l'Animal et en suivant les ovaires, nous les avons vus se réunir pour former l'utérus qui se termine par un vagin assez long; ces deux derniers organes sont toujours situés dans la partie

antérieure de la cavité viscérale. Nous n'avons pu voir encore à quel point le vagin aboutit intérieurement, car il s'est toujours trouvé détaché dans les manœuvres que nous avons faites pour ouvrir; au moyen d'une aiguille éinoissée, la peau qui est fort résistante. Les ovaires sont très - blancs, assez gros, et d'une dimension égale dans les deux tiers de leur étendue, puis ils se rétrécissent subitement et se terminent par un conduit filiforme, excessivement ténu; leur longueur égale à peu près trois fois celle de l'Animal; ils ne diffèrent point pour la forme des ovaires des Filaires. Les œufs sont elliptiques, transparens sur leurs bords et marqués d'une grande tache opaque dans leur milieu. Les espèces rapportées à ce genre sont les *Liorhynchus truncatus*, *graciliscens* et *denticulatus*. (e.d.i.j)

LIOU-LĪOU. ins. A Cayenne on donne ce nom à un Insecte de la famille des Cicadaïdes. (g.J)

* LIPALITHE. min. Nom donné par Lenz à une variété de quartz qui se rapproche de la Calcédoine ou du Silex pyromaque (John, Recherches chimiques, T. IV, p. 190). (g.dkl.)

LIPARE. Liparus. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, famille des Rhynchophores , tribu des Charansonites de Latreille (Familles Naturelles du Règne Animal), établi par Olivier et ayant pour caractères : massue des antennes de quatre articles commençant au huitième ; menton proportionnellement plus grand que dans les genres Charansou , Brachyrhine , Brachycère , etc. Museau, trompe libre ou non reçue dans un sillon ou enfoncement du présternum ; point de pieds sauteurs: jamais de forts crochets aux jambes ; pénultième article des tarses bilobé ; antennes coudées. Ces Insectes se distinguent des Brachyrhines, des Rhynchènes, etc., par des caractères tirés de la forme des antennes et du nombre d'articles qui forment la massue ; ils s'éloignent des Bronchua et des Vlinthcs en ce

LIP

ique ceux-ci ont la massue des anfen- ■ ncs composée de trois articles. Les ILipares vivent presque toujours à l terre; leurs mœurs ne sont pas encoire bien connues ; Dejéan (Cat. des (Col. , p. 88j mentionne neuf espèces ide ce genre aui sont toutes propres à l l'Europe; celle qui est la plus comunune à Paris et qui sert de type au l genre , est :

Le Lipahf. german, L. germanus,o\\\. (Col. T. v, Û. 83, pl. 3a, : fig. 4g5, et pl. 4 , fig. 43;. Très-noir ; i corselet pointillé, marqué de deux] points d'un gris fauve, formés par des ! poils; élytres chagrinées, réunies, tantôt sans taches, tantôt mouchetées de roussâtre; cuisses plus ou moins dentées. On le trouve au pied i des murs dans l'herbe. (G.)

* LIPAREA. bot. phan. (Théophraste.) Syn. de Colutea arborescens , L. V. DAGTJENAUDIER. (B.)

LIPAREINA. bot. poiteau.) Syn. de Drypètes. f?» ce mot. (b.)

LIPARIA E. Liparia. bot. phan.

Genre de Plantes de la famille des Légumineuses , et de la Diadelphie Décandrie, L. , établi par Linné (Mant., î 56) , mais qui a été modifié par De Candolle (Frodr. , a, p. 121) qui l'a caractérisé de la manière suivante : le calice a son tube court , son limbe à cinq lobes, dont quatre supérieur lancéolés, aigus, presque égaux, et un inférieur très-long, elliptique et pétaloïde. La corolle est glabre; l'étendard est ovale-oblong; les ailes allongées, l'une recouvrant l'autre avant leur épanouissement ; la carène est droite, aiguë et étroite ; les étamines diadelphes ; l'ovaire sessile est très-court ; le styie filiforme. La gousse est ovoïde et contient un petit nombre de graines.

Ce genre, ainsi caractérisé, ne renferme plus qu'une seule espèce, *Liparia sphaerica*, L. (Mant., 268), pincée par Lamarck parmi les Boibonia.

C'est un Arbuste originaire du Cap , glabre dans toutes ses parties , à l'exception des pédicelles et de l'ovaire qui sont très-velus. Ses feuilles sont

LIP 445

lancéolées , aiguës et piquantes à leur sommet, très - entières , marquées il'uti grand nombre de nervures et dépouvues de stipules. Ses fleurs, d'un jaune orangé, forment un capitule globuleux.

Les autres espèces placées par Linné dans ce genre n'en ôient pas les caractères. Le professeur De Candolle en a fait un

genre particulier qu'il a nommé Priestleya. F. ce mot.

LIPARIS. pois. Espèce du genre Cycloplère. V. ce mot. (b.)

LIPARIS. Liparis. ins. Ce nom a été donné par Ochsenheimer à un genre de Lépidoptères qu'il a formé avec les Arctia Monac/ia , dispar, Salicis , C/irysorr/icea , aurifiua , etc. P '. AncrE. (g.)

* LIPARIS. Liparis. bot. phan.

Genre de la famille des Orchidées et de la Gynandi ie Monandrie , L. , proposé par le professeur Richard dans son travail sur les Orchidées. d'Europe , et adopté par J. Lindley {Bot.

Regist. , 882). Ce genre a été formé aux dépens des Ma/axis, et a pour type le Malaxis Loese/ii de Swailz. Voici ses caractères : le calice est étalé ; le Libelle est supérieur , sessile, entier, un peu creusé en gouttière; le gynostème est allongé, recourbé, membraneux sur ses bords dans sa partie supérieure ; l'anthère est leiminale , operculée , contenant deux masses polliniques solides , ovoïdes , partagées en deux par un sillon longitudinal. Ce genre diffère surtout du Malaxis par son gynostème allongé et membraneux sur ses bords, et par ses masses polliniques divisées. Outre le Malaxis Loesclii , on doit encore y rapporter les espèces suivantes : Malaxis liliifolia, M. Jlavescens , Du Petit-Thouars; M . purpurascens , Du Petit-Thouars; le CymbWum bituberculalum , Hooker , Exot. Piaf. , 1 1 6 ; le Malaxis dislkha , Du Petit-Thouars ; M. cœspitusa, Du Petit-Thouars, et le Cymbidium rejlexu/n , Brown.

Ces espèces sont généralement de petites Plantes , ayant la tige renflée

et bulbiforme à sa base ; des feuilles presque toujours radicales et au nombre de deux , tantôt membraneuses , tantôt charnues ; de petites fleurs jaunâtres. Elles sont terrestres ou parasites, (a., r.)

LIPIN. moll. Dénomination imposée par Adanson (Voy. au Sénégal , p. 125 , pl. 8 , fig. 18) à une Coquille nommée Murex afar par Linné, et placée dans le genre Fuseau , sous le nom de Tusus ajar , par Lamarck.

. (Anim. sans vert. T. vu, p. 151 , n. 29.) (d..h.)

* LIPOCARPHA. bot. piian. Ce nom a été donné par R. Brown [Botany of Congo , p. 40] au genre qu'il avait nommé Hypoelyptum , d'après "Vahl , dans son Prodrômus Floræ Novæ-Hollandiæ. C'est pour éviter qu'on le confonde avec Y Hypoelyptum de Richard , autre genre trèsvoisin , qu'il a cru nécessaire de proposer ce changement de dénomination. Le genre Lipocarpa appartient à la famille des Cypéracées et à la Triandrie Monogynie. R. Brown le caractérise ainsi : écailles imbriquées , uniflores ; périgone membraneux , à deux valves presque égales , opposées aux écailles ; point de soies hypogynes; style bilobé caduc; akène renfermé dans le périgone.

Les Plantes de ce genre ont des chaumes sans noeuds, triquêtes, munis de feuilles à la base ; leurs fleurs forment des épis terminaux , agrégés , capituliformes et entourés par un involucre.

\J Hypoelyptum argenteum de Vahl peut être considéré comme le type de ce genre , et doit prendre le nom de Lipocarpa argentea. Cette Plante croît sur la côte ouest d'Afrique , ainsi que dans l'Amérique méridionale. On devra lui réunir l'Hypoelyptum

microcephalum de la Nouvelle- Hollande, sous le nom de L. microcephala. (g..n.)

LIPONIZ. ois. (Vieillot.) Syn. de Roucou. V. ce mol. (dr..z.)

* LIPOÏRICHE. jiOT. piian.

LIP

Genre de la famille des Synanthérées, F

Corymbifères de Jussieu , et de la t.

Syngénésie superflue, L. , établi par \

R. Brown [Oùse/v. on tâe Cotnpositœ , ;i

p. 11S) qui l'a ainsi caractérisé: in- ?!

volucre dont les écailles sont imbri- i"

quées sur deux rangs et presque éga- c

les ; réceptacle convexe , garni de P

paillettes foliacées distinctes ; eapi- '

Iule radié ; fleurons du disque lier- o1

maplirodites, ayant les stigmates mu- 1*

nis d'un appendice aigu ei hispidule ; "

demi -fleurons de la circonférence, o1

sur un seul rang , en languettes , et f

femelles; akènes à peu près unifor- r(mes , turbinés , surmon-
tés d'une aigrette soyeuse et caduque.

Ce genre est voisin du Melanan- I1
 thera de Richard et Brown; il ofiie «
 aussi de l'affinité avec VEclipta de 4
 Linné, \effrecliaàe. Jacquin etleZh'c- 01
 medea de Cassini : ce dernier le place p
 dans sa section des Hélianthécs pro- o
 totypes. L'auteur l'a établi sur une c
 Plante non décrite, et pour laquelle c
 il n'a proposé aucun nom spécifique. c
 Elle est indigène de l'Afrique équi- \ noxiale. Ses feuilles sont
 opposées ,
 indivises; ses fleurs sont jaunes et i
 portées sur des pédoncides termi- t
 naux. (G..N.))
 LIPPIE. Lippia. bot. fhan. Ce
 genre , de la famille des Verbénacées ' et de la Didynamie An-
 giospermie, L.,
 fut établi et imparfaitement caractéri- I
 sé par Linné. Examiné de nouveau 1
 par Kunlh {Nov. Gen. etSpec. Plant. I

œquinoct., 2, p. 262), il a été augmenté de plusieurs Plantes rapportées

à d'autres genres , et caractérisé de la]

manière suivante : calice à quatre ou ,

cinq dents , se fendant ensuite en deux (seginens ; corolle dont le tube est évasé supérieurement ; le limbe plane

et bilabié ; la lèvre supérieure échancrée ,

créée , bilobée , l'inférieure trilobée ; |

quatre étamines didynames non saillantes -\

lantes ; stigmate capité , rarement linéaire et latéral ; drupe petite , sèche, couverte par le calice , séparable en deux loges monospermes. Ce genre se compose d'environ vingt espèces indigènes de l'Amérique, et surtout des

LIQ

(contrées méridionales ; plusieurs faisaient partie des genres *Verbena* de Linné , *Zapana* de Lamarck , et *Illoisia* d'Ortega. Parmi ces espèces, nous citerons les suivantes : 1° *Lippia nadiiflora* , Mich. , ou *Verbena tinodiflora* , L. , qui croît dans l'Amérique du Nord et dans l'île de Cuba ; 2° *Lippia asperifolia* , Rich. de Kutith, (Ou *Verbena glutinifera* de l'Héritier ((Slirp. i , t. 1 2); 3e *Lippia hirsuta* , Kth . , I Mutis de Liane ; 4° *Lippia citrodora* , 1 ou *Verbena triphylla* , l'Hérit. , loc. 1 cit. T. 11. Cette dernière Plante est très remarquable par ses jolis thyrses de fleurs, et par ses feuilles qui répandent une odeur fort agréable d'île de citron lorsqu'on les frotte entre les mains. Les autres espèces sont des Arbrisseaux, des sous-Arbrisseaux • ou des Herbes, à feuilles

simples, op- | posées, quelquefois dentées en scie, (OU crénelées. Les fleurs sont bl.in- 1 châtres , accompagnées de bractées, i et disposées en capitules ou en pani- (Cules ordinairement axillaires , quelquefois terminaux.

Le Lippia ouata , L. , Mant. , réuni 1 d'abord aux Se/ago , est devenu le Itype du genre Microdon de Choisy.

,V~. ce mot. (g..n.)

LIPPISTES. Lippistes. moll. Genîre proposé par Montfort pour une < Coquille marine que Fiebtel avait] placée parmi les Argonautes, mais qifi 1 doit bien |>l u tôt appartenir aux Dauiphinules dont elle a les caractères.

V. Dauphinule. (d..h

LIPURA. mam. Illigera donné ce nom à un genre qu'il lorme de YHyira.v hudsoneus de Schreber , espèce (dont l'existence est encore douteuse.

(is. G. st.— H.) L I Q U I D A M B A R . Liquidambar.

:bot. PHAN. Genre de Plantes autre- Ifois placé dans la famille des Amcnitacées, mais qui aujourd'hui appar- 1 tient à la nouvelle famille des Myriicées établie par le professeur Richard. 'Ce genre ouïe pour caractères : des I fleurs unisexuées et monoïques; les 1 mâles forment de petites grappes rainieuses et se composent d'un tres-

LIQ 447

grand nombre d'étamines dépourvues entièrement de calice , de corolle et même d'écaillés qui en tiennent lieu; ces grappes sont accompagnées d'un involucre tétraphylle et caduc.

Les lieux les femelles forment des chatons globuleux , également accompagnés d'un involucre de quatre folioles. Ces fleurs sont très-serrées et soudées entre elles. Leur calice est évasé , moussépalé , tronqué et inégal à son bord ; il renferme deux ovaires uniloculaires , soudés par leur base avec le calice et terminés chacun par un long style et par un stigmate recourbé. Le fruit se compose de deux capsules uniloculaires, terminées par une longue pointe recourbée à leur sommet , s'ouvrant par leur côté interne et renfermant plusieurs graines pariétales et ailées.

Le Liquidambar résineux , *Liquidambar styraciflua* , L. , est un grand Arbre originaire de l'Amérique septentrionale; mais que l'on cultive également très-bien en pleine terre dans le climat de Paris. Par son port et son feuillage il ressemble beaucoup à un Erable et surtout au Sycomore. Mais ses feuilles sont généralement alternes, pétiolées, à cinq lobes lancéolés , profonds et inégalement dentés. On retire de cet Arbre une substance balsamique connue sous le nom de Liquidambar.

On l'obtient soit par des incisions faites au tronc et par lesquelles elle découle naturellement, soit en faisant bouillir les branches dans l'eau. Le premier est le plus pur et le plus estimé. Il est liquide, consistant, d'une couleur ambrée, d'une odeur agréable et d'un saveur acre et aromatique.

Le second est plus épais; il a une couleur rougeâtre assez foncée ; son odeur est également agréable.

Ce baume est peu employé en médecine. On lui substitue généralement le baume du Pérou. Il est stimulant et aromatique. Pendant fort long temps on s'en est surtout servi pour se frotter les gants. Quelquefois on le mélange :

dans le commerce avec le styrax liquide.

LIR

On cultive encore une autre espèce de ce genre, originaire d'Orient : c'est le *Liquitambar orientalis*, L. Il diffère du précédent par ses feuilles beaucoup plus petites et dont les lobes sont plus profondément dentés.

Quant au *Liquidambar asplenifolia*, il forme le genre *Comptonia*. V.

ce mot. (a. n.)

LIQUIRITIA. bot. phan. Moench a rétabli sous ce nom imposé par Brunfels un genre formé d'une espèce de. Réglisse, mais que les botanistes n'ont pas adopté. (b.)

* LIRCEUS. *Lirceus*. chust. Genre de l'ordre des Isopodes établi par Rafinesque (*Aimais of Naiitr.*, n 1), ayant pour caractères : quatre antennes, dont les deux supérieures seulement sont très-longues, formées de quatre grands articles qui augmentent en dimension vers le haut, et de plusieurs autres petits, terminaux; les deux inférieures plus courtes que la tête qui est arrondie; yeux ronds, latéraux; pâtes pourvues d'un ongle terminal; corps pinnatifide, formé de sept segments, sans écailles latérales; queue

grande, arrondie, utiiculée en dessous avec d;s appendices cachés. L'espèce qui a servi à Rafinesque pour établir ce genre est le *Lirceus fonlina* lis cet auteur. C'est un Animal très-voisin des Aselles , long d'un quart de pouce , à clos convexe , à queue semitrilobée, dont la couleur est noirâtre. Il vit dans les sources des environs de Lexington. (c.)

LIRELLE. bot. chrypt. On donne ce nom à l'apothéeiou ou au réceptacle des Opégraphies. 11 est sessile , linéaire , flexueux, s'ouvra nt par une i'ente longitudinale. (o..N.)

LIRI. jMOLL. Nom donné par Adan- STra à une petite Coquille qu'il rapporte à son genre Lépas , et qui n'est probablement autre chose qu'un Cabochon. Gmelin (Linné , 1 ôcédit., p.

S /i 4, h. 110) lui a donné le nom de *Pcilella perversa*. (d..H.)

* LTRICONITE. -min. (Jameson.)

LIS

Même chose que Lirocone. V. ce mot. (B-)

LIRIO DENDRON . bot. fiân. r.

Tulipier.

LIRION. bot. fiân. (Théophraste.) Syn. à' dmaryllis lutea, L. , et nom grec du Lis. (b.)

LIRIOPE. bot. phan. Le genre ainsi nommé par Loureiro ne paraît pas deyelir être séparé du Sansvuiera.

On doit encore faire rentrer dans celui-ci le *Salmia* de Cava- nilles, nommé aussi *Pleomele* par Salisbury , et qui se compose

des Jletris fragrans et hy acinthoides , L. V. Sanseviè-

* LIRIOZOA. Fo1.YP. r. Tuli-

PAIRE

LIRIOZOON ou LIRIOZOOM.

polyp. Le genre formé sous ce nom par IJe Molle, et dans lequel ce baron confondait des Encrines et Isis , n'a pas été adopté. (E.D..L.)

LfRIS. INS. Genre d'Hyménoplè— re , établi par Fabricius , et correspondant au genre Stize {V. ce mot) de Latreille; il y a joint aussi quelques espèces fies genres Larre et Lyrope. {V. Ces mots.) (g.)

,v LIROCONE. min. Ce nom désigne dans le système minéralogique de Mohs, l'un des genres de l'ordre des Malachites, composé de deux espèces , ayant pour caractère commun , de donner par la trituration, une poussière d'un vert très-pâle. Ces espèces sont : le Lirocone prismatique (Cuivre arsénialé octaèdre obtus) et le Lirocone hexaèdre (Fer arsénia-

té). (G. DEL.,)

LIRON. mam. Syn. de Lérot. f:

ce mot. (b.)

LIS. Lili.um. bot. phan. Genre de Plantes monocolylédones , type i!e la famille des Liliacées , et que l'on reconnaît aux caractères suivons : son calice coloré et pétaloïde est formé de six sé-

pales disposés en cloche évasée ; ces sépales sont égaux et marqués sur le milieu de leur face interne d'un sillon

LIS '

glanduleux et longitudinal. Les élimines au nombre de six sont dressées et égales; les anthères sont allongées, presque linéaires et à deux loges.

L'ovaire est libre , obovoïde , un peu déprimé , marqué de six côtes saillantes, à trois loges contenant un grand nombre d'ovules disposés sur deux rangées longitudinales. Le style est long, terminé par un stigmate tenflé et à trois lobes. Le fruit est une capsule ovoïde à six côtes saillantes , à trois loges polyspermes s'ouvrant en trois valves seplifères ^sur le milieu de leur face interne. Les "graines sont planes; elles contiennent un embryon cylindrique , placé i u milieu d'un eudosperme blanc.

Les espèces de ce genre sont assez nombreuses , et un grand nombre se cultivent dans nos jardins dont elles font l'ornement. Leur bulbe a un caractère très-propre à les faire distinguer ; il se compose d'écaillés charnues et imbriquées les unes sur les autres. La lige qui acquiert quelquefois une hauteur de cinq à six pieds ;est cylindrique, simple , chargée de veilles étroites, linéaires, éparses ou verticillées. Les fleurs sont très-grandes , formant un épi à la partie supérieure de la tige; elles sont dressées >m renversées , blanches ou plus souvent jaunes ou rouges. Nous allons mentionner ici les espèces que l'on cultive le plus souvent dans les jardins.

Lis blanc , *Lilium candidum* , L., l'ed., Lil., t. 199. Le Lis blanc qui est l'espèce la plus répandue et l'une des plus belles du genre, est originaire du Levant , mais aujourd'hui il est en

quelque sorte indigène de toutes les contrées méridionales de l'Europe. Son bulbe est de la grosseur du poing , composé d'un très-grand nombre d'écaillés imbriquées , lisses , étroites et dont les plus intérieures se terminent supérieurement en une feuille radicale. Celles-ci sont très-allongées et étalées , étroites. La tige qui naît du centre du bulbe est cylindrique , haute de huit à dix pieds , simple , glabre ,

TOME JX

LIS 44

toute couverte de feuilles éparses, très-rapprochées , linéaires, aiguës; un peu sinueuses sur les bords; les fleurs au nombre de cinq à huit forment un épi à la partie supérieure de la tige. Elles sont très-grandes , blanches , pédonculées et dressées. Cette belle espèce fleurit aux mois de juin et de juillet. On en cultive plusieurs variétés dans les jardins , telles sont : 1° le Lis à fleurs doubles; 2° le Lis ensanglanté, dont les sépales sont marqués de lignes ou lâches pourpres; elles existent aussi sur les feuilles , la tige et jusque sur les écailles du bulbe ; 3° le Lis à

FEUILLES PANACHÉES. La Culture du

Lis et de ses variétés est fort simple et n'exige pas de grands soins. La terre de bruyère est celle qui lui convient le mieux, mais il se plaît également dans les autres espèces de terrains. Tous les trois ou quatre ans on doit déplanter les oignons pour en séparer les cayeux. Le Lis blanc est non-seulement une des plus grandes et des plus belles espèces que nous cultivons dans nos jardins,

mais il l'emporte sur elles par son parfum exquis. Cependant son odeur est aussi .suave que délicieuse dans un jardin , qu'elle devient dangereuse lorsqu'on la respire dans l'intérieur d'un appartement. On a vu les accidents les plus graves et même la mort survenir chez des individus qui étaient restés exposés aux émanations des fleurs du Lis , pendant une nuit. De tout temps le Lis a été cultivé avec soin et chanté par les poètes de tous les siècles comme l'emblème de la pureté virginale. Ils nous l'ont représenté connue devant son origine à quelques gouttes de lait échappées du sein de Lémnia, et tombées sur la terre au moment où la déesse repousse Hercule encore enfant, qui avait profité du sommeil de l'épouse de Jupiter pour se nourrir de son lait. Les médecins ont fait usage des diverses parties du Lis blanc. Les écailles de son bulbe, qui sont légèrement acres, cuites dans l'eau, ou mieux encore sous les cendres, ont été employées

450 LIS

pour faire des cataplasmes légèrement excitans et propres à hâter la suppuration dans les abcès froids. On a fait avec ses fleurs une eau distillée très-odorante , que l'on employait autrefois comme antispasmodique, mais qui aujourd'hui est à peu près inusitée.

Lis bulbifère, *Lilium bulbiferum*, L. , Sp.; Red., Lil ., t. 210. De son bulbe, qui est également écailleux et imbriqué, s'élève une tige d'environ deux à trois pieds , couverte de feuilles éparses et étroites, d'un vert plus foncé que dans l'espèce précédente , offrant à leur aisselle des bulbilles ovoïdes, d'un vert foncé, sessiles et écailleux ; ses fleurs aussi grandes que celles de l'espèce précédente sont ressées et forment un épi comme dans le Lis blanc ; quelquefois la tige n'en porte qu'une ou deux ; elles sont d'un

jaune rougeâtre, et inarquées de petites taches brunes et disséminées.

Cette espèce croît dans les montagnes un peu élevées en France, en Allemagne , en Italie , etc. On la cultive dans les jardins.

Le Lis orangé , *Lilium croceum* , Desf. , est considéré par quelques auteurs comme une simple variété de l'espèce précédente. Il en diffère néanmoins par sa tige plus élevée, par ses fleurs beaucoup plus nombreuses , et par l'absence totale de bulbilles à l'aisselle des feuilles. Il croît plus particulièrement en Allemagne , et se cultive également dans les jardins.

Lis Martagon, *Lilium Martagon*, L., Red., Lil., t. 146. Cette jolie espèce se trouve dans les bois montueux d'une grande partie de la France. Sa tige s'élève à une hauteur d'environ deux pieds ; elle porte des feuilles lancéolées, étroites , aiguës , verlicillées ordinairement par six.

Ses fleurs sont purpurines marquées de taches noires ; elles sont renversées et ont leurs sépales fortement roulés en dehors. Ces fleurs répandent une odeur assez désagréable ; mais la Plante forme un très-bel effet et on la cultive 'réquemment dans les jardins. Elle réussit mieux dans la

LIS

terre de bruyère , et fleurit en mai et j uin.

Lis de Pomvone , *Lilium Pomponium*, L., Sp ; Red., Lil., t. 7. Il est originaire des montagnes du midi de la France. Sa tige ne s'élève guère audelà d'un pied à un pied et demi.

Ses feuilles sont lancéolées., étroites, éparses et très-rapprochées les unes des autres. Ses fleurs plus petites que dans les espèces précédentes sont renversées, d'un beau rouge ponceau, et ont leurs sépales roulés en dehors. Cette espèce, qui fleurit vers le mois de juillet, se cultive dans les jardins.

Lis tigré ou Lis de la Chine , *Lilium tigrinum* , Bot. Mag. , t. 1257.

Celte espèce est originaire de la Chine, du Japon et de la Cochinchine , et il n'y a guère plus d'une vingtaine d'années qu'elle a été introduite dans les jardins d'Europe par les Anglais.

Sa tige qui peut s'élever jusqu'à une hauteur de cinq à six pieds , porte des feuilles éparses , lancéolées , étroites , beaucoup plus courtes vers la partie supérieure. Ses feuilles offrent à leur aisselle des bulbilles noirâtres , comme dans le Lis bulbifère. Les fleurs sont extrêmement grandes, d'un rouge un peu orangé avec des taches d'un pourpre foncé- Ces fleurs quelquefois très-nombreuses forment une sorte de grappe simple à la partie supérieure de la tige. Cette belle espèce aujourd'hui assez commune est très-rustique , et se cultive en pleine terre.

. Lis superbe ou Martagon du Canada , *Lilium superbum* , L., Sp.; Red., Lil., t. 103. Il y a environ un siècle que ce Lis , qui doit être considéré comme la plus belle espèce du genre , a été introduit en Europe par Pierre Collinson , membre de la Société royale de Londres. Son bulbe, quoiqu'assez petit, donne naissance à une tige qui souvent s'élève à six et même sept pieds. Ses feuilles lancéolées et étroites forment des verticilles de huit à dix feuilles. Ses fleurs d'un rouge orangé, ayant leur fond jaune et tigré de taches pourpres

LIS

LIS

pont extrêmement nombreuses , renversées, et forment un tliyrse élégant qui souvent ne se compose pas de moins d'une trentaine de fleurs. Le Lis superbe est originaire du Canada ; on doit le cultiver dans la terre de bruyère et surtout à l'exposition <lu nord. On le multiplie parle moyen des cayeux , que l'on enlève tous les trois ou quatre ans , en déplantant les oignons. Plusieurs autres espèces de ce genre mériteraient d'être citées ici, à cause de la beauté de leurs fleurs ; telles sont : le Liiium Japonicum , Thunb.; le Liiium Philadelphicum , L. ; Liiium Chalcedonicum , L.; LiLiumPy renaicum , Gou.in , etc.

On a étendu le nom de Lis à des Plantes qui souvent u'olfrent même presque aucun trait de ressemblance avec les Plantes de ce beau genre; ainsi l'on a appelé ;

Lis Asphodèle , le genre Hémérocalle et le Crinurn américain/
m.

Lis épineux , le Ca/esbœa spinosa ,

Lis d'étang , le Nymphœa allia ,

Lis des Incas, l' Alstroemeria Liclitu.

Lis-Jacinthe, le Scilla Lilio-Hyaciuthus.

Lis nu J apon , , l' ' Amary II 'is Sarnieusis , L. , et Y Uvaria Japonica.

Lis de mai, le Couvai laria majalis.

Lis des marais, les Iris, particulièrement le Pseudo-yJcorus.

Lis de Mathiole, le Pancratitum maritimum.

* Lis de mer, les Encl ines.

Lis nu Mexique, Y Amaryllis Belladonna.

Lis Narcisse, Y Amaryllis Atamasco et li; Pancrallium maritimum, L.

Lis oranoé, Y Hemerocallis fulva ,

* Lis de Perse, le Fritillaria Persica.

Lis de Saint-Bruno, le Pfialaugium liliastium.

Lis de Saint-Jacques, Y Amaryllis furmosissima.

Lis de Saint-Jean, Le Gladiolus commuais.

Lis de Surate, Y Hibiscus Surateusis.

Lis de Suze. Même ebose que Lis de Perse.

Lis des teinturiers , la Gaude et la Lysimaque vulgaire.

Lis Turc, l'Ixie de la Cbine.

Lis des vallées. Même ebose que Lis de mai.

Lis vermeil. Même ebose que Lis Asphodèle.

Lis vert , le Colchicum aulumnale. (b.)

LISEROL LE. Evolvulus. bot.

phan. Genre de la Pentandrie Digytiie , et de la famille des Convolvulacées, qui se compose en général de petites Plantes

herbacées étalées, rameuses, non lactescentes, rarement dressées , portant des feuilles alternes et entières , des fleurs blanches ou bleues axillaires et pédonculées, ayant un calice à cinq divisions profondes, une corolle monopétale rotacée , à cinq lobes plissés , un ovaire à deux loges contenant chacune deux ovules; cet ovaire est surmonté de deux styles profondément bifides , dont chaque division porte un stigmate simple. Le fruit est une capsule ovoïde enveloppée par le calice persistant et s'ouvrant ordinairement en deux valves. Les espèces de ce genre, au nombre d'une vingtaine environ , croissent en grande partie dans l'Amérique méridionale; d'autres dans l'Inde, et quelques-unes dans la Nouvelle-Hollande Aucune de ces espèces ne mérite d'intérêt et n'est cultivée dans nos jardins, (a.r.)

LISERON. *Couvolulus*. bot. phan.

Grand genre formant le type de la famille des Convolvulacées , et appartenant à la Pentandrie Monogynie , L. 11 se compose d'un nombre très-considérable d'espèces, qui croissent dans toutes les contrées du globe, mais qui augmentent vers les régions méridionales. Ce sont des Plantes herbacées , annuelles ou vivaces , ayant souvent une racine tubéreuse et charnue, une tige volubile ou rampante, des feuilles alternes gué-

452 LIS

ralement simples et entières, quelquefois incisées , des fleurs par- Ibis très-grandes et colorées , diversement disposées, nues ou accompagnées de deux bractées plus ou moins grandes. Leur calice est à cinq divisions profondes et égales ; la corolle est monopétale, régulière, infundibuliforme ou campanulée à cinq lobes plissés par le milieu ; les étamines au nombre de cinq sont

incluses: l'ovaire est) à deux, rarement à trois loges contenant chacune deux ovules redressés. Le style est simple et inclus terminé par deux ou trois stigmates globuleux ou allongés. Le fruit est une capsule enveloppée par le calice , à une, deux ou trois loges contenant chacune une ou rarement deux graines et s'ouvrant en général en deux ou trois valves. Dans le Prodrôme de la Flore de la Nouvelle- Hollande, Rob. Brown a séparé des Liserons , pour en former un genre

Il a été articulé sous le nom de *Calystegia*, et *Convolvulus sepium*, *C. Soldanella*, *C. spithameus* , L., et deux espèces nouvelles qu'il nomme *Calystegia marginata* et *Calystegia reniformis*.

Ce genre ne diffère des vrais Liserons que par son calice enveloppé de deux bractées foliacées, très-grandes, et par son ovaire à deux loges séparées l'une de l'autre par une cloison incomplète. Mais ces caractères nous paraissent insuffisants pour former un genre particulier , car beaucoup d'autres espèces de vrais *Convolvulus* , sont également munies de deux bractées , un peu plus petites, il est vrai, et l'ovaire dans un grand nombre d'autres espèces offre tous les passages entre l'unilocularité et la bilocularité. La distinction entre le genre *Convolvulus* et le genre *Ipomoea* , est assez difficile. Selon les uns le premier se distingue parce qu'il offre deux ou trois stigmates distincts , tandis qu'il n'y a qu'un stigmate à deux ou trois lobes dans les *Ipomoea*.

Mais le professeur Kunth a autrement circonscrit ces deux genres. Il place parmi les *Convolvulus* , toutes les espèces dont les étamines sont in-

cluses, et forme le genre *Ipomœa* de toutes celles qui les ont saillantes audessus du tube de la corolle. 11 résulte de-là évidemment que ces deux genres n'en forment qu'un seul, qui peut se diviser en deux sections principales, représentant chacune les genres *Convolvulus* et *Ipomœa* des auteurs modernes. Nous avons dit précédemment que le nombre des espèces de ce genre était très-considérable. Plusieurs d'entre elles méritent un intérêt particulier, parce qu'elles nous fournissent des médicamens ou des alimens utiles; ce sont celles-là seulement que nous mentionnerons ici :

Liseuon Jalap, *Convolvulus Jalapa*, L., Rich., Bot. M éd., t. i, p. 281. Cette espèce est originaire des environs de Xalappa au Mexique , d'oii est venu le nom de Jalap , sous lequel on la connaît. Elle croît également dans d'autres parties de l'Amérique méridionale et septentrionale; car il est prouvé aujourd'hui que la Plante désignée par Michaux, sous le nom d' *Ipomœa macrorhiza* , dans sa Flore de l'Amérique boréale , est bien la même que celle du Mexique , dont le professeur Desfontaines a donné la description et la figure dans le troisième volume des Annales du Muséum. Sa racine est fusiforme ou arrondie , blanche , charnue , lactescente, donnant naissance à plusieurs tiges herbacées, sarmenteuses, striées, de la grosseur d'une plume à écrire , parsemée de petits tubercules , s'élevant à une hauteur de quinze à vingt pieds et s'enroulant autour des corps voisins. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, subcordiformes, entières, aiguës , quelquefois divisées en deux, trois ou cinq lobes plus ou moins profonds , glabres à leur face supérieure , velues inférieurement. Les fleurs sont grandes, violacées, solitaires à l'aisselle des feuilles ou elles sont portées sur des pédoncules assez longs. Le calice est

persistant, à cinq divisions profondes. La corolle est infundibuliforme, évasée. Les étamines sont incluses. La capsule est

LIS

ovoïde, arrondie, enveloppée par le calice, ordinairement à quatre loges contenant chacune une ou deux graines anguleuses. C'est la racine de cette Plante que l'on emploie en médecine sous le nom de Jalap. Nous avons parlé des propriétés de ce médicament au mot Jalap, auquel nous renvoyons.

LISEUON ScAMMO.VEE, CoiWoU'IlllIS

Scaininunea, L., Rich., Bot. Méd., i, p. 282. Cette espèce qui croît en Syrie et dans plusieurs contrées de l'Orient, a une racine vivace, allongée, épaisse, charnue, lactescente, d'où s'élèvent des tiges grêles, volubiles, un peu velues, de quatre à cinq pieds de hauteur. Elles portent des feuilles alternes, pétiolées, hastées, aiguës, glabres et entières. Les fleurs sont rougeâtres, plus petites que dans l'espèce précédente, réunies au nombre de trois à six sur un pédoncule ramifié et placé à l'aisselle des feuilles. Le calice est également persistant. C'est de la racine de cette Plante que l'on retire la substance gommorésineuse connue sous le nom de Scarnmonée d'Alep. Pour l'obtenir on pratique à la partie supérieure des racines, mise à nu, des incisions plus ou moins profondes. Il s'en écoule un liquide blanc et lactescent que l'on reçoit dans de petites coquilles où il se concrète. La Scarnmonée d'Alep est en morceaux peu volumineux, d'un gris foncé, à cassure résineuse, d'une odeur forte et désagréable, d'une saveur âcre et amère.

Selon l'analyse de Bouillon-Lagrange et. Vogel, elle se compose de 60 parties de Résine; 5 de Gomme; 2 d'Extrait, et de 35

parties de débris végétaux et autres substances étrangères. Cette Gomme résine que l'on appelle aussi Diagrède est un purgatif drastique très-violent que l'on ne doit employer qu'avec beaucoup de circonspection et à des doses très-faibles , telle que celle de 4 à 6 grains, que l'on peut augmenter graduellement.

Liseron Meciiocan, *Convulvulus SJechoacana*, L. Ce Liseron est origi-

LIS 465

naire de l'Amérique méridionale ; on le connaît sous les noms vulgaires de liryone d'Amérique, lJata te purgative , Rhubarbe blanche, Scarnmonée d'Amérique. Sa racine est tubéreuse, charnue, blanche et pleine d'un suc lactescent. Ses tiges sont longues, anguleuses, sarmenteuses , flexibles , portant des feuilles alternes pétiolées, cordiformes , entières, des fleurs blanches ou rouges , axillaires, pédonculées et solitaires, grandes comme celles du Liseron Jalap. On trouve cette espèce au Brésil , au Mexique et dans d'autres parties de l'Amérique méridionale. C'est la racine de cette Plante qui est connue et employée en médecine sous le nom de Méchoacan. Cette racine , telle qu'on la trouve dans le commerce, est coupée en rouelles ou en morceaux irréguliers. Généralement elle est privée de son écorce. Elle est blanche et comme farinée , sans odeur, ayant une saveur faiblement acre. Assez souvent cette substance est falsifiée avec la racine de Bryone, que l'on y mêle. La racine de Méchoacan eijt faiblement purgative. On en fait aujourd'hui assez rarement usage; sa dose doit être plus élevée que celle du Jalap. On l'administre de la même manière.

Liseron Turbitii , Convolvulus Turpethum , L. Le Turbilh est originaire de Ceylan. Ses racines , comme celles de toutes les espèces précédentes , sont grosses, charnues, allongées, blanches en dedans et lactescentes. Ses tiges sont également grêles et vol 11 biles , ses feuilles cordifoimes, anguleuses et un peu crénelées, blanches et colouneuscs , portées sur un pétiole ailé. Ses fleurs, grandes et blanches, sont réunies au nombre de trois à quatre sur des pédoncules axillaires. La racine de cette Plante est connue , dans les pharmacies, sous le nom de Turbith végétal. On l'y trouve sous la forme de tronçons cylindriques , longs de qualre à cinq pouces, sur un pouce de diamèlré, et dont on a quelquefois enlevé la partie centrale; ils offrent à lcuis deux

m us

extrémités un grand nombre de petits pertuis qui sont autant de vaisseaux coupés transversalement, de sorte que selon la remarque de G-uibonrt (Hist. des Drog. simpl.), cette r acine ressemble, au premier abord, à la tige d'une Planteinonocoty lédonée.

Le Turbith végétal est fortement purgatif, mais on l'emploie Irèsrarement aujourd'liui.

Les quatre espèces que no-us venons de décrire , savoir : le Japlap, la Scammonée , le Méchoacan et le Turbith, sont exotiques. Elles sont remarquables par leur propriété purgative, qui est plus ou moins intense. Il est important de remarquer que la même propriété se trouve également dans plusieurs de nos espèces indigènes , qui ont aussi une racine tubéreuse et charnue; c'est ce que l'on remarque surtout pour les Convolvulus sepii/m, Convolvulus SoldanelLa , Convolvulus arvensis et plusieurs autres. En effet

cette action purgative est due à un principe résineux , dont la quantité variable indique le degré d'action dans les racines des diverses espèces de Liserons. Ainsi dans la racine de Jalap, d'après l'analyse faite par le docteur Félix Cadet-Gassicourt, cette résine est dans la proportion d'un dixième; tandis qu'il n'y en a qu'un vingtième dans celle du *Convolvulus arvensis*, d'après le travail récemment publié par Chevalier. Il résulte de-là qu'en doublant la dose de la racine du petit Liseron des champs , on peut obtenir des résultats entièrement analogues à ceux que produit le Jalap. Mais cette propriété purgative tenant, ainsi que nous venons de le voir, à la présence d'un principe résineux , pourra ne pas exister dans quelques espèces du genre , lorsque ce principe lui-même n'y existera pas. C'est ce que prouvent plusieurs Liserons et principalement les deux suivans, dont les racines sont employées comme aliment.

Liseron Patate , *Convolvulus Batatas*, L. Vulgairement Patate ou Batate. La Patate originaire de l'Inde

LIS

est aujourd'hui cultivée et naturalisée dans presque toutes les parties chaudes du globe. Ses racines tubéreuses et charnues sont fusiformes , rouges, violacées en dehors, blanches intérieurement; cependant il y a des variétés à racines jaunes ou blanches extérieurement. Ses tiges sont irrégulières, herbacées, volubdes; celles qui s'étalent à terre s'y enracinent de distance en distance ; elles portent des feuilles alternes , pétiolées , cordiformes ou hastées, quelquefois trilobées. Les fleurs qui sont blanches en dehors , presque nues à leur face interne, sont portées sur de longs pédoncules axillaires, au sommet desquels elles sont réunies plusieurs ensemble. Les Patates sont un légume sain et agréable ;

elles sont un peu farineuses et sucrées. Dans les pays chauds leur culture n'exige ni frais , ni soins Irès-mnltipliés ; on les traite comme nous faisons ici pour la Pomme de terre. Mais dans nos climats cette culture demande de grandes précautions. Voici le procédé généralement usité: on prépare vers la mi-avril uue couche de trois pieds et demi de large , sur deux d'épaisseur, en fumier de cheval bien chaud , que l'on recouvre d'environ six pouces de terre. Lorsque la couche a perdu sa trop grande chaleur , on place dans la terre qui la recouvre et à deux ou trois pouces de profondeur, des tranches, de racine de Palale, comme pour la Pomme de terre. Ces morceaux doivent être à environ huit pouces de distance les uns des autres. Quand les jets qui ne lardent pas à en naître , ont acquis environ un pied de longueur, on les enlève , on en retranche toutes les feuilles à l'exception de celle qui les termine , et on les plante presque horizontalement dans une planche bien profondément labourée el à environ deux pieds de distance les uns des autres. La Patate jusqu'au moment de sa récolle qui se fait vers le milieu d'octobre , n'exige d'autres soins que d'être purgée des mauvaises herbes et d'être arrosée de temps en temps,

LIS

LIS

mais abondamment. Ou calcule que chaque pied peut produire environ deux livres de racines. En général les terres légères sont celles qui conviennent le mieux à la Patate. Il y a encore plusieurs autres modes de culture qu'il n'est pas de notre sujet de luire connaître ici avec détails.

Le Liseron comestible, *Convolvulus erlulis* , décrit par Thunberg dans sa Flore du Japon et dont ce naturaliste n'a pas observé les fleurs, ne nous paraît pas différer de la Patate.

Ses racines se mangent au Japon comme celles de la Patate.

Quelques espèces de Liserons sont cultivées dans les jardins comme Plantes d'agrément; tels sont : le Liseron tricolore, *Convolvulus tricolor*, L. , connu sous les noms de Belle de jour et de Liset. Il est originaire de Portugal et d'Espagne. C'est une Plante annuelle d'un pied environ d'élévation , le plus souvent étalée. Ses feuilles sont lancéolées ; ses fleurs solitaires, campanulées , bleues sur les bords du limbe de la corolle , blanches au milieu et jaunes à la gorge. On cultive encore le Liseron satiné, *Convolvulus Cneorum*, également originaire de la Péninsule.

C'est un joli petit Arbuste de deux pieds de hauteur , portant des feuilles lancéolées et satinées , couvertes d'un duvet argenté. Ses fleurs qui sont blanches, lavées de rose, s'épanouissent pendant la plus grande partie de l'été.

On a aussi, mais mal à propos, nommé Liseron rude , le *Smilax aspera* , L. (a. R.)

**LISERONS. bot. piIAN.Syn. de Convolvulacées. V. ce mot. (b.)

LISSET BLANC et BLEU ou LI- SETTE et LISERET. bot. phan.

Vieux noms des *Convolvulus sepium* et *tricolor*. /^.Liseron. (b.)

LISSETTE, COUPE-BOURGEON, БÉЧК. iNS. On a donné ces noms à des Insectes des genres *Attelabus* , *Eumolpus* , *Pyralis* ,

etc., qui font beaucoup de tort aux boulons de Vignes, aux greffes des Pêchers et au-

tres Arbres fruitiers, f. Attelabe , Eumolpe , Pyrale et Vigne, (g.)

LISIANTHE. *Lisianthus*. bot. phan. Ce genre , de la famille des Gentianées , et de la Pentandrie Ljigyuie, L., est ainsi caractérisé : calice presque campanulé, divisé au sommet en cinq segmens courts se recouvrant et diaphanes sur les boids; corolle infundibuliforme dont le limbe offre cinq divisions étalées, égales, la gorge imberbe; cinq étamines un peu inégales, à anthères sagittées; style long, surmonté d'un stigmate à deux lamelles ; capsule biloculaire, à cloisons formées par l'introflexion des valves; graines anguleuses , non bordées. Les Lisianthes sont des Piaules herbacées , rarement ligneuses, à feuilles presque sessiles, à fleurs offrant plusieurs modes d'inflorescence, tantôt solitaires, tantôt en ombelles , en corymbes , en panicules ou en épis. Le nombre des espèces s'élève aujourd'hui à une trentaine environ; elles sont toutes indigènes de l'Amérique méridionale. et des Antilles, excepté les *Léisianthus carinatus* et *trinervius* de Lamarck qui croissent à Madagascar. Aublet a décrit et figuré , dans ses Plantes de la Guiane , plusieurs Lisianthes remarquables par leur beauté et la saveur amère qu'ils partagent avec les autres Gentianées.

Tels sont les *Lisiantlius purpurascens*, *alatus* et *g/a/idi/lurus*. Enfin , c'est aux auteurs de la Flore du Pérou et à K h ni h que l'on doit la connaissance de la plupart des autres espèces.

LISIMACHE. bot. phan. Pour Lysimaque. V. ce mot. (b.)

LISIZA. pois. Syn. de Japonais, espèce du genre Cotte, V. ce mot , sous-genre Aspidophore. (b.)

* LISONGÈRE. ois. Ce mot qui signifie en espagnol Flatteur, dans le sens gracieux, a été appliqué par Pernelty, dans son Voyage aux Malouines, à un Oiseau-Mouche. F.

Colibri. (b.)

456 LIS

LISOR, conch. Blainville (Dictionnaire des Sciences Naturelles) pense que le Lisor d'Adanson (Voyag. au Sénégal , pl. 17 , fig. 16) a été rapporté à tort, par Gmelin , au *Macra s/ultorum* , et que c'est probablement une *Ve'nus* et peut-être la *Venus lœta*. Nous ,ne partageons pas l'opinion de Bl.u'n ville , car en lisant la Description d'Adanson , p. a3i , nous voyons que le ligament est intérieur, placé dans une fossette entre des dents lamelleuses, et qu'il y a de plus, à la charnière, des dents latérales , également lamelleuses, caractères qui conviennent essentiellement aux Mactres et non aux Vénus. Si on joint à cela la ressemblance dans la couleur, la disposition des rayons et le bâillement des valves, on sera porté à croire que le Lisor est bien la même Coquille que le *Macra stultorum*. (d..h.)

LISPE. molTj . Adanson (Voy. au Sénégal , pl. il, fig. 2) a placé sous ce nom, dans son genre Vermet, une agrégation de tubes calcaires contournés irrégulièrement', et qui appartient plutôt aux Serpules qu'à ce genre. Linné lui a donné le nom de *Serpula glomerata*. V. Servule.

LISPE. Lispa. INS. Genre de l'ordre des Diptères , famille des Athéricères, tribu des Muscides, division des Créophiles , Latr.

(Fam.Nat. du Règn. Anim.), ayant pour caractères : une trompe distincte; cuillerons grands, recouvrant en majeure partie les balanciers ; côtés de la tête non prolongés en manière de cornes portant les yeux; ailes couchées sur le corps; antennes insérées près du front, plus courtes que la tête, en palette allongée, avec une soie plumeuse; second article un peu plus long que le troisième. Ces Diptères s'éloignent des Mouches et autres genres voisins , parce que ceux-ci ont les ailes écartées; ils diffèrent du genre *Achias* par la tête qui, dans ceux-ci, est prolongée de chaque côté. La seule espèce qui com-

LIS

pose ce genre se trouve fréquemment sur le sable des bords des mares où.

elle court très-vite.

Lisr-E tentaculaire , *Làpa tentacutata*, Degée, Latr. Elle ressemble à la Mouche domestique pour la taille et la couleur ; son corps est d'un noirâtre cendré avec le devant de la tête blanchâtre, les palpes jaunâtres et l'abdomen marqué de plusieurs taches d'un blanchâtre soyeux , dont deux très-distinctes sur son dernier anneau; ses ailes sont transparentes et sans taches; les palpes sont grands, très-déliés à leur base, et s'élargissant ensuite en forme de spatule ciliée sur les bords. Elle se trouve dans toute la France et à Paris. (g.)

* *LISSA*, pois. (Delaroché.) Nom donné aux îles Baléares à une variété du *Mugil cephalus* , L. V. Muge.

LISSANTHE.Z,M«a«/Ae.BOT.PHAN.

Genre établi par Rob. Brown (Frudr.

Flot: Nov.-Hppl. 1, p. 540) dans la famille des Æpacridées , et la Pentandrie Monogynie , L., pour quelques espèces placées d'abord dans le genre *Styp/ielia*, dont elles diffèrent par les caractères suivants . le calice est nu ou accompagné de deux bractées ; la corolle est infundibuliforme ; son limbe est à cinq divisions étroites , dépourvues de poils. L'ovaire est à cinq loges et devient une drupe charnue , renfermant un noyau osseux et solide.

Les espèces de ce genre , au nombre de six, sont de petits Arbustes dressés , ayant des feuilles éparses, très-petites , persistantes, entières j des Heurs blanches et petites formant des grappes ou des épis axillaires; quel- 1 uefois elles sont solitaires à l'aiselle es feuilles.

Parmi ces espèces, on dislingue le *Lissanthe daphnoides* , R. Bro-\yn, loc. cit.; *Styphelia daphnoides*, Smith, Netv.-Holl. 48 ,dont les feuilles sont elliptiques, lancéolées, mucronées au sommet; les fleurs axilloires , le calice accompagné de deux bractées ; la corolle infundibuliforme. (a. r.)

■ LISSE. Lissa, crdst. Genre de

LLS

D'ordre des Décapodes , fumillo des IfJracbyures, tribu d&S Triangulaires, | établi par Leacb (Mise. Zuvl. T. H, tab. US) et ayant pour caractère-, se- . Ion lui : pi emiei article de antennes fftpéi ieures eyliudiique , plus gros et plus long que le second : quelques poils in uiassu*: - » j i les aftteuues ^ serves beaucoup plus giosse- el un peu pluï longues que 1er. inities pale-, qui

boni ton 1 «•■» noduleuses , ains q ie les biasqui diminuent
progtessivenien!

de giaudeui depuis la seconde pitre insqu à la cinquième ;
ourles i > i . : . < ■ s . lisses au bout j carapace loi li mi ni Bodu-
leuse, sausépiues , avec h- liont avancé el échancté au bout; or-
bites des jeux ayant uni; li-suie en dessus et eu arrière: yeux por-
tés sur de Courts pédoncules.

Latreillc n'a pas adopté ce genre; il le réunit à ses Inac/ius. La
seule espèce que nous connaissions et qui sert de t > pe au génie
esl le JÀssa C/iiragia , Leacb (lue. cit.); Caticti Chiragra , Herbst,
lab. 17, lig 96; Jnac/ius CMragra, Fabr. , Litr.; JUaia Uùnigta
bosc. Elle Se tiouvedans la Méditerranée, (g.)

* .lissochilf. LissocUiuis. but.

y H an Genre nouveau établi par Ko- Lert browu , publié par J
Liudley {Collect. t. 5i, et faisant partie de ia laimJle des Oicbi ci s
el de la Cvn.nidrie Monaudi ie , L. Voici se-, ca ra cl ères tels qu
ils ont été donnés pat Liudiey , /oc. cit. Les trois folioles inté-
rieure!» du calice sont très-grau les, étalées et en loi nie d'ailles;
les tiois extérieures sont beaucoup plus petites el réllécbies. Le
labelle est i.oncave à s* base et redressé dans sa partie supérieure
; il s'unit intérieurement avec les deux côtés du gy- DOslème.
L'autlièie est teuninale et opercubloi me , elle reufeime deux
«nasses polliuiques bilobées ilans leur partie intérieure , et allac-
bées au somme! du stigmat par un appendice lamelleux qui leur
est commun à toute:, les deux. Ce génie ne se compose encore
que d'une seule espèce, Ussoc/tilus speclovue , LindJey, dont

LIS 457 ce jeuue et savant botaniste a donné une excellente' li-
gure à la planche Si de ses C'ol/ecla/tca. 11 y rapporte a vec doute

le Saiyiium fâjganùiuin , Lm ,

Suppl.j 402. C'est utje l'ianle 1:011 palasite, ayant la lige r nflée. el bulbilbrme intérieurement; les teuilles longues , planes , charnues, sans nervures et eusifunues hs tleur- jaunes, giandes, disposées eu un long épi teiininal. Celle e-pece croît au cap de bouiic-Lspéiaiice. [A.Ji.)

* LISSONOTL. Lissonotus. me.

G'iin: de l'ordre des Coléoptètes, section de's 'J'éliamères , famille des Lungicornes , liibu dcsCér.unbycins, établi par D.ilmau el adopté par Lalieille [l'am. Nat. du Fiègn. Anim.) qui ne donne pas ses caraclèies. L espèce qui sert de type à ce genre est le J,us-viiotus eu uesi / is , (' ait ii/i um cyues- Iris , Fabr. Scbouuber en cite quatie espèce* dont il dit une petite famille dans sou genre Ceiambyx. (c.)

LISSOSTYLIS. jjot. fhak. Tour Lyssosty is. V. ce mol. (a.)

* LIS'J'KKA. nor. m an. l'.ober!

Biown , dans la seconde édition du Jardin de Rtw , a l'ait un genre C4etera qui a pour type les O/j/ujs ovata et Ojj/ujs con/ata de Linné. Mail ces espèces ne diffèrent pas génériqueiiient de 1 Ojj/i/ys nid un avis , L. , qui constitue le type du génie Iscottia. Le piol'csseur Kiebard , daus son travail sur les Orchidées d'Luiope, a doue <i u devoir réunir le génie JAstera au hvottia. f . NÉoïtie.

Adanson avait donné le nom de Listera à un geuie qu'il avait formé dans la famille des Légumineuses et qui correspond à peu près au genre SjtartiuinAn Linné; mais ce nom de genre n'a pas été adopté. (a. K.)

LISTIUJMTL conch Lui-1 donne ce nom à une Coquille fossile qui a des stries rayonnantes à sa surface, et dont les deux valves sont également bombées, il est à présumer que ce n'est pas une Huître véritable; mats

LIT

LIT

à quel genre rapporter ce corps ?

LITTA. bot. piian. Syn. de Vohiria d'Aublel. V. ce mot. (b.)

LITCHI ou LETCHI. bot. piian.

Nom vulgaire d'une espèce du genre Euphoi'ia. pr. ce mot. (a. h.)

LTTHACNE. bot. man. Genre de la famille des Graminées', et de la Monœcie Triandrie, L. , établi par Palisot-Beauvois (Agi ostographie , p.

j35) qui lui a imposé les caractères suivans : chaume rameux ; épis sim- J)les , dissemblables, celui qui termine l'axe à épillets unifloies et mâles; lépicène nulle; glumes (paillettes , Palisot-Beauv.) très-aiguës ; trois élamines; les épis axillaires sont composés d'épillets uniloi es et femelles , ceux-ci ont les valves de la lépicène très-aiguës; les glumes coriaces, dont la valve inférieure est tronquée , naviculaire et gibbeuse; les écailles tronquées, frangées; le style est simple, et les stigmates sout plumeux.

Ce genre ne se compose que d'une seule espèce que Swarlz plaçait dans ' le genre Olyra sous le nom d'OIJra pauciflora. Cette d'aminée croît dans les forêts de la Jamaïque. (g..n.)

LTTHAGROSTiS. bot. piian (Gaertner.) Syn. de Coix Lachryma- Jobi. (b.)

LTTHANTHRAX. min. Syn. grec de Charbon de pierre {Steinkokle des Allemands), employé par Boetius de Boot et vVa'llerius. On a confondu sous ce nom la Houille et le Jayet.

fO. BEI,.)

LITHARGE. m'tn. chim. On désigne par ce nom , dans le commerce , le protoxide de Plomb fondu et cristallisé en lames jaunes par le refroidissement. Elle est souvent colorée en rouge par un peu de Minium; mais elle redevient jaune lorsqu'on la chauffe dans un tube de verre fermé , le Minium se réduisant à l'état <lo protoxide. Toute la Litharge du commerce provient de l'exploitation des mines de Plomb argentifères.

Elle contient presque toujours une petite quantité d'Acide carbonique qu'elle enlève à l'air humide et qui s'y trouve à l'état de sous-carbonate de Plomb.

Litharge d'Argent. Protoxide de Plomb fondu, qui, ne contenant pas de Minium , n'est point rougeâtre , et a un brillant argenté.

Litharge d'Or. Protoxide de Plomb fondu , qui a une couleur jaune assez éclatante. (g. del.)

LITHÉOSPHORE. min. Targioni et Licetus ont donné ce nom à la Pien e phosphorescente deBologne, et dans ces derniers temps ,de Laméiherie l'a pareillement appliqué à la Baryte sulfatée radiée. (G. DEL.)

* LLTHINE. min. chim. Oxide de Lithium. Pr. ce mot. (g. del.)

* LITHIUM, min. Nouveau Métal qui, par ses propriétés, doit être placé entre le Barium et le Sodium , et qui, en punissant à l'Oxigène dans la proportion de 100 à 78,2, produit un Oxide alcalin appelé Litlodon par les Suédois et Lit/dué par les Français. Davy l'ayant obtenu à l'état métallique, a trouvé qu'il possède les propriétés analogues à celles du Sodium et du Potassium. La Lithine a été découverte en 1818 par Arfwédson dans la Pétalile , le Triphane et la Tourmaline verte. Berzelius l'a retrouvée depuis dans la Rubellite ; elle est blanche , très-caustique , sans odeur ; elle verdit fort et sent le sirop de Violettes ; fond à un degré de température qui n'est pas très-élevé , et forme des sels neutres avec tous les Acides. Sa tendance à attaquer le Platine par la chaleur fournit un moyen de reconnaître sa présence dans les Minéraux. Pour ceia , il suffit de traiter le Minéral au chalumeau par le carbonate de Soude sur une feuille de Platine. S'il y a de la Lithine , elle est mise à nu et colore le Platine en jaune brunâtre tout autour de la masse fondue. (g. del.)

LITHIZONTOS. min. Variété d'Escarboucle , suivant Plin , d'une

LIT

à couleur bleue assez faible, et que l'on soupçonne être une variété de

- Grenat, plutôt que de Corindon

à bleuâtre, f. Escarboucle. (g. del.)

LITHOBIBLION. min. Nom donné par Wallerius aux empreintes de

• feuilles sur les pierres et aux feuilles fossiles elles-mêmes. (g. del.)

LITHOBIE. Lithobius. ins. Genre delà classe des Myriapodes, ordre des Chilopodes, famille des iEquipèdes de Latreille (Fam. Natur. du liègn. Anim.J , établi par Leacli,et ayant pour caractères : antennes sétacées , composées d'articles presque coniques, dont les deux premiers sont plus grands; lèvre largement échan-crée en devant, avec le bord supérieur dentelé et les yeux grenus; quinze paires de pie.ls ; plusieurs des demi-segments supérieurs cachés sur les autres. Ces Aniniauxsedistinguent des Scutigères par les pieds qui , dans ceux-ci , sont inégaux ; ils s'éloignent des Scolopendres et des Crytops par les anneaux du corps, qui, dans ceux-ci , ont tous les demi-segments dorsaux découverts. Léon Uufour (Ann. des Se. Nat. T. 11, p. Si) a donné l'anatomie de ce genre: d'après ce savant, les organes de la digestion se composent : 1° de deux glandes salivaires; 2° d'un tube alimentaire droit, de la longueur de l'Animal; et 3° d'une paire de vaisseaux hépatiques Les organes générateurs mâles sont composés: 1°de deux testicules com|)osés chacun d'une paire de glandes allongées, pointues et parcourues par une rainure médiane; ils ont été pris parTréviran us pour des* masses graisseuses; 2° de trois vésicules séminales, deux latérales et une intermédiaire. Cette particularité qu'offre seul le Lithobie, d'avoir trois vésicules séminales , est fort remarquable , et Léon Uufour dit qu'il n'en a jamais rencontré que dans ce genre en nombre impair ; 3° d'une verge qui est placée dans le dernier segment dorsal du corps du Lithobius. Les organes femelles se composent : 1° de l'ovaire qui con-

siste en un seul sac allongé qui contient des œufs globuleux et blancs ; u° des glandes sébacées de l'oviducte; et 3° de la vulve qui est flanquée à droite et à gauche par une pièce crochue , bi-articulée , terminée par une pointe bifide et armée à sa base de deux dents courtes. Les Lithobiés vivent à terre , sous des pierres, comme les Scolopendres; on en rencontre souvent en été sous les tas de Plantes , le bois pourri , etc. Leach en décrit trois espèces dont deux se trouvent en Angleterre. Celle que nous tiouvons en France et qui sert de tpe au genre est :

Le Lithobie fourchu , *L. foijicatus* , Leach , Latr ; *Scolopendra forjicata*, L. , Tréviranus (Verm. Schrit.

Anat. tab. 4 , fig. 6-7) ; *L. fuijicata* et *coleopliatra*? Panz. [Fa un. Ins. , fasc.

50, fig. i3-ia); la Scolopendre à trente pales, Gcoff. Longueur, un pouce au" plus, lisse , luisante, tan-< tôt d'un brun de poix, tantôt d'un roux qui tire sur l'ambre. Elle se trouve fréquemment en été dans les jardins du midi de la France et de Paris. (g.)

* LITHOBRYON. bot. crypt. {Lic/tens.) Ddlcn nomme Lilho-bryon corallo'uies le *Cladonia. ceranoides* d'Acharius. (A. F.)

LITI10CA.LAMES ou STÉLË- CIUThS. bot. foss. On trouve ce mot dans les anciens orvetographes pour désigner ce qu'ils regardaient comme des liges de Bambous ou de l'ioseaux fossiles. (b.)

LrTHOC AH DIUM . conçu. Les moules des Bucardes fossiles dans les anciens ory ctographes. (b.)

LTTHOCARPES. bot. foss. Syn.

de fruits fossiles. V. Carpolitiies.-

* LITHOCIA A. bot. crypt. [Lichens.) Troisième sous-genre du genre *Ferrucaria* d'Acharius (S/«. Me/à. Licâ., p 3). Il renferme les espèces h thalle sous-tartareux , crustacé, contigu , fendu en aréoles ou pulvérulent. 11 est

LIT

ainsi nommé , parce que la presque totalité des espèces se fixent sur les pierres. (a. F.)

UTHODE. Lithodes. civust. Genre de l'ordre des Décapodes , famille des Brachy u'res , tribu des Triangulaires, élabli par Leach et Latreille en même temps et ayant pour caractères : pieds-mâchoires extérieurs étroits, avancés , allongés et semblables à de petits pieds; yeux rapprochés à leur base; les quatre antennes saillantes ; serres plus courtes que les pieds suivans, les deux pieds postérieurs très -petits, repliés et point piopres à la marche. Ces Crustacés ressemblent beaucoup aux Inachus , aux P.irthenopes et aux JVIaïas ; mais ils en diffèrent surtout par la forme de leurs deux pieds postérieurs et par d'autres caractères tirés des antennes , de la carapace et des autres parties du corps. Leur carapace est triangulaire, très - épineuse , renflée postérieurement de chaque côté parle grand développement des régions branchiales et terminée en avant par un rostre bifurqué , garni de fortes pointes sur les côtés. Les yeux sont gros, rapprochés et portés sur de courts pédoncules; les antenn.es extérieures ont à peu près la moitié de la longueur du corps; elles sont insérées sous les yeux , et. leurs deux premiers articles sont plus longs que les autres; les intermédiaires sont avancées , assez longues, divisées en deux soies comprimées , multiarticulées. L'abdomen est membraneux , composé de six plaques crustacées.

L'espèce qui sert de type à ce genre et qui se trouve dans nos mers est :

Le Litiode arctique , *L. arclica*, Latr. ; *Lithodes Maia* , Leach (Moll.

Brit. , tab. 24); *Cancer Maja*, L.; *Jnachus Maja*, Fabr. ; *Parthenope Maja*, id. et Herbst {Carter. , tab.

]5, lig. 87); Crabe épineux, Ascan.

[Icon. rar. natiir., tab. 40). Long de trois pouces, tout hérissé d'épines ; serres et trois pieds suivans chargés de tubercules épineux ; doigts des pinces ayant de petits faisceaux ; il se

LIT

trouve dans les mers du l'Europe.

* LITHODÉMON, min.

Jayet.

nord de

de (P.)

Syn.

* LITILODENDRON. polyp. Genre établi par Schweigger. Caractères :

polypier calcaire , rameux , portant des cellules lamelleuses ; rameaux écartés, cylindriques; cellules cyathiformes. Il comprend les Oculines et les Caryophylles à tige rameuse de Lainarck. (e. d.l.)

LITHODENDRUM. polyp. C'est à--dire Arbi e-Pieri e. D'anciens oryctographes nommaient ainsi des Polypiers coralloïdes ou cornés.

LITHODOME. Liihodomus. conçu.

Cuvier(Règn. Anim. T. 11)a proposé un sous-genre sous ce nom pour des Coquilles du genre Modiole qui ont la propriété, comme beaucoup d'autres Mollusques acéphales , de percer la pierre ou les Polypiers pierreux. On a pu étendu que ces Modioles se creusaient des loges aussi bien dans le Granité ou les Roches non calcaires que dans les Pierres calcaires. Ce fait n'est pas encore bien certain ; quoi qu'il en soit, ce sous-genre ne saurait être conservé, puisque l'anatomie des Animaux ne diffère en rien de celle des autres Modioles et que la coquille elle-même ne présente pas de différences suffisantes pour légitimer cette coupe. V. Modiole et Li-

THIOPHAGES. (D..H.)

LITHOPTYNGITES. polyp. On trouve ce nom dans les anciens oryctographes pour désigner des Polypiers fossiles qui présentent quelques rapports de forme avec des Champignons. (Bo

LITHOGÉNÉSIE ou FORMATION DES PIERRES. Partie de la Lithologie qui a pour objet la recherche des causes qui ont donné naissance aux substances pierreuses et des lois qui président à leur formation. (G. DEL.)

LITHOGLOSSE. Lithoglossum.

LIT

fois. Wss. L'un des synonymes de I Glossopèlres. A', ce mot.
(b.)

LITHOGLYPHITES. min. Nom ; générique donné par VVall-crius à des Pierres qui présentent la forme de i différens objets connus. En ce sens , il est synonyme de Pierre figurée. On l'a regardé aussi comme l'équivalent du Bildstein des Allemands ou du Talc graphique d'Haiiy. (g. del.)

LITHOLOGIE. Partie de la Minéralogie qui s'occupe plus spécialement des Pierres. Ce dernier mot n'ayant plus une acception bien déterminée, le nom de Lithologie a été presque entièrement abandonné.

(g. dix.)

LITHOMARGE, min. V. Abgile.

LITHOMORPHYTES. min. Même chose que Lithoglyphites. V. ce mot.

* LITHONTHLASPI. bot. phan.

(Columna.)' Syn. de Thlaspi saxatile, L. (b.)

LIT H O i N T R I R I O N. bot. phan.

(Daléchamp.) Syn. d'Herniaire glabre, (u.)

' LITHOPHAGE. Lithophagus.

INS. Genre île l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères , famille des Xylophages , tribu des Trogossitaii es, établi par Latreille (Fam. iNalur. du Règn. Anim.), et dont il ne donne pas les caractères. Ilavoisine les Mycétophiiges et les Agathidies.

Le nom de Lithophage ou Mangeur de pierres a été donné par Desbois (Dict. des Animaux) à un petit Ver qui se trouve dans l'ardoise ; Desbois dit que ce Ver s'en nourrit , qu'il a quatre mâchoires qui lui servent de dents , et qu'il subit des métamorphoses dans une petite enveloppe qu'il se fabrique dans la pierre dont il suce le suc. Personne , à notre connaissance, n'a encore retrouvé cet Animal remarquable, et nous craignons bien qu'on ne doive le ranger parmi les Animaux créés par l'imagination. Latreille (Nouv. Dict.

d'Hist. JNat..) demande si ce serait la chenille d'une espèce de Tinette. (g.)

LIT 46 i

LITHOPHAGES. conch. Les Mollusques Lithophages ne se rencontrent que parmi les Acéphales ou Conchifères. On a réuni sous cette dénomination tous ceux qui ont la singulière propriété de ronger les pierres calcaires , pour se loger et se mettre à l'abri des chocs extérieurs.

Presque toutes les familles des Conchilières ont des genres qui préfèrent soit le bois, soit la pierre. Nous en parlons à mesure que l'occasion se présente ; nous ne les considérons pas non plus ici comme une famille particulière , mais comme offrant une propriété qui leur est commune. On a eu des opinions fort différentes sur la manière dont ces Animaux peuvent percer les pierres ; quelques personnes pensent qu' l'Animal choisit les pierres dans l'état de mollesse, parce qu'elles ont vu des Pholades dans quelques dépôts vaseux blancs, peu consistans , qu'elles auront regardés comme une pierre commençante; mais cette opinion ne peut supporter le moindre examen approfondi ; car s'il

faut une pierre tendre à l'Animal , lorsqu'il s'y introduit , il faut qu'elle res.le dans le même état pendant toute la durée de la vie; si elle vient à durcir il ne trouve plus les conditions convenables pour vivre, il doit nécessairement périr ; il serait impossible alors de trouver vivant un Lithophage quelconque dans une pierre .dure, ce qui est loin d'être vrai. On a supposé que l'Animal , par des mouvemeus multipliés el les frottetemens nombreux des aspérités de sa.

coquille contre les parois de son étroite prison, était dans le cas d'augmenter lentement la cavité qui le contient, mais ce moyen tout mécanique trouve des objections puissantes: i° les Perforans se trouvent souvent dans des pierres d'une dureté et d'une densité quelquefois plus grande que la coquille elle-même, qui est d'ailleurs souvent fort mince; 3° les aspérités quelconques de la coquille ne sauraient servir à augmenter la cavité qui la contient, puisque l'on devrait les trouver

46a LIT

émoussées ou usées par les froitcinens , et il n'en est pas ainsi ; que toutes s'y trouvent clans une trèsbcille con-ei vallon , même dans les lames ou les aspérités les plus délicates, qui quelquefois les couvrent.

Un grand nombre de Coquilles perforantes soni entièrement lisses, et sont dans l'impossibilité de se retourner dans la cavité qui les contient par une crête pierreuse qui s'enfonce dans la rainure que laissent les crochets des deux valves. Fleuriau de Bellevue qui a fait un grand nombre de recherches sur ces Animaux, a observé que les Pholades étaient constamment enveloppées d'une liqueur épaisse , noire , qui sans doute était une liqueur

corrosive. Ayant observé aussi que ces Animaux étaient phosphorescens , il pensa que ce pouvait bien être à l'Acide phosphoreux qu'était due la propriété de corroder les pierres, qui est particulière aux Lithophages.

Supposer aux Peiforans une liqueur corrosive, il faut également en supposer la sécrétion et son organe sécréteur; je dis supposer parce qu'on a cherché inutilement l'organe sécréteur. Fleuriau a pensé que ce devait être le pied qui en devait fournir le plus; mais si l'on fait attention que les Saxicaves , par exemple, et les Modioles ont cet organe entièrement l'û'âirnfeiftairet , que Jes Animaux de ce premier genre ont le manteau à peine ouvert à l'endroit du pied ,on se demandera, pour ceuxlà au moins , où pourrait être placé l'organe sécréteur. Si l'organe qui produit la liqueur corrosive des Lithophages n'est pas connu, il ne s'ensuit pas qu'il n'existe pas , et cette seule objection raisonnable contre l'opinion de Fleuriau de Bellevue , ne me semble pas suffisante pour la détruire. 11 est à présumer que la liqueur sécrétée est acide , car les Lithophages vivent toujours dans les pierres calcaires. On n a point encore une observation constatée qu'ils puissent vivre dans des pierres d'une nature différente, et ce fait confirme

LIT

beaucoup l'opinion du savant observateur que .nous venons de citer.

Nous n'admettons donc pas l'opinion de Blainville, qui pense que la macération de la pierre par le mucus de l'Animal, est dans le cas de la dissoudre lentement; il donne à l'appui de son opinion les Patelles qui se creusent sur les rochers une place qu'elles

adoptent; mais il faut dire que c'est sur une pierre calcaire tendre que cela se remarque; il faudrait que le même phénomène" se répât sur les calcaires les plus durs , et l'observation manque. Il serait difficile de concevoir au reste, même à un chimiste, comment un morceau de pierre calcaire exposé à une longue macération dans un mucus de Mollusque qui ne contiendrait aucun principe dissolvant, pourrait cependant se ramollir, ou se dissoudre , ou se désagréger. On voit par ces doutes nombreux que la question qui nous occupe est loin encore d'être résolue ; il manque une foule de conditions avant d'arriver à une solution complète : ce serait d'examiner les mucosités des Lithophages , par les moyens chimiques, de chercher sur un grand nombre et dans tous les genres les organes de sécrétion qui sont probablement placés dans les bords du manteau, s'assurer que ces Animaux ne peuvent vivre que dans les pierres calcaires, etc. C'est ainsi que l'on pourrait prétendre résoudre une question intéressante et importante tout à la fois. (d.h.)

* LITHOPHILUS. Lithophilus. INs.

Genre de Coléoptères de la Famille de-: Tenebrionides, tribu des Diaperidæ.

établi par Megele , et dont nous ne connaissons pas les caractères. La.

seule espèce de ce genre est le Triluma coronata de Fabricius. (g.)

LITHOPHILE. Lithophila. bot.

puan. Genre de la famille des Amaranthacées, et de la • Monadelphic Diandrie , L., établi par Swartz {F/or.

Jnd. -Occid. , 1 , p. 48) et qui , très rapproché du Gomphrc/ia , s'en distingue par les caractères suivans : ses

LIT

fleurs forment des épis terminaux' , ovoïdes ou allongés, composés d'un très-grand nombre de fleurs imbriquées etsessiles; chaque fleur est accompagnée de trois bractées sqnamniacées, minces, membraneuses et scaiieuses , enveloppant la fleur en totalité. Le calice est mince et membraneux , comprimé , à cinq divisions un peu inégales, glabres ou couvertes de poils lanugineux- Les élamines, au nombre de deux, partant d'une sorte de tube membraneux qui. embrasse la base de l'ovaire et se termine par les deux filets staminaux qui sont opposés. Les anthères sont oblongues , dressées, jaunes, à une seule loge L'ovaire est arrondi cl presque lenticulaii e , surmonté d'un style très-court que terminent deux stigmates subulés et divergens. Le fruit est un akène membraneux et un peu vésiculeux. Swartz,n'a décrit qu'une seule espèce de ce genre , Lilhophila muscoidès , lue. cit. Cette petite Plante forme des touffes d'un à deux pouces d'élévation sur les Rocbes maritimes de toutes les Antilles. Swartz Dé l'avait trouvéequedansla petite île déserte de Navazra. Nousen possédons des échantillons recueillis par le professeur Richard, à Sainte-Croix , à An ligue , Spauislitown , Sainl-Eusiache , etc. Les feuilles radicales sont linéaires , étroites, entières , un peu obtuses , glabres, excepté vers leur base où elles sont chargées de longs pods soyeux. Les tiges, qui sont le plus souvent étalées , sont longues d'un à deux pouces ; elles poitent des feuilles opposées, plus courtes que les radicales. Les fleurs entourées de bractées scarieuses et blanches forment un petit épi ovoïde allongé, (a. n.)

* L1THOPUILLES. Lithophillœ.

ABACHN. fr. DnASSE.

LITHOPHOSPHORE, min. Ou Pierre phosphorescente. Synonyme de la Baryte sulfatée radiée de Bologne, (g. del.)

LITHIOPHYLLES. bot. foss. Dans quelques oryctographes , ce mot dé-

LIT 46 5

signe les empreintes de feuilles dans les couches calcaires. (b.)

LITHOPHYTE et LITHOXYLE.

polyp. D'anciens auteurs désignent communément par ces .mots les Polypiers dendroïdes pierreux. (e.d..e.)

LITHOPHYTES. foeyp. C'est-à-dire Plante- Pierre. Cuvier (Uègn.

Auim. T. iv, p. 80) adopta ce nom empiunlé des anciens naturalistes pour désigner un groupe de Polypiers dont l'axe intérieur est de substance pierreuse et fixé. Il comprend les ïsis , les Madrépores et les Millépores. K. ces mots. (e.d..l.)

LITHOPORE, folyp. r. Mil-

LÉPOBE.

LITHOSIE. Lithosia. ins. Genre de l'ordre des Lépidoptères , famille des Nocturnes, tribu des Tinéïles , établi par Fabricius , et ayant pour caractères: antennes et yeux écartés, les premières simples dans la plupart ; spiritrompe très -distincte et allongée ; palpes inférieurs plus courts

3 ué la tête , cylindriques , recourbés, e trois articles dont le dernier plus court que les précédens ; palpes supérieurs cachés; ailes couchées horizontalement sur le corps ou en toit arrondi. Chenilles vivant à nu, à seize pates. Les Lithosies se distinguent des Ecailles et des Callimorpbes dont Latreille avait fait des sections de son genre Lithosie dans la première étlition du Dictionnaire d'Histoire Naturelle de Déterville , parla manière dont, ces deux génies portent leurs ailes , par les palpes et par les chenilles qui sont toujours renfermées dans des tuyaux. Les Yponomeutes s'en rapprochent beaucoup , mais elles en diffèrent par les palpes inférieurs qui sont plus longs que la tête. Ochsenheimcr range avec ses Eyprepia , qui comprennent plusieurs espèces d'Arcties et les Callimorphes de Latreille , quelques-unes des Lithosies de ce dernier. Olivier (Encycl. Méth.) ne distingue pas les Lithosies des Bombyx. Ce genre, tel qu'il est restreint aujourd'hui, répond presque entièrement à celui de

464 LIT

Lithosie deFabricius, ainsi qu'aux Sélines [Setinà] de Schrank. Les Lithosies sont des Nocturnes ornées de couleurs assez variées et très-agréables ; leur forme est étroite et allongée. Elles se'tiennent tranquilles pendant le jour sur le tronc des Arbres ou sur la tige des Plantes. Leurs chenilles ont de grands rapports avec celles des Arcties et des Callimorphes; elles sont allongées, cylindriques, velues et rayées ou tachetées de rouge ou d'autres couleurs. Elles se nourrissent de Lichens et de Plantes phanérogames. Lalreille divise ce genre ainsi qu'il suit :

f mintermes des mâles pectinées.

Lithosie-Ciouette , L. grammica, Fabr., Latr. ; la Phalène-Chouelte, Geoff'r.; l'Ecaillé - Chouelte , Engram. (Pap. d'Eur.,pl. 156, fig. 20a).

Ailes jaunes, les supérieures rayées de noir ; les inférieures avec une bande noire sur le bord postérieur.

ff Antennes simples dans les deux sexes, tout au plus ciliées dans les mâles.

Lithosie gentille , L. pulchella , Fabr., Latr.; Bombyx pulchella , Oliv. ; la Gentille, Engram. {Ibid. , pl. 221 , fig. 009). Ailes blanches , les supérieures ponctuées de noir et de rouge sanguin, les inférieures ayant une bande noire le long du bord inférieur. Sa chenille vit sur l'Héliotrope d'Europe. Du midi de la France ; extrêmement rare à Paris. (g.)

LITHOSMUNDA. bot. ross. On a quelquefois désigné sous ce nom les empreintes de Fougères deshouillères. (B.)

LITHOSPERMUM. bot. phan. V.

Ghemil.

LITHOTHLASPI. bot.' phan.

Pour Lithonthlaspi. V. ce mot.

LITHOXILE. poi. yp. et bot. foss.

V. LITHOPHYTE

LITHOXYLE. bot. phan. Syn.

de bois pétrifié. (b.)

LIT

* LITHRODES. min. (Karstein.) V . Eljeolitue.

LTORNE. ois. Espèce du genre Merle. V. ce mot. (b.)

LITSEE. Litsœa. bot. phan. Genre établi par Lamarck, adopté par Jussieu et faisant partie de la famille des La urinées et de la Dioécie Polyandrie , L. Le même genre a été nommé Tetranthera par Jacquiou et Hexanthus par Loureiro. Voici ses caractères : ses fleurs sont dioïques , disposées en ombelle et accompagnées à leur base d'un involucre de quatre à six folioles caduques. Leur calice est monosépale ; son limbe, quelquefois entier, offre le plus souvent de quatre à six divisions égales. Dans les fleurs mâles , on compte de six à quinze étamines ayant leurs anthères quadricellulaires , et des glandes placées à la base de leurs filamens intérieurs. Le pistil est à l'état rudimentaire.

Dans les fleurs femelles , on trouve les étamines stériles, un ovaire surmonté d'un stigmate dilaté et lobé.

Le fruit est une baie nue, c'est-à-dire non environné par le calice. Ce genre se compose d'environ une douzaine d'espèces originaires d'Asie ou de l'Amérique méridionale. Ce sont de grands Arbres portant des rameaux et des feuilles alternes, trèsentières, coriaces et dépourvues de stipules; des fleurs réunies plusieurs ensemble dans un involucre, et formant ainsi des espèces de capitules, tantôt axillaires et solitaires, tantôt disposées en corymbes ou en ombelles. Parmi ces espèces nous distinguerons :

Le Litsée de la Chine, Litsœa chinensis, Lamk., Dict ; Tetranthera laurifolia , Jacq. , Hort. Sclæreri. ; Sebifera glutinosa , Lour.

C'est un grand et bel Arbre que l'on connaît aussi sous le nom de faux Cerisier de la Chine , et qui depuis; long - temps est cultivé à l'Ile-de-France. Ses feuilles sont alternes , ovales, un peu obtuses , très-entières , finement réticulées à leur face supérieure , un peu glauques inférieurement. Les fleurs sont

LIT

axillaires , portées sur des pédoncules velus et (l)icliotomes. Le fruit est une Laie globuleuse, à peu près de la

!;rosscur d'une petite cerise , ctf dont a chair a une saveur camphrée et désagréable. (a. R.)

LITT^EA. bot. pu an. Le Boriapartea juncea de la Flore du Pérou avait reçu de Bruunhof le nom de Lillœa geminijlora. (G..N.)

L1TTORELLE. Littorella. bot.

PHAN. Genre de la famille des Plantaginées , et de la Monœcie Tétrandrie , L., composé d'une seule espèce , Littorella lacustris , L. , Lamk. , 111., t. 3.08. C'est une petite Plante qui croît sur le bord des étangs, dans les endroits récemment recouverts par l'eau. Elle fonce de petites toulles dressées', qui par leur port semblent plutôt annoncer une Planlc monocotylédone qu'un Végétal à embryon bilobé. Les feuilles sont toutes radicales, effilées, cylindriques , dilatées et à bords membraneux à leur base.

Les (leurs sont monoïques et axillaires , réunies ensemble de manière c que l'on trouve à l'aisselle d'une même feuille une fleur mâle longuement pédunculée, placée entre deux fleurs femelles sessiles. Le pédoncule de la fleur mâle est cylindrique , presque de la longueur des feuilles, offrant vers sa partie inférieure une petite écaille obtuse et roulée. La fleur elle-même est tout à-fait

terminale; elle offre un calice divisé presque jusqu'à sa base en quatre lanières linéaires, obtuses, dressées; la corolle est monopétale tubuleuse, un peu évasée vers sa partie supérieure, qui dépasse le calice et se termine par quatre lobes obtus et réguliers. Les étamines, au nombre de quatre, sont, ainsi que la corolle, hypogynes; leurs filets sont subulés, quatre fois plus longs que la corolle; les anthères sont cordiformes, bilobes à leur partie inférieure par laquelle elles sont attachées à leur filet et renversées en dehors de manière qu'elles semblent pendantes et attachées par leur sommet. Un petit rudiment de pistil oc-

TOME IX

LIT 465 coupe le centre de la fleur. Les fleurs femelles sont sessiles. Chacune d'elles est accompagnée d'une écaille ou bractée obtuse qui l'enveloppe presque en totalité. Le calice est divisé presque jusqu'à sa base en trois lanières étroites et aiguës. La corolle est monopétale, surcoulée immédiatement appliquée sur l'ovaire, rétrécie à son sommet qui se termine par un limbe irrégulièrement tronqué. L'ovaire est ovoïde, sessile, à une seule loge, contenant un seul ovule dressé. Le Style se termine et se confond avec le stigmate qui est six ou sept fois plus long que la fleur, subulé, légèrement velu et glanduleux. Le fruit est un petit akène ovoïde, recouvert en totalité par les enveloppes florales qui sont persistantes. Son péricarpe est dur et presque osseux. Sa graine, qui est dressée, se compose d'un tégument mince et membraneux, adhérent avec un endosperme blanc, charnu, contenant dans son centre un embryon dressé presque cylindrique. Le *Littorella lacustris* avait d'abord été décrit par Linné

lui-même sous le nom de *Plantago unijiora*, mais cette Plante forme bien réellement un genre, y. Plantain. (a. h.)

* LITTORINE. *Littorina*. moll.

Férussac, dans ses Tableaux Systématiques lies Animaux mollusques , a divisé le genre Paludine des auteurs en cinq sous-genres dont le dernier a leu le nom de Littorine. Ce sous-genre, sans présenter une division très-naturelle, est pourtant utile à conserver en ce qu'il réunit un assez grand nombre de petites Coquilles ûuviatiles ou marines que l'on plaçait tantôt dans les Cyclostomes , tantôt dans les Turbos ou d'autres genres dont elles s'éloignent également, r . Paludine. (d .ii.)

* LITUACEES. Lituaceœ.

Blainville , à l'article Mollusque du Dictionnaire des Sciences [Naturelles , a donné ce nom à une famille de Coquilles cloisonnées dont il réunit les genres sous les caractères sui vans: A ruina à peu près inconnu, si ce n'est

466 LIT

dans la Spirille ; coquille polyhalame ou cloisonnée , symétrique , enroulée dans une plus.ou moins grande partie de son étendue , mais constamment droite vers sa partie terminale , de manière que l'ouverture n'est jamais modifiée par l'avant-dernier tour.

Cette famille , d'après la forme des cloisons, se trouve partagée en deux sections : la première comprend les Coquilles dont les cloisons sont sinueuses ; elle renferme les deux genres Ammonocératite et Hamite ; la seconde section renferme les Coquilles à cloisons simples. Les genres qui la composent sont : Spirule qui

comprend comme sous-genres les Hortoles et les Spirolines auxquelles sont rapportées les Lituïtes , Lילוול , Scapliite et Ichthyosareoliie. Le genre Scaphite est placé évidemment hors de ses rapports. V. ce mot, ainsi que ceux des genres que nous venons de citer. (d..h.)

LITDITE. Lituïtes. moule. Genre établi par Denis de Montfort dans sa Conchyliologie Systématique (T. 1 , pag. 278) pour un corps pétrifié, assez rare dans les collections , qui est fort voisin des Spirules , et qui en diffère cependant par plusieurs points importants. Depuis la création de ce genre que Lamarek n'a point mentionné , les auteurs systématiques ont eu sur lui des opinions différentes ; ainsi Cuvier l'a admis au nombre des sousgenres que renferme son grand genre INaulile; il l'a mis en rapport avec les Hortoles qu'on ne saurait en séparer, avec les Spirolines et les Nodosaires, l'éloignant assez des Spirilles. Férussac les en rapprocha , mais les confondit avec les Spirolines. Dans le troisième groupe de son genre Spiroline, Blainville saisit avec plus de justesse leurs rapports , il en fit une des sections du genre Spirule , et nous pensons que dans cette opinion les Lituïtes ne sont pas assez séparées des Spirules. Les Lituïtes ne diffèrent des Hortoles que par l'enroulement des tours de spire qui commencent la couille; dans la Lילוול , les tours sont

LIT

contigus; dans l'Hortole, ils sont séparés comme dans les Spirules; mai»

les genres Lילוול et Ilo1 lole diffèrent des Spirules par des caractères bien tranchés ; le premier est la continuation de la co-

quille en ligne droite , ce qui ne se présente pas dans la Spirule; le second est la position du siphon:

dans les Spirules, il est marginal; dans les deux genres qui nous occupent, il est constamment au centre des cloisons. Ces motifs nous semblent suffisans pour admettre le genre Lituite de Montfort en y rapportant les Hortoles du même auteur , et de le.

rapprocher des Spirules dont il est très- voisin , ainsi que des Spirolines. Les caractères de ce genre peuvent être exprimés ainsi : coquille libre , cloisonnée, contournée en spirale à son sommet; tours contigus ou séparés , le dernier se continuant en ligne droite; cloisons simples , régulières , percées au centre par un siphon.

Nous rapportons à ce genre le Lituite augural, Lituus, D. M. , Conchyl. Syst. T. 1 , pag. 278 , et le Lituite chossé , Lituus convolvans , N.; Hortolus convolvans , Montfort, loc. cit., pag. 28a, qui, avec une même forme, ne diffère de l'espèce précédente que par la séparation des tours de spire qui forment son sommet.

LITUOLE. Lituola. mole. Genre de la famille des Lituolées (F\ ce mot), établi par Lamarek pour des Coquilles, multiloculaires micoscopiques de la Craie. C'est dans sa Philosophie Zoologique qu'il fut d'abord établi sous la dénomination de Lituolite qui fut changée en celle de Lituole dans l'Extrait du Cours, et maintenue dans les Animaux sans vertèbres. Les caractères donnés à ce genre s'éloignent si essentiellement de ceux donnés par Montfort à ses Lituites, que nous croyons que c'est à tort qu'on a cherché à réunir ces deux genres essentiellement différens par le volume d'abord , la régularité des cloisons dans l'un , leur irrégularité

dans l'autre, et l'existence d'un siphon central dans les Lituïtes , lorsque les Lir-

UT

tue-les ne présentent jamais cette partie, et n'offrent que trois ou six trous à la dernière cloison. Voici les caractères que Lamarck assigne aux Lituïles : coquille multiloculaire , partiellement en spirale, discoïde, .. tours continus, le dernier se terminant en ligne droite; loges irrégulières; cloisons transversales et simples sans siphon , la dernière percée de trois à six trous. On ne connaît encore les Lituïles qu'à l'état fossile ; elles sont petites, multiloculaires , divisées par des cloisons assez peu régulières; elles commencent à s'enrouler comme de très-petits Nautilus à tours contigus et unis, et finissent en ligne droite; les cloisons ne sont pas percées d'un siphon ; la dernière cloison offre de trois à six trous, les autres en sont dépourvues; les deux seules espèces de ce genre sont les suivantes :

LITUÏLE NAUTILOÏDE, *Lituola nautiloidea*, Lamk., Anim. sans. vert. T.

"vu , p. 604 , n. 1 ; *Lituola nautiloidea* , ibid.; Encyclop , pl. 465 , fig. 6 ; *Lituolites nautiloidea* , ibid ; Ann. du Mus. T. v, pag. 245, n. 1 , et T. vii , pl. 6a, fig. «2; on la trouve fossile dans la Craie de Meudon , elle n'a pas plus de quatre millimètres de longueur.

Lituïle difforme , *Lituola deformis*, Lamk., loc. cit., n. 2; *Lituola deformis* , ibid.; Encyclop., pl. 466 , fig. i, a,b; *Lituolites deformis*, ibid. ; Ann. du Mus., n. 2, et T. vii, pl. 62 , fig. i3, a , b; elle se trouve avec la précédente , et n'en est peut-être qu'une variété ; cependant elle paraît avoir constamment la dernière

cloison complète , non perforée : elle n'est longue que de deux millimètres.

LITUOLÉES. moll. Lamarck avait d'abord proposé cette famille sous le nom de Lituolacées dans sa Philosophie Zoologique. Outre les genres Lituolite, Spirolinite et Spirule , il y joignait les Orthocères , les Kippuiles et les Bélemnites. Depuis (Extrait du Cours), il changea le nom de Lituolacées en celui de Lituolés, et il a séparé de cette famille

LIY

avec juste raison les trois derniers genres que nous venons de citer. Elle resta donc composée de trois genres seulement qui furent conservés dans le même ordre dans les Animaux sans vertèbres. Cuvier n'a point admis cette famille. Dans son Règne Animal, on trouve le grand genre Nautilé divisé en plusieurs sous-genres ; l'un d'eux, Lituus , comprend comme sous-divisions les genres Lituite , Lituole , Spiroline , Nodosaire et Orthocératite. Férussac (Tableaux Systématiques des Animaux mollusques) a conservé cette famille de Lituacées dans laquelle il n'a apporté que peu de changements. Il la compose des quatre genres Canope , Lituole , Spiroline et Spiule. Le genre Spiroline est divisé en trois groupes : 1°. Coquille à sommet contourné. Genre : Nodolite, Montf. 20.

Tours détachés. Genre : Lituole , Montf. 20. Tours contigus. Genres :

Spiroline , Lamk., et Lituite , Montf.

A l'exception du genre Canope, sur lequel nous conservons quelques doutes, on peut admettre , avec quelque changement , la division de Férussac pour cette famille. V. aussi les noms de genres que nous venons de citer. (n..n.)

LITUOLITE. Lituolites . moi]l .

On a donné ce nom aux Lituoles à l'état fossile ou de pétrification. Ces terminaisons en ite , que l'on avait établies pour distinguer les espèces fossiles des vivantes dans un même genre, sont abandonnées avec juste raison. V. Lituole. (d..h.)

LIVËCHE. Ligusticitm. bot. tian.

Génie de la famille des Ombellilères , et de la Pentandrie Digynie, L. , offrant pour caractères : ombelle et ombellules formées de plusieurs rayons, et munies d'itivolucres et d'mvolnccles polyphylICs ; calice à cinq dents à peine visibles; cinq pétales ovales, lancéolés, entiers, égaux, courbés en dedans; cinq étamines; ovaire surmonté de deux styles rapprochés , un peu courts et à stigmates simples; akène ovale- 50*

LIV

oblong, marqué de chaque côté de cinq sillons profonds , et conséquctnment présentant cinq angles ou côtes épaisses el un peu saillantes. Ce genre a beaucoup de rapports avec le JLaserpitium, le Selinum et Y Àngelica; il ne diffère même du premier qu'en ce que ses fruits ne sont pas relevés de côtes aussi saillantes et membraneuses. La faiblesse de ce caractère a été cause qu'on a transporté successivement plusieurs Plantes d'un

genre à l'autre. Ainsi les *Laserpitium simplex* , L. , *JJauricum* , Jacq. , *peucedanoiefes*, Desfonl. , *silicifolium* , Jacq., et *verticillatum* , Waldst. et Kit., paraissent devoir être réunis aux *Ligusticum*. Sprengel a proposé d'y rapporter encore les genres *Gingidium* et *Aciphylla* de Forster, les *Jtlhamantha Cervarià* et *Libanolis* , L., a/a/a de Marschall, et *multijlora* de Sibthorp. D'un aulrecôté, il en a démembré le *L. tenuifolium* de Ramond , pour en former le genre *Walrothia*.

V. ce mot

La LivÊche commune , *Ligusticum Levisticum* , L. , a été placée parmi les *Jngelica* par Allioni , Lamarck et De Candolle. Les autres espèces naissent dans les pays montueux de l'Europe méridionale. (g.. H.)

LIVIE. *Livia*. ins. Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Homoplères, famille des Hyménélytres, tribu des Psyllides , établi par Latreille aux dépens du genre *Psylle* de Geoffroy , et ayant pour caractères :

antennes de dix articles, très-grosses à leur base ; tête cariée et allongée ; premier segment du corselet très-distinct. Ces Insectes ressemblent beaucoup aux Psylles ; mais ils en diffèrent par les antennes qui sout d'une même venue dans ces derniers, par la tête qui est courte et par le premier segment du corselet qui est petit et peu distinct; ils s'éloignent des Pucerons, parce que ceux-ci n'ont que six à sept articles aux antennes et des Th.rips qui ont huit articles à ces mêmes antennes. Les antennes d^s Livics sont de la longueur

des deux tiers du corps ; elles sont insérées au-devant des yeux dans une éhancrure latérale; les trois premiers articles sont, très-grands et les suivants enus, très serrés et difficiles à distinguer ; le dernier est terminé par deux soies divergentes dont l'inférieure plus courte. La tête est grande, aplatie et carrée avec un enfoncement longitudinal et profond au milieu. Les yeux sont grands et placés sur les côtés ; on voit derrière chacun d'eux un petit œil lisse. Le dessous de la tête est creux dans tout le milieu de sa longueur. Le corselet est grand, peu convexe; le premier segment est court, transversal ; l'écusson est triangulaire et obtus. Les élytres sont un peu coriaces, en toit assez aigu ; elles sont marquées de deux nervures principales, épaissies à l'angle externe de la base et dilatées au bord extérieur qui est fort arqué.

L'abdomen est conique ; son extrémité est munie, dans les femelles, d'une tarière logée entre deux pointes coniques; les pales sont courtes et grosses. Les femelles déposent leurs œufs, qui sont peu nombreux, ovales et assez grands, dans les boutons des fleurs du Jonc articulé ; ce qui produit une monstruosité qui a la forme d'une balle de Graminée très-grande. La larve et les nymphes ressemblent, quant à la figure, à celles des Psylles du Figuier. Elles sont oblongues, fort obtuses aux deux extrémités et très-déprimées ; les antennes sont très-apparentes, annelées et coniques.

Les larves ne diffèrent des nymphes que parce qu'elles n'ont pas les rudiments d'élytres décrites-ci. Leur démarche, sous ces deux états, est lourde et lente; elles demeurent constamment enfermées dans l'intérieur des galles qu'elles ont produites sur le Jonc, se nourrissent du suc de cette Plante, et rendent par l'anus une matière farineuse, très-blanche, et au milieu de laquelle elles

semblent t; prendre plaisir à vivre. L'Insecte l parfait s'y tient aussi fort tranquille- Il lement et saute, de même que les Psylles , plus qu'il ne marche. La

LII

scule espèce connue de ce genre est :

La Liviedes Joncs , *L. Juncorurn* , haïr. [Gêner. Crust. et Ins. T. m, p.

170), *Psylla Juncorurn* , ibiii. (Hist. Nat. des Fourmis, p. 5*2 , pl. 12, fig. 3). Elle a un peu plus d'une ligne de long; ses antennes ont les trois premiers articles rouges , les suivans blancs et les deux derniers noirs ; la tête est rouge ; le corselet est rougeâtre; les élytres sont transparentes et les ailes d'un blanc bleuâtre; l'abdomen est rougeâtre à sa naissance , jaune à la fin ; la tarière est noire et les pâtes d'un blanc jaunâtre. Cet Insecte fréquente les lieux marécageux des environs de Paris et de plusieurs parties de la France. (g.)

LIVISTONE. *Liuistona*. bot.

niAN. Dans son *Prodromus Floræ !\ovœ Hollandiæ* , p. 267 , R. Brown ;i fondé ce genre de la famille des Palmiers et de rHexandrie Monogynie , L., et lui a assigné les caractères suivans : fleurs hermaphrodites; périlanthe double, l'un et l'autre tiipartites ; six étaminesdonl les filets sont distincts et dilatés à la base; trois ovaires cobéiens par leur face intérieure , sui montés de styles réunis et d'un stigmate indivis ; baie monosperme (unique par avortement de deux ovaires) ; albumen creux dans son centre; embryon dorsal. Ce genre doit être placé, selon II. Brown, entre le *Corypha* et le *Charnœrups*.

Les deux espèces qui le constituent sont : i° *Liuistona inermis* , Palmier élevé de six à douze mètres , et dont les stipes sont dépourvus d'épines.

3°. *L. hurnilis* , qui ne s'élève qu'à un ou deux mètres , et dont les troncs sont épineux. Ces deux Palmiers croissent dans les contrées intertropicales de la Nouvelle -Hollande.

Leurs frondes sont palmées, à pinnules bifides et séparées par des filaments. R. Brown indique en outre comme appartenant à ce genre le *Latania c/tinensis* , Jacq. (*Frugm.*

Bot. , p. 16, t. 11, f. 1). (G..N.)

LIVON. moix. Le Turbo Pica de Linné et de Lamarck a été ainsi noni-

UV 469 mé par Adanson (*Voy. au Sénégal.*, pl.

12, fig. 7)- Turbo. (d..h.)

* LIVONÈCE. *Liuoneca. crust.*

C'est un des genres que Leach a établis avec tant de prodigalité dans la famille des Cjinothoadés et que Latreille n'a pas adopté. V. *Cymotiioades.* (g)

* LIVOT. ois. L'un des noms vulgaires de la Buse. V. Faucon, (b.)

LIVRE, bot. phan. Grosse variété de Poires acerbes qui ne se mangent que cuites. (b.)

LIVRÉE, mam. On nomme ainsi une disposition particulière des couleurs du pelage chez plusieurs Mammifères dans leur jeune âge, comme chez les Lionceaux, les jeunes Tapirs et les Faons

de la plupart des Cerfs. Les couleurs d'un jeune Animal en livrée
1 appellent constamment celles que présentent d'une manière
permanente d'autres espèces du même genre; et on pourrait
même pour celles-ci, au lieu de dire, comme on le fait ordinaire-
ment, qu'elles n'ont pas de Livrée dans leur jeune âge, admettre
qu'elles la conservent pendant toute la durée de leur vie. Cette re-
marque peut servir à expliquer, pour certains cas, comment deux
espèces très-voisines peuvent différer beaucoup sous le rapport
de leur pelage, quoique ordinairement toutes les espèces d'un
même genre naturel aient un système de coloration analogue. F.
Mammifères, (is. g. st.-h.)

LIVRÉE, moll. Nom vulgaire de l'Hélix nemoratis, l'une des
Coquilles les plus communes des campagnes de la France. (b.)

LIVRÉE, ins. Les amateurs et les jardiniers donnent ce nom à
la chenille du Bombyx Neustria. Elle se nourrit des feuilles de di-
vers Arbres fruitiers. (g.)

LIVRÉE D'ANCRE, ins. Geoffroy donne ce nom à l'Insecte que
Fabricius décrit sous le nom de Trichius fasciatus. F. Trichiu. (g.)

* LIVRET, bot. latin. F. Liber.

470 LIX

LIXE. Lixus. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section
des Tétramères, famille des Rhynchophores, tribu des Charan-
sonites, établi par Fabricius, et ayant pour caractères : pénul-
tième article des tarses bilobé; antennes coudées, insérées près
du milieu d'un avancement antérieur et en forme de trompe de-
vant la tête, composées de onze articles dont les quatre derniers au
moins composent une massue allongée et en fuseau. Ces Insectes

s'éloignent des Brentes , des Atlelabes, des Rhynchènes et des Charansons proprement dits par des caractères tirés des antennes, de la forme du corps et des pales. Ils ont, en général , une forme allongée, rétrécie aux deux extrémités; leur corps est souvent couvert de petites écailles ou d'un duvet grisâtre ou cendré. La Irompe est assez longue et avancée ; les élytres sont très-dures , pointues au bout ; les tarses sont terminés par des ongles robustes au moyen desquels ils s'accrochent fortement aux doigts lorsqu'on les saisit ; ils vivent ordinairement sur les Plantes de la famille des Composées , comme les Jacées, les Chardons et autres. Ils marchent très-lentement. D'après Léon Dufour , l'appareil digestif des Lixes débute dans l'arrière-bouche, par deux vaisseaux salivaires d'une ténuité capillaire , flexueux , repliés et assez longs. Le canal alimentaire a près de trois fois la longueur du corps ; l'œsophage est grêle, suivi d'un jabot ellipsoïde d'une consistance presque calleuse parcourue à l'intérieur par huit colonnes composées de soies imbriquées et destinées à broyer encore les alimens. Le ventricule chylifié , d'abord dilaté et boursoufflé , devient cylindrique, comme un intestin , se replie et s'enfle de nouveau, et peu avant l'insertion des vaisseaux hépatiques , on voit un espace hérissé de papilles. L'intestin grêle est long, flexueux ou replié; il se dilate en un cœcum allongé, terminé par un rectum filiforme. La larve d'une espèce de notre pays a été observée par De-

géeef . C'est celle espèce que Linné a nommée *Curculio paraplec/icus*, parce qu'il croyait que cette larve étant mangée par les Chevaux avec la Plante *clians* Inquelle elle se nourrit , leur donnait la maladie appelée paraplégie, et que les Suédois nomment *Staikra*, comme la *Piaule*. C'est dans l'intérieur des tiges de la *Phellandrie aquatique* , *Ombellifère* qui croît dans les marais ,

que vit cette larve ; elle se nourrit de la moelle qui se trouve dans la partie submergée de ces tiges; elle est longue d'environ sept lignes ; toute blanche, avec la tête écadleuse et d'un brun jaunâtre ; la bouche est garnie de très-petits poils et composée de deux mandibules cornées, fortes et très-pointues ; de deux petites lèvres, de deux mâchoires et de quatre palpes; cette larve se transforme en nymphe au commencement de juillet; celle-ci est nue, sans coque et de la même couleur que la larve; les élytres et les pâtes sont appliquées sur les côtés, et la trompe est courbée sous la poitrine; elle vit toujours dans la tige, et quand elle est prête à se transformer en Insecte parfait , elle remonte toujours dans cette tige, au-dessus du niveau de l'eau , la ronge en partie avec les dents et fait une ouverture ovale qui lui sert de passage. Dejean ^Cat. des Col., p.

97) mentionne vingt et une espèces de Lixes; celle qui est la plus commune à Paris, et dont nous venons de donner l'histoire, est:

Le LIXE PARAPLECTIQUE , JL. pd-

raplecticus , Fabr. , Oliv (Col. T. v, n. 85 , pl. 21 , fig. 2ggy. Il est l'œuf le plus de six lignes , noirâtre , couvert d'un duvet court, serré, d'un jaune gris ; trompe mince , cylindrique , de la longueur du corselet; élytres terminées chacune par une pointe aiguë; cuisses simples. Cette espèce se trouve à Paris; parmi les autres espèces de ce genre il y en a une qui a reçu le nom de Lixus odonogicus , parce qu'on lui a attribué une vertu odontalgique. Fr. , pour les autres espèces , Lalreille , Olivier, Fabricius , etc. (&•)

* LIZARI. BOT. PIIAN. V. Ezaiu.

LLAGUNOA. bot. than. P'. La-

GUNOA.

LLAMA. MÀM. D'où , par corruption , Lama. Espèce du genre Chameau, y . ce mot. (b.)

* LLAVEA. bot. crypt. {Fougères.) Lagasca (Gen. et Spec. , p. 55; a donné ce nom à un nouveau genre qu'il a ainsi caractérisé : fructifications en forme de pointes ou de petites lignes obliques sur la nervure, recouvertes entièrement dans leur jeunesse par un induré membraneux, continu , qui s'ouvre de dedans en dehors ; capsules pédicellées, munies d'un anneau qui se détache avec élasticité. Ce genre, qui a beaucoup de rapport avec l' Asplenium , ne se compose que d'une seule espèce indigène de l'Amérique méridionale et a laquelle Lagasca a donné le nom de Llavea cordifolia. (g..n.)

LLITHI. bot. piiav. (Feuillée.) Nom de pays du Latirus caustica , Willd. Arbre du Chili qui n'appartient peut-être pas au genre dans lequel on l'a placé. (B.)

LLOQCI. bot. puas. Nom de pays du Piudéa de la Flore du Pérou, (b.)

* LLORENTEA. bot. phan. r.

Lokentea. (b.)

* LLUZ. pois. (Delaroche.) Syn.

de Gadus Mcrlucius , L. , aux îles Baléares. V. Gade. (u.)

* LO. mam. Syu. de Lynx. C'est le Los des Danois. P~. Chat.
(b.)

LOASA. Loasa. bot. piian. Genre établi par Adanson, d'abord placé dans la famille des Onagres , mais dont Jussieu a fait le type d'un ordre naturel nouveau qu'il a nommé Loasées. V. ce mot. Les caractères du Loasa sont les suivans : ce sont des Plantes herbacées, rameuses, ayant beaucoup de ressemblance dans leur port avec les Bryones , ordinairement couvertes depods très-cuisans. Leur tige est volubile ou sarmenteuse ; leurs feuilles alternes ou opposées, dentées ou incisées, et partagées en

LOA 47i

lobes plus ou moins profonds et quelquefois pinnatifides. Les Heurs sont portées sur des pédoncules qui oilreut en quelque sorte toutes les positions, c'est-à-dire qui sont tantôt uxillaires, tantôt terminaux, latéraux ou opposés aux feuilles. Ces fleurs , qui sont jaunes ou d'un rouge pâle, sont solitaires ou réunies eu grappes pauci flores. Leur calice adhérent avec l'ovaire infère a cinq lobes profonds et égaux. La corolle ss compose de cinq [létales onguiculés , concaves , égaux, étalés, attachés au limbe du calice. En dedans do la corolle sont cinq écailles dressées, alternes avec les pétales , et offrant h leur sommet deux ou trois lobes. Les étamines sont fort nombreuses; dix d'entre elles plus extérieures, stériles cl dépourvues d'anthères, sont placées par paires en face de chaque écaille; les autres, plus courtes, sont disposées en cinq faisceaux opposés aux pétales. Les anthères sont dressées , à deux loges s'ouvrant par un sillon longitudinal. L'ovaire est infère, à une seule loge, contenant trois trophospermes pariétaux. Le style est droit, divisé à son sommet en trois branches rapprochées. Le fruit est une capsule oblonguc, couron-

née par le limbe du calice, offrant une seule loge polysperme et dont les graines sont attachées à trois trophospermes longitudinaux qui correspondent aux sutures. Cette capsule s'ouvre par son sommet en trois valves.

Les graines qu'elle renferme sont très-nombreuses et fort pépéliles, ayant un tégument lâche et réticulé à l'extérieur, mince et membraneux intérieurement. Elles contiennent, au milieu d'un endosperme charnu, un embryon presque cylindrique dont la radicule est tournée vers le bile.

Toutes les espèces de ce genre sont originaires de l'Amérique méridionale et particulièrement du Pérou, Linné n'en a décrit qu'une seule, *Luasa hispirta*. Lamarck, dans le Dictionnaire de Botanique de l'Eucyclopédie Méthodique, en a fait connaître cinq espèces non-

472 LOA

nelles qui lui avaient été communiquées par Jussieu. Ce dernier botaniste, dans le cinquième volume des Annales du Muséum, p. 25, donne une petite Monographie de ce genre dont il porte les espèces au nombre de douze. Enfin, le professeur Kunth [iiiHumb. Nov. Gêner. 6, p. n5) en décrit quatre espèces nouvelles, dont trois originaires du Pérou, et une seule de la Nouvelle-Grenade, (a. r.)

LOASEES. Loaseœ. bot. phan.

Le professeur Jussieu, dans le cinquième volume des Annales du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, a proposé d'établir une famille particulière pour les genres *Loasa* et *Menizelia*. Cette famille a été adoptée par Kunth [in Humb. Nov. Gêner. 5, p.

n3)quiya réuni les genres *Turnera* de Linné, *Piriqueta* d'Aublet et un genre nouveau qu'il nomme *Klaprothia*. Voici quels sont les caractères de la famille des Loasées:le calice est monosépale, tubuleux , libre ou adhérent avec l'ovaire infère; son limbe est à cinq divisions ; la corolle se compose de cinq pétales léguliers, planes ou concaves, quelquefois plus petits que les lobes du calice ; la gorge du calice est garnie de cinq écailles ou d'un bord membraneux et découpé qui manque dans quelques genres. Les étamines sont généralement très-nombreuses, quelquefois en même nombre que les pétales) assez souvent les plus extérieures sont plus grandes; elles sont insérées au calice; les anthères sont allongées, inlrorses, à deux loges s'ouvranl par un sillon longitudinal:

l'ovaire est libre ou infère, à une seule loge offrant intérieurement trois trophospermes longitudinaux , quelquefois saillans en forme de cloisons et portant plusieurs ovules périlropes ou suspendus. Cet ovaire est surmonté de trois longs styles grêles, quelquefois réunis et soudés en un seul , et terminéschacun par un stigmate simple ou sous forme de pinceau. Le fruit est une capsule couronnée par les lobes du calice , quand

LOA

l'ovaire était infère, nue, quand il était libre et supère; uniloculaire , à trois trophospermes longitudinaux, correspondant au milieu de la face interne des valves dans tous les genres, excepté dans lë LoasaouWs sont placés vis-à-vis les sutures. Celte capsule s'ouvre par son sommet seulement en trois valves incomplètes.

Les graines sont très-nombreuses , péritropes ou pendantes. Dans le genre *Turnera*, elles sont accompagnées d'un arille mem-

braneux , incomplet et unilatéral, que nous n'avons point observé dans les autres genres; leur tégument propre est généralement réticulé ; il renferme au centre d'un endosperme charnu, un embryon ayant la même direction que la graine , c'est-à-dire dont le bout de la radicule est tourné vers le bile.

Les Loasées sont des Herbes rameuses , souvent couvertes de poils hispides et dont la piquûre est brûlante comme celle des Orties; leurs feuilles sont éparses ou opposées , entières ou diversement lobées ; leurs fleurs, assez souvent jaunes et grandes, sont tantôt solitaires, tantôt diversement groupées. Cette famille, qui ne se compose que d'un petit nombre de genres, a été divisée par Kunth {in Humb. Nov. Gêner. 5 , p.

n 5) en deux sections caractérisées de la manière suivante:

§ I. Loasées vraies.

Etamines indéfinies; ovaire adhérent avec le calice; trophospermes placés devant les sutures du péricarpe :

Loasa , Adans. , L. ; Menizelia , L. ; Klaprothia , Kunth.

§ II. Turnéracées.

Etamines définies ; ovaire libre ; trophospermes placés sur le milieu de la face interne des valves; graines arillées :

Turnera , L. ; Piriqueta , Aublet.

Il n'est pas très-facile de déterminer la place que les Loasées doivent occuper dans la série des ordres naturels ; voici ce que dit à cet égard le

LOB

célèbre botaniste à qui l'on en doit la formation. Cette famille se rapproche des Onagracées, mais en diffère par des caractères tranchés, et surtout par ceux tirés de son ovaire et de son fruit. Elle a, comme les Myricacées, des étamines nombreuses et un seul style; mais elle en est distinguée par son port et la structure de son fruit; sa corolle polypétale, ses étamines nombreuses et son fruit uniloculaire l'éloignent des Campanulacées qui sont monopétales, multiloculaires et à étamines définies. On ne peut la rapprocher des Cucurbitacées quoique celles-ci aient des graines également attachées à des trophospermes pariétaux, puisqu'elles ont ne plus des fleurs à sexes séparés, sans pétales, et des étamines très nombreuses. Si on la compare enfin avec les Nopalées ou Cactées, on trouvera peut-être une affinité plus caractérisée par ce style et cette loge unique, et par l'adhérence des graines ou des placentas qui les portent aux parois du fruit. Ce rapport se fortifiera par l'examen comparatif de la fleur du *Loasa* avec celle du *Cactus Pereskia* dans laquelle on trouve une conformation extérieure presque semblable, deux espèces de pétales et des étamines nombreuses qui ont la même structure, (a. r.)

* *LOBAC bot. phan.* On ne sait positivement à quel Végétal appartient cette racine des Philippines citée par Camelli comme un excellent antidote contre le venin des Serpens.

Jussieu pense que ce peut être l'*Ophioxylum*. (b.)

LOBARIA. bot. crypt. (Lichens.) Hoffmann a créé ce genre dans ses *Plantae lichenoïdes* pour la presque totalité des Lichens membraneux et lobés placés depuis, par Acharius (*Lichenographia. univ.*), dans les *Cornicularia*, *Imbricaria*, *Platismatica* et *Lobaria*, subdivisions du genre *Lichen* tel qu'il avait été

partagé d'abord dans son Prodrômus. De Caudolle a établi , à l'aide de ces sections , autant de genres distincts , qui n'ont

LOB 47\$

point été adoptés. La méthode des Lichens avait conservé un genre *Lobaria* qui n'est pas le même que celui d'Hoffmann. Il ne comprend qu'un petit nombre d'espèces à folioles coriaces , membraneuses , libres , lobées , à lobes larges , arrondis , hérissés en dessous , fructifères , à scutelles éparses , sous-sessiles. De Candolle a conservé ce genre qu'on ne retrouve plus dans la Lichénographie universelle ni dans le Synopsis.

Des cinq espèces qui figurent dans la Flore Française, trois ont été réunies aux *Stictes*; ce sont les *Lobaria herbacea* , *pulmonaria* et *scrobiculata* , et deux se retrouvent parmi les *Parmélies* , sous les mêmes noms spécifiques; ce sont les *Lobaria perlata* et *glomulifera*. V. *Parmelie* et *Sticte*. (a. f.)

LOBE et LOBÉ. Lobus, Lobaius.

bot. phan. Une feuille , une corolle , un pé'ale et en général un organe plane quelconque est appelé lobé quand il est partagé par des sinus plus ou moins profonds, en un certain nombre de divisions qu'on nomme des Lobes ; ainsi on dit feuille bilobée , trilobée , multilobée. On a également donné le nom de Lobes ou feuilles séminales aux coylédons de l'embryon. C'est dans ce sens qu'on dit embryon unilobé ou bilobé. (a. h.)

LOBELI A. bot. phan. F~. Lobélie.

LOBÉLIACÉES. Lobeliaceæ. bot.

FtIAN . A l'article Campanulacées, nous avons déjà dit que le groupe de N égétaux établi sous le nom de Lobéliacées nous paraissait devoir demeurer réuni aux Campanulacées. f.

ce mot. (a. r.)

LOBELIE. Lobelia. bot. phan.

Genre de la famille des Campanulacées , section des Lobéliacées, composé d'un nombre très - considérable d'espèces qui croissent dans presque toutes les parties du globe , mais plus spécialement dans l'Amérique méridionale et le cap de Bonne-Espérance.

Ce sont des Plantes herbacées , annuelles ou plus souvent vivaces , ou

474 LOB

des Arbustes portant des feuilles simples, alternes, dentées; des fleurs bleues , blanches ou rouges, disposées en grappes terminales ou quelquefois solitaires et axillaires. Presque toutes les espèces de Lobélies sont lactescentes, ainsi qu'on le remarque dans un grand nombre d'autres Plantes de la famille des Campanulacées. Plusieurs sont extrêmement acres et vénéneuses. Les caractères de ce genre sont les suivans : le calice est adhérent avec l'ovaire infère; son limbe est à cinq divisions égales. La corolle est monopétale, irrégulière, tubuleuse; son limbe est à cinq lobes inégaux, disposés en deux lèvres :

l'une supérieure , formée de deux divisions; l'autre inférieure, de trois divisions. Les étamines, au nombre de cinq , sont réunies entre elles par les filets et les anthères, et forment un tube généralement saillant, terminé par des poils, et au travers duquel

liassent le style et le stigmate ; celui-ci est généralement bilobé. Le fruit est une capsule , libre seulement par sa partie supérieure , couronnée par les lobes calicinaux, offrant une, deux ou rarement trois loges polyspermes et s'ouvrant par son sommet en deux valves septifères sur le milieu de leur face interne. Nous allons donner ici la description de quelquesunes des espèces les plus remarquables, soit par la beauté de leurs fleurs qui les a fait introduire dans nos jardins , soit par leurs usages et leurs propriétés. Nous ferons seulement remarquer ici que sur plus de cent espèces qui composent ce genre , trois seulement croissent en Europe, savoir : *Lobelia Dortmanna* , dans les marais du Nord, mais qui a été trouvée jusque dans l'étang de Cazaudans l'Aquitanie par Bory de Saint-Vincent.

V. Landes. *Lobelia urens* , dans les régions moyennes , et *L. laurentia* , en Italie et dans le midi de l'Espagne.

Lobelia cardinalis , *Lobelia cardinalis* , L Cette espèce , qui est originaire de la Virginie, est herbacée et vivace. Sa tige , qui est simple , s'élève à une hauteur de deux à trois

LOB

Les pieds et porte des feuilles ovales-lancéolées , aiguës et sessiles. Ses fleurs , qui sont grandes et d'une belle couleur écarlate, forment à la partie supérieure de la tige un épi de huit à douze pouces de longueur. Cette belle espèce est aujourd'hui fort commune dans les jardins. Elle peut passer l'hiver en pleine terre , en ayant soin de la couvrir; mais néanmoins il est plus prudent de la rentrer dans l'orangerie. Il faut, pour cette espèce 7 un terre franche et légère. On la multiplie facilement de graines, de boutures au printemps ou d'éclats en automne.

Lobélie Éclatante , *Lobelia fulgens*, Bonpl. , Pl. Nav. et Malm. T.

vu. Cette espèce , l'une des plus belles de ce genre , a été trouvée près de Valladolid, au Mexique, par Huraboldt et Bonpland. Sa tige est simple, dressée , cylindrique, purpurecente et un peu velue ; ses feuilles sessiles , lancéolées, aiguës, irrégulièrement dentées et légèrement velues; ses fleurs grandes , disposées en un long épi et du pourpre le plus pur et le plus intense. La Lobélie éclatante est aujourd'hui assez commune ; elle doit être rentrée en orangerie pendant l'hiver.

Lobélie à longues fleurs , *Lobelia longiflora*, L. , Jacq. , Hort.

Find.,l. 27. Cette espèce est annuelle et croît dans presque toutes les Antilles. Sa tige est rameuse, haute d'environ un pied, velue et un peu rude; ses feuilles sont lancéolées, velues à leur face inférieure, profondément et irrégulièrement dentées.

Les fleurs, solitaires à l'aisselle des feuilles, sont blanches. Leur tube, long de trois à quatre pouces , se termine par un limbe ouvert , à cinq divisions inégales. La Lobélie à longues fleurs, que l'on cultive quelquefois ici dans les serres, est extrêmement vénéneuse. Son suc est très-âcre et caustique.

Lobélie Tupa , *Lobelia Tupa* , L.

Originnaire de la côte occidentale de l'Amérique méridionale , cette espèce a sa tige dressée , haute de cinq à six

LOB

'oicds , rameuse , portant des feuilles sessiles et un peu écur-rentes, ovalessancéolées, aiguës, légèrement cotonneuses et blan-

châtres. Ses fleurs, jppi forment un long épi terminal , «ont d'un rouge vif , longues d'environ ileux pouces. Ceste cspèceest l'une des ;olus vénéucusesdu genre. Toutes ses pparties sont remplies d'un suc Liane »3t laileux d'une extrême âcrelé. Son wdeur seule , suivant plusieurs voyageurs, suffit pour provoquer le vonmissement.

Lobélie syphilitique , Lobe/ia isyphilitica , L., Rich., Bot. Méd., 1 , fp. 346. Originnaire des forêts de l'Aunérique septentrionale , cette Lobélie [présente une lige herbacée, simple, daroile, haute d'environ deux pieds , aanguleuse, velue , surtout inlérieurrement; ses feuilles sont alternes , ssesiles, rapprochées , lancéo-lées, aaguës, légèrement pubescenles , irrégulièrement dentées , et un peu sirnueuses sur les bords. Ses fleurs , violacées et solitaires à l'aisselle des Ifeuilles, forment à la partie supérieure de la tige un épi ti ès-allongé , entrecoupë de feuilles. Toute la Plante test lactescente et répand une odeur tun peu vireusc, lorsqu'on la froisse centre les doigts. Sa racine , qui se ccompose d'une touffe de libres grêles <et blanchâtres, a une saveur âcre que ll'on a comparée à celle du Tabac.

I Elle a été analysée par Boissel (Bull. rPharm., de'cemb. i824)qui y a trou- ■vé : j° une matière grasse de consis- I tance butyreuse; a" du sucre incristtallisable et infermeulescible ; 3° une i matière mucilagineu&e; 4° du mala- Ite acide de Chaux ; 5° du malate de lPotasse ; 6" des traces d'une matière ; a mère très-facilement altérable ; 7o ides muriate et sulfate de Potasse , «etc., et du ligneux. Donnée à faible idose, la décoction de cette racine • excite la transpiration cutanée; à 'dose un peu plus élevée, elle augi-mentc les déjections alvines, et enfin ••agit quelquefois comme émélque, si ■ elle est plus concentrée. Cependant ,

d'après Boissel , l'extrait qu'il a fait iprendre à plusieurs Animaux n'a ja-

LOB 47ft mais provoque le vomissement. Cette racine jouit chez les médecins de l'Amérique septentrionale d'une trèsgrande réputation dans le traitement de la syphilis, et ils l'administrent quelquefois seule, d'autres fois en lui associant l'usage du mercure. Les Canadiens l'emplov aient depuis longtemps et en faisaient un secret que le docteur Johnson parvint à leur arracher. Il le communiqua au voyageur Rai m , qui le fit connaître en Europe vers l'année l'jbG. Mais on l'y emploie très-peu , malgré les essais tentes il y a une cinquantaine d'années par Dupau qui dit avoir constaté sou efficacité dans un grand nombre de cas. Le Lubelia viens , L., qui croît dans les bois humides aux environs de Paris , possède à peu près les mêmes propriétés; mais on n'en fait pas usage. (A- n-)

LOBIER. bot. cRYPT. Paulet donne ce nom à un Bolet subéreux qu'il décrit comme nouveau dans son genre Xylometron. (B-)

LOBIOLES. bot.cryft. (Lichens.) On nomme ainsi les subdivisions du thalle en petites pièces ou lanières dont la forme imite celle des. feuilles.

LOBrPÈDE. ois. Genre établi par Cuvier (Règn. Ai.i.n.)pour le *Tringa hyperburœa*. V. *Tringa*. (dr..z.)

*LOBOITE. min. Cette substance pierreuse , regardée d'abord comme une espèce particulière, n'est qu'une variété d'Idociase , voisine de l'Egeran. Elle a été dédiée au comte de Lobo, qui en avait donné le premier une description. On la trouve à Frugard , en Uplande, non loin des mines de Dannemora. Elle est compo-

sée , d'après Berzelius , de Silice , 36 ; Alumine, 17, 50 ; Chaux , 37,65; Magnésie, 2,52; Fer oxidé,5,25. (g. del.)

LOBULA.IRE. Lobularia. polyp.

Genre de l'ordre des Alcyonées , dans la division des Polypiers sarcoïdes , formé aux dépens des Alcyons de Linné , ainsi caractérise : corps commun , charnu , élevé sur sa base , ra-

«76 LOB

ranent soutenu par une lige courte, simple, ou munie de lobes variés; surface garnie de Polypes épars ; Polypes entièrement rétractiles , ayant huit cannelures au dehors et huit tentacules péclinés. Il a été établi par Saviguy, et ne renferme encore que trois espèces qui vivent dans les mers de l'Europe, les Animaux habitant ces masses polypeuses , ont été observés et décrits par plusieurs auteurs; Lamouroux a donné une description détaillée , avec figures , de celui du Lobularia digitata (Alcyonium lobatum), dans son Histoire des Polypiers , p. 314 et suivantes. Les figures données par Ellis , Spix et Lamouroux, ne se ressemblent guère; nous pensons néanmoins que ces différences ne peuvent être rapportées à aucune inexactitude , mais dépendent de l'état du Polype , à l'instant où il a été dessiné. Ainsi, par exemple , la figure de l'Animal du Lobularia digitata, donnée par le dessinateur Spix , et copiée par Lamouroux, pl. 14, fig. 1 , a, nous semble représenter le Polype comme nous l'avons observé lorsqu'il est déjà mort depuis quelque temps , mais nullement desséché et encore saillant, hors de sa cellule; ses tentacules sont contractés , on ne peut plus les dérouler sans dilacération. Les Polypes des Lobulaires sont placés à la surface du corps charnu qui les soutient ; ils sont très-nombreux , entassés sans ordre , et

logés dans des cellules à ouverture crénelée et profondes de quelques lignes; elles communiquent, par leur fond, avec des canaux longitudinaux plus étroits , qui parcourent toute la longueur du Polypier. Le corps du Polype est renfermé dans un sac membraneux, fortifié, à l'extérieur, par huit bandelettes filiformes , longitudinales , fixées, d'une part, au bord de la cellule , et de l'autre à la base des tentacules. Par sa contraction , le sac peut faire saillir au dehors le corps du Polype dont l'extrémité antérieure est munie de huit tentacules couverts, sur une de leurs faces, de papilles mobiles. Au milieu des ten-

LOB

tacules se trouve la bouche, petite ouverture arrondie , entourée d'appendices très- irritables. Toute cette partie supérieure de l'Animal est ^ fixée à un corps cylindrique beau- 1" coup plus petit , se terminant en ar- t" ricre par huit filamens tortueux, in- *' teslinifoi mes , dont l'extrémité paraît '}' libre et flottante dans le fluide qui remplit le sac. Les mouveinens de ces Polypes sont lents ; les œufs sont 5 gros , sphériques et rougeâtres lors de w leur maturité. Il nous semble que r c'est à tort que Lamarck pense que le ^ corps mollasse qui supporte les l'oly- j; pes des Lobulaires , ne doit pas être (, considéré comme un Polypier. Son tissu a le plus grand rapport avec ^ l'écorce des Gorgones. Comme cette écorce , il est formé d'une substance gélatineuse empâtant une infinité dç * petits grains calcaires; si l'on place dans l'Acide nitrique affaibli un fragment de Lobulaire digité, frais 5 ou desséché , il se produit une effervescence assez vive, et bientôt la por- [, tion gélatineuse , plus cou-àdérable i que la portion calcaire, reste à nu. \ Nous n'avons pu y découvrir de tra-

/ ces de fibres , et moins encore de ces filamens roides que l'on voit dans l'intérieur des Alcyons desséchés.

L'ouverture des cellules est crénelée ou étoilée comme celle de plusieurs Gorgones; mais au lieu d'un axe corné, la partie centrale des Lobulaires est composée de canaux irréguliers , longitudinaux , dont les pavois sont formées d'une substance semblable à celle de l'extérieur du Polypier; elle contient néanmoins une plus petite quantité de granulations calcaires; dans l'état vivant , ces tubes sont remplis d'un liquide transparent. Ajoutons que les Polypes des Lobu- 1 laires ont les plus grands rapports de forme et d'organisation avec ceux des Gorgones; el que la masse qui les soutient est, comme l'écorce et l'axe de ces dernières , le résultat évident du travail des Polypes.

Le genre Lobulaire comprend les" Lobularia digitala , co/oi-
dea et palmata. (E.D..L.)

LOC

^ LOBULAIUE. Lolularia. bot.

iphan. Ce genre, établi par Uesvaux

(Journ. de Botanique , 5 , p. 172) aux «dépens des Alyssum, n'est considéré cque comme une section (Je ce dernier tgenre par De Candolle(iS/i7e/«. Veget.

JVat. 3 , p. 5i8). Cette section a pour t type Y.dlyssum maiiti-
mum, Lamarck, cou Clypeola marilima , L. (G..N.)

LOBULE Lobulus. bot. khan.

Idans les embryons à deux cotylédons inégaux , le professeur Mirbel appelle le Lobule le cotylédon le plus petit et <qui semble à l'état rudimentaire.

Dp'embryon de la Macre (Trapa na~ Itans, L.) offre l'exemple le plus marquant dans l'inégalité des deux cotylédons. (a. h.)

* LOCHE. MOLL. Nom vulgaire des Limaces et des Arions. V. ces mots.

LOCHEKIA. bot. thak. (Necker.) ;Syn. de Sigesbeckie. V. ce mot. (b.)

LOCHES, pois. Nom générique français adopté par Cuvier pour le genre Cobule. V. ce mot. On appelle vulgairement Loche de mer, l'Aphv.

.V. Gobie. (B.)

LOCH.NBRIA. bot. piian. Ce nom : générique a été imposé par Scopoli ;au Peim-Kara de Rliède {Huit.

Malab. 4, lab. a4) qui est maintenant une espèce du genre Elœocar-

j))US. (O..N.)

LOCOMOTION, zool. Ce mot ' présente en physiologie un sens assez ■ étendu; il signifie non-seulement la faculté que possèdent les Animaux de : se transporter d'un lieu dans un autre , mais encore la fonction en vertu

- de laquelle ils meuvent, sous la dépendance de leur volonté , ou leur

- corps en totalité , ou simplement quel-

• ques-unes de leurs parties. La Locomotion est en quelque sorte le complément de la sensibilité dans le règne animal, puisque c'est par le moyen de leur faculté locomotrice

que les Animaux peuvent exécuter les différents mouvemens qui doivent leur concourir à leur conservation. La Locomotion s'exécute au moyen d'or-

LOC

ganes dont l'ensemble constitue l'appareil locomoteur. Cet appareil se compose des organes actifs et des organes passifs du mouvement. Les premiers sont l'encéphale où réside la volonté ou la volonté d'exécuter tel ou tel mouvement, les nerfs qui la transmettent aux muscles qui l'exécutent sous leur influence. Les os ou parties dures qui prêtent un point d'appui aux muscles et favorisent ainsi les mouvemens en sont les organes passifs.

La Locomotion considérée dans son sens le plus étendu, c'est-à-dire comme signifiant la faculté qu'ont les Animaux de pouvoir à volonté se transporter d'un lieu dans un autre, ne s'exécute pas de la même manière dans la série des Animaux. Ainsi l'Homme, les Quadrupèdes, certains Reptiles et Insectes marchent; les Oiseaux, les Chauve-Souris, et un grand nombre d'Insectes volent; les Poissons nagent; les Ophidiens, les Vers rampent, etc., etc. Ces différents modes de Locomotion seront traités aux mots Marche, Progression, Natation, Reptation et Vol.

LOCULAR. bot. ph an. Espèce du genre Froment. V. ce mot.
(b.)

LOCUSTA. INS. Nom scientifique des Sauterelles, f. ce mot. Les anciens donnaient aussi ce nom à quelques Crustacés du genre Palæmon.

P~. ce mot. (g.)

LOCUSTA . eot. l'HAN. Nom scientifique de la Valériane devenue type du genre Fédia. V. ce mot. (b.)

LOCUSTAIP.ES. Locustariœ. ins.

Famille de l'ordre des Orthoptères sauteurs , établie par Latreille et ayant pour caractères : antennes sétacées ; tarsi à quatre articles ,- élytres et ailes en toit; pattes postérieures propres au saut. Cette famille renferme la division des Gryllus Tettigonia de Linné. La division des Gryllus Locusta appartient au genre Criquet proprement dit. Latreille y dans ses ouvrages antérieurs , ne rangeait dans cette famille que le

genre des Sauterelles (Locusta); il l'a subdivisé depuis (Fam. Nat. du Règne Anim.), et à présent la famille des Locustaires renferme cinq genres rangés dans les trois divisions suivantes :

a. Des coléoptères et des ailes ordinaires dans les deux sexes.

Les genres : Sauterelle, Cono-

CÉPHALE , Pennicorne.

e. Mâles ailés , femelles aptères ou n'ayant que des élytres très-courtes.

Le genre : Anisoptère.

c. Les deux sexes presque aptères, n'offrant au plus que des élytres très-courtes , en forme d'écailles arrondies et voûtées.

Le genre : Ehipigère. Pr. tous ces mots. (g.)

LOCUSTE. Locusta. bot. piian.

Quelques agroslographes appellent ainsi l'assemblage de fleurs réunies dans une lépicène et que l'on désigne plus généralement sous le nom d'Epillet. V. Efillet. (a.b.)

LOCUSTE LLE. ois. Espèce du genre Sylvie. V. ce mot. (b.)

* LODALITHE. min. (Sévergin , Mém. de l'Acad. imp. des Se. de Pétersbourg, T. i, p. 558.) Ce n'est , suivant Léonbard, qu'une variété de Feldspath. (g. del.)

LODDE. pois. Espèce du genre Salmone. V. ce mot. (b.)

LODDIGÉSIE. Loddigesia. bot.

piian. Genre de la famille des Légumineuses et de la Monadelphie Décamirie, L., établi par Sims{Botanical Magazine, t. 960), et adopté par De Caudolle {Prodromits Sjst. T[^]eg.

2, p. i56)qui l'a ainsi caractérisé :

calice un peu renflé, à cinq dents aiguës; corolle dont l'éten-
daid est de plusieurs fois moins long que les ailes et la carène :
dix élamines toutes réunies par leurs filets; ovaire oblong, com-
primé, à deux ou quatre ovules.

Ce genre fait partie des Génistées ou de la première section de
la tribu des Lotées. Il est placé non loin des Croalaria, avec lequel
il offre de tels

rapports que la plupart des jardiniers ont donné ce nom à la
seule espèce qui le constitue , et qui a été nommée par Sims Lod-
digesia oxalidifolia.

C'est un petit Arbrisseau liès-rameux et glabre , indigène du cap de Bonne- Espérance. Ses feuilles sout pétiolées, accompagnées de stipules subulées , et composées de trois folioles obeor-dées mucronées. Ses fleurs au nombre de trois à huit forment une petite ombelle , et sont de couleur blanche, avec une teinte purpurine au sommet de la carène. (c.N.)

LO DICU L ARIA. bot. piian. Palisol deBeauvois, dans son Agrostographie, a- établi sous ce nom un genre particulier pour la Rotthoella fasciculata de Desfontaines , qui ne diffère des: autres espèces du genre Rottboella que par la longueur et la forme des paléoles de la glumelle. Ce caractère ne paraît pas suffisant pour l'établissement d'un genre. ^ .Rottboella. (a. r.)

LODICULE. Lodicula. bot. phan.

Palisol de lieauvois appelle ainsi les deux petites écailles les plus intérieures des fleurs dans les Graminées, et que le professeur Richard avait nommées antérieurement Glumelle.

V. ce mot. (a. r

LODOICÉE. Lodoicea. bot. phan.

Il n'est personne qui ne connaisse ces énormes fruits , souvent d'une forme si bizarre , et que l'on nomme vulgairement Cocos des Maldives. Pendant long- temps on n'a su à quel Arbre ils appartenaienent , ni même quelle était au juste leur patrie, puisqu'on les croyait généralement originaires des îles Maldives ; mais Commerson et surtout Labillardière nous ont , les premiers, donné des renseignemens certains à cet égard, et nous ont appris que

l'Arbre qui les produit croît naturellement dans les îles Sechelles, sur le rivage de la mer, et que leurs fruits, souvent transportés à d'énormes distances par les flots , viennent aborder sur des rivages lointains C'est ainsi que l'on a cru que les Maldives étaient leur lieu natal; on en a vu

nmême arriver sur des points encore ppiliis éloignés de leur véritable patrie. tCommerçon , dans ses manuscrits , en savait formé un genre sous le nom de ILodoicea ; ce genre a été adopté par ILabiillardière (Aun. Mus. lJar. 9, jp'. i40) qui en a fait connaître le carractère avec détail.

Le Cocotier des Sechelles , Lodoicea Sechellarum, Labill., loc. cit., it. i5, est un Palmier dont le stipe ddroit et cylindrique peut acquérir une lihauteur de quarante pieds etaa-delà.

III eit marqué d'empreintes formées j.par les feuilles qui s'en détacheut ichaque année. Celles-ci , poitécs sur dde longs pétioles , forment au somiinet du stipe une vaste couronne coinfposée ordinairement de quinze à vingt jçeuilles. Les pétioles sont longs de sept àà huit pieds , élargis et membraneux àà leur lia se ; les feuilles sont ovales, ssubcordiformes à leur base , offrant à Heur contour un grand nombre de divisions profondes et plissées en forme cd'éventail. Les fleurs sont unisexuées tet séparées sur deux individus dis— ttincts. Le régime de fleurs mâles se tcoinpose d'un petit nombre de ébattons cylindriques longs d'environ edeux pieds et demi sur un diamètre de ttrois à quatre pouces. Ils se compofsent de larges écailles étroitement îm- Ibriquées, se divisant en dessus vers lie quart de leur largeur en deux laines verticales qui enveloppent pres- (qu'en totalité un faisceau composé 1 d'environ une trentaine de lleuis imlbriquées. Ces (leurs sont disposéessur (deux rangées .et séparées les unes des : autres par

une petite écaille. Chaque Iflcur se compose d'un calice de sixsépales étroits allongés, creusés en forme de gouttière, et de vingt-quatre à trente-six élamines attachées sur uu 1 réceptacle commun. Le régime de I fleurs femelles est un peu rameux , et îpporte un petit nombre de ûeurs sessilles. Leur calice est composé de cinq ià sept sépales très-larges et étioileiment a pp lia uds sur le pistil. L'ovaire (presque sphérique est surmonté de ttrois ou quatre stigmates allongés et ""aigus. Le fruit est une noix d'un pied

st demi de long, contenant, selon Labillardière , sous une partie fibreuse , trois ou quatre noyaux qui léussissentrarement tous. Ces noyaux qui sont connus sous le nom 3e Cocos des Maldives, sont très-gi os, noirs, osseux , épais , terminés à leur partie supérieure par deux ou trois lobes saillans , séparés les uns des autres par des enfoncemens profonds. C'est entre ces lobes qu'on trouve une ouverture oblongue , garnie de fibres sur ses bords , et donnant issue à l'embryon au moment de la germination.

L'amande renfermée dans cette noix est dure. L'embryon est placé dans une petite cavité située à la partie supérieure de l'amande ou endosperme.

Ce beau Palmier a été transporté par Sonnerai à l'Ile-de-France. Son amande est un aliment assez médiocre , et ses feuilles, ti ès-consistantes , sont utilement employées pour couvrir le* maisons. (a. R.)

LOEFLINGIE. Lœflingia. bot. ru an. Ce genre établi par Linné , et placé parce naturaliste dans sa Triandrie Monogynie , fait maintenant partie de la nouvelle famille des Paronvchiées d'Auguste Saint-Hilaire. <jn le rangeait autrefois parmi les Caryophy

liées, famille aux dépens de laquelle une partie de celle des Paronychiées a été constituée. Dans l'exposition des genres qui composent celle dernière, le professeur A. -L. de Jussieu (Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle, T. 11, p. 586) impose les caractères suivans au *Loeflingia* :

calice divisé très-profondément en cinq divisions bidentées à la base; corolle à cinq pétales très-petits et connivens; trois élamines ; style unique surmonté d'un style (selon Linné) ou plutôt de trois (d'après Auguste Saint-Hilaire); capsule uniloculaire à trois valves et polysperme. Ce genre fait partie de la première section des Paronychiées , section à laquelle Auguste Saint-Hilaire a donné le nom de Scléranthées; mais, ainsi que le Minuartia, il diffère des autres genres voisins par l'existence de sa corolle

480 LOK

et ses capsules polyspermes. Auguste Saint-Hilaire eutrevait donc la juxtaposition de ces deux genres , un petit groupe dans la section des Scléranthées et qui rapprocherait singulièrement les familles des Paronychiées et des Caryophyllées , puisque les deux genres que nous venons de citer ne se distinguent de ces dernières que par leurs étamines et leurs corolles périgynes. On ne connaît que deux ou trois espèces de *Loeflingies*. Celle qui doit être considérée comme type, a été nommée *Loeflingia hirsutissima* par Linné (Stet. Hulm. 1758, T. i, p. 1) qui l'a dédiée au célèbre voyageur Lœfling, auquel on en doit la première description. Cette Plante est herbacée , et pousse du collet de sa racine, des liges grêles, pubescentes, visqueuses, très-rameuses, longues de un à deux décimètres , couchées et étalées sur la terre. Les feuilles sont petites . linéaires , subulées , opposées et ramassées ou fort rapprochées les unes des autres au

sommet des rameaux et de leurs divisions. Les fleurs sont petites, axillaires, sessiles et solitaires. La *Loeflingia kisanica* croît naturellement, comme son nom spécifique l'indique, partout en Espagne et en Portugal. Nous l'avons reçue d'un botaniste qui l'a recueillie en France, dans le département des Pyrénées-Orientales. Cavanilles (Icônes, t. 1, p. 38, t. 148, f. 2) a donné la description et la figure d'une seconde espèce sous le nom de *Loeflingia pentandra* qui croît aussi en Espagne sur les bords de la Méditerranée, et qui diffère principalement de la précédente par ses étamines au nombre de cinq. Examinée de nouveau avec plus de soin, elle doit sans doute constituer un genre distinct des vraies *Loeflingia*. (G.N.)

LOESELIE. *Loeselia*. hort. pitan.

Ce genre, établi par Linné, avait été placé par le naturaliste, ainsi que par la plupart des auteurs qui ont suivi son système, dans la Didymie Angiospermie mais une connaissance

plus positive de ses organes sexuels l'a fait reporter dans la Pentandrie [i.e. Monogynie par Rœmer et Schultes. La place qu'il doit occuper dans les familles naturelles n'était pas non plus bien exactement déterminée. Jussieu l'avait rangé, d'après le caractère (donné par Linné, à la fin des Convolvulacées. Gaertner en ayant décrit le fruit avec son exactitude accoutumée, l'auteur du *Général Plantarum* reconnu ensuite (Annales du Mus., d'Hist. Nat., t. 5, p. 258) que le genre *Loeselia* devait faire partie des Polémoniacées, et qu'il était extrêmement voisin de *Yhoitzia*, peut-être même identique avec lui. Voici les

caractères essentiels d'après Gaertner, et Lamarck : calice tubuleux à quatre ou cinq dents aiguës, droites et courtes ; co-

rolle à cinq divisions profondes, ohlongues et ciliées ; cinqétami-
nés, dont quatre insérées sur le tube, j et la cinquième, plus
courte , insérée sur le milieu d'une des divisions de la corolle; un
seul style filiforme terminé par un stigmatte en massue ; (capsule
à trois valves s'ouviant parle (sommet , chacune portant une
cloison sur son milieu , et renfermant une ou deux graines dans
chaque loge.

Le *Loeselia liliala* , L. et Lamarck j (Illustr., t. 527), est encore
la seule espèce connue. C'est une Plante herbacée dont la tige est
quadi angulaire , rameuse , garnie de feuilles opposées , ovales,
un peu pointues, dentées en scie et rétrécies à la base. Les fleurs
naissent sur des pédoncules axillaires , et sont accompagnées de
deux sortes de bractées , les unes extérieures , imbriquées en foi
me de cône , opposées , ovales, arrondies, veinées, presque ses-
siles , et bordées de dents sétacées ; les autres intérieures, situées
à la base des calices , membraneuses et ciliées. Cette Plante croît
pi es de la Vera-Cruz en Amérique.

* LOGANÉES. Loganeœ. bot.

ru an. Robert Brown (P/or/r. F/.

Nov.-Holl. l, p. 405i, en parlant du genre *Logania* , fiit voir ses
rapports avec les genres *Geniosivma*, *Anasser*

LQG

de Jussieu, 7'agroœa et *Ustria*, et dit que ces divers genres
doivent probablement former un ordre distinct , intermédiaire
entre les Apocynés et les Rubiacées. Plus tard, dans ses Re-
marques générales, le même botaniste développe davantage cette
idée , et ôlant tout-à-f;iit le *Logania* de la famille des G^nlianées

dont il l'avait d'abord rapproché il le place plus près des Apocynées avec les génies *Genios/oma* de Foister dont *Vslnasser* de Jussieu est à peine distinct, *Ustedia*, *Ucertnera* de Larrarck, *IJagamœa* d'Aublet et peut-être le *J agrœa*, il forme une section distincte ou une petite famille, que l'on peut appeler *.Loganées*. Mais le célèbre botaniste anglais n'indique pas les caractères de cette nouvelle famille, qui selon lui est destinée à combler le vide qui existe entre les Apocynées elles Rubiacées, plusieurs des Plantes qui lui appartiennent étant munies de stipules. (a h.)

LOGANCE. *Logania*. bot. piian.

Ce genre est le même que l'*Lt/osma* d'Andrews, nom qui n'a pas été généralement adopté. Robert Brown qui a établi le genre *Logania*, le

filait d'abord (*Proir*. JSvv.-Holl.) à » fin des *Geutianéis*, à cause de quelque rapport avec les genres *Milrasacme* et *E.racum*. Mais plus tard (.Gêner, liemarks) il le rapprocha des *. Apocwiées* où avec quelques autres ! genres il forme une section ou une petite famille qu'il nomma *Loganées*.

K. ce mot. Ce genre a été ainsi caractérisé : calice à cinq divisions profondes ; corolle monopétale subcampanulée, à gorge velue et limbe quin- (quéparti ; cinq étamines plus courtes que le limbe; ovaire surmonté d'un -SI₃ le persistant, terminé par un stigmate ovoïde capitulé; capsule s'ouvrant en deux parties et laissant deux trophospermes attachés sur le milieu de chaque partie, et finissant par devenir libres; graines attachées par le milieu de leur face inférieure. Brown décrit onze espèces de ce genre, toutes originaires de la Nouvelle-

LOG

Hollande. Ce sont de petits Arbustes ou des Plantes beibacées , portant des feuilles très entières , souvent munies de stipules qui se soudent et forment une gaine interpétiolnaire Les Heurs sont blanches, terminales ou axillaires , tantôt solitaires , tantôt en grappes ou en corymbes. A ce genre Robert Brown rapporte l'Exacurn vaginale de Labillardière , sous le nom tieLogania talifolia, et X'i.uos- 11 ta albiflora d'Andieus, sous celui de Logania Jloribunda. (a.R.)

LOGE. bot. niA.v. On appelle ainsi la cavité simple ou multiple que présente un ovaire ou un pé:icarpe, une anthère , etc., lorsqu'on les coupe transversalement : c'est dans ce sens qu'on dit ovaire à une, deux, quatre, cinq Loges, etc. (a. h.)

* LOGFIA. bot. i'HAN. Genre de la famille des Syuanthérées , proposé par Cassini (Bullet. de la Soc. Phi-?

loin., septembre 1819) qui lui a imposé les caractères suivants : involucre formé de cinq écailles sur un seul rang, égales, appliquées, munies d'une large bordure membraneuse, gibbeuses et ossifiées dans leur partie inférieure ; quelques écailles rudimentaires sont situées à l'extérieur; réceptacle plane, muni de cinq paillettes situées entre les deux rangées de fleurons extérieurs; calalhide ovoïde pyramidale , pentagone , dont les (leurs du ci ntre , au nombre de cinq , sont régulières et hermaphrodites, celles de la ci; conférence au nombre de dix sur deux rangées, tubuleuses et femelles ; ovaires des fleurs centrales oblongs , droi's et surmontés d'une aigrette composée de poils caducs et à peine plumeux ; ovaires des fleurs de la cii conférence oblongs, arqués en dedans et dépourvus d'aigrette. Ce genre est un démembrement

du Filago de Linné, et ne se compose que de deux espèces assez communes en France , et particulièrement aux environs de Paris. Ce sont les /'. rnontana et T. gallica.

Cette dernière espèce est la seule à laquelle se rapportent précisément

4Sa LOI

les caractères génériques exposés plus haut, car la première se rapproche beaucoup, de l'aveu de Cassiui lui-même , du genre Oglifa , aulre anagramme du mot Filago'-. L'auteur de ces subdivisions génériques, paraît être revenu à des idées plus en harmonie avec celles qui dominent chez la plupart des classificateurs; il ne considère plus que comme des sous- genres du Filago, ces groupes que d'abord il avait établis comme très-distincts.

LOGHANIA. bot. ph.vn. (Scopoli et Necker.)Svn. du Ruyschia de Jacquin. V. ce mot. t (g..n.)

* LOGO LIS. hot. phan. (Gaertner.) V. Gymnanura.

LOIR. Myoxus. mam. Ce genre de Rougeurs , qui appartient à la grande famille des Rats, a néanmoins quelques rapports avec celle des Ecureuils , soit par ses caractères zoologiques , soit surtout par ses habitudes; il fait même partie, dans quelques ouvrages systématiques, du genre Sciurus. Il a quatre molaires de chaque côté, et, comme presque tous les autres Rongeurs, deux incisives à chaque mâchoire. Ces incisives sont longues , folles , plates à leur partie antérieure , et comprimées et anguleuses à la postérieure; les supérieures sont coupées carrément :

les inférieures sont pointues. Les molaires se divisent dès leur base en racines , et leur couronne plate offre des lignes trans-

verses saillantes et creuses. A la mâchoire supérieure, la première molaire est formée de trois tubercules , dont deux sont externes , et l'un interne. Les autres sont plus grandes et de forme carrée.

Quant aux molaires inférieures , elles diffèrent peu des supérieures. Les membres sont à peu près égaux. Le postérieur est terminé par cinq doigts armés d'ongles aigus et comprimés ; le pouce , assez court , est susceptible de s'écarter des autres doigts, et est même un peu opposable dans quelques circonstances. L'antérieur n'est au contraire que tétradactyle , le

LOI

pouce ne consistant plus que dans un tubercule allongé , sur lequel cependant on aperçoit encore un rudiment d'ongle ; les quatre autres doigts sont d'une longueur moyenne. La paume est nue et a cinq tubercules, et la plante , pareillement nue , en a six : toutes ces parties et le dessous des doigts sont également recouverts d'une peau très-douce. La queue est bien différente de celle des Rais ; elle est toujours couverte de poils abondants , et quelquefois même presque aussi touffue que celle d'un Ecureuil.

La langue est douce et assez longue ; l'oreille est membraneuse, la pupille ronde et même très- contractile; et il y a entre les deux narines un petit muflle. Les moustaches sont longues, les lèvres épaisses et velues; la supérieure est fendue, et l'inférieure forme une sorte de gaine d'où sortent les incisives , à cause d'une disposition particulière des bords qui se réunissent l'un à l'autre en arrière de ces dents. Il y a dans ce genre, ou du moins dans les espèces les plus connues, huit mamelles, dont quatre sont pectorales, et quatre ventrales. Mais un des faits les plus curieux de l'organisation de ce genre, est l'absence du cœcum , qui existe

chez tous les autres Rongeurs soit de la famille des Rats , soit de toute autre famille , et qui a même généralement dans cet ordre un volume considérable.

Cette anomalie est d'ailleurs d'autant plus remarquable que ces Animaux sont très - frugivores. Leur nourriture consiste en fruits de toute espèce , qu'ils vont chercher sur les Arbres où la forme de leurs ongles leur permet de grimper avec beaucoup de facilité. Cependant , quoique leur régime soit essentiellement végétal , quand ils viennent à.

rencontrer des nids, ils font souvent leur proie des œufs et même des jeunes Oiseaux qu'ils y trouvent. Ce sont pour la plupart de petits Animaux nocturnes , dont le pelage est généralement peint de couleurs , sinon brillantes, du moins agréables et harmonieusement disposées. Ils vivent

LOI

sur les Arbres , à la manière des Ecureuils , et peuvent comme eux , mais toutefois avec moins de facilité , sauter de branches en branches. Ils sont ainsi presque toujours à l'abri de l'attaque des Animaux carnassiers ; cependant lorsqu'ils ne peuvent l'éviter, ils se défendent avec courage, et font à leurs ennemis de cruelles morsures ; on prétend même que les plus grosses espèces du genre ne redoutent pas la Belette. C'est à la fin du printemps que l'accouplement a lieu; et les petits, ordinairement au nombre de cinq environ , naissent en été. A l'approche de l'hiver, les Loïs font dans leur retraite une petite provision de noisettes, de châtaignes et d'autres fruits , et lorsque la température n'est plus que de 7° environ , ils tombent , comme la Marmotte , dans un engourdissement qui dure autant que les froids. Ils se réveillent ce-

pendant de temps à autre, soit lorsque le froid devient vif, soit lorsqu'il y a long- temps qu'ils n'ont pris de nourriture. C'est pendant ces intervalles de veille , aussi après leur engourdissement , qu'ils consomment leurs provisions. De nombreuses et intéressantes observations ont été faites dans ces derniers temps sur la léthargie hibernale des Loirs par Mangili (Ann. du Mus. T. x), par de Saissy., par Edwards (Influence des agents physiques sur la vie), et par d'autres physiologistes ; nous en ferons connaître quelques-unes. La respiration est suspendue et renouvelée; à des intervalles réguliers; mais ces intervalles varient suivant la température; à 5° un individu observé par Mangili respirait 22 ou 24 fois de suite en une minute , après 4 minutes de repos. En outre la température de l'Animal baisse beaucoup; ainsi un Léroty, qui en été avait 36°, S, n'avait plus au mois de décembre que 21°, suivant les observations de Saissy. Cet abaissement de la température pendant la saison froide a été très- bien expliquée par le savant physiologiste Edwards; il a montré que les Animaux hibernants (Pr. ce mot)

LOI 48

produisent habituellement moins de chaleur que les autres Animaux à sang chaud ; et qu'ils sont , sous ce rapport, d'une manière permanente dans les mêmes conditions que tous les jeunes Animaux.

On n'a encore bien distingué dans ce genre que quatre espèces, dont une seule est étrangère.

Le Loin, Bu (T., Vliir, 24; Myoxus Glis , Gm., qui a donné son nom au genre , est l'espèce de lapin grande ; il a près de six pouces du bout du museau à l'origine de la queue. Il est généralement

gris tend ré en dessus, avec ie dessous et la partie interne des membres d'un blanc un peu roussâti e; la queue est entièrement d'un cendré brunâtre.

Le tour de l'œil est noirâtre, et le dessus de la tête est d'un gris plus pâle que le reste du corps; enfin les pâtes sont blanches avec une tache brune sur le métacarpe et sur le métatarse. Les oreilles sont courtes, à peu près detni-circulaii es , et la queue, à peu près de la longueur du corps, est touffue et distique. Cette espèce habite 1rs forêts de l'Europe méridionale ; elle se fait un lit de mousse, soit dans le tronc d'un Arbre creux, soit dans une fente de rocher, mais toujours dans un lieu sec. La chair des Loirs a le goût de celle du Cochon d'Inde; et elle était estimée chez les Romains , au point qu'ils les élevaient et les engraisaient pour leurs tables , comme nous l'ai o11s des Lapins. On est même maintenant encore en Italie dans l'usage de les manger. On se les procure en faisant dans un lieu sec, une fosse que l'on tapisse de mousse, et où l'on met des faines : les Loirs s'y rendent en grand nombre , et on les trouve engourdis vers la fin de l'automne; c'est précisément le temps île les manger.

Le Lérot, Buff., vur, 25; Myoxvs Nileta, Gm., a le dessus delà tête, du corps et du premier tiers de la queue, d'un roux vineux, avec les lianes gris et le dessous de la tête, du corps et de la queue , ainsi que la lèvre supérieure , blancs. L'œil se

484 LOI

trouve placé clans une grande tache noire qui se prolonge jusqu'au-dessous de l'oreille. Les membres sont blancs, à l'exception de la partie supérieure de celui de derrière, qui est noire. La queue , toute blanche en dessous, noire en dessus dans ses deux

derniers tiers , et toute blanche à son extrémité , est plus longue que le corps, et terminée par des poils longs et assez abondans. Enfin le Léroto a les oreilles plus ovales que le Loir, et sa longueur est moindre d'un cinquième environ. Cette espèce habite tous les climats tempérés de l'Europe, et même la Pologne; elle est plus nom.bieuse et plus répandue que celle du Loir, et se trouve souvent dans les jardins, el quelquelbis même dans les maisons. Il se niche dans les trous des murailles, el aussi dans les Arbres creux. Il est souvent très-nuisible par l'habitude qu'il a de courir sur les espaliers, el d'entamer les meilleurs fruits au moment ou ils commencent à mûrir; il détruit ou gâte particulièrement beaucoup de pêches. Il est d'ailleurs entièrement inutile à l'homme, et ne se mange pas comme le Loir, sa chair étant désagréable et de mauvaise odeur. Le Léroto porte en beaucoup de lieux le nom de Loir ou de Loiroto.

' Le Muscardin, *Myoxus Muscardinus*, Gm., *Mus Avellanarius*, Lin., est entièrement d'un beau fauve roussâtre , avec le dessous de la tête , la gorge et la poitrine blancs, et le dessous du corps blanc roussâtre.

Cette jolie espèce, delà taille du Mulo, a les oreilles courtes et la queue un peu plus longue quele corps, et terminée par des poils assez longs et abondans ; elle est répandue dans presque toute l'Europe méridionale ou tempérée , ou elle se trouve ordinairement dans les bois , quelquefois aussi dans les jardins. Elle se retire l'hiver dans les vieux troncs d'Arbres, se faisant d'ailleurs un nid à la manière de l'Ecureuil. Ce nid, placé ordinairement assez bas , est fait d'herbes entrelacées; il a environ six pouces de diamètre , et n'est ouvert que

par le haut. L'espèce du Muscardin , est moins nombreuse que celle du | Lérot ; on prétend qu'elle renferme deux variétés, dont l'une, la seule \ qui se trouve en France, n'a aucune | odeur, el l'autre a au contraire l'o- \ deur du musc; quoi qu'il en soit la] chair de tous les individus est désa- • gréable.

Le Lérot du Sénégal , Myoxus \ Coupcii , Fr. Cuv , Mamm. Lith.; le (Loin mur in , Myoxus murinus , Desm , Mamm Suppl. Ce Loir, un j peu plus gra_ que le Muscardin , (et qui a la queue plate, mais garnie de poils longs et abondans , a le des- (sus du corps et la queue d'un cendré un peu roussâtre , avec le dessous blanc grisâtre. Les pales sont blanchâtres, et les oreilles un peu ovales.

Fr. Cuvier a donné à cette espèce le nom de Myoxus Coupeii , nom du ' voyageur qui a rapporté du Sénégal 1 l'individu type de sa description; mais nous pensons qu'elle ne diffère j pas du Myoxus murinus , espèce publiée à peu près dans le même temps ' par Desmarest d'après d'autres individus rapportés du cap de Bonne-Es- ' pérance par Delalande. Le Myoxus ' murinus différerait, il est vrai, par sa couleur cendrée noirâtre, et qui ne tire nullement sur le roussâtre , com- ! me celle du M. Coupeii. Mais on f sait que les Animaux noirs ou noirâtres prennent à la longue, par lac- ' liou de la lumière, une teinte de ' brun ou de roux ; et il est bien pos- f sible que la couleur du M. Coupeii ' ne soit que l'effet de ce changement; ' d'autant plus qu'il est d'ailleurs en ' mauvais état et que la pointe seule e de ses poils est roussâtre, tout ce 1 qui n'est pas exposé à l'action de la f lumière étant au contraire exactement de même couleur que chez le t M. murinus. Les habitudes de cette d espèce sont peu connues; Fr. Cuvier nous apprend

seulement qu'elle c[^]t , comme les espèces européennes , 1 sou-
mise à un sommeil léthargique.

Nous savons cependant et nous pou- t vons ajouter qu'elle se
trouve assez 4 fréquemment au Cap dans les mai- t|

LOK

son*. Ou trouve aussi au Sénégal de petits Loirs, dont lacou-
leur générale et les proportions sont celles du M. murinus , mais
dont la taille est moindre; le ventre est aussi plus blanc. Nous en
avons vu plusieurs individus entièrement semblables , et nous
pensons qu'il pourrait bien constituer une espèce distincte.

Le Myvixus D/iusdcSchrebnr, dont le pelagecsten dessus d'un
grisfauve, et qui habiterait la Russie et la Géorgie , n'est, suivant
G. Cuvier, qu'une variété du Loir; et, suivant Fr. Cuvier, qu'un
Lérot dont la queue n'a pas pris tout son accroissement.

Quant au Dégu de Molina , Sciurus Degus , Gin., petit Animal
du Chili, dont le pelage est d'un blond obscur avec une ligne noi-
râtre sur l'épaule, qui vit en société dans des terriers , et qui n'hi-
berne pas, cette espèce eft encore très-douteuse. On a aussi rap-
porté à ce genre la Gerhille du Tamarisc (P. Gerboise), les Ecu-
reuils Guerliuguets , et le Rat à queue dorée de Bufibn. Cette es-
pèce , qu'on avait nommée aussi Lérot à queue dorée, et Loir épi-
neux , a été reportée depuis dans le genre Echimys de Geoffroy
Saint-Hilaire; P. KciUMYS huppe. On a aussi quelquefois désigné
le Gerbo , sous le nom de Loir de montagne , et le Pola touche
suus celui de Loir volant , P. Gerboise et Polatouche. Enfin , sui-
vant Desmarest, il serait au contraire possible qu'on dût rappor-
ter à ce genre le Musculua frugivortu , et le Musculus diclirurus
de Rafinesque {P. Rat), ainsi que le Mus Jluridanus d'Ord, espèce

que Harlan (Fauna AmWicana , p. 141) place parmi les Campagnols, (is. G. ST.-H.)

LOIROT. mam. Le Lérot porte le nom de Loïrol dans quelques parties de la France. P. Loin. (is. O. ST.-H.)

LOISELEURIA. bot. phan. (Desvaux.) P. Azalée.

LOKAI NUI. bot. phan. Nom générique proposé par Adanson pour le Kariw-niota de Rhéede. Ce genre a reçu plusieurs autres noms, entre

LOM 485

autres celui de JViuta qui lui a été imposé par Lamarck et qui a été adopté par les auteurs modernes. P .

Niota. (O..N.)

LOLIGO. moll. P. Caliv.ab..

* LOLIGOIDÉES. Loligoidcae.

moi:... Nom proposé par Lesueur pour désigner les Calmars dont il fait une famille. P. ce mot, T. m, p. 63. (b.)

* LoLiGoPSIS. moll. P. Cal-

MARET

LOLIUM. bot. phan. P. Ivraie.

* LO LOT 1ER. bot. phan.

(Proyart.) Syn. de Papayer, Carica Papaya , L. , sur les côtes d'Afrique , au nord du Zaïre , où l'on nomme son fruit Lolo et non Papaye. (b.)

LOMAN. MOLL. Nom donné par Adanson (Voy. au Sénégal, pl. 6, tig.

7) au Conus textilis de Linné et de Lamarck. Il est connu sous le nom vulgaire de Drap d'or. C'est une espèce qui varie beaucoup, avec laquelle on en a fait plusieurs. (D..H.)

LOMANDRA. bot. phan. Genre de la famille des Juncées et de l'Hexandrie Trigynie , L., établi par Labillardière (Nouv. -Holl., 1 , p. g3) et auquel R. Brown a donné le nom de Xerotes, en lui assignant les caractères suivans : les (leurs sontdioïques ; leur calice coloré est à six divisions profondes ; dans les fleurs mâles , les trois divisions intérieures , et quelquefois les trois internes, sont soudées ensemble par leur base ; les six étamines sont attachées au périanthe , et offrent des anthères peltées ; on trouve un pistil rudimentaire au centre de la fleur. Dans les fleurs femelles , les six sépales sont distincts et persistans ; les étamines sont privées d'anthères; l'ovaire est à trois loges monospermes, surmonté de trois styles un peu soudés par leur partie inférieure. Le fruit est une capsule cartilagineuse, à trois loges, s'ouvrant en trois valves , septifères sur le milieu de leur face interne et contenant chacune une graine peltée. Labillardière, dans sa Flore de la Nouvelle-

486 UOMI

Hollande, av;il décrit seulement deux espèces de ce genre. R. Brown , dans son Prodrome , en caractérise vingt-quatre sous le nom deXérotés.

Il réunit à ce genre les *Dracoena obliqua* et *Jiliformis*A?. Thunberg. Toutes ces espèces sont originaires de la Nouvelle-Hollande. Ce sont des Herbes vivaces , roides , sèches , ayant un port tout particulier. Leur racine est fibreuse ; leur tige très-courte ou plus souvent nulle. Leurs feuilles sont étroites , planes , linéaires , quelquefois canaliculées , très-rarement liformes , dilatées à leur base en forme de gaine scarieuse , et quelquefois dentées vers leur partie supérieure. Les fleurs sont disposées en panicule, en grappe, en épi ou en capitule au sommet de la tige. Le tégument propre de la graine est quelquefois lâchement adhérent et simule une sorte d'arille. L'embryon est droit , cylindrique, placé à la base d'un endosperme cartilagineux. Ce genre , par plusieurs de ses caractères, se rapproche de la famille des Palmiers.

Les deux espèces décrites et figurées par Labillardière sont les *Lumandra rigida* , /oc. cit. , 1, p. g3 , t. 120 , et *Loinandra longifolia* , loc. cit., 1, p. 92, t. 119. (a.r.)

LOMARIA. bot. crypt. (Fougères.) Ce genre qui ne nous paraît différer e'n rien de celui que Robert Brown a établi depuis sous le nom de *Stegania*, fut fondé par Willdenow ; il se rapproche surtout des *Blechnum* avec lesquels il fut d'abord confondu, et quelques espèces même qu'on doit peut-être rapporter à ce genre , furent laissées parmi les *Blechnum* par Willdenow : tel est le *Blechnum* boréale ou *Osmunda spica/is* de Linné qui , par ses caractères , l'orne le passage entre les *Lomaria* ou *Stegania* de R. Brown et les vrais *Blechnum*. Ce génie peut être ainsi caractérisé : capsides enlourées d'un anneau élastique, disposées en une série continue le long du bord de la fronde fertile, et finissant par couvrir toute leur surface

inférieure; tégument marginal continu, membraneux et scarieux, souvent divisé en lanières s'ouviant en dedans. Dans toutes les espèces de ce genre les frondes fertiles sont plus grêles, à pinnales étroites et comme contractées; le tégument s'étend ordinairement jusqu'à la nervure moyenne, et finit par être déjeté en dehors,

Sar le développement des capsules, on voit que les *Lomaria* diffèrent des *Blechnum* en ce que le tégument naît du bord même de la fronde dans les premiers, tandis que, dans les seconds, il prend toujours naissance à quelque distance du bord de la fronde qui n'est pas contractée comme dans les *Lomaria*. Quant aux genres *Lomaria* et *Stegania*, nous ne voyons pas de caractères propres à les distinguer, la seule différence qu'on pourrait observer entre eux, consistant en ce que dans les *Stegania* le tégument est ordinairement parfaitement continu et entier, tandis que dans les vrais *Lomaria* il est divisé en lanières nombreuses et scarieuses. Si on admettait cette distinction, les *Stegania*, parmi lesquelles on devrait probablement ranger le *Blechnum* boréale, habiteraient presque tous les climats froids et tempérés des deux hémisphères, tandis que les vrais *Lomaria* seraient beaucoup plus fréquents dans les régions équatoriales, quelques espèces seulement s'étendant jusque dans les régions tempérées de l'hémisphère austral; en réunissant ces deux genres dont les caractères distinctifs sont si légers, on voit que les *Lomaria* se rencontrent sur presque tous les points du globe, mais ils sont plus fréquents dans la zone intertropicale et dans l'hémisphère austral que dans nos régions boréales où le *Lomaria borealis* (*Blechnum* boréale, Willd.) est le seul représentant de ce genre. Toutes les espèces de ce genre ont la fronde une seule fois pinnatifide, à divisions longues, étroites et entières; leurs nervures sont pinnées, et les

nervules ne sont ordinairement qu'une ou deux fois bifurquées; quelques espèces seulement présentent une tige

LO.M

LOM

droite et assez élevée pour qu'on puisse les ranger au uomhrc des Fougères arborescentes ; tels sont le Lomaria Boryana , Willd., de l'île Maurice , et le Lornaria robuste (Pteris palmœformis , Du Pet. -Th.) de l'île Tristan d'Acugna. (ad. h.)

* LOMASPORA. bot. phan. (De Candolle.) V. Auabis. (b.)

LOMATIE. Lomatia. bot. phan.

Genre de la famille des Protéacées , établi par R. Brown dans son travail général sur celte famille {Lin. Traits., 10 , p. 199) pour quelques espèces A'Embolhriuni , dont Knighl et Salisbury ont fait leur genre Tricondylus.

Le genre Lomatia présente des fleurs jaunes-rougeâtres , dépourvues d'involucre , disposées en grappes terminales , quelquefois axillaires, allongées ou com tes et corvmbiformes.

Le calice est inégulier , formé de sépales distincts et tournés du même côté. Les étamines sont placées dans une petite fossette que présente la partie supérieure de la face interne de chaque sépale. Lis trois glandes hypogynes sont placées d'un seul côté ; l'ovaire est pédicellé , allongé , polysperme. Le style est persistant , terminé par un stigmate oblique , dilaté, oibiculaire et un peu plane.

Le fruit est un follicule ovoïde , allongé, s'ouvrant par une suture longitudinale et contenant un assez grand nombre de graines planes , terminées par une aile membraneuse dans leur partie supérieure. Robert Brown a décrit cinq espèces de ce genre, toutes originaires de la Nouvelle-Hollande. Ce sont des Arbustes portant des feuilles alternes, généralement divisées à la manière des feuilles des Ombellifères , très -rarement simples et entières et quelquefois de figures variées sur le même individu.

Les espèces de ce genre sont • i° la *Lomalia silaifolia*, Br. ou *Embothrium silaifolium* , Smith, Aew- Holl. 20. *Lomatia tincioria* , Br. ou *Embothrium linctorium* , Labill. , Nov.- Hol., t. 4a ct45. Ses graines, infusées dans l'eau, fournissent une belle

couleur rouge. 5". *Lomatia polymorpha* , Br. 4°. *Lomatia ilici-j'olia*, id. 5°. *Lomatia longifolia*, id. , ou *hmbolhrium mjrroides* , Gaerln., Carp., ai5,t. 218. (v.n.)

* LOMATION. bot. chypt. (Hydrophytes.) Ce nom, donné à un genre de *Fucus* inédit par Targioni Tazelti , est devenu spécifique pour une *Délesseric* très-rare que nous soupçonnons devoir rentrer parmi nos Iridines. V . ce mot. (b.)

LO M ATO Pli Y L LE . *Lomatophyllum*. bot. piian. Genre proposé par Willdenow dans le Magasin des Curieux de la Nature de Berlin pour y placer le *Dracœna marginala* d' Aiton , ou *A lues purpurea* de Lamarck.

Ce genre est trop imparfaitement caractérisé pour pouvoir être adopté. (G..N.)

LOMBA. bot. rriAN. La Plante que Rumph a décrite et figurée sous ce nom (vol. 6, t. 5g, f. 1) est le *Piper peltat uni*. A". Poivrier,

(a. b.)

LOMBRIC. rei'T. oph. Le Serpent figuré sous ce nom (pl. 65) dans (Encyclopédie par oïdre de matières est un Orvet. V". ce mot. (B.)

LOMBRIC. Lumbricus. annel.

Nom sous lequel la (dupait des naturalistes désignent un genre d'Annelides très-anciennement admis, et qui a pour type le Lumbricus terrestris , communément Ver de terre. Savigny, dont nous avons adopté la méthode pour la classe des Annelirles, substitue au nom générique de Lombric celui d'Enterion. (F . ce mot.) Il applique celui de Lombrici , à une famille , et emploie la dénomination de Lombricines , Lumbricinœ , pour désigner un ordre. (aud.)

LOM BRIC AI RE. bot. crypt.

{Ilydiop/iytes.) Pour Lumbricaire.

Tr. ce mot. (b.)

* LOMBRICINES. Lumbricinœ.

annei». Savigny (Syst. des AnnelLdes, p. 99) désigne sous le nom d'Anneli les Lombricines, /înnclides Lumbricinœ , le troisième ordre de cette

LO.M

classe. Toutes ces Annelidcsont pour caractères : point d'yeux, d'antennes ni de pieds -, point île mâchoires , de ci ries , de bran-

chies; des soies mobiles^{si}angées sur les côtés du corps.

La bouche est nue ou tentaculée ; les soies sont rarement métalliques et très - rarement rétractiles; elles ne sont point groupées par faisceaux , mais isolées, ou tout au plus rapprochées par paires , qui , dans leur disposition sur les côtés des segmens , représentent assez bien les rames des Annelides Néréidées. Elles varient pour la forme et sont quelquefois liérissées de petites épines mobiles. L'anus s'ouvre derrière ou dessous le dernier segment. Cel ordre comprend deux familles très - distinctes , les Echiures et les Lombrics. V. ces mois. (aud.)

*LOMBRICOIDE. rept. oph.? Espèce du genre Cœcilie. V. ce-mot.(p.<)

* LOMBRICS. Lumhici. annel.

Savigny (Syst. des Annel. , p. 100 et 103) nomme ainsi une famille de l'ordre des Lombricines , et lui assigne les caractères suivans : branchies nulles ; l'organe respiratoire ne dépassant point la surface de la peau ; bouche rétractile , à deux lèvres, sans aucun tentacule; pieds ou appendices latéraux remplacés par des soies non fasciculées , distribuées sur tous les segmens, et formant, par leur disposition , des rangées longitudinales sur le corps; soies non rétractiles, sans éclat métallique; point de soies à crochets. L'anatomie démontre que l'intestin est dépourvu de cœcum et qu'il va droit à l'anus ; il reçoit dans son trajet plusieurs des fibres musculaires propres aux anneaux du corps , ce qui constitue autant de petits diaphragmes. La circulation est assez facile à découvrir; on voit naître du canal intestinal et de la surface interne de l'enveloppe extérieure , une infinité de petits vaisseaux veineux qui s'entrecroisent avec denombi eusesarté-

rioles. Ces veines se réunissent en un tronc commun placé longitudinalement sous le ventre , et il en part

LOM

antérieurement cinq petits canaux qui aboutissent à un canal dorsal, qu'on peut considérer comme un cœur. De petites artères naissent de celui-ci et viennent former un réseau avec les veines de la périphérie du corps. La respiration paraît s'effectuer à la surface de la peau. Quant aux organes générateurs, ils existent sur le même individu et les appareils de l'un et de l'autre sexe se voient vers le tiers antérieur du corps. Les Lom-i bries pondent des cocons ou des œufs qui ont la plus grande analogie avec ceux des Sangsues. Léon Du four les a décrits avec soin (Ann. des Se. Nat. T. v, p. 17). Cette famille comprend deux genres, celui d'Entérion qui correspond au génie Lombric proprement dit , et celui d'Hypogéon. V.

ces mots. (atjd.)

LOMÉCHDSE. Lomechusa. ins.

Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Pentamères , famille des Brachélytres , tribu des Microcéphales , établi par Gravenhorst et ayant pour caractères : antennes formant une massue perfoliée ou en fuseau , à partir du quatrième article, souvent plus courte que la tête et le corselet. Palpes terminés en alêne; tête s'enfonçant dans le corselet jusqu'aux yeux; point d'épines aux jambes. Ces Insectes diffèrent des genres Tachine et Tachypore par les jambes qui , dans ceux-ci, sont épineuses; ils s'éloignent des Aléochares et autres genres voisins par des caractères de la même valeur. Ces Insectes sont très-petits; on les trouve, comme les autres Brachélytres, sous les pierres, les tas

d'herbes ou de feuilles pourries, etc. L'espèce qui sert de type au genre est :

La Loméchuse paradoxale , *L. paradoxale*, Grav. , Latr.; *Staphylius emarginatus* , Oliv. (Col. T. m, n.

42, pl. 2, fig. 1a). Elle est jaunâtre et les bords du corselet sont relevés.

Elle se trouve à Paris. Latreille rapporte à ce genre les *Aleochara bipunctata*, *lanitginosa* , *nilida* , *tymata* , *nana* de Gravenhorst. (g-)

LOM

LOMENTACÉES. Lomentaceæ.

BOT. phan. On appelle ainsi l'une des grandes tribus de la famille des Légumineuses, à laquelle quelques auteurs donnent aussi le nom de Césalpinées. V. Légumineuses, (a. r.)

* LOM ENTAI HE. Lomentaria.

bot. ckypt. (Confen ées.) Genre trèsnaturel , formé parLyngbye dans son Tentamen d'algologie danoise, p. 100, et que nous avons soigneusement examiné. Cet examen nous a déjà montré qu'il ne peut demeurer parmi les Floridées ou le plaçait Lamouroux , comme une troisième section de son genre Gigartina , en soupçonnant néanmoins qu'il en pnuirait être distingué. Cette erreur de placement était justifiable par l'aspect des Lomentaires , dont les couleurs , la grosseur des tubes et la consistance offrent en effet quelques rapports avec ce qu'on observe dans la famille qui unit les Fucacées aux Dlvacées, mais l'on a peine à concevoir comment Agardh a pu confondre de tels Végétaux, tubuleux , et

si évidemment ai ticulés, avec des Acanthophores , des Bryopsides, des Laurenties et des Furcellaires , dans son genre Chondria si monstrueusement composé de Plantes qui n'appartiennent seulement pas à des familles semblables. Il fallait que l'algologue de Luud n'en eût eu que des échantillons desséchés , où il ne pût distinguer l'organisation coufervoïde si ien rendue dans la figure 3 de 1»

planche 50 de Lyngbye , et qui a échappé à Turner, dont le dessin est au reste un peu exagéré. Les caractères du genre qui nous occupe consistent en des filamens ronds , tubuleux, subgélatineux, obtus, doubles, dont h: tube ou filament intérieur très-distinct, rempli par la substance colorante, est articulé de distance en distance au moyen de cloisons transversales doubles , les deux tubes (l'extérieur et l'intérieur) se rétrécissant au point d'intersection , de sorte que l'article paraît plus ou moins renflé vers le milieu ,

LON 48 9

et quelquefois même ovoïde. La fructification qui ne nous a jamais paru gigarline , consiste en gemmules contenues dans quelques-unes des arliculations de la Plante vers l'extrémité, ou dans l'étendue des rameaux.

Les Lomentaies sont des Plantes élégantes, verdâtres, ou plus souvent pourprées, dont on trouve plusieurs espèces en dehors des tropiques, sur les rochers que la mer laisse à sec soit à toutes les marées, soit seulement dans les s\ zigics. Quelques-unes adhèrent fortement au papier dans la préparation, d'autres n'y tiennent que peu. L'espèce la

fil us commune et en même temps a plus reniai quable de nos rivages est le Lomentaria purpurea , N., Lomentaria articulata , Lyngb., toc.

cit., t. 10 ; Chondria articulata , Agardh, Sp., p. 557; Ulva articulata, De Cand., Flor. Fr. T. il, p. 7 ; Fucus articulatus, Turn., Il /st., pl. 106 ; Gigartina articulata de Lamouroux.

Le nom tiré des articulations de cette Plante devait être rejeté puisque toutes les Lomentaires sont essentiellement articulées. (B.)

LOMEINTUM. bot. pu an. Willdenow nommait ainsi les gousses qui sont articulées, c'est-à-dire séparées en deux ou plusieurs loges monospermes par désarticulations transversales. T". Gousses. (a.b.)

* LOMEINTUM. bot. crypt.

{Champignons.) Les Champignons qui ont leurs surfaces externes parsemées de farine ont été appelés Lomentacés, et leurs parcelles farineuses nommées Lamenta par quelques mycologues.

LOMONITE. min. (Werner.) Pour Laumonite. V'. ce mot. (b.)
LOMPE. pois. V. Cycloptère.

LONADE. Louas, bot. pn an. Ce.

genre , de la famille des Synanthérées, Coi} mbifères de Jussieu , et de la Syn. gén. égale, L., a été proposé par Adanson et adopté par Jussieu , Gaertner , De Candolle et Cassini qui l'ont ainsi caractérisé : involucre hémisphérique, formé d'écaillés imbriquées.

igo LO.N

appliquées, oblongues , arrondies au sommet, concaves et membraneuses sur les bords; réceptacle élevé , colloïde , garni de paillettes analogues aux folioles de l'involucre ; calathirle globuleuse, composée de fleurons égaux , nombreux , réguliers et hermaphrodites ; ovaires obovoïdes, glabres, portant sur leur face inférieure une glande saillante , surmontée d'une aigrette en forme de couronne continue , membraneuse et irrégulièrement dentée. Ce genre appartient à la tribu des Antbéinidées , et il est voisin de l'Hyménolèpe dont il diffère par la structure du réceptacle et de l'aigrette. V. Hyménolèpe. L'espèce sur laquelle il a été fondé avait été rapportée par Linné, de même que Y Hymenolepis leptocephala , au genre jllhanasia, dans lequel , selon Cassini, l'aigrette est composée de paillettes articulées , imitant les petits os ou phalanges qui composent les doigts des Animaux. Une structure si singulière mérite bien qu'on ne confonde pas avec les Plantes qui en sont douées, celles dont l'aigrette est formée de simples paillettes ou d'une membrane en forme de couronne. Le Lonas inodora , Gaerln. , L. umbellata , H. Cass. , est une Plante herbacée dont la lige est rameuse, les feuilles pinriatifides , glauques; les calathides jaunes, disposées en ombelles terminales. Elle croît dans le bassin de la Méditerranée. A cette espèce Gassini a ajouté la description d'une nouvelle, sous le nom de Louas minima , qui n'en est peut-être qu'une variété. (g..n.)

LONCHÈRES. mam. Illiger nomme ainsi un genre où. il place diverses espèces à épines de la famille des Rats , et particulièrement l'Lchimys

huppé, f. EciilMYS. (IS. G. ST.-H.)

LONGHtTIS. bot. cbypt. {fougères.) Ce genre peu nombreux , établi par Linné, appartient à la section des Polypodiacées ; son caractère essentiel est d'avoir les capsules disposées en groupes lunules , placés au Jbnddcssius des crenelurcsdcseuil-

LON

les , sur le bord même de la fronde , et recouvertes par un tégument marginal également de forme lunulée , s 'ouvrant en dedans. L'espèce qui a servi de type à ce genre , le *Lonchitis hirsuta* , L. , est assez commune à la Martinique et dans les autres îles des Antilles ; c est une très-grande Fougère à pétiole velu, blanchâtre; lafronde est trois fois pinnatifide , à pmmules oblongues, profondément crénelées, à crénelurcs obtuses, et dont les sinus portent fur leur bord des groupes de capsules recouverts par un tégument membraneux, légèrement hérissé de poils. On connaît encore quelques espèces de ce genre , mais beaucoup plus rares; la plupart sont de l'Amérique équinoxiale, une habile l'île de Mascareigne ou la découvrit Bory de Saint-Vincent : au~ cime des espèces connues n'est arborescente, (ad. b.)

LONCHIURE. Lonçhîurus. rois.

Sous geni edeSciènes. PT. ce mol. (b.)

* LONCHOCAttPE. Lonchocar^ pus. bot. phan. Kunth [in Humb.

Noi>. Gen. , 6, p. 5S3) a établi sous ce nom un genre nouveau dans la famille des Légumineuses. Ce genre, adopté par De Candolle(P/W/'. Syst.t a,p 25g), est formé d'espèces auparavant dispersées dans les genres Dal-^ bt-rgia , liobinin , Amerimnum , etc.

Voici les caractères qui lui ont été assignés : son calice campaniforme et un peu resserré dans sa partie supérieure, se termine par cinq dents à peine marquées. La corolle, qui est papilionacée, offre un étendard orbiculaire, émarginé, subcordiforme, étalé et presque réfléchi; les ailes sont à peu près de la longueur de l'étendard et delà carène et adhérentes à cette dernière; les dix étamines diadelphes ou quelquefois monadelphes. L'ovaire est courtement stipité, contenant de sept à neuf ovules. Le stigmate est obtus ou un peu globuleux. La gousse, un peu stipitée, est allongée, lancéolée, plane, membraneuse, indéhiscente, contenant de quatre à huit graines réniformes dont la radi-

LON

<cul est infléchi. Kunth avait placé

idans ce genre les *Kobinia sericea*, Poirct; *Rubinia \dulacea*, Bcauv. ;

. *Dalbergia pentaphylla*, Poirel; *Dalb. domingensis*, Turpin; *Amerimni*{m

.scandais, WilldU; *jtmeriiu. latijbium*, WilldL j et deux espèces entiè rement nouvelles qu'il a nommées *Lonchucarpis punctatus* et *Lunch, macrophy Llus*. Le professeur De Candolle {lue. cit.) adopte ces huit espèces de Kunth, et y ajoute onze autres espèces dont quelques-unes sont tout-

. a-fait nouvelles. Toutes ces espèces sont des Ai bi es dépourvus d'épines, croissant dans les Antilles ou l'Amérique méridionale, Leurs feuilles sont impaiipinnées, composée-, de folioles opposées et pétioleulées. Leurs fleurs sont purpurines. Ce genre est encore peu exactement limité. Il renferme des espèces à éta-

monadelphes , diadelphes ou semi-diadelphes , mais toutes ces espèces s'accordent assez pour le port. (a u.)

* LONG ANE. bot. ph.vn. Fruit ■ du Longanier, espèce du genre Eu-

phoria. P . ce mot. (b.)

* LONGCIAMPIA. bot. ph.vn.

Sous ce nom , le Gnaphalium Leyscruides , Desfont. , Flur. AU. , 2 , p. 267 , a été érigé en un genre distinct par YVilldenow , dans le Magasin des Curieux de la Nature de Berlin. Cassini n'ayant sans doute pas connaissance de ce genre a formé, sur la même Plante , un sous-genre de Leysera qu'il a nommé Leptophyte. V.

ce mot. (O..N.)

LONGICAUDES. ois. L'une des : sections établies par Blainville parmi les Gallinacées. (dr... z.)-

LONGICAUDES ou MACROURES, crx'.st. Duméril emploie ces mots pour désigner une famille de l'ordre >des Décapodes que Latreille désigne simplement sous le nom de Macroïres. F. ce mol. (g.)

* LONGICONE. ois. V. Gros-Bec.

LONGICORNES. Zo/^co/ws. ins.

IFamille de l'ordre des Coléoptères , îsection des Tétramères, établie par

LON 49i

Latreille et ayant pour caractères : les trois premiers articles des tarses garnis de brosses en dedessous , et les deux intermédiaires larges, triangulaires ou en cœur : le troisième article étant profondément divisé en deux lobes. Mâchoires n'ayant point de dent cornée à leur côté interne ; languette triangulaire ou coniforme , échancrée ou bifide ; antennes filiformes ou sétacées , de la longueur du corps , ou \ plus longues ; tantôt insérées dans une échancrure des yeux ; tantôt en dehors. Pieds longs , grêles avec les tarses allongés ; corps allongé. Les larves de Longicornes sont anodes ou pre-apodes ; elles vivent clans l'intérieur de» Arbres ou sous leurs écorces : leur corps est mou , blanchâtre, plus gros en avant , avec la tête écaillée pourvue de mandibules fortes et sans autres parties saillantes : elles percent souvent les Arbres très-profondément ou les criblent de trous ; d'autres rongent les racines des Plantes ; en général elles causent de grands dommages. Les femelles des Longicornes ont l'abdomen terminé par un oviducte tubulaire et corné ; leurs antennes sont assez généralement plus courtes que celles des mâles. Ils produisent un petit son aigu en frottant les parois intérieures du corselet contre le pédicule de la base de l'abdomen. Plusieurs sont nocturnes , quelques-uns fréquentent les fleurs , d'autres se trouvent sur le viron\ bois et les troncs d'Arbres. Latreille (Fam. Nat. du Règne Anim.) divise cette famille en cinq tribus dans l'ordre suivant : Prioniens , Cérambycins, Nécydalides , Lamiaires et Lepturètes. r. ces mots. (g.)

* LONGINA. bot. cynr. L'un des vieux sjn. de Blechnum boréale , Swartz Osmunda spicans , L. (b.)

LONG [PALPES. Longipalpus. ins.

Latreille {Gen. Crust. it Jus. T. 1, p. 19G) désignait ainsi une petite division des Carabiquesquirenfeimaitles genres Drypta, Galerita et Zuphium, Il ne l'a pas conservée dans ses ouvrages postérieurs , et il s'est servi de c<s

•iga LOO

mol (Fam. Nat. du Règne Anim .) pour désigner une tribu de la famille des Brachélytijes qui a pour caractères:

tete dégagée et étranglée postérieurement ; labre entier ; palpes maxillaires presque aussi longs que la tête , avec le quatrième ou dernier article caché ou peu apparent. Cette tribu renferme quatre genres qui sont t les genres Fédère, Slilique , Stène, È va esthète. V. ces mots. (g.)

*LONGIPÈDES.ois. (Scopoli.) Syn.

d'Echassiers et espèce du genre Fourmilier, y . ce mot. (b.)

. LONGITENNES. ois. (Cuvier.) Syn. de grandsVoiliers. y . cent-jot. (b.)

LONGIROSTRES. ois. (Cuvier.) Famille de l'ordre des Echassiers qui comprend les Oiseaux munis d'un long bec; tels sont les Bécasses, les Courlis , les Ibis , etc. (a. r.)

LOJNG-NEZ. zool. On a donné ce nom comme spécifique à un Singe, à un Serpent du genre Thyphlops ainsi qu'à un Squale, y. ces mots. (b.)

* LOÎN'GOUZE. bot. PHA.N. (Fiacourt.) Nom mnlegache d'une espèce d' A.mome qui cioît aussi aux îles de France et de Mascareigne. Lamarck l'appelle Amonuun madagascariense.

in.)

LONG.UE-EPINE. pois. (Bonnaterre.)Syn.d'Attinga. V. Diodon. (b.)

LONGUE-MITRE, bot. crypt. y.

Macromitrium.

* LONGUP. ois. Garrulus gabriculatus. Espèce du genre Corbeau, y.

ce mot. (b.)

LONICERA. bot. phan. y. Chèvrefeuille.

LONIER. moll. Gmelin , dans la 13e édil. du Syst. Natures, a donné au Lonier d'Adanson (Voy. auSéncg., pl. 12 , fig. 6) le nom de Trochus griseus. y. Troqub. (d..h.)

LONTARUS. bot. phan. Ce genre, de la famille des Palmiers , est le même que le Burassus. y. ce mot.

*LOOSA. bot. tii.vn. (Linné.) Vour Loasa. V. ce mol. (R.)

LOP

LOPEZIE. Lopczia. bot. than. (Genre établi par Cavanilles , dans la 1 famille des Onagres , et de la Mo- I nandi ie Monogyuie , L. , très-facile à f reconnaître aux caractères suivans : ii le calice est adhérent par sa base avec l'ovaire qui est infère ; son limbe | est étalé , à quatre divisions très-profondes et un peu inégales; sa corolle 1 se compose de cinq pétales inégaux; deux supérieurs, onguiculés et coudés à leur base et offrant deux bosses f glanduleuses, les deux latéraux sont j plus grands et également onguicu-

lés, à l'inférieur est le plus petit • chaque i fleur n'offre qu'une seule élamine q dressée, placée vers la partie supé- r Heure ; son filament est plane et n comme canaliculé à sa base où il em- ' brasse la partie inférieure du style. . L'ovaire est infère, globuleux, à quatre loges contenant chacune qua- !

tie ovules attachés deux à deux et 1 superposés par paire. Le style est plus courl que l'étamine , terminé par un stigmate simple. Le fruit est une baie 1 presque sèche, s'ouvrant seulement i par son sommet en quatre dénis qui 1 correspondent aux cloisons. Les grai- * nés sont suspendues et contiennent un embryon dépourvu d'endosperme s et renversé comme les graines.

On connaît quatre à cinq espèces f de ce genre , toutes originaires du j Mexique. Cesonten général desPlan- (tes herbacées, annuelles , à l'excepti- j on d'une seule espèce qui estvivace et sous-frutscenle à sa base, et que pour cette raison , Roemer et Schultes out appelée *Lopezia frulescens* .

Toutes les Lopézies ont les feuilles j alternes , dentées ; les-fleurs violacées , |; petites, pédouculées et axillaires.

L'espèce la plus commune dans les jardins est\e *Lopezia me- vi- caua*,\ah\, fi Enum. i, p. 5, ou *Lopezia race- \> mosa*, Cavan. , Icon.i, -p. ta, T. XVIII. il C'est une Plante élégante annuelle , dont la tige rameuse est haute d'en- [■ virou un pied, un peu anguleuse et velue ; les feuilles sont alternes , ova- j les , aiguës , marquées de dents éloi- j gnées, glabres; les fleurs sontpurpu- j rines, portées sur de longs pédon- '

cules axillaires et uniflores. Celle espèce, que l'on a long-temps cultivée en serre , végète très-bien en pleine terre. On la plante dans les parterres. (a. h.)

* LOPHA. Loph. ins. Genre établi par Megrre, et que Latreille réunit à celui de Bembidiou. V. ce mot. (g.)

LOPHANTUS. bot. phan. Linné et Fovster avaient employé ce nom pour désigner deux genres dont l'un a été réuni aux Hyssopus , et l'autre aux Waltheria : on ne s'en sert plus que comme spécifique dans ces genres ainsi que pour la principale espèce de Metrusiderus. P~. ces mots. (g..n.)

LOPHAR etLOPIIARIS. rois. Le Poisson de la Pi oponlide , connu sous le nom de Lophar , dont Linné avait fait un Perça , que Lacépède avait rap porté à son genreCentropome , etdonl Rarinesque (ICiul. Sic, p. 17) a formé un genre sous le nom île Lopharis , a pour caractères : les ventrales réunies par une membrane transversale. V. Perche. (b.)

* LOPHAR IN A. bot. phan. Nom sons lequel Necker (Elern. Bot., n.

3f)6) a formé un genre composé des espèces A'Krica qui ont les anthères surmontées d'une arête en forme de crête. Ce caractère qui est peut-être bon pour distinguer une section , n'a pas assez de valeur pour motiver l'établissement d'un genre. /^.Bruyère.

LOPHERIN A. bot. puan. (Dicl.

des Se. Nal.) Pour Lopharina. P~. ce mot. (G..N.)

LOPH1DIDM. bot. phan. Le genre de Fougères établi sous ce nom ; par Richard , rentre dans le Schizoea ' de Smith. V. ce mol. (b.J

LOPHIE. Luphius. pois. Genre de l'ordre des Bi anchiostèges de Linné , qui n'entre que par force dans la fa-

1 mille des Percoïdes , de l'ordre des Acanthopléiygiens de Cuvier , devant former une quatrième tribu

■ qu'on pourrait nommer les Bau-

LOP /193

droi.es et qu'il remplit seul ; ce genre a pour caractères généraux: outie un squelette cartilagineux , et la peau sans écailles , des pectorales supportées comme par deux bras , soutenus chacun par deux os comparables au radius et au cubitus; des ventrales placées fort en avant des pectorales ; des opercules et des rayons branchiostèges enveloppés dans la peau , et les ouïes ne s'ouvrant que par un trou percé en arrière des pectorales.

« Ce sont, dit Cuvier (Règn. Anim.

T. 1 , p. 589), des Poissons voraces , à estomac large, à mle-tin court, qui peuvent vivre très-long- temps hors de l'eau , à cause <lu peu d'ouverture de leurs ouïes. » Trois sous-genres y sont établis.

t Les Lo'i'iiiES proprement dites , qui ont la tête exti êmement large et déprimée, épineuse en beaucoup de points , ayant la gueule très-fendue , armée de dents pointues , la mâchoire inférieure garnie de nombreux baibillons , deux dorsales distinctes , et quelques rayons libres et mobiles sur la tête; la membrane des

ouïes forme un cul de-sac ouvrit dans l'aisselle, soutenue par six rayons Irès-allongés, mais l'opercule petit. Leur intestin a deux ciecum's très-courts vers sou origine, la vessie natatoire manque.

On n'en connaît qu'une espèce; le *Luphius viviparus* de Schneider, et le *Luphius Ferguson* de Lacépède, ne paraissent que de simples variétés, ou ayant été élablies sur des individus mal préparés.

La B.vuDRoYE ou Baudroie, vulgairement Galanga , Crapaud ou Diable de mer , et Raie pécheresse; *Luphius piscalurius*, L. , *Gmcl* , *Sysi.J\at. xm T.i*, p. 1479; *Bloch.*,pl. 87; *Encycl.' Pois.*, pl. 8, f. 26; *Lac, Pois. T.i*, p. 50* , pl. 1 5 , f. 1 ; le *Raua marina* , et le *Rana piscotrix* des anciens , que les formes bizarresel comme monstrueuses de ce Poisson avaient beaucoup frappés , et sur lequel ils débitèrent des conles absurdes, perpétués chez les pêcheurs qui disent particulièrement la Baudroye l'ennemie du Requin el capable de le vaincre.

4 ;i 4 LOP

<t Une tête démesurée (dit Bosc) avec des nageoires ventrales et pectorales en l'orme de main frappent d'abord ceux qui observent une Loplue Baudroye pour la piemière fois ; sa mâchoire inférieure est plus avancée que la supérieure; sa bouche est très-grande et continuellement ouverte, tout l'intérieur esc garni de dents inégales et nombreuses, semblables à celles des mâchoires ; la langue est comte et épaisse; les narines sont placées derrière la lèvre supérieure et présentent comme la forme d'un verre à paie mobile. Les yeux sont placés à la partie supérieure de la tête , et très-rapprochés l'un de l'autre; entre eux s élève un long filament terminé par une membrane assez large et bilobée à la base

de laquelle on en trouve une autre petite et triangulaire. Ce filament est suivi, dans la direction du dos, de trois ou cinq autres d'autant plus grêles (its qu'ils s'éloignent plus de la tête, avec des membranes moins larges, simples, et des fils le long de leur tige; des barbillons vermiformes garnissent les côtés du corps, de la queue et de la tête, au-dessus de laquelle paraissent quelques tubercules ou aiguillons particulièrement entre les yeux et la première nageoire du dos. Il y a deux dorsales dont la première a sa membrane bien plus courte que les rayons qui la fixent. La couleur de ce Poisson est obscure en dessus, blanchâtre en dessous; la caudale ainsi que les pectorales sont bordées de noir, la peau est unie, flasque, sans écaille ni ligne latérales. » La Baudroie se trouve dans toutes les mers d'Europe; dans la Méditerranée elle dépasse rarement dix-huit pouces à deux pieds de longueur; dans l'Océan elle devient plus grande; nous en avons vu prendre sur les côtes d'Alicante de plus d'un mètre de longueur. Lacépède dit qu'il y en a de plus d'une toise, et Pontoppidan assure qu'on en voit en Norvège qui ont jusqu'à quinze pieds. Partout la figure étrange de cet Animal le rend un objet de dé-

LOP

gout, on ne le porte guère sur aucun marché, les pauvres même dédaignent sa chair et la disent malfaisante; nous pouvons assurer, en ayant fait plusieurs fois usage, qu'elle est blanche, d'un goût fort agréable et saine. Geoffroy de Saint-Hilaire a lu à l'Institut un Mémoire fort intéressant sur l'anomalie de cette espèce et particulièrement sur les filaments singuliers qui la caractérisent; ce Mémoire enrichit l'excellent recueil des Annales, rédigé par Audouin et Brongniart, nos collaborateurs.

«Ce Poisson , dit enfin Lacépède , n'ayant ; ni armes défensives dans ses tégu- !

mens , ni force dans ses membres , ni célérité dans sa natation , est , malgré sa grandeur , contraint d'avoir recours à la ruse pour se procurer sa subsistance, de réduire sa chasse à des embuscades, auxquelles d'ailleurs sa conformation le rend très-propre ; il s'enfonce dans la vase , se couvre de Plantes marines , se cache entre les pierres, et ne laisse apercevoir que l'extrémité de ses filaments qu'il agite en divers sens, auxquels il donne (toutes les fluctuations qui peuvent ; les faire ressembler davantage à des Vers ou autres appâts. Les autres Poissons attirés par celle apparente proie, s'approchent, et sont engloutis par le seul mouvement de la Lophoteuthis Baudroie , dans son énorme gueule,] et y sont retenus par les innombrables dents dont elle est armée.» Ce Poisson n'est ni rare ni commun , et (les pêcheurs disent qu'il croît avec) beaucoup de promptitude , B. 6 , n. f. 10 , 11 , p. 24, 26 , v. 5, a. 9 , 13 , c. e 6,8.

Les Ctenophores , qui ont comme les Baudroies ou Baudroies , des 11 rayons libres sur la tête, dont le premier est grêle, terminé souvent par une houppe, et dont les deux suivants, « augmentés d'une membrane , sont quelquefois très-renflés et d'autres fois réunis en une nageoire. Leur corps et leur tête sont comprimés , leur bouche ouverte verticalement; leurs ouïes sont munies de quatre) rayons ne s'ouvrant que par un canal ,

LOP

et un petit trou derrière les pectorales ; leur dorsale occupe presque tout le dos; des appendices charnus garnissent souvent tout leur corps.

Leur vessie natatoire est grande ; leurs intestins sont médiocres et sans cœcunis. Ils peuvent remplir d'air leur vaste estomac à la manière des Tétrodons et gonfler, leur ventre comme un ballon ; à terre leurs nageoires paires, en forme de pales, les aident à ramper, beaucoup mieux qu'on ne croirait un Poisson susceptible de le faire : aussi les trouve-t-on parfois assez loin de l'eau sur le rivage ou l'on assure qu'ils peuvent demeurer hors de leur élément jusqu'à deux ou trois jours , ce qui n'empêche point qu'on n'en rencontre dans la haute mer parmi les bancs d'Ilots dans des Fucacées , où nous en avons souvent pêché , particulièrement entre des paquets de *argastus bacciferum*. Il n'en existe guère que dans les mers tropicales: Linné n'en connaissait qu'une espèce ; aujourd'hui l'on en voit au moins une douzaine dans les collections. Ce sont des Poissons beaucoup moins grands* que les Baudroies proprement dites, qui ne présentent aucun aiguillon , qui sont comprimés dans un sens différent , c'est-à-dire verticalement , dont les couleurs, sans être brillantes, sont variées et ajoutent à la bizarrerie des formes.

L'Histrion , *Lophins histrio* , L , Gmel. , /oc. cit. , p. 14; Bloch, pl. Jii ; Encycl. , l'ois., pl. 9, f. aK ; Guaperva , Marcgraff j Bras. îto. Cette espèce à qui la bizarrerie de la forme et de ses mouvemens a mérité le nom qui la désigne, se trouve indifféremment dans les mers de l'Amérique et des Indes ; elle acquiert de neuf à dix pouces de longueur. Sa couleur générale est d'un jaune orangé diapré de taches brunâtres, d. 1-1-12, p. 10- 11 , v. ft , a. 7, c. 10.

Le Riquet à la Houpe , *Lophins tricornis* , Cuv. ; *L hispidus*; Schn. , 14a, variété de l'Histrion ; Lacépède , Pois. T. 1, p. 3a3, pl. 14, f. 1. Nous pouvons affirmer que ce Poisson n'est pas

LOP 49 f.

une variété d'âge du précédent , mais bien une espèce beaucoup plus petite, que nous avons retrouvée assez fréquemment à l'Ile-de-France, où Commerson 1 avait dessinée. C'est ce dessin très-exact qu'a reproduit Lacépède. Sa couleur de nankin , ses taches autrement disposées et d'un brun glauque ou bleuâtre, sa taille beaucoup plus petite, la membrane qui tei mine son filet antérieur trifurquée , et surtout les alentours de sa bouche dépourvus de toute espèce de filets , la caractérisent suffisamment.

Nous en avons conservé des individus dut ant plusieurs jours dans des vases, ayant soin de ne pas laisser l'eau se corrompre, et comme on le fait des Cyprins dorés. Ils demeuraient quelquefois des joui nées entières dans une immobilité qui les eût fait croire morts, tnttis tout-ù coup ils nageaient de la façon la plus singulière, et comme s'ils eussent marché gravement dans le Uuide dont ils étaient environnes; d'autres l'ois, se gouttant, ils venaient à la surface de l'eau où ils demeuraient exondés aux trois quarts. Ayant une fois gi aduellemenl ajoutède l'eau douce à l'eau de mer, où nous conservions un de ces Poissons , il finit par vivre dans l'eau douce la plus pure sans y paraître souffi ir, pendant plus de huit jours après lesquels il mourut probablement d'inanition, d.

L Uni , *Luphius lœvigatus* , Bosc , est l'un des Chiiouecles les plus communs , et cependant il avait échappé à tous les ichthyologisles. 11 c-t aussi l'un des plus petits. Nous l'avons retrouvé à notre départ d'Kurope et à notre retour dons les parages des îles du cap Vert , parmi les Sargasses, et nous en avons également conservé un individu vivant pendant quelque temps, n. 1-O-12 , P. 10, v. 6 , A. G, c.

Le Commeusonien , Lac. , lue. cit. , pl. 14, f. 3 ; le Chironccte , Lac. , lac. cit., f. 2 ; les Lophins striatus et mur— moratus de Schaw, avec le Hérissé et le Lisse de Lacépède , Ann. du Mus. T. iv, pl. 45, f. 3 et 4 , sont d'autres es-

496 LOP

pèccs de ce sous-genre sur lequel Cuvier ;i donné un Mémoire dans le lome premier, p. 118, des Annales du Muséum .

fff Malthées , qui ont la lête extraordinairement élargie et aplatie, principalement sur la saillie et le volume du sub-opercule ; les yeux fort en avant; la bouche sous le museau , médiocre et protractile; les ouïes soutenues par six ou sept rayons , et ouvertes à la face doïsale par un trou au-dessous de chaque pectorale ; une seule pelite dorsale molle, ce qui fait encore une exception aux caractères de l'ordre ou le savant Cuvier place les Lophies. Le corps est hérissé de tubercules osseux , des baibillons y régntent tout le long sur les cotés; mais la tête C.-.1 dépourvue de layons libres, ce qui indique dans les Malthées des mœurs très-diQereules de celles des Lophies dout se composent les deux sous-genres précédens. Il n'y ^existe d'ailleurs ni vessie natatoire ni cœcum.

La Ci-iauve-Souris, Laphius Kesperdlio , L., Gmel.,/oc. cit., p. 1480; Bloch, pl. 110; Encycl. Pois., pl.

9, f. 27; Guacucuja, M uegr., Hrasil., p. 1 45 . L'un des plus vilains Poissons de la mer, presque en losange, hérissé de pointes, avec un museau tellement pointu qu'on l'a quelquefois nommé petite Licorne; on trouve cette espèce de Lophiedans les mers d'Amérique, particulièrement aux Antilles, où elle acquiert un à deux pieds de long.

D. 5-7, P. 19, V. 5, 6, A. 6, c. 11, là.

La Lophie de Faujas, Lac. , loc.

cit., p. 318 , pl. 11, f. ^ et 5 ; *Lophius stellatus*, Wahl, Soc. Copenh. T.

1 v, pl. 5 , f. 5 et 4. Cette espèce, venue au Muséum de Paris de la Collection de La Haye , n'a guère que quatre pouces de long. Très-aplatie , sa partie antérieure est comme discoïde , terminée par un prolongement du corps en forme de queue; lisse en dessous , toute hérissée de tubercules en dessus , elle est encore garnie au pourtour et à la bouche qui est un peu en dessous de la partie antérieure d'autres mamelons hérissés qui

LOP

rappellent les piquans des Mélocactes. b. 5, d. 5, r. 5, y. 11 , a. 5 , c. 7.

Les Lophies rentrent si difficilement dans la Camille ou elles ne semblent avoir été placées par l'illustre Cuvier qu'avec doute, et tout en offrant entre eux des rapports frappants, les sous-genres qui s'y rapportent présentent de si grandes différences , soit dans la direction de la compression de leur corps, soit dans la situation de leur bouche , l'absence ou la présence des appendices et de la vessie natatoire, la nudité ou l'aspérité de leur peau et leur aspect néanmoins toujours étrange, qu'il serait peut-être à propos d'en former une famille distincte, bien plus rapprochée qu'on ne l'a fait des Cartilagineux, ainsi que le pensait Linné; et dans laquelle les Lophies proprement dites , les Chirocentres et les Malthées seraient élevées à la dignité de genre. Nous soumettons nos doutes à cet égard au savant qui prépare une grande histoire

des Poissons oii tous les points douteux de leur histoire seront éclaircis. (b.,

* LOPH1oDON.m,vm. V. Paljeo-

THER1UM

LOI'HIOLA. bot. rnAN. Le nom de Lophiola aurea a été donné par Gawler à une Plante qui rentre dans le genre Cvnostjlis de Biown , el qui a été nommée par Pursh C. ameticana. F. Cono-style (o..N.)

* LORiUOLÈPE. Lophiolepis. bot.

ni an. C'est le nom d'un sous-genre que Cassini a établi parmi les Cirsium , et qui est essentiellement ca— raciérisé par les appendices des écailles de l'involucre, lesquels sont longs , arqués en dehors el bordés de petites épines. Ces caractères le distinguent des vrais Cirsium dont les appendices de l'involucre sont courts, droits et sans épines; des Vicnomon chez lesquels ces appendices sont longs, étalés, arqués en dehors, épais , roides , et armés d'épines très-longues; et des Qtlfiacënttson (dernier sous-genre du Cirsium), qui ont les appendices longs , étalés , droits,

LOP

:roides, subulés et spinescens. On voit idonc, par ces faibles différences, que les sous-genres en question se loncent les uns dans les autres. L'Or- HJioceniron, en effet, est tellement i intermédiaire entre les Lophiolepis et les vrais Cirsium , qu'il nous

semble à réunir ces sous-genres , et ne fortifier avec eux qu'une seule et indivisible association.

Les quatre espèces assignées avec certitude au *Lopholepis* , sont : 1° (*Cirsium citiatum* ou *Cnicus ciliatus* , Willd.; 2° *Cirsium arachnoideum* , Maischall-hieberstein .; 3° *Cirsium*.

mutans , qui est peut-être le *Cnicus bipibratus* de Maischall ; 4° et *Cirsium lanceolatum* , OeCand., ou *Caridus lanceolatus* , L. ; mais celle (dernière) Plante n'est placée qu'avec doute parmi les *Lopholepis*. Outre ces espèces , Cassini indique comme appartenant probablement à ce sous-genre, les *Cirsium eriophorum* , De (Cand. ; *Cirs. serrulatum* , *Bipibratum* , *lanceolatum* et *mutans* de Marschall-Bieberstein. (o.n.)

LOI'IIIRA. HOT. PH AN'. Gaertner filius (Caip. 51 , tab. 188 , fig. a) a décrit et figuré sous le nom de *Lophura* : ala/a, Banks, Mss., le fruit d'un genre auquel il attribue les caractères suivants : le calice est libre, persistant, formé de cinq folioles impaires , linéaires, roides, fortement veillées et réticulées; l'une d'elles est plus grande que les autres est obtuse et forme une sorte de languette ; les étamines sont en grand nombre; le style est libre , surmonté d'un style simple , subulé , Ici miné par un stigmate à deux divisions linéaires ; uës. Le fruit est une sorte de noix coriace, recouverte par le calice, à une seule loge indéhiscente , contenant une seule graine dressée, dont l'embryon , dépourvu d'endosperme, a la radicule inférieure et les cotylédons charnus et épais. Cette espèce, la seule que l'on connaisse , est un arbre originaire des forêts de l'Afrique australe; ses feuilles, alternées ont longues , lancéolées, cordifor-

mes, roides et dépourvues de stipules. Ses fleurs sont disposées en grappes.

Ce genre paraît avoir quelques rapports avec les Erables , dont il s'éloigne par plusieurs caractères importants. (a. r.)

* LOPHIUM. bot. ck"ipt. (Hypoxy /uns.) Ce genre, ciéé par Fries , a pour type YHysleriurn mylilinum de l'ersoon ,qui est X Hypoxy Ion ostraceum de Bulliard. Il est voisin des Hysterium , mais il en diffère pourtant p^r ses thèques qui sortent du réceptacle. Il est caractérisé ainsi qu'il suit : réceptacles comprimés , presque membraneux , s'ouvrant par une fente longitudinale ; thèques droites, s'échappant sous forme pubescente. Il ne 1 enferme encore que deux espèces. (a. f.)

LOPHIUS. rois. P. Lophie.

LOPHOBRYNCIUS. pois. Quatrième ordre de la classe des Poissons dans la Méthode de Cuvier où les branchies se divisent en petites houppes rondes, disposées par paires le long des arcs branchiaux, structure dont on ne retrouve aucun autre exemple chez les Poissons. Ces parties sont d'ailleurs enfermées sous un grand opercule attaché de tous côtés par une membrane qui ne laisse qu'un petit trou pour la sortie de l'eau. Ils ont tout le corps cuirassé et d'un aspect étrange. Ce sont les genres Syngnathus , Hippocampe , Sélénosse et Pégase. A', ces mots.

* LOPHIONOCERE. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères , famille des Longicornes , tribu des Céranibyens, mentionné par Latreille (Fam. Nat.

du Règne Animal.) et dont nous ne connaissons pas les caractères, (g.)

LOPHONOTES. rois. La famille établie sous ce nom par Dumeril , parmi ses Holobranches , a pour caractères: les ventrales situées sous les pectorales ; le corps épais , comprimé, et la dorsale très-longue. Elle contient les genres Toenianote, Cory-

V. ces mois. (b)

LOPHOPHORE. ois. Temminck a changé ainsi le nom du genre du Monaul établi par Vieillot, qui, ayant l'antériorité, doit être adopté. F.

MoNATTL. (a. a.)

LOPHORHYNQUE. ois. V. Ca-

UAMA.

LOPHORINE. ois. Vieillota voulu faire sous ce nom un genre particulier pour le *Supeibe*, *Paradisea superba* ; mais ce genre n'a pas été adopté. (a. b.)

LOPHOTE. Lophotes. pois. Genre appartenant à la famille des Tœnioïdes de Cuvier dans l'ordre des Acanthoptérygiens de sa Méthode ichthyologique , et à la famille des Pétalosomes de Dumeril. Il fut établi par Giorna dans les Actes de l'Académie de Turin (1805-1808, p. 19, pl.

2) d'après un individu mal conserve.

Cuvier ayant eu occasion de revoir ce Poisson et d'en observer un individu de quatre pieds de long pris dans les mers de Gênes, nous en a donné une description plus exacte et une figure par-

faite dans les Annales du Muséum, i.xx, fig. 17. On ne peut donc mieux faire pour donner une idée de cet Ani- . mal que de laisser parler lui-même le savant qui l'a scrupuleusement caractérisé : « Les Lophotes, dit-il (Piègn.

Anim. T. il, p. 247) ont le corps allongé et finissant en pointe, la tête courte, surmontée d'une crête osseuse , trèsélevée ; rayon épineux, bordé en arrière d'une membrane, et à partir de ce rayon une nageoire basse à rayons presque tous simples , régnant également jusqu'à la pointe de la queue qui a une caudale distincte, et eu dessous de cette pointe est une très- ' coui le anale. Les pectorales sont médiocres , armées d'un premier rayon épineux, et sous elles on distingue à peine des ventrales de quatre ou cinq rayons excessivement petites. Les dents sont pointues et peu serrées; la bouche est dirigée vers le haut , et

LOP

l'œil est fort grand. On compte six rayons aux branchies ; la cavité abdominale occupe presque toute la longueur du corps. » On n'en connaît encore qu'une espèce qui est le Lop/iotus Lacedipedia/ius, qui n'a été trouvé jusqu'ici que dans la Méditerranée. (B.)

LOPHYRE. bevt. saur. Sousgenre d'Agame. T'. ce mot. (b.)

LOPHYRE. Lophyrus. moi/l. Poli, dans son grand ouvrage des iëstacés des Deux-Siciles , a donné ce nom aux Animaux des Oscabrions. V. ce mot. (D..H.)

LOPHYRE. Lophyrus. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères , section des Térébrans , famille des Porte- Scies, tribu des Tenthredines , établi par Lalreille, et correspondant à la première

division du genre *Hyloloma* de Fabricius, et à la première famille du genre *Fterone* de Jurine. Ce genre est ainsi caractérisé : antennes des mâles de seize articles au moins, eu peignes ou en panaches ; celles des femelles simplement en scie, plus grêles vers leur extrémité ; labre très apparent ; mandibules tridentées ; ailes ayant une grande cellule radiale ; trois cellules, cubiales presque égales, la première et la seconde recevant chacune une nervure récurrente, et la troisième atteignant le bout de l'aile.

Les Lophyres se distinguent des Tenthredes , des Athalies , des Mégalogontes; et autres genres voisins, par les articles des antennes et par les cellules des ailes. Ce sont des Hyménoptères de taille moyenne, et qui appartiennent à l'Europe. L'espèce qui sert de type à ce genre est :

Le Lophyie du Pin, L. Fini , Latr., Jurine; *Hylutoma* Vint, Fab.; le mâle f Panz. , Faun. Ins. Germ. , fuse. 87, tab. 17, le même sexe); Ily lotom a r/orso/a , Fabr. ; la femelle (Panz., 70c. cit., fasc. 63, tab. 9). Le mâle est long de quatre lignes, noir, avec les antennes très-barbues; les jambes et les tarses sont d'un jaune

Lor

sale, tirant sur le brun. Les femelles sont plus grandes et plus grosses , d'un gris jaunâtre , avec la tête et les tarses noirs; les barbes des antennes sont très-courtes. La larve de cette espèce vit en société sur les brandies du Pin : elle est blanchâtre, avec la tête d'un brun jaunâtre et quatre rangs de taches noires. La nymphe est renfermée dans une coque ovale assez dure dont une des extrémités se détache , à la sortie de l'Insecte parfait, eu manière décalotte, et y reste attachée comme un couvercle de boîte. Cette

espèce se trouve à Paris. On peut rapporter à ce genre les *Pteivus Loriots* de Jurine et *Hylotoma Juniperi* de Fabricius.

LOPHYROPES. *Lophyrva*.

crust. V. *Lophyropoes*.

LOPHYROPODIIS. *Lophyropoda*.

CTUJST. Qrçtre (ci-devant famille sous le nom de *Lnphyiopes*) établi par Latieille, et se composant du genre *Monuculiis* de Linné et de quelques espèces decelui qu'il nommait *Cancer*.

Latieille les a désignés collectivement (Règu. Anim. de Cuv.) par la dénomination de *Branchyopoder*,; ce sont les 7ùitomos/racés de Mi. 1er.

Schœffer, rlermann , Jurine père et fils, Ramdhor, Prévoit, Hrongniait fils et îSlauss ont ajouté beaucoup aux observations de cet auteur, et complété eu grande partie l'histoire qu'il nous avait donnée de ces Animaux. Les caractères de cet ordre sont : un œil sessile et immobile; tête confondue avec le thorax ; corps

Crotégé par un test; pieds au uomre de six ou huit, en y comprenant les pieds-mâchoires, ces pieds étant natatoires dans le plus grand nombre, branchifères , sans onglet sensible au bout, et garnis de soies, de poils , etc. , mais non foliacés comme ciïix de l'ordre des *Aspidiphorcs*.

Ces Animaux habitent le plus souvent les eaux douces ; leurs œufs foi ment tantôt deux paquets ou deux grappes situées à la base de l'abdomen ; tantôt ils sont rassemblés, au-

LOR

dessous du test, sur le rjos je nimal.

La treille divise cet ordre t. faux familles; ce sont les Univalves
jes Osiracodes. V. ces mots. (g»

LOPHYRUS. KEFT. MOU.. INS.

V. LoPIIYRE

* LOPIMIE. Lopimia. bot. phan.

Genre de la famille des Malvacées et de la Monadelphie Polyandrie, L. , établi par Mai tius (IS'owa jlct. Bonn. Xi , p. 96) qui l'a ainsi caraclérisé : involucelle plus long que le calice, à vingt folioles sétacées et conniventis; corolle plane; colonne staminale un peu recourbée {subde/lexa); trente à quarante anthères ; dix stigmates ; capsule à cinq coques enduites d'un mucilage visqueux. Ce genre a le port des Sida; il se rapproche aussi du Pavonia et de V Urena, mais il s'en dislingue facilement par la viscosilé de son fruit avant la dessiccation. Une seule espèce à laquelle Mai tins a donné le nom de *Lopimia malacophylla* , constitue ce nouveau genre. Link et Otto l'ont décrite et figurée dans leur Recueil des Plantes rares du jardin de Berlin (T. 1 , p. 67, t. 30) sous le nom de *Sida malacophylla*. C'est un Arbrisseau pubeseent , à feuilles orbiculaires presque coivliformes , et à doubles dentelures sur las liords ; Jes (leurs sont solitaires dans les aisselles des feuilles, et de couleur écarlatc.

Cette Plante croît dans les lieux marécageux de la province de Bahia au Brésil. (G..M.)

LOQUE, bot. phan. L'un des noms vulgaires de la Douce-Amère, et dans les Cévennes, selon Bosc, du *Carlina acaulis*, dont on mange les réceptacles charnus en guise d'Artichauts, (b.)

Les habitants de la province de Jaen de Bracamoros, dans l'Amérique méridionale, donnent aussi le nom de Loque au *Kageneckia glutinosa* de Kunth. K. Kageseckie.

LORANTHE. *Loranthus*. bot.

iiiian. Gp, re d'abord placé dans la famille des Caprifoliacées, mais formant, aujourd'hui le type d'une nouvelle famille nommée Loranthées.

Les Loranthées sont tous des Végétaux parasites, vivaces et ligneux, fort analogues pour le port et l'organisation à la Gui qui appartient à la même famille. Leur tige est généralement rameuse et cylindrique; leurs feuilles le plus souvent opposées, rarement alternes, coriaces, persistantes, très-entières, marquées de nervures longitudinales; les fleurs, dioïques dans la seule espèce qui croisse en Europe, sont hermaphrodites dans toutes les autres. Ces fleurs sont quelquefois très-petites et verdâtres, d'autres fois fort grandes et colorées; elles sont rarement solitaires, le plus souvent groupées en épis, en grappes, ou en panicules terminales et axillaires. Chaque fleur est accompagnée d'une ou deux petites bractées squamiformes, ou d'un calicule tantôt court et en forme de cupule, tantôt recouvrant l'ovaire en totalité. Le calice est adhérent avec l'ovaire infère; son limbe est quelquefois à peine marqué; d'autres fois il forme un petit rebord membraneux et saillant très-manifeste.

La corolle, dont la longueur varie depuis une ligne jusqu'à deux pouces, se compose de quatre à huit pétales linéaires, tan-

tôt libres et distincts les uns des autres, tautôt soudés entre eux dans une étendue plus ou moins considérable de leur longueur. La corolle, considérée dans son ensemble, est allongée, tubuleuse , assez souvent oblique , et renflée dans sa partie inférieure. Chaque pétale porte sur sa face interne une étamine dont le filet est attaché plus ou moins haut sur cette face interne.

Les filets sont subulés , dressés ; l'anthère est allongée , à deux loges , s'ouvrant par un sillon longitudinal et du côté interne. Cette anthère , échancrée à sa base , est très-caduque, et ne tient au filet que par le sommet de celui-ci. L'ovaire est turbiné, infère, couronné par un disque

LOR

épigyne, saillant, annulaire; il offre une seule loge qui contient un seul ovule renversé. Le style est cylindrique , simple , généralement de la longueur des étamines et quelquefois plus long; il se termine par un stigmate renflé et simple. Le fruit est une baie généralement ovoïde ou globuleuse, omphiliquée à son sommet, contenant dans une pulpe charnue , visqueuse et gluante, une seule graine renversée. Celle-ci se compose d'un tégument propre qui n'est pas distinct de l'endocarpe et d'un endosperme charnu qui contient dans sa partie supérieure un embryon axiale, cylindrique, dont la radicule, tournée vers le hile , lui donne une direction semblable à celle de la graine ; cette radicule est entièrement recouverte par une lame de l'endosperme , en sorte que l'embryon est totalement intraire. Quelquefois on trouve dans une même amande deux et jusqu'à quatre embryons, circonstance qui se remarque également dans le Gui.

Le nombre des espèces de ce genre est extrêmement considérable , et il serait fort à désirer que quelque botaniste en entreprît une bonne monographie ; car il règne une assez grande confusion parmi ces espèces, qui croissent dans toutes les régions chaudes du globe, une seule étant originaire d'Europe {*Loranthus Europæus*, Jacq.) Linné, dans la première édition du *Species Plantarum* , publiée en 1753, n'en décrit qu'une seule espèce (*Lur. americanus*). En 1762, dans la seconde édition du même ouvrage, il en fit connaître cinq , trois originaires de l'Amérique méridionale , une de la Chine et une de l'Inde. L.unarck, dans l'*Encyclopédie*, en décrit vingt -cinq e-pèces, dont plusieurs entièrement nouvelles. Ce nombre est porté à vingt-six par Willdenow {*Sp. Plant.*

179g). Persoon , dans son *Synopsis*, en mentionne quarante-trois espèces , parmi lesquelles quinze avaient été décrites, et un grand nombre figurées dans le troisième volume de la

LOR

Flore du Chili et du Pérou de Ruiz et Pavon. Plus récemment notre collaborateur, le professeur Kunth, en a décrit vingt-huit espèces nouvelles, dans les *Nova Généra* de Humboldt et Bonpland, trouvées par ces célèbres voyageurs dans les diverses parties de l'Amérique méridionale qu'ils ont visitées. Si l'on ajoute à ce nombre quelques autres espèces décrites isolément par plusieurs botanistes, on verra qu'il peut être évalué à environ quatre-vingts, sans compter plusieurs espèces nouvelles et inédites qui existent dans les herbiers.

•Nous avons déjà dit qu'une seule espèce de ce genre croissait en Europe; c'est le *Loranthus Europæus* , Jacq. , *Vind.* , 150 ;

Austr., t. 30. Il croît , parasite , sur le tronc des Chênes, des Poiriers, des Pommiers et des Châtaigniers; c'est un petit Arbuste ayant le port du Gui. Sa tige est ligueuse , dicholome et comme articulée; ses feuilles sont assez généralement opposées , quelquefois alternes sur le même individu; elles sont elliptiques, obtuses, entières, un peu coriaces, glabres et veinées, surtout intérieurement. Les fleurs sont dioïques, formant un épi solitaire au sommet de chaque rameau.

Le calice a son limbe légèrement denté ; la corolle est formée de six pétales portant chacun une étamine.

Le fruit est une baie globuleuse, pisiforme , jaunâtre, presque translucide, contenant une seule graine au milieu d'une pulpe gluante. Cette Plante a d'abord été observée en Autriche par Jacquuin ; elle est aujourd'hui assez commune sur les Arbres du parc de Scbcebrunn. Pallas L'a retrouvée en Sibérie. Elle existe également en Italie, dans les Calabres, où elle croît principalement sur les Châtaigniers. Plus récemment, le fils du professeur Savi de Pise Va trouvée dans la chaîne de l'Apennin , au nord de Pise.

Le Lorantiie cuculi,>uiie , Lo~ ranthus cucullaris, Lamk. , Diction.

d'Hist. Nat. , i , p. 444 , T. xxm , est une des espèces les plus belles et les

LOR 50i

plus singulières île ce genre. C'est la même que le professeur Richard a indiquée sous le nom de Lorcut/ius braceatus, dans les Actes de la Sociéled'Histoire Naturelle de Paris. Elle est parasite ; ses feuilles sont opposées , scssiles , lancéolées, entières, falci-

formes , aiguës et veinées. Ses fleurs sont portées sur un pédoncule axillaire long d'un pouce, bifurqué à son sommet , et chaque branche porte trois fleurs recouvertes en partie par une large bractée cordiforme , repliée en deux, coriace, persistante et rouge. Chaque fleur est accompagnée d'un calicule monophylle , ovoïde, ayant son bord tridenté; ce calicule est plus long que le calice propre, qui est adhérent avec l'ovaire, et terminé par un limbe court et entier. La corolle se compose de six pétales distincts fortement roulés en dehors dans leur partie supérieure. Cette espèce est originaire de la Guianc. D'après une analyse soignée que nous en avons faite, nous ne serions pas éloignés d'en faire le type d'un genre distinct par sa large bractée cuculliforme et son calicule recouvrant l'ovaire en totalité.

LORANTHEES. Lurantheœ. mot.

man. Cette famille naturelle de Plantes, qui a pour types le Loranthus et le p'iscu/n, a d'abord été indiquée par le professeur Richard sous le nom de Viscoïdées, dans son Analyse du Fruit, p. 55. Un peu plus tard, Jussieu l'a décrite sous celui de Loranthées (Ann. Mus. la, p. 285), nom qui a été généralement adopté.

Cette famille peut être caractérisée de la manière suivante : les fleurs sont généralement hermaphrodites , trèsrarement unisexuées et dioïques; le calice est adhérent avec l'ovaire infère; son limbe forme un rebord souvent peu distinct, quelquefois légèrement denté. Ce calice est accompagné extérieurement, soit de deux bractées , soit d'un second calice cupuliforme, ou enveloppant et cachant quelquefois entièrement le véritable calice. La corolle se compose

104 LOR

de quatre à cinq pétales insérés vers le sommet de l'ovaire; ces pétales sont quelquefois entièrement distincts les uns des autres, d'autres fois soudés entre eux dans une étendue plus ou moins considérable, de manière à représenter une corolle monopétale.

Les étamines sont en même nombre que les pétales; elles sont sessiles ou portées sur des filets quelquefois très-long, et chacune d'elles est attachée au milieu de la face interne de chaque pétale. Leur anthère est allongée, à deux loges, s'ouvrant par un sillon longitudinal. Les anthères du Gui, par leur singulière organisation, s'éloignent de celles des autres Loranthées. L'ovaire est généralement infère, quelquefois seulement semi-infère; il offre une seule loge qui ne contient qu'un ovule renversé. Cet ovaire est couronné par un disque épigyné étendu, sous forme d'anneau, en dedans de l'insertion de la corolle; le style est souvent long et grêle, quelquefois manquant entièrement; le stigmate est souvent simple. Le fruit est généralement charnu, contenant une seule graine renversée, adhérente avec la pulpe du péricarpe qui est gluante et visqueuse. Cette graine renferme un endosperme charnu, dans lequel on trouve un embryon cylindrique, ayant la racine supérieure, c'est-à-dire tournée vers le haut. La graine étant renversée, cette racine est quelquefois un peu saillante en dehors, par une ouverture qui se trouve à l'endosperme, ainsi qu'on le voit dans le Gui par exemple. Il arrive quelquefois qu'un même endosperme renferme plusieurs embryons.

Les Loranthées sont pour la plupart des Plantes vivaces et parasites, quelques-unes sont terrestres. Leur tige est ligneuse et ramifiée; les feuilles sont simples et opposées, entières ou dentées, coriaces et généralement persistantes, sans stipules.

Les fleurs sont diversement disposées, tantôt solitaires , le plus souvent groupées en épis , en grappes, ou

LOR

en panicules axillaires ou terminales,

Les genres rapportés à cette fa- :

mille par Jussieu sont, outre le *Lo- 1 ranthus* et le *Fiscum*, le *Bkizop/iura*, '• L. , V *Aucuba* de Thunberg , le *C/doranlhus* de l'Héritier, le *Codonium 1* de Vahl. Mais Robert Brown a modifié cette réunion de genres. Ainsi il en a retiré avec juste raison le *Rhi- zophora* , qui a un ovaire à deux loges polyspermes , des graines dé- > pourvues d'endosperme , et un embryon dont la germination hâtive se] fait quand la graine est encore ren- I fermée dans son péricarpe , et que ■ celui-ci tient encore à la Plante-mèié.

Il en a formé un ordre naturel nouveau, sous le nom de *Rhizophorées* , auquel il a réuni les genres *Bru- i guiera* et *Carallia*. Plus récemment i le même botaniste a fait du genre *C/i/ora- niàusde* l'Héritier le type d'une i nouvelle famille qu'il a nommée *Chloranthées* , famille qui a été adoptée par J. Liudley. Mais nous ne partageons pas entièrement la ma- i nière de voir du célèbre botaniste anglais sur l'organisation de ce genre.

Il le décrit comme tout-à-fait dépourvu de péricarpe, tandis que nous pensons qu'il a un péricarpe double. En effet , dans le *Ckloranthus inconspicuus* , la seule espèce qui nous soit connue, nous avons trouvé un ovaire infère , c'est-à-dire adhérent avec le calice. Celui-ci forme du côté i externe \:n petit rebord entier qui en est véritablement le limbe. La corolle , se compose de quatre

pétales soudés , ensemble par leur base , les deux moyens étant entièrement réunis et n'en formant qu'un seul; chacun de ces pétales porte à sa face interne une anthère sess'ile allongée, à deux loges, s'ouvrant par un sillon longitudinal. (Robert Brown, au contraire, ne mentionne pas le limbe calicinal , et pour lui les pétales ne sont que des filets d'étamines dilatés et pétaloïdes. Mais nous ne saurions adopter cette manière de voir, et l'analogie vient à l'appui de notre opinion. En effet, il est évident que, dans ce genre, l'ovaire est infère ; ce que prouve l'in-

LOR

sertion épigyne : la corolle : eu second lien , ce genre est bien certainement pourvu d'une corolle. L'analogie le prouve encore. En effet, l'organe que nous avons considéré dans ce genre, comme la corolle, est absolument analogue et semblable pour sa position à la corolle des autres Loranthées; comme elle, elle porte les étamiries. Mais il existe entre le *Cyloranthus* et les Loranthées une différence bien plus importante; c'est la position de l'embryon. Dans toutes les premières, cet embryon est placé au sommet de l'endosperme , et sa radicule est tournée vers le bile.

Dans le *Cyloranthus* , au contraire, l'embryon a une position et une direction tout-à-fait opposées , c'est-à-dire qu'il est placé à la partie inférieure de l'endosperme , et que sa radicule est tournée vers la partie inférieure du péricarpe, tandis que les cotylédons sont dirigés vers le bile. Cette différence est la seule de quelque importance qui existe entre le *Cyloranthus* et les Loranthées.

Suffit-elle pour séparer ce genre et en faire une famille distincte? Nous ne saurions nous prononcer dans cette question.

La famille des Loranthées se distingue surtout des Caprifoliacées, auxquelles elle était d'abord réunie, par sa corolle le plus souvent polypétale, par ses étamines opposées aux divisions de la corolle, par son ovaire constamment uniloculaire, contenant un seul ovule renversé.

Cette famille doit être placée entre les Caprifoliacées et les Rubiacées.

Robert Brown, au contraire, la rapproche des Protéacées, parce qu'il considère également les Loranthées comme apétales. (a. r.)

* LOREE. Lorea. bot. cryvt.

(Hydrophytes.) Notre collaborateur Lamouroux paraissait avoir le dessein de former un genre du *Fucus loreus*, L., qui est *V. Himantalia lorea* de Lyngbye; il indique ce genre sous le nom de Lorea dans son article Fu- < i s du présent Dictionnaire, ainsi

LOR 50.1

qu'au mot *Himantalia* v. Cependant le genre auquel Lyngbye a donné cette dernière dénomination nous paraît très-bon, et surtout parfaitement nommé, Lorea étant un adjectif lequel qu'il employait souvent Stackhouse qui, en fait de nomenclature, n'est pas un modèle à suivre. Nous caractériserons conséquemment avec Lyngbye le genre dont il est question, soit qu'on adopte l'un ou l'autre nom : (ronde comprimée, dichotome, partant d'une base cyathiforme, dont la fructification consiste en des tubercules nombreux, épars sur toute la surface de la Plante.

Nous connaissons deux espèces de ce genre : *Himantalia lorea*, Lyngbye, Tent., p. 36, tab. 8, a; *Fucus loreus*, L., Turn., tab.

196 (médiocre) ; Slackh. , Nér. Brit. , lab. 10 (bonne), dont le *Fucus etongatus*, L., est un double emploi , et dont la base cyathiforme ou lurbiuée a été décrite et figurée à part dans la Flore de Norwège sous le nom à *Ulva pruniformis*. Cette Plante , commune sur les rochers que la mer découvre rarement, sur toutes les côtes océanes de l'Europe, et dont nous avons vu particulièrement des individus énormes , à Belle-Ile-en - Mer, sur la rive dite de la Mer sauvage , s'accroche dans les fentes par un empâtement d'où s'élève comme une capsule très-évasée, fermée d'un diaphragme, d'un à deux pouces de longueur et de diamètre, du centre de laquelle sort une fronde en manière de lanière légèrement comprimée, épaisse comme le doigt, et se divisant régulièrement à l'infini , de distance en distance, en dichotomies, jusqu'aux extrémités de la Plante qui est consistante, enduite d'une certaine viscosité , longue de deux à dix pieds, très-flexible , mais capable de résister aux plus grands efforts de la vague courroucée. Il arrive cependant que les lanières, qu'on dirait de cuir, sont parfois détachées de la base cyathiforme ou turbinée; alors pelotonnées par la lame, elles sont rejetées sur le rivage en grands amas

504 LOR .

inextricables. La couleur générale est olivâtre , tirant sur le bistre , toute piquetée de noirâtre quand la Plante est en fructification.

L'expédition de la Coquille nous a rapporté une seconde espèce de ce genre que nous nommerons *Himantalia Duivilloei*; elle vient des côtes de la Conception au Chili. Egalement dichotomes , les divisions en sont plus rapprochées, la base de la tige est plus

grosse , et les extrémités s'aplatissent au point fie devenir foliacées ou. membraneuses, sans néanmoins s'élargir. (b.)

* LORENTEA. bot. phan. Ortega avait constitué sous ce nom un genre connu antérieurement sous celui de Sanuitalia. V. ce mot. Lagasca s'est servi de la même dénomination pour désigner un nouveau genre de la famille des Synanlhérées que Cassini établit également , niais un peu plus tard, et qu'il nomma Cklonia. Il appartient à la tribu des iagétinées , et selon Cassini , on doit le placer entre les genres Pectis et Cryptopeialon , dont il ne diffère que par la stiueture de l'aigrette. Ces légères différences ne paraissent pas suffisantes pour autoriser des distinctions génériques. V. P-ECTIS. (G..N.)

LORI. ois. Pour Lory. V. ce mot.

DB..Z

LORICAIRE. Loricaria. rois.

Dernier genre de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux , de la famille des Siluroïdes de Cuvier et de celle des Olophores , parmi les Ilobianches abdominaux de Uuméiil, établi par Linné dans l'ordre des Abdominaux. Il a pour caractères : des plaques anguleuses et dures cuirassant entièrement le corps et la tête, se distinguant des Silures, cuirassés par la bouche placée sous le museau ; cette bouclie présente quelque analogie avec celle qui distingue parmi les autres Siluroïdes le sous-genre Synodonte. Les Loricaires ont encore des inlermaxillaires petits, suspendus

ous le museau , et des inaudibulaires transverses et non réunis, portant

LOR

des dents longues , grêles, flexibles et terminées en crochet; un voile circulaire , large et membraneux , entoure l'ouverture de celte bouche; les os pharyngiens sont garnis de nombreuses dents en pavé. Les vrais opercules son t immobiles comme dans les Asprèdes; mais deuxpelites plaques extérieures paraissent en tenir lieu. La membrane branchiostège a quatre rayons. Le premier rayon de la dorsale , des pectorales et même des ventrales, sont de fortes épines. On n'y trouve ni cecum , ni vessie aérienne. Les Poissons de ce genre sont répartis dans les deux sous-genres suivans.

frlYrosTOMES , qui ont une deuxièr me petite dorsale munie d'un seul rayon comme dans les Callichtes.

Leur voile labial est simplement papilleux et porte un petit barbillon de chaque côté. Ces Poissons n'ont pas de plaque sous le, ventre. Leurs intestins , roulés en spirale, sont Irèsgrêles et douze à quinze fois plus longs que tout le corps. On les pêcieie dans les rivières de l'Amérique méridionale.

Le Loricaria cataphracta de Schneider , qui n'est pas celui de Linné ; le Loricaria Plecoslomus , L. , Gmel. , Syst. Nat., xni, T. i, p. i565; Bloch, pl. 374 ; Guacuri de Marcgraaff, Brasil. , 166; Encycl. Pois. , pl. 65, f. 260; Lac, Pois. T. v, pl. 4, f. 2 , représenté par Séba, T. ni, t. 29, f. 11, et une autre c:-pèce inédite que nous avons entrevue dans les galeries du Muséum, complètent ce sous-genre.

-j-f Lobicaire proprement dite, qui n'ont qu'une dorsale située en avant; le voile labial garni sur les bords de plusieurs barbillons et quelquefois hérissé de villosités ; le ventre garni de plaques en dessous , et les intestins de grosseur médiocre.

Le CuuiAssÉ , *Loricaria cataphracta*, L., Gmel., loc. cit. ; p. 1566 ; cirr/wsa de Schneider et setigera de Lacépède ; le Plécoste, Encycl. Pois., pl. 65, f. 2.ig, illoch, pl. 575, f. a, représenté par Séba, T. 111, tab. 29 , fig. 14, a sa nageoire caudale four-

LOR

LOR

chue, ayant le premier rayon de son lobe supérieur très-allongé, et dépassant quelquefois même le corps en longueur, caractère qui est imparfaitement indiqué dans plusieurs figures faites sur des individus desséchés qui avaient été mutilés. C'est encore un Poisson des eaux de l'Amérique méridionale. Le *Loricaria maculata* à Bloch, pl. 57.r>, f. 1, dont Lacépède le a représenté une variété , T. v, pl. 4 , f. i , appartient encore à ce sous-genre. (b.)

* LORICAIRE. *Loricaria*. polyp.

Genre de l'ordre des Cellariées dans la division des Polypiers flexibles, établi par Lamouroux aux dépens des Sertulaires. Caractères : Polypier phytoïde , comprimé, articulé, Irrameux; rameaux nombreux, presque diotomés ; chaque articulation composée de deux cellules adossées, jointes dans toute leur longueur ; ouvertures latérales situées dans les

Earties supérieures des cellules , semblables à une cuirasse très-étroite à sa base. Ce genre, que Lunouroux a séparé des Cries, à cause de la forme singulière des cellules des Polypiers qu'il y rapporte , ne renferme encore que les Loricaria eurypœa et americana. (e. d..L.)

* LORICAIRE. Loricarla. bot.

cryft. (Hydruphytes.) Nous trouvons dans l'article Fucacees de feu notre collaborateur Lamouroux (T. vu, p.

71 de ce Uict.) ce nom proposé comme celui d'un genre nouveau formé aux dépens des Fucus, mais dont les caractères ne sont pas même indiqués. Il eût répondu probablement à celui pour lequel dans l'article Fucvs(ibid., p. 78) il propose le nom de Lorca (V. ce mot); on ne peut admettre ce nom", puisque Loricaire était antérieurement consacré en zoologie. (B.)

LORICÈRE. Loricera. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères , famille des Carnassiers, tribu des Carabiques , division des Thoi aciques , établi par Latreille, et ayant pour caractères : an-

tennes courtes , ayant les troisième, quatrième et cinquième articles plus courts et plus gros que les autres et velus; derniers articles des palpes intermédiaires et postérieurs, presque cylindriques; côté interne des premières jambes lorlement échancré.

Ce genre diffère des Pogonophores, Omophorons et Nébries , par les jambes antérieures qui, dans ceux-ci, n'ont point d'échancrure intérieure; ils s'éloignent des Elaphres et genres voisins par des caractères tirés des antennes, des yeux et des formes du corps. Ces Insectes sont allongés et très-voisins par la forme des

Harpales ; la tcle est petite , ovale , et terminée en arrière par un cou un peu déprimé; les yeux sont saillans; le corselet est presque orbiculaire, tronqué et rebordé ; les pâtes sont assez longues et les tarses sont terminés par deux ongles égaux. Les Loricères se trouvent sous les pierres , dans les lieux humides et au bord des rivières. Nous en avons trouvé beaucoup à Amiens, sous la Mousse et au pied des Arbres, dans 1ns bois.

L'espèce qui sert de type au genre , et qui se trouve dans le nord de la Fiance et à Paris, est:

La Loricèïe bronzée , *Loricera œnea* , Latr. ; *Carabus pilicornis* , Fabr. Longue de trois lignes; d'un noir bronzé en dessous , d'une belle couleur d'airain en dessus ; élytres striées, ayant chacune trois points enfoncés disposés en ligne dans le sens de la longueur. (g.)

LORIOT. *Oriolus*. ois. Genre de l'ordre des Omnivores, dont les caractères sont : le bec en cône allongé, comprimé horizontalement à sa base , tranchant; la mandibule supérieure relevée par une arête , échancrée à sa pointe ; les narines latérales , nues, percées à peu près horizontale-, ment dans une grande membrane; trois doigts devant et un derrière; le tarse plus court que le doigt du milieu , ou de même longueur; l'externe réuni à ce dernier; les ailes medio-

LOR

LOR

cres, avec la première rémige très-courte , cl l'a deuxième moins longue que la troisième; celle-ci étant la plus longue de toutes. Les Lorient ont ainsi des rapports assez intimes avec les

Merles, dont ils se distinguent d'ailleurs facilement par la grosseur de leur bec et la brièveté de leur tarse. Ces caractères sont surtout prononcés dans certaines espèces; et ordinairement le degré d'exagération de l'un d'eux correspond à celui de l'autre ; eu sorte que quelques Loriots qui ont le bec un peu plus grêle, ont aussi le tarse un peu plus allongé; tel est particulièrement le Prince-Régent qui se trouve ainsi un peu plus voisin des Merles. Les Loriots se rapprochent aussi des Troupiales à d'autres égards et particulièrement par la disposition de leurs couleurs ; Linné , Latham et Gmelin avaient même réuni les uns et les autres dans leur genre Oriolus; mais Daudin, Vieillot, Temminck et Cuvier ont reconnu que les Troupiales s'éloignent sous beaucoup d'autres rapports des vrais Loriots , et les en ont séparés pour en former un genre particulier sous le nom *Icterus* :

dans la méthode de Cuvier, les Loriots et les Ictères ou Troupiales sont même placés dans des familles toutes différentes. Le genre Oriolus se trouve ainsi composé uniquement d'espèces de l'ancien continent et de l'Australasie , tandis que tous les Troupiales sont au contraire répandus seulement dans l'Amérique. Ainsi nous voyons encore ici, comme dans le plus grand nombre des cas , les divisions que commandent les caractères zoologiques des êtres, correspondre à celles qu'indiquerait leur distribution géographique. Les Loriots vivent dans les bois, ordinairement par couples, mais ils se réunissent par famille pour leurs voyages périodiques ; ils se tiennent habituellement sur les branches les plus élevées des Arbres, et attachent à leur extrémité leur nid qu'ils forment de brins de paille et de chanvre artistement entrelacés avec des rameaux , et dans lequel ils

mettent ensuite îles plumes, des toiles d'Araignées et de la Mousse. lis se nourrissent également ou d'Insectes et de Vers, ou de différentes sortes de baies, et paraissent même plutôt frugivores qu'insectivores.

Presque toutes les espèces se ressemblent par leur plumage; ce qu'au reste on observe à l'égard de presque tous les genres vraiment naturels. Les couleurs des mâles sont le jaune et le noir, et celles des femelles, le jaune verûâlre et le noirâtre. Les jeunes mâles ressemblent à ces dernières dans leur premier âge , et ils ne revêtent complètement le plumage propre à leur sexe qu'à la troisième anuée.

Loriot de la Chine. F~. Loriot rieur.

LoniOT CoUDOUGNAN ou CoUDOU- GAN. V. LoiiLOT RIEUR.

Loriot Coula van , Bu Cf. , Pl. enl.

50, Oriolus chinensis, Lath., a le bec de même forme que chez le Loiiifit d' Eu rope , m ais pl us gros e t les co u le urs du plumage généralement semblables à celles de cette espèce. Il se distingue d'ailleurs facilement par une large bande noire qui s'étend d'un côté du bec à l'autre , en passant sur les yeux et l'occiput , et par les couvertures des ailes qui sont jaunes. De la Chine, des îles de la Sonde, et surtout de la Cochinchine.

Loriot d'Europe, Oriolus Galbula, L., est l'un des plus beaux Oiseaux de France. Sa taille est à peu près celle du Merle. Le corps et la tête sont , chez le mâle, en dessus et en desous, d'un beau jaune, à l'exception d'une petite tache noire qui va du bord inférieur de la mandibule supérieure à l'œil. Les ailes sont noires

avec une tache prune sur leur milieu , et un petit liséré blanc-jau-nâtre à l'extrémité des pennes. La queue est noire dans ses deux premiers tiers, jaune à son extrémité ; les deux pennes médianes n'ont cependant qu'un liséré jaune. Le bec est rouge. La femelle est eu dessus d'un vert olivâtre , en dessous d'un gris mêlé de jau-nâtre, avec de petites lignes bru-

LOR

nés. Enfin le croupion est jaune, les ailes brunâtres , et la queue d'un brun-vert olivâtre avec un peu de jaune à son extrémité. Cette Cfpèce est, lors de son passage, assez commune dans différentes parties de l'Europe , et particulièrement en France et en Hollande; elle arrive dans nos contrées vers le milieu du printemps et les quitte en automne.

Loriot grivelé , *Oriolus rnaulalus* , Vieill. De Java. Il paraît n'être qu'un jeune âge.

Loriot d'Or ou Lorigdor , Vaill., Ois. d'Air. , 160; *Oriolus auratus* , Vieill. Généralement d'un beau jaune avec une tache noire autour de l'œil; les pennes des ailes noires avec une bordure jaune ; les deux médianes de la queue noires, avec l'extrémité jaune; les suivantes jaunes sur une plus grande étendue , et l'externe entièrement jaune. Bec d'un brun rouge foncé. Cette espèce habite le sud de l'Afrique et la Côte-d'Or.

Loriot de paradis, *Oriolus aureus*, Cmel. ; *Oriolus paradiseus*, Dumont, a été long-temps placé parmi les Oiseaux de Paradis, sous le nom de Paradis orangé , à cause de l'éclat de son plumage; mais il a été reporté enfin parmi les Loiois par Lcvaillant, Vieillot et Temminek. 11 est à peu près de la taille du Loriot d'Europe.

La gorge , les bords du bec , une grande partie de l'aile et la queue, à l'exception d'une petite tache jaune placée à l'extrémité, sont noirs ; la tête , le col , et la parure que forment les plumes très-allongées du col ,sont d'une belle couleur orangée; le reste du corps est généralement jaune.

La femelle de ce magnifique Oiseau est généralement olivâtre; et il paraît ue les jeunes mâles lui ressemblent ans leur premier âge. L'espèce habite les Moluques.

Loriot Prince-Régent , *Oriolus Regens*, Quoy et Gaim. Cette espèce, que l'éclat et la iichesse de son plumage rapprochent du Loriot de Paradis, dont au contraire il s'éloigne par ses formes, est généralement d'un beau noir velouté, avec le dessus de

LOR 507

la lêlc et du col couvert de plumes courtes, tiès- seiiées , d'un jaune orangé , et les pennes secondaires d'un beau jaune éclatant. <<)uoy et Gaimard ont donné dans la Zoologie du "Voyage autour du monde une très-bonne figure de cette espèce; et on en voit maintenant au Muséum un bel individu donné par Gai not et Lpssoii. Elle habite la Kouvelle-Uolla ode.

Loriot rierc, Vaill., Ois. d'Afr., 265 , Oiiolus melanocephalus , Gmcl.

Tête et poitrine noires ; couveitures des ailes jaunes; bout des pennes alaires jaune; toute la queue étant aussi de cette couleur, à l'exceptiou d'une portion des pennes médianes qui est noii e. Le Coudougnan ne différerait pas spécifiquement du Loriot rieur, suivant plusieurs ornitholo-gistes ; il paraît cependant avoir la

queue noire sur une beaucoup plus grande étendue, et le bec plus petit.

Le Lorient rieur habite l'Inde, et le Coudougnan l'Afrique méridionale.

Lorient varié, *Oriolus variegatus*, Vieill. Habite la Nouvelle-Hollande, et est ainsi décrit par Vieillot : le front noir ; le dessus du corps , le col et la gorge mélangés de blanc, de noiset de verdâtre: les flancs jaunes , le dessous du corps blanc avec des taches noires; la queue noirâtre avec une bordure d'un gris bleuâtre, et une grande tache blanche au bout des huit plumes latérales.

Lorient a ventre blanc, Temm., Pl. col. 214, *Oriolus xanthognathus* , Horsf. Habite Java. Le mâle est d'un jaune vif sur le dos , les scapulaires , les couvertures d'en dessous de la queue et l'extrémité interne de toutes les plumes latérales de la queue ; d'un beau noir sur la tête, le col , la poitrine, les ailes et la queue; tout le ventre est blanchâtre avec de petites taches noires sur le milieu des plumes. Ce Lorient, le plus petit de tous, n'a que six pouces six lignes de long

Lorient vert , *Oriolus viridis* , Vieill. ; *Gracula viridis* , Lath. A près de dix pouces de long. 11 l.

508 LOR

généralement d'un vert pâle avec des taches brunes et noisâtres à la gorge, le dessous du corps blanchâtre avec des stries noisâtres ; les ailes et la queue noisâtres ; le bec de couleur de corne et les pieds noirs. De l'Australasie. (is. g. st.-ii.)

LORIPÈDE. Loripes. conçu. L'Animal de la Lucine lactée qui a servi à Poli pour l'établissement de ce genre est probablement

semblable à celui des autres Lucines autant qu'il est possible d'en juger par l'identité des caractères des coquilles comparés entre eux; nous ne pensons pas d'après cela qu'il soit nécessaire de séparer en deux genres des Coquilles analogues jusqu'au moment où la connaissance de l'Animal d'une autre Lucine soit venue confirmer ou détruire l'analogie que nous croyons maintenant suffisamment fondée. V . Lucine. (d..h.)

* LORIPES. jioll. (Ocken.) V.

Cypiune.

LORIQUE. bot. piian. Le tégument propre de la graine ou l'épi — spermeest quelquefois formé de deux lames dont l'une est extérieure, souvent crustacée comme dans le Ricin que Gaertner nommait Testa, et Mirbel Lorique. V. Episppkme. (a. h.)

LORIS. Loris, mam. Genre de Quadrumanes Lémuriens , très-remarquable par les formes sveltes du corps ; par les membres grêles et allongés; par la tête arrondie, en même temps que le museau est relevé, et le nez prolongé en boutoir; par les yeux ronds, d'une extrême grandeur, et seulement séparés par une cloison osseuse très-mince , l'ouverture du canal lacrymal étant d'ailleurs placée hors de l'orbite. Les oreilles sont arrondies , et les narines s'ouvrent sur les côtés d'un mulle glanduleux , divisé sur la ligne médiane par un sillon qui se prolonge sur toute la lèvre supérieure, où se voit même une légère échancrure.

La queue est tout-à-fait nulle , du moins à l'extérieur > car il

LOR

existe cinq vertèbres coccygiennes.

Les membres diffèrent principalement de ceux des Makis par leur plus grande longueur et leur extrême gracilité : ils sont tous pentadactyles et terminés par une véritable main , c'est-à-dire qu'ils ont tous le pouce distinct et opposable; celui du pied de derrière est surtout très-allongé et très-séparé des autres doigts. Les ongles sont tous larges et plats , excepté celui du second doigt du membre postérieur qui est étroit , pointu et arqué , caractère qui se trouve généralement chez tous les Lémuriens , et particulièrement chez les Makis. Le tibia est plus long que le fémur, et le tarse et le métatarse sont égaux. Le système dentaire a beaucoup de rapports avec celui des Galagos. La mâchoire supérieure a à chaque côté deux petites incisives séparées des deux autres par un intervalle vide; une canine, et six mâchelières , dont les trois premières ne sont que de fausses molaires; les trois dernières ont deux pointes en dehors , et un large talon avec deux tubercules en dedans; la moyenne est la plus grande des trois , et la troisième la plus petite. A. la mâchoire inférieure , il y a de chaque côté trois incisives allongées et pointues, contiguës à celle de l'autre côté, et surtout remarquables par leur position proclive ; une canine qui passe en arrière et non pas en avant de la canine supérieure, et cinq mâchelières , dont deux fausses molaires; les deux premières vraies molaires ont quatre tubercules pointus , la dernière en a cinq. Chaque mâchoire se trouve ainsi avoir dix-huit dents, nombre qui se trouve également chez les Galagos et chez les Makis.

L'organisation intérieure du Loris n'est pas bien connue encore; cependant on doit à Uaubeuton la connaissance de plusieurs faits intéressants. On devait s'attendre , chez un Animal dont le corps est si allongé et si grêle , à trouver un grand nombre de vertèbres : il en existe en

LOR

effet quinze dorsales et neuf lombaires. Les mamelles , pectorales comme chez tous les Quadrumanes , sont au nombre de quatre, mais il paraît qu'il n'existe que deux glandes mammaires. Les organes de la génération ressemblent , à beaucoup d'égards , à ceux des Makis; mais le clitoris est surtout remarquable chez la tèmelle ; il soit de l'extrémité inférieure de la vulve, cl ii est si gros qu'il semble occuper une partie de cette ouverture . il a autant de grosseur que le pénis du mâle , et autant de longueur au dehors de la vulve; son extrémité est partagée en deux petites branches entre lesquelles se trouve placé l'orifice du canal de l'urètre, comme l'a constaté Dmbenlon , en injectant par le clitois de l'air dans la vessie. « De tous les Animaux que nous avons disséqués, dit l'illustre collaborateur de Butlbii (T.

XIII, p. iii8), la femelle du Loris est ila setde dont l'urètre suive le corps du clitoris , et perce le gland comme

- dans la verge et le gland des mâles. ■» Les analomistes ont à peine l'ail attention à ce fait , découvert il y a qua-

itre-vingts ans par Daubcntou ; il en test peu, cependant, qui méiitenl

autant d'être remarqués. Ainsi se i trouve démontrée, de la manière la jplus complète et la plus certaine , l'ainalogie du clitoris avec le peu is du îmâle ; en effet , tandis que chez certains Oiseaux, nous voyons le pénis i rudimentai e comme le clitoris de la t femelle, et imperforé comme lui {pr.

'Clitohis ; et Geoffroy Saint-Ililaire ,

Mém. du Mus. d'Hisl. Nal. IX), le

- clitoris réalise au contraire, chez le 1 Loris, toutes les conditions d'un véritable pénis ; rapport bien renia r- •quable , surtout quand on songe que ile Loris est un Quadrumane, c'csl-àalire un des Mammifères que son organisation rapproche le plus del'-Homme ; et d'autant plus important que

- l'unité de composition organique ne .peut reposer sut une base solide qu'autant que l'analogiede l'organe femelle et de l'organe mâle est démontrée.

sSi, eu effet, il u'y avait pas imité

LOR f,og

de composition pour tous les individus de la même espèce, comment l'admettre pour l'universalité des êtres?

Le Loius grêle , Loris gracilis , Geoff. St -Hil.; le Lorus, liull'.xiii, xxx, p. a 10 ; Tardigradus , Séba, est la seule espèce de ce genre établi par Geoffroy-Saint-Hilaire (Mag. , Encyc. T. vu, 1796), sous le nom de Loris , adopté depuis par tous les zoologistes , exceplé par Illiger qui l'a nommé Stenops. — Il habite Ccy — lan , et le nom de Loris ou Loeris est celui que les Hollan lais lui ont donné. Son pelage est généralement roussâtre; mais il a le tour des yeux roux; un;: tache blanche sur le front; le bout du museau , les côtés de la tête , la mâchoire inférieure , le dessous du col de couleur blanchâtre ; la poitrine et le ventre mêlés de blanchâtre et de cendré; enfin, la face interne des membres et les pieds, de couleur grise, teinte de blanchâtre ou de jaunâtre'* Sa taille esta peu près celle de l'Ecureuil ; son poil est très-lin , très-doux et laineux. Ses habitudes sont peu connues. On sait cependant qu'il eu fort lent dans ses .111011veiuens ; qu'il dort presque tout le jour, et qu'il se nourrit de fruits, d'oeufs, d'Insectes.

G. 1 rischer (V. Lettre à Geoffroy sur une nouvelle espèce de Loris) a décrit comme une nouvelle espèce, un *Quadrumane* qu'on ne considère généralement que comme une variété d'âge du Loris grêle de Geoffroy. 11 lui avait donné le nom de *Lotis ceylanicus*. Le Loris du Bengale de Bufl'on , et quelques autres espèces nommées quelquefois aussi Loris , appartiennent au genre *Nycticèbe* de Geoffroy Sainl-Hilaire. V. ce mot.

LOS

son travail sur les Orchidées d'Europe , a fait sous ce nom un genre nouveau pour les *Satyrium hircinum* et *anropuphorum* de Linné , placés par Swartz dans le genre *Orc/iis*. Voici les caractères du genre *Lornglossum* :

le calice est on forme de casque ; le Libelle est allongé , à trois divisions étroites , dont la moyenne est bil'nle; l'éperon est très-court ; le gynostème et l'anthère ont la même forme que dans le genre *Orchis* , mais les devix masses polliniques sont attachées sur un même rétinacle, renfermé dans une petite poclie , comme dans les vrais *Sérapias* , tandis que dans les espèces d'*Orchis* , qui toutes sont éperonnées , chaque masse pollinique est insérée sur un rétinacle particulier. Les espèces de ce genre ont absolument le port des *Orchis*. Comme eux , elles offrent deux gros tubercules ovoïdes, blancs, charnus, une tige portant des feuilles engainantes , et des Heurs disposées en un épi dense au sommet delà lige. Le *Loroglos- .sum hircinum* , Rich. , /oc. cit. ; *Satyrium hircinum* , L., croît dans les bois couverts et sablonneux , où. il se fait reconnaître par son odeur de bouc extrêmement forte et

désagréable. Sa tige a environ un pied et demi à deux pieds de hauteur. Ses fleurs sont d'un vert pâle, tachetées de pourpre. Son labelle est excessivement long et étroit; La division moyenne, qui a environ un pouce et demi de longueur, est bifide à son sommet. Le *Loruglussum antropophorum* , Rich. ; *Satyrium antropophorum* , L , est moins grand que le précédent, il croît sur les pelouses découvertes à Fontainebleau , et dans beaucoup d'autres parties de la France. Ses fleurs sont légèrement purpurines, et leur labelle , par sa figure singulière , a quelque ressemblance avec un homme pendu. (a.r.)

LORY. ois. Sous-genre de Perroquets. P*. ce mot. (b.)

LOSET. moll. Adanson (Voy. au Serrégv, pl. 9, fig. 33) nomme ainsi une petite Coquille qui doit nparle-

LOT

nir au genre Fuseau , et que Gmelin a placé dans les Murex , sous le nom de Murex fusiformis {Syst. Nat. , p.

LOSS. M Ait. V. Elan, au mot Cerf.

LOSSAN et LOSSON. ins. L'un des noms vulgaires delà Calandre du Blé. (b.)

LOT ALITE ou LOT AL ALITE.

Miv. (Seweigin, Actes de l'Acad. de Pétersbourg, T. xv, p. 485.) Variété de Diallne verte , trouvée près de Loiala en Finlande. (g. del.)

LOTE ou LOTTE, pois. Espèce de Gad'e devenue le type d'un sous-

?énéré. ,V. Gade. On a encore appe- , é Lote vivipare , la Blen-
 nie ; Lote de Hongrie , le grand Silure commun , ou Glanis'; Lote
 Barbotte ou Lote , franche, leCobite; grande Lote, la Lingue, etc.
 (b.) ■

LOTEA. bot. ph.vn. Ce genre , 1
 proposé par Médicus et Möench, ne r
 forme plus qu'une section des Lolus il
 dcDeCandolleetSeringe. /^.Lotier. p
 LOTEN. bot. crypt. Adanson l
 nommait ainsi un génie composé de L
 toutes les espèces de Byssus de Mi-]>
 clieli et de Dillen. Ces espèces fila- h
 menteuses font maintenant partie |>
 d'un grand nombre de genres dis-- «.
 tincis dans les familles des Algues et ii
 des Champignons. (G..N.) \,
 *LOTÉES LotecB. bot. phan. C'est la
 le nom donné par De Candolle , dans li
 le second volume de son Prodrômus , V
 et dans le sixième Mémoire sur les "r
 Légumineuses, à la seconde tribu de 11

cette famille. Elle est caractérisée par jti
sa corolle papilionacée ; ses élimines) i
monadelphes ou diadelphes ; son lé- ><;
gume coutinu , uniloculaire ou rare- |<
ment biloculaire par l'introflexion de ci l'une des sutures; son
embryon ho-
motrope dont les cotylédons sont p!a- ti,
niuscules, et se développent par la nj;
germination en feuilles munies de \
stomates. Cette tribu contient un très- k, grand nombre de
genres répartis en
cinq sous-tribus , savoir: i° Génis- \

LOT

tées; aQ Trifoliées; 5J Clitoriées ; 4" Galégées ; f>° A.straga-
lées. pour l'énumération des genres le mot Légumineuses. (G..N.)

LOTIER. Lotus. vv. phan. Genre de la famille des Légumi-
neuses , et de la Diadelphie Décandric, L., caractérisé delà ma-
nière suivante par Seringe (in De Candolte Prodrutn.

Syst. Peget., 2, p. 209) : calice tubuleuxà cinq divisions pro-
fondes ; ailes de la corolle presque égales à l'étendard; carène en
forme de bec; style droit; stigmatte oubulé ; légume cylindracé ou
comprimé, dépouivu d'ailes ou de bordures foliacées. Ces carac-
tères excluent du genre Lutus plusieurs Plantes que Linné y avait

réunies. C'est ainsi que le *Dorycuiuni* de Tournel'ort et le *Tctragonolobus* de Scopoli ont été rétablis par Seringe (loc. cit.), qui a placé dans le premier de ces genres plusieurs espèces linnéennes de *Lutus*, le'. les que les L.

rectus, græcus et hirsutus , et , dans le second , les espèces remarquables par leurs légumes munis de boi dures foliacées; telles sont les Plantes que Linné nommait L. tctragonolobus et L. siliquosus. Le genre Lotier. débarrassé de ces Plantes hétéiomorphes , renferme encore uue cinquantaine d'espèces pour la plupart indigènes du bassin de la Méditerranée.

Quelques-unes habitent d'autres contrées assez éloignées, telles que les Indes-Orientales , le cap de lionne- Espérance , la Nouvelle-Hollande , la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du ' nord. Ce sont des Plantes herbacées, ; à feuilles palmées, trifoliées , à stipules foliacées. Les tleurs,dc couleur jaune, rarement blanchâtres ou ro- :ses, au nombre de une à six, sont ipoi téés sur des pédoncules axillaires ici accompagnées d'une feuille florale.

Seringe {lue. cit.) a disposé les espètees de Lotus eu trois sections. La preumière, à laquelle il a donné le nom de *Krokeria*, qui était employé par *Mœench comme générique; se distingue à son légume renflé , succulent , 'Couibé, et à ses fleurs au nombre de

LOT 5n

une à deux seulement. Elle ne se compose que d'une seule espèce, le Lotier comestible, L. edulis, L., Plante qui croît naturellement dans le midi de l'Europe et en Egypte.

Elle a des tiges légèrement couchées, velues, des feuilles à trois folioles, obovales; des fleurs jaunes, axillaires, solitaires ou

gémînées. Leurs gousses sont tenîlies , succulentes , d'une saveur douce, analogue à celle des petits Pois , et se mangent dans quelques pays. Sa culture étant facile sous le climat de Paris , Bosc a conseillé de l employer pour nourrir les bestiaux et surtout les CocIiods.

La seconde section formait le genre *Lotea* de Mécîcus et Mcench. Elle est caractérisée par sou légume long et comprimé; ses fleurs presqu'en.

ombelles. On y a réuni cinq espèces dont la principale est le *L. ornithopoilioides* , L., Plante célèbre, en ce que c'est sur elle que Garcia ab horto découvi it le phénomène du sommeil des Plantes.

La troisième section , que Seringe nomme *Lulotus* , a un légume long, cylindracé, et des fleurs en corymbes.

Elle renferme plus de quarante espèces, parmi lesquelles deux seulement méritent de fixer notre atention.

Le Lotier de Saint-Jacques, *Lotus jacobœ us* , L.. a une tige presque ligneuse , glaucescente , des feuilles composées de trois folioles linéaires , mucronées , des bractées et des stipules aussi linéaires ; les fleurs supportées par des pédoncules plus longs que la feuille, disposées en corymbes; et des légumes cylindriques, glabres.

Les corolles soni d'un pourpre noir avec l'étendard jaunâtre. Ou cultive cette Plante pour l'ornement des jardins , en raison de ses couleurs variées ainsi que de l'élégance de son port, mais elle exige d'clre rentrée pendant l'hiver dans l'orangerie. Elle est originaire de Saint-Jacques, l'une des îles du cap Vert.

Le Lotier corniculé , *Lutetia corniculatus* , L. , est une espèce extrêmement abondante en Europe. Les diverses stations où elle se trouve la

5ia LOT

font varier tellement qu'il est souvent très-difficile de se persuader que c'est la même Plante. Dans les champs et sur le bord des routes , elle est glabre, ses tiges sont couchées et ses folioles obovées. Dans les lieux humides, ses tiges sont velues , fistuleuses, et s'élèvent à une grande hauteur.

Elle a des feuilles ovales et grasses dans les localités maritimes. Enfin elle présente quelquefois des tiges liliformes et des feuilles linéaires , lancéolées. Ces divers états de la même Plante ont été considérés comme des espèces distinctes par quelques botanistes. (g..n.)

Le nom de Lotier, corruption de celui de Laitier , est aussi donné vulgairement au *Polygala vulgaris* , L.

*LOTO. min. Nom donné en Toscane à la poussière sablonneuse , mêlée de paillettes de Mica , qui se rassemble sur le bord et au fond des lagunes, dont l'eau donne par évaporation de l'Acide borique. Elle n'est que le résidu du lavage du Macigno , qui est traversé par les vapeurs aqueuses, chargées d'Acide borique.

Elle est composée , suivant Klaproth, de Silice, d'Alumine , d'Oxyde de Fer, de Soufre et de sulfate de Chaux.

(G. DEL

* LOTOIDES. bot. piian. Sous ce nom De Candolle (Prodrum. Syst.

feget. A'o/. 2 , p. i 56) a désigné la cinquième section du genre Cytise, à laquelle il donne les caractères suivans : calice dont le tube est court , obeonique, la lèvre supérieure bipartite, l'inférieure tridentée; la corolle à peine plus longue que le calice. Cette section renferme quatre espèces qui sont des sous- Ai brisseaux à liges rameuses coucliées , et à fleurs jaunes, peu nombreuses et réunies en tête; la plus remarquable de ces Plantes est le Cytisus argenteus , L. ,

i'olie espèce assez commune dans les lieux incultes de tout le bassin de la Méditerranée. (g..n.)

LOTOIRE. Lotorium moll. Mon tj'ort , qui, dans sa Conchyliologie sys-

, LOT

tématique , a proposé un très-grand nombre de genres , avait établi celui-ci à tort pour un démembrement des Murex de Linné que Lamaick avait établi sous le nom de Triton. J^. ce mot. (D..H.)

* LOTONOMS. bot. piian. De Candolle { Proclrom. Syst. / eg. 2 , p. 1 66) nomme ainsi la seconde section du genre Ononis , laquelle offre des stipules non adnées ou à peine adnées au pétiole, foliacées comme dans les Lo/us; mais des élamines monadelphes comme dans les Ononis. Elle se compose de vingt-huit espèces toutes indigènes du cap de Bon ne-Espérance, et dont le plus grand nombre n'appartient qu'avec doute au genre Ononide. V-ce mot. (g..n.)

LOTOR. mam. Syn. de Raton. P~.

ce mol. (b.)

LOTOR [DM. moll. V. Lotoire.

LOTOS, bot. riiAN. Dans les ou- \ rages des naturalistes , des poètes et des historiens de l'antiquité, il est souvent fait mention des diverses espèces île Lotos , dont les fruits servaient d ali- mens. Les descriptions fort incomplètes qui en ont élé données, onl néanmoins suffi pour faire voir qu'un assez grand nombre de Végétaux différens entre eux avaient porté le nom de Lotos chez les anciens , et aujourd'hui on admet assez généralemeiït qu'ils peuvent être rangés en trois classes , savoir : les Lotos aiboies- cens , les Lotos aquatiques et les Lotos herbacés ou terrestres Les Végétaux, où l'on a cru reconnaître ces divers Lotos, sonl :

i°. Lotos en Arbre. Homère parle de l'Arbre des Lotophages. , dont le fruit , doux comme le miel , faisait oublier aux étrangers leur patrie.

Théophrasle en paile dans le même sens , et en donne la des- cription suivante : le Lotus est de la giandeur du Poirier, ou un peu plus petit; ses feuilles découpées ressemblent à celles de l'Yeuse. U y en a plusieurs variétés distinguées par le fruit. Celui- ci , de la grosseur d'une fève, naît

LOT

] parallèlement sur les branches, à la ; manière des baies du Myrte, et mûrit i comme les grappes de Raisin en i changeant de couleur. On en l'ait un

■ vin qui s'aigi il au bout de trois jous. Du reste, le fruit est très abondant sur l'Arbre, et l'Arbre lui-même est

commun sur la côte de Carthage, où l'on raconte que l'armée d'Ophellus, privée de toute autre nourriture, vécut plusieurs jours des seules drupes

■ du Lotus. C'est dans l'île des Lolophages que le fruit acquiert la saveur la plus exquise ; mais le bois de l'Arbre, qui est noir et dont on fait des

flûtes, est préférable, au contraire,

• dans la Cyrénaïque. (Fée, Fl. de Virg., p. «a.) Amenée, qui nous a

donné aussi une description de cet Arbre, dit que son fruit porte un noyau très-petit, et prend à l'époque

de sa maturité parfaite une couleur

Sourpiée, et acquiert la grosseur d'une olive. Un passage de Polybe,

• qui dit avoir vu l'Arbre des Lotos, a commencé à chercher la voie pour arriver à sa détermination botanique.

Le Lotos des Lolophages, est-il dit dans cet historien, est un Arbrisseau : rude et armé d'épines. Ses feuilles sont petites, vertes et semblables à celles du Rharnnus. Ses fruits, encore

tendres, ressemblent aux baies du Myrte; mais lorsqu'ils sont mûrs, ils

• égalent en grosseur les olives rondes, se teignent d'une couleur rougeâtre et

il renferment un noyau osseux. Clusius iet. Jean Bauhin soupçonnèrent que le Lotos des Lolophages devait être une

- espèce de Jujubier. Cette opinion fut ' ensuite adoptée par Shaw , dans son

Voyage, ou il en donna une figure i incomplète. Mais c'est au professeur Desfoutaincs , qui a visité les lieux où les anciens faisaient croître l'Arbre ides Lotos, que l'on doit la confirmation de ce fait. Il a prouvé que cet Arbre était véritablement un Jujubier, et dans le beau Mémoire qu'il : a publié à ce sujet (Mém. Acad. Se, année 1788, t. 21) , il l'a décrit et figuré sous le nom de Zizyphus Lotus.

1 Cette opinion dusaviint auteur de la 1 Flore Ailantique a été généralement

LOT 5i5

adoptée par tous les commentateurs et tous les auteurs qui se sont occupés d'antiquités botaniques. Nous avons déjà, à l'article Jujubier de ce Dictionnaire, donné la description du Zizyphus Lotus ; nous croyons donc inutile de revenir ici sur les caractères botaniques de cette espèce.

Pline parle aussi d'un autre Lotos

qui croît en Italie oh il porte le nom e Celtis et dont les fruits ressemblent à des cerises. Beaucoup d'auteurs pensent que le naturaliste de Rome a voulu désigner ainsi l'Arbre que les modernes ont appelé Celtis australis , et dont les fruits ont un saveur acerbe et peu agréable.

a°. Lotos aquatiques. On en distinguait trois espèces qui croissaient dans les eaux du Nil. Ces Plantes étaient en grande vénération chez les Egyptiens qui en ornaient leurs édifices et en paraient le front de leurs divinités. L'une de ces espèces, que les anciens appelaient *Cyamus egyptiacus* et qu'Hérodote désigne sous le nom de Lis rosé, avait une racine épaisse, charnue, qui servait d'aliment. Sa fleur rose était deux fois plus grande que celle du Pavot ; son fruit, que l'on comparait à un rayon circulaire de miel, renfermait, dans des alvéoles creusées à sa face supérieure, une trentaine de fèves arrondies, propres à servir d'aliment. Il est impossible de ne pas reconnaître dans cette description le *Nelumbo*, *Nymphœa Nelumbo*, L., ou *JVe/«/«bium speciosum*, Willd. Mais nous devons ajouter que cette espèce n'existe plus dans les eaux du Nil ; elle en a disparu et n'y forme plus ces masses de verdure, au milieu desquelles les habitans des rives du Nil allaient respirer un air frais et parfumé. Aujourd'hui le *Nelumbo* ne se trouve plus que dans l'Inde.

Une seconde espèce de Lotus est celle que les anciens appelaient simplement Lotos. Sa racine, dit Hérodote, est tubéreuse et charnue ; ses fleurs sont grandes, blanches, et ressemblent à celles du Lis. Au coucher du soleil, on la voit se fermer et souvent s'enfoncer

TOME IX

51 ii LOT

sous les eaux, pour ne se remontrer qu'au retour de cet astre. Son fruit est semblable à celui du Pavot et renferme une très-

grande quantité de graines que l'on mange et dont on fait une sorte de pain. Cette espèce ne saurait être confondue avec la précédente; elle en diffère et par la forme de sa racine, la couleur de sa fleur, la structure de son fruit. Tout indique que c'est le *Nymphaea Lotus* de Linné, qui croît encore dans les eaux du IN il, et dont la racine, la fleur et le fruit s'accordent parfaitement avec ce que les anciens nous ont transmis de leur *Lo Los*.

Enfin une troisième sorte de Lotus aquatique est celle que les Arabes désignent sous le nom de *Linoufar*, d'où l'on a fait le nom français de *Nénuphar*, qui a été donné au genre *Nymphaea*. Cette espèce croissait également dans le Nil. Elle se distingue de la précédente par ses feuilles non dentées, ses fleurs plus petites et d'une belle teinte bleue de ciel. C'est à cette espèce que Saviguy a donné le nom de *Nymphaea caerulea*.

5°. Lotos Plante terrestre.

Dans plusieurs passages de l'Iliade et de l'Odyssee, Homère parle d'un Lotus existant partout dans les campagnes, et qu'il dit servir de nourriture aux chevaux d'Achille ou aux bœufs dérobés par Mercure. Dioscoride, Galien et Paul d'Egine disent que ce Lotus a des feuilles trifoliées, et qu'il se rapproche beaucoup du Cytise. C'est donc parmi les Plantes dont les botanistes ont formé la famille des Légumineuses, qu'il convient de reconnaître le Lotus trifolié d'Homère. Mais comme cette famille est extrêmement nombreuse en espèces et que parmi elles un très-grand nombre offre ce caractère de feuilles trifoliées, il est assez difficile d'arriver à une détermination rigoureuse de cette espèce. Ainsi quelques-uns ont cru que ce Lotus était le *Medicago falcata*; d'autres le Lotus *corniculatus*; enfin plusieurs pensent avec Sprengel et Fée que c'est le *Melilotus*

LOU

officiiiialis, qui en effet est comm.n partout et forme un excellent fourrage. Telle est l'énuraéralion rapide des principales espèces de Lotus des Anciens. Nous n'avons pas cru devoir nous étendre beaucoup sur ce sujet qui prête singulièrement à l'arbitraire. Ceux qui désireront des détails plus circonstanciés sur ce point de botanique ancienne pourront recourir aux ouvrages de Sprengel et surtout à la Flore de Virgile de notre collaborateur Fée, ou nous avons puisé la plupart des faits consignés dans cet article. (a. r.)

LOTTE, pois. r. Lote.

LOTUS, bot. phan. /^.Jujubier, Lotos et Nénuphar..

LOUBINE. pois. L'un des noms vulgaires du Centropoine Loup. On donne aussi ce nom à une Perche de la Guiane. (b.)

LOUCHE, pois. *Labrus luscus*, L., ' espèce du genre Labre. F', ce mot.

LOUCHINS. ckust. Ecrit Louchyris dans Déterville. L'un des synonymes vulgaires de Cloportes. V. ce mot. (B.)

LOUCHEA. bot. phan. Ce nom a été donné par l'Héritier à une Plante rapportée d'Afrique par le professeur Louiche Desfontaines , et que Linné avait autrefois réunie au *Camphorosma*. Elle forme effectivement un genre très-distinct et même trèséloigné de celui-ci ; mais Forskahl l'avait décrit antérieurement sous le nom de *Pteranthus* qui a été adopté.

V. Ptéranthe. (g..n

* LOUISE, ins. (Geoffroy.) V,

AORION.

LOUP. Lupus. MAMj. Espèce du genre Chien. On appelle Loup doré le Chacal , et Loup noir, deux autres espèces «lu même genre. Le Lynx du genre Chat a été quelquefois nommé Loup cervicr, et l'Hvène Loup Tigre. (b.) .

LOUP MARIN, mam. Ce nom a été

LOU

quelquefois donné à des Phoques et même à l'Hyène. (b.)

LOUPDEMER.rois.Espèced'Ana- 1 bique. Perche du genre Centropome aussi appelée Louhine. Les pêcheurs nomment aussi quelquefois Loups, les vieux Brochets. (B.)

LOURADIA. eot. l'iiAN.Pouriavradia. V. Lavradie. (g..n.)

LODRÉE. Lourca. bot. vhas.

Necker (E/em. Bot., n. 1318) est le premier auteur qui ait proposé ce genre de la famille des Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L. Moench lui donna plus tard le nom de Chrislia. Desvaux et le Candolle l'ont adopté sous le nom donné par Necker, et en ont ainsi tracé les caractères: calice campanulé, persistant, à cinq divisions peu profondes , égales , étalées , renflées et enveloppant le fruit après la floraison; corolle papilionacée dont l'étendard est en cœur renversé, la carène obtuse; étamines diadelphes; légume composé de cinq à six articles, planes , mou-

spermes, réunis à la suite les uns des autres et cachés dans le calice. Ce genre est un démembrement du grand genre *Hedysarium* de Linné. Il a beaucoup de rapports d'une part avec les *Desmodium* qui ont été également séparés des *Hedysarum* et de l'autre avec les *Smitia* qui se rapprochent beaucoup des *Escallonia*. 11 se compose de trois espèces que nous ne ferons qu'indiquer, savoir: 1° *L. fespertilionis*, Desv., *Hedysarum Pesperilionis*, L. fils et Jacq., le rat: 3, t. 566; 2° *L. oëcotdata*, Desv., ou *Hedys. oëcotdatum* Poiret; 3° *L. renjobermis*, D. C., ou *Hedys. reniforme*, Loureiro. Ces Plantes croissent dans la Cochinchine et dans les îles de l'Archipel indien. Dans l'ouvrage que le professeur De Candolle a publié tout récemment sur les Légumineuses, le genre *Lourea* fait partie de la tribu des *Hédysarées*.

Janine Saint-Hilaire (Bull. de la Soc. Philom., décemb. 1822) a donné les caractères d'un genre *Lourea* qui n'est point celui de Neckera, et dont il a depuis converti le nom en celui de

LOUREIRA

Leptochloa; mais ce genre rentre comme section sous le nom d'*Oslodinium* dans le *Flemingia* de Roxburgh. V.

ces mots. (u. if.)

LOUREIRA. bot. ru an. Ce genre, établi par Cavanilles, est identique avec le *Mozinna* d'Ortega, adopté sous ce dernier nom par notre collaborateur A. De Jussieu dans la Monographie des genres de la famille des Euphorbiacées. fr. *Mozinne*.

LOUTRE. Lutta, mam. Genre de Carnassiers appartenant à la famille des Vermiformes, et l'un de ceux qui composaient le grand genre *Muscula* de Linné. 11 se trouve en ellet, sous tous les

rapports, très-voisins des Martes et des Mouffettes , malgré les modifications très-remarquables que présentent diverses parties de son organisation, et particulièrement l'appareil de la locomotion. Les Loutres ont à l'une et à l'autre mâchoire le même nombre de dents ; savoir : six incisives , deux canines et dix machelières, sur lesquelles on compte six fausses molaires , deux carnassières , et (ce qui forme un des caractères généraux de la famille des Vermiformes) deux tuberculeuses. Toutes ces dents, et surtout les incisives et les canines , sont très-semblables pour leurs formes à celles des Martes et des Mouffettes ; néanmoins comme tous les genres voisins ont généralement , à cause du nombre différent de leurs fausses molaires, trente-deux , trente-quatre ou trente-huit , mais non pas trente-six dents , le système de dentition des Loutres leur est exclusivement propre, et peut servir à caractériser le genre. Au reste , quelques dents ont aussi des formes particulières ; les carnassières supérieures présentent à leur partie interne un talon considérable, et on voit de même un tubercule très-étendu en arrière des inférieures. En somme, comme l'a remarqué Fr. Cuvier, « le système de dentition des Loutres est celui des Martes, modifié par le grand développement de la partie des

f)6 LOU

tème qui a pour objet de triturer les aliments, et non de les couper; c'est-à-dire que ce développement caractérise des Animaux moins carnassiers et plus frugivores que les Martes. »

On sait en effet que les Loutres peuvent se nourrir de substances végétales , et , par exemple, d'herbages et de jeunes branches d'arbres, quelle que soit la croyance populaire à cet égard.

Les organes de la locomotion sont de même pour l'essentiel semblables à ceux des Martes , et présentent en général les mêmes caractères', mais avec beaucoup 'plus d'exagération.

Les membres ont d'une extrême brièveté ; chez un individu de près de deux pieds de long , le fémur et les os de la jambe n'excèdent pas trois pouces ; et encore les Loutres , pour nous servir de l'expression usitée en histoire naturelle, sont-elles véritablement empêtrées. Au contraire le corps est d'une extrême longueur, et tellement qu'il n'est aucun genre qui mérite mieux le nom de Vermiforme.

Les doigts sont , comme chez les Martes, au nombre de cinq à chaque

doigt ; mais ils sont réunis sur toute leur longueur (excepté chez la Loutre du Cap) par une large et forte membrane ; caractère qui ne se retrouve parmi les Carnassiers que chez les seuls Phoques, quoiqu'on l'ait aussi attribué par erreur à la Marte Vison. Enfin la queue, ordinairement de moitié environ moins longue que le corps, et quelquefois beaucoup plus courte, est toujours aplatie horizontalement, comme chez tous les Mammifères aquatiques. Elle est dans son entier revêtue de poils plus rudes et moins longs que ceux du corps. Ceux-ci sont de deux sortes , les uns soyeux , luisans , assez longs , ordinairement de couleur brune; les autres laineux, plus courts , plus abondans, plus fins, ordinairement de couleur grisâtre.

Quelques Loutres , et particulièrement l'espèce indienne décrite par Fr. Cuvier sous le nom de *Baron* , ont le poil assez rude : d'autres , au contraire , et surtout la Loutre du

Kamtschatka , ont une fourrure que sa^douceur et sa finesse rendent extrêmement précieuse. Les moustaches sont formées, dans le plus grand nombre des espèces , de longs poils blancs ou blanchâtres : et presque toutes ont aussi un museau plus ou moins développé. La langue est assez douce, et l'oreille e.it toujours simple et très-petite. Les pâtes antérieures sont entièrement nues en dessous ; mais à celles de derrière , le talon se trouve couvert de poils. Les mamelles sont, du moins chez la Loutre commune, au nombre de quatre: elles sont très-peu apparentes , si ce n'est à la fin de la gestation et pendant l'allaitement. L'os pénial , comme chez les Martes , existe assez développé chez le mâle; et le clitoris contient de même un os chez la femelle. C'est encore un caractère commun aux Loutres et à toute la famille des Vermiforines d'avoir deux petites glandes situées près de l'anus ; et qui sécrètent une liqueur fétide. Enfin le crâne, dans son ensemble, est élargi et déprimé, surtout à la partie postérieure , et , quoique semblable par ses principaux caractères à celui des Martes, il rappelle aussi , sous plusieurs rapports, celui de certains Phoques. Au reste , on pourrait faire la même remarque à l'égard de toutes les autres parties de l'organisation. Ainsi se trouve liée avec la grande série des Carnassiers terrestres celle de ces Carnassiers amphibies si souvent rapprochés des Cé-* tacés .

L'allongement extrême du corps chez la Loutre, l'aplatissement de sa queue, et surtout la large palmature de ses pieds , sont autant de caractères qui indiquent un Animal aquatique. En effet , la Loutre qui ne marche qu'avec peine et très-lentement , nage au contraire avec la plus grande facilité , plonge très-bien , et peut , dit-on, demeurer long -temps sous l'eau. Elle passe même en quelques lieux pour un véritable amphibie; fiible qui

n'avait pas même besoin d'être démentie, et que Buffon s'est donné la peine de réfuter, en remar-

LOL₁

LOU

quant qu'elle a besoin de respirer à peu près comme tous les Animaux terrestres , et que si même il lui arrive de s'engager dans une nasse à la poursuite d'un poisson, on la trouve noyée.

Elle se nourrit en effet de préférence de poissons , et en détruit une grande quantité. Aussi est-elle très-redoutée des pêcheurs qui lui attribuent une intelligence et une industrie presque surnaturelles. Dans ses pêches, elle commence toujours, disent-ils, par remonter contre le courant, afin de n'avoir plus qu'à suivre, lorsqu'elle revient à son gîte chargée de proie et déjà fatiguée. Ce gîte est tout simplement la fente d'un rocher ou la cavité d'un arbre, ou elle se fait ordinairement un lit de feuilles sèches :

on en a même vu quelquefois, suivant la remarque de Buffon, se relever dans des piles de bois à flotter; ce qui ne doit nullement étonner. La Loutre, qui craint peu le froid et l'humidité , préfère en effet toujours le trou le plus voisin de la rivière où elle a coutume de pêcher : habitude dont on trouve la cause dans son organisation qui lui rend la marche si pénible. On sait de même combien les Phoques , pour lesquels la marche est encore beaucoup plus difficile , préfèrent pour leur retraite les lieux les plus voisins de la mer. La Loutre est, dit-on, assez docile pour que l'on soit en plusieurs lieux parvenu à la dresser à pêcher au profit de ses maîtres , et à rapporter fidèlement sa proie. Buffon au contraire a plusieurs fois essayé d'élever en domesticité et d'appivoiser de

jeunes individus , sans y avoir jamais réussi : «Ils cherchaient toujours à mordre, dit-il, même en prenant du lait, et avant que d'être assez forts pour mâcher du poisson ; au bout de quelques jours, ils devenaient plus doux, peut-être parce qu'ils étaient malades et faibles; et loin de s'accoutumer à la vie domestique, ils sont tous morts dans le premier âge. » Il faut cependant bien se garder de conclure que toute semblable tentative doive rester de même sans succès : il n'est point d'être que l'Homme ne

puisse , avec plus ou moins de peine, laconner à son joug. Ainsi nous avons vu une Loutre élevée en domesticité par un paysan qui l'avait prise jeune:

elle était apprivoisée de la manière la plus complète, caressait et suivait son maître à la manière d'un chien , et se montrait même très-peu farouche à l'égard des étrangers. Il est vrai que le possesseur de cette Loutre croyait presque , en l'adoucissant , avoir opéré un prodige, parce que ses préjugés lui avaient toujours fait supposer à cet Animal un naturel tout-à-fait intraitable.

Toutes les Loutres ont à peu près le même pelage ; toutes sont d'un brun plus ou moins foncé en dessus, d'un Drun plus clair en dessous, et surtout à la gorge qui est même quelquefois presque blanche; aussi la distinction des espèces du genre est-elle très-difficile. On n'a même cru pendant long-temps qu'à l'existence de trois seulement; mais dans ces derniers temps les envois faits de divers points du globe par plusieurs voyageurs , et particulièrement du cap de lionne-Espérance , de l'Inde et des deux Amériques , par Dclalande , Duvauccl , Diard, Leschenault de la Tour, Auguste de Saint-Hilaire et Lherminier , ayant fait connaître nonseulement les pelleteries, mais en même temps les squelettes ou du moins les crânes d'un grand nombre de Loutres; il a été fa-

cile de se convaincre qu'il existe un assez grand nombre d'espèces qu'avaient fait confondre la ressemblance de leur pelage et le peu de précision des seules descriptions qu'on en avait possédées jusqu'alors. l'Y. Cuvier croit même pouvoir, au moyen de ces précieux matériaux , établir jusqu'à onze espèces , dont une appartiendrait à l'Europe, trois à l'Amérique méridionale, trois à l'Amérique septentrionale, trois aux Indes-Orientales, et une au sud de l'Afrique. Nous suivrons dans cet article le travail de ce zoologiste (V.

Loutre du Dictionnaire des Sciences Naturelles) , quoique quelquesunes des espèces qu'il admet ne soient

SiS • LOU

peut être pas assez caractérisées pour u il ne reste quelque doute sur leur istinction réelle. — Nous décrirons d'abord les trois espèces anciennement connues.

La Loutre d'Europe , *Luira vulgaris*, Erxl.; *MuslelaLutra*, L., a deux pieds de long ; elle est en dessus d'un brun foncé, en dessous d'un gris brunâtre avec la gorge et l'extrémité du museau d'un grisâtre clair. La cou-r^ leur de la gorge se fond insensiblement et se nuance avec celle du dessus du corps. On a trouvé quelquefois des individus dont le pelage était varié de petites taches blanches qu'où a regardées comme l'effet de la malarie albine. C'est cette variété queDesinarest a décrite dans sa Mammalogie sous le nom de *Luira vulgaris varie-?*, gâta, d'après un bel individu qui fut pris à l'Ile-Adam, et que possède le Muséum. Cette espèce entre dans le rut en hiver; la feinelle met bas au printemps trois ou quatre petits qui se séparent d'elle au bout de deux mois environ, Nous ne décrirons pas la chasse de la Loutre

qui se fait de diverses manières, et dont tout l'art consiste à lancer l'Animal dans un lieu où il n'y a que peu d'eau ; autrement elle échappe facilement aux chiens. Sa chair se mange eu maigre, mais elle est peu estimée parce qu'elle conserve un goût désagréable de poisson; sa fourrure, employée à divers usages, l'est surtout depuis quelques années dans le commerce de la chapellerie. L'espèce qui se trouve répandue dans toute l'Europe , et qu'on croyait même habiter aussi l'Inde et l'Amérique , était très-bien connue des anciens , comme on le voit par divers passages d'Hérodote et d'Aristote. On ne peut en effet douter que YErihyrlris des Grecs ne soit la Loutre , surtout depuis la découverte de la Mosaïque de Palestrine oii se voient représentés deux individus à côté desquels se trouve placé le mot Enhydrà.

La Loutre d'Amérique, G. Cuv.; Lutra Brasiliensis , GeolT. S t.
-IL; Mu^tçla lu/ris Brasiliensis , G ni. 5 la

Loe

Saricovienne de Geoffroy et de plusieurs auteurs, habite l'Amérique méridionale, et paraît exister aussi dans le sud de l'Amérique septentrionale :

elle est plus grande que notre Loutre ; son pelage est généralement d'un brun fauve, un peu plus clair sur la tête et le col , plus foncé vers l'extrémité ries membres et de la queue , avec la gorge et l'extrémité du museau d'un blanc jaunâtre. Cette espèce n'a point de véritable mulle; seulement les narines sont nues sur leur contour. Ses habitudes sont peu connues, et le peu de détails que donnent sur elle les voyageurs peuvent tout aussi bien être rapportés aux autres Loutres de l'Amérique méridionale.

La Loutre du Kamtschatka , Geoff. St. -H.; *Lutra marina*, Erxl. ; *Lutra lutris*, Fv. Cuv.; *Mustiela lutris*, L- , a presque trois pieds et demi de longueur; sa queue, proportionnellement plus courte que dans les autres espèces , n'a qu'un pied trois pouces.

Elle est généralement d'un beau brun marron lustré, dont la nuance varie suivant la disposition des poils, avec la tête, la gorge, le dessous du corps et le bas des membres antérieurs d'un gris brunâtre argenté. La magnifique fourrure de cette espèce est principalement composée de poils laineux , surtout à la partie supérieure du corps. Sa douceur, son nœud, son éclat en font l'une des plus précieuses pelletteries qui soient répandues dans le commerce; elles sont surtout recherchées dans la Chine et le Japon où les Russes et les Anglais en transportent annuellement un grand nombre. La Loutre du Kamtschatka habite, outre cette contrée, la partie la plus septentrionale de l'Amérique , et plusieurs îles ; elle se tient le plus souvent sur le bord de la mer , et non pas , comme les autres espèces , à portée des eaux douces.

Les voyageurs rapportent que dans cette espèce qui vit par couple, la femelle ne met bas qu'un seul petit , après une gestation de huit à neuf mois.. On ne sait si la Loutre de Steller

LOU

doit être rapportée à cette espèce à laquelle elle ressemblerait par les couleurs de son pelage, tandis qu'elle aurait un système dentaire tout particulier. On connaît aussi fort incomplètement le Carnassier décrit sous le nom de *Mustela Hudsonica* par Lacépède , et qui habite le Canada. Cet Animal , que sa grande taille ne permet pas de confondre avec la Loutre du Canada de Fr. Cuvier, pourrait bien n'être également que la Loutre du Kamtschat-

ka ; telle est du moins l'opinion de Desmarest {filammalogie) et de Hailan (iauna Americana.)

La Loutie du Cap, Luida inunguis , Cuv. , rapportée du pays des Hottentots par Delalande , est encore une espèce bien distincte à tous égards, et qu'on doit même considérer comme formant dans le genre une section particulière , à cause des caractères fort remarquables que présentent les pieds. Les doigts gros et courts sont très-peu palmés, surtout aux membres antérieurs; Us sont d'ailleurs de grandeur fort inégale, et les deux plus longs, le second et le troisième, ont leur première phalange réunie. Enfin les ongles manquent partout, si ce n'est aux deux grands doigts du membre postérieur, où même ils n'existent que très-rudimentaires. Cette espèce tout-à-fait anormale se trouve, comme on le voit, rendue plus terrestre par l'imperfection de sa palmature : les membres sont aussi inoins allongés , et le corps un peu raccourci proportionnellement.

On sait cependant par Delalande qu'elle vit à peu près à la manière des autres Loutres , et se nourrit comme elles de Poissons et de Crustacés. Elle est plus grande que l'espèce d'Europe, mais lui ressemble d'ailleurs assez bien par son système dentaire, et même par les couleurs de son pelage généralement d'un brun châtain avec 1 extrémité du museau et la gorge blanches.

La Loutre Barang, Luida Barang, Fr. Cuv. , habite l'Inde, et particulièrement Java et Sumatra, d'où elle

LOU 619

a été envoyée par Uiard et Duvaucel.

Elle a un pied huit pouces de long , et la queue a huit pouces; elle se reconnaît assez bien par son pelage rude, brun sale en dessus, avec la gorge d'un gris brunâtre qui se fond avec le brun du reste du pelage : les poils laineux sont d'un gris- brun sale.

Le Simitng qu'on pou rait nommer *Lutra pempicillara* , s'il doit réellement être distingué des autres Loutres de l'Inde, est une espèce indiquée par Radies (Cal. des Mamm.

de Sumatra , Tr. Linn. de Londres , T. xiii) , et à laquelle Fr. Cuv. pense qu'on peut rapporter une jeune Loutre envoyée par Diard. Cet individu est d'un Brun foncé, plus clair et un peu roussâtre en dessous avec le tour des yeux , les côtés de la tête et la gorge blanchâtres et le menton' blanc.

Dans l'état adulte le Siinung se distingue encore du Baraug par sa taille plus considérable.

La LoUTREjNlKNAIEROUÏNltNAYIE,

Lutra Nair , Fr. Cuv. , habile aussi l'Inde, el a été envoyée de Pondichéiy par Lcschenault; elle a deux pieds quatre pouces, sans compter la queue qui a un pied cinq pouces; son pelage est d'un châtain foncé en.

dessus, plus clair sur les côtés du corps, d'un blanc roussâtre en dessous , sur la gorge , les côtés de la tête et du col et le tour des lèvres ; le bout du museau est roussâtre , et deux taches à peu près de la même couleur sont placées l'une en dessus , l'autre en dessous de l'œil.

L3 Loutre de la Trinité , *Lutra insularis*, Fr. Cuv., envoyée de la Trinité par Robin , a les poils courts et très-lisses : elle est d'un brun clair en dessus, blanc jaunâtre en dessous, sur les côtés de

la tête, la gorge et la poitrine. Cette Loutre a deux pieds trois pouces, et la queue a un pied six pouces.

La Loutre de la Guiane, *Lutra emulris*, Fr. Cuv., a trois pieds et demi avec sa queue qui forme le tiers de cette longueur : elle est d'un brun très-clair surtout en dessous, avec la

5ao LOU

orge et les côtés de la face presque lances.

La Loutre de la Caroline, *Lutra lataxina*, Fr. Guv., est un peu plus grande que la précédente : elle est d'un brun noirâtre en dessus, d'un brun moins foncé en dessous, avec la gorge, l'extrémité du museau et les côtés de la tête grisâtres. Le Muséum doit les individus qu'il possède à Lherminier qui les lui a envoyés de la Caroline du sud.

Enfin la Loutre du Canada, *Lutra Canadensis*, Yv. Cuv., n'est connue que par sa tête osseuse qui ressemble beaucoup à celle de la Loutre d'Europe dont elle diffère cependant à quelques égards, et surtout en ce que, vue de profil, elle suit une ligne plus inclinée surtout dans sa partie antérieure. Au reste, le crâne de la Loutre du Canada ressemble beaucoup aussi à celui de l'espèce précédente.

On a aussi rapporté aux Loutres quelques espèces qui doivent être placées, et qui ont déjà été reportées dans d'autres genres. Tel est le Yapock qui a en effet les pieds palmés comme les Loutres, mais qui est un véritable Didelphe. (V. ce mot.) On a aussi donné le nom de Loutre d'Egypte à l'Ichneumon. V. Mangouste au mot Civette. (is. g. st.-h.)

* LOUVAREAU. Luvarus. pois. Nous trouvons ce genre établi par Rafinesque, mentionné et figuré dans son Indice d'Ithiologia siciliana, p.

3g, pl. i, fi ij Selon qu'on en peut juger par le dessin incomplet qui représente ce Poisson de la Méditerranée, il aurait de très-petites ventrales situées sous les pectorales à neuf rayons , une dorsale étendue sur la moitié postérieure jusqu'à la queue à quatorze rayons, l'ovale du même nombre, et parfaitement apposée en dessous, une petite adipeuse comme les Sombres , vers l'insertion d'une caudale fourchue. Les opercules sont dépourvus de toute dentelure , et l'on ne distingue aucunes dents dans une bouche grossièrement représentée. Ce genre fait partie de l'ordre des Stro-

LOX

matini de l'auteur. Il ne contient qu'une espèce nommée Luvarus imperialis , Poisson de cinq pieds de long, et dont la chair est exquise/(B.)

LOUVETEAU, mam. Le petit du Loup et de la Louve. (b.)

LOUVETTE ou PHALÈNE LOU- VETTE. ins. Nom vulgaire de \He~ pialus lupulinus dont la chenille vit sur le Houblon. V. Hépiale. (g.)

LOVELY. ois. Espèce du genre Gros-Bec. F '. ce mol. (b.)

LOWANDO. mam. (BuffonO Syn.

de Tartarin. K. Cynocéphale et Macaque, (g.)

LOXIA. ois. V. Loxie.

LOXIDIUM. bot. phan. Ce nom , donné par Ventenat {Decad. Gen- Nov.)k un genre de Légumineuses, est postérieur à celui de Swainsona proposé par Salisbury et adopté par R. Brown et De Candolle. V. Swain-

SONE. (G..N.)

LOXIE. Loxia. ois. Genre de l'ordre des Granivores. Caractères : bec médiocre, fort, très-comprimé ; les deux mandibules également courbées , crochues ; leur extrémité se croisant; narines latérales, arrondies , placées vers la base et cachées par des soies dirigées en avant; trois doigts en avant, divisés , un en arrière ; ailes médiocres; la première rémige la plus longue; queue fourchue. Dans tous les pays où croît spontanément le Pin , se trouvent les Becs-Croisés ; c'est de la graine de cet Arbre qu'ils tirent leur principale nourriture ; ils savent disséquer avec beaucoup d'adresse le cône ligneux et n'y laissent aucun vestige de l'amande favorite. Lorsque ce mets vient à leur manquer, ils se jettent indifféremment sur toutes les graines que peuvent leur fournir les Plantes desséchées qui font la triste parure des crêtes arides. Ces Oiseaux recherchent de préférence les régions boréales , et c'est même au milieu des frimats qu'ils se livrent à ces élans d'amour pour lesquels la plupart des

LOX

autres êtres attendent le retour des feux du printemps. Ils établissent leur nid clans les Sapins touffus ; il est artistement construit avec des petites bûchettes qui enveloppent le mol duvet ; ils y pondent quatre ou cinq œufs d'un gris verdâtre , irrégulièrement tachetés de brun-rougeâtre.

Bec-Croisé ou Perroquet des Sapins , *Loxia Pytiopsilaccus* , Bechst; *Loxia curvirostra major*, Gmel.; Frisch, T. n.fig- a. Bec très-fort , très-courbé, large à sa base de sept lignes, plus court que le doigt au milieu , la pointe croisée de la mandibule inférieure ne dépassant point le bord supérieur du bec. Le mâle adulte a les couleurs principales d'un cendré olivâtre; des taches brunes, bordées de cendré sur la tête ; le croupion d'un jaune verdâtre qui est aussi la couleur de la poitrine et du ventre, mais nuancé de grisâtre; les rémiges et les rectrices d'un brun noirâtre, lisérées de cendré olivâtre; les rectrices caudales brunes , avec une large bordure plus claire. Les

jeunes de l'année sont d'un cendré > rnn sur les parties supérieures , avec des taches d'un brun plus foncé sur la tête et le dos ; les parties inférieures sont blanchâtres , avec des taches longitudinales brunes ; le croupion et les rectrices caudales supérieures sont jaunâtres. Après leur première mue , suivant qu'elle est plus avancée , toutes les parties du corps sont d'un rouge ponceau ; les rémiges et les rectrices noirâtres, lisérées de rougeâtre. La femelle diffère peu du jeune ; elle a les parties supérieures d'un cendré verdâtre, avec de grandes taches brunâtres , la gorge et le cou d'un gris nuancé de brun ; le croupion jaunâtre; l'abdomen et les rectrices caudales inférieures blanchâtres ; une grande tache brune sur la queue. Longueur, sept pouces.

Bec-Croisé des Pins ou commun, *Loxia curvirostra* , L. , Bufl'. , Pl. enl. 218. Bec long, faiblement courbé, large à sa base de cinq lignes, de la longueur du doigt du milieu ; la

pointe croisée de la mandibule inférieure dépassant le bord inférieur du bec. Le mâle adulte est d'un cendré verdâtre, avec le front et les joues gris, tachetés de jaunâtre et de blanchâtre; le croupion jaune, les parties inférieures jaunâtres ; l'abdomen •gris tacheté; les rémiges et les rectrices noirâtres, lisérées de verdâtre.

Les jeunes ont les parties supérieures d'un gris brun , nuancé de verdâtre ; les parties inférieures blanchâtres, avec des taches longitudinales brunes et noires. Après la première mue , ils sont d'un rouge de brique, plus ou moins teints de verdâtre, et ont une grande tache brune sur les tectrices caudales inférieures qui sont blanches. La femelle ressemble au jeune , son plumage se nuance de teintes verdâtres et jaunâtres. Longueur , six pouces.

Bec-Croisé falcirostre, *Loxia falcirostris* , Lath. Le mâle adulte est d'un gris verdâtre ; il a deux bandes transversales sur les ailes, et la queue très- fourchue. Les jeunes, jusqu'à l'âge de deux ans, ont le plumage d'un rouge de laque. Longueur, trois pouces. Amérique septentrionale.

Bec-Croisé de Sibérie, Vieill. ; *Loxia Siberica*, Lath. Cet Oiseau, décrit par Pallas, T. vin, n° 53, quoique considéré par Vieillot comme un Bec-Croisé , doit être placé parmi les Gros-Becs. (dr..z.)

LOXOCARYE. *Loxocarya*. bot.

FHan. Genre de la famille des Restiacées, établi par Robert Brown pour une Plante qu'il nomme *Loxocarya cinerea* , Prodrôm. FLor. Nov.- Holl. 1 , p. 249, et qui offre les caractères suivants : ses chaumes sont privés de feuilles, recouverts de gaines, pubescens , cendrés, simples et cylindriques intérieurement, divisés en panicule à leur partie supérieure.

Les fleurs sont placées seule à seule au sommet des rameaux, et accom-

Eagnées de bractées mucronées et puescenlcs. Le périanthe est formé de quatre écailles. L'ovaire est monos-

5aa LOX

penne, terminé par un syle simple et subulé , et par un slig-mate égalemeiit simple. Le fruit est un follicule cartilagineux, s'ouvrant par son coté convexe. Ce genre est voisin du Rcstio, mais il en diffère par son ovaire monosperme et son style simple.

LOXOCÈRE. Loxocera. ins. Genre de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères , tribu des Muscides, établi par Meigeu et adopté par Latreille qui lui donne pour caractères : antennes plus longues que la tête , avec le dernier article plus allongé que les précédons , el linéaire; coips long et menu; tête presquepyramidale; ailes couchées. Ces Insectes diffèrent des genres Seperlon , Lauxanie, Tétanocère, etc. , par des caractères tirés de la forme des antennes , des pieds, du corps et des ailes. Ils ont de la ressemblance , au premier coupd'œil , avec certains Ichneumons.

L'espèce qui seit de type à ce genre est :

La LoxocÈttE IcnNEUMONiDE, Loxocera Ichneumonea , Panz. (Fau/i.

las.. Germ. , fasc. 73, tab. 24). Noire; base de l'abdomen en illessus; deux tiers posérieurs du corselet et pâtes fauves ; ailes transparentes , à nervures rembrunies. Cette espèce se trouve dans les bois , sur les feuilles. Elle babite Paris et l'Allemagne, (g.)

* LOXODON. bot. puan. Genre de la famille des Sj nanthérées , Corymbifères de Jussieu , et de la Syngénésie superflue, L. , proposé par Cassini (Dictionn. des Se. Natur. T.

XXVII , p. 2.53) qui lui assigne les caractères suivans : involucre presque campanulé, composé de folioles , sur deux ou trois rangs, irrégulièrement imbriquées, inégales et lancéolées ; réceptacle plane et sans appendices.

Les Heurs du centre sont nombreuses et hermaphrodites ; elles ont une corolle dont le limbe n'est point distinct du tube , à cinq divisions dressées, oblongues , lancéolées, sé-

fmrées par des divisions inégacs; anthères pourvues au sommet

LOX

d'un appendice long, linéaire, et à la base, de deux appendices très longs, filiformes, ha fleurs de la circonférence sont femelles ; elles forment deux rangées dont l'intérieure offre une corolle moins longue que le style, et à languette variable ; la corolle de chaque fleur est plus longue que le style ; la languette est longue, linéaire, entière, bi ou tridentée au sommet; point d'étamines rudimentaires ni de languette intérieure; ovaires fusiformes, oblongs , dépourvus de col , hérissés de poils gros et courts , surmontés d'une aigrette légèrement plumeuse. Ce genre a été constitué aux dépens des Chaptalia dont il diffère par ses fleurs centrales , hermaphrodites et à corolles régulières.

Il a beaucoup de rapports avec le Lieberkuhna et le Lasiopus, autres genres proposés par Cassini qui lésa tous placés dans la tribu des Mutisiées. Deux espèces sont attribuées à celui, dont il

est ici question. Ce sont les Tussilago (Chaptalia) exscapa, Pers. ; et Chaptalia runcinata de Kunth, auxquelles Cassini donne les noms de Loxodon breuipes et L. longipes. La première croît aux environs de Montévidéo, et la seconde dans les Andes de la Nouvelle-Grenade. Kunth en a donné une figure (Nui: Gêner, et Spec. riant, œquin., 4, tab. 305). (g..n.)

* LOXONIA. bot. phan. Genre de la Didynmnie Angiospermie , L. , établi par William Jack (Traits. Linn.

•Soc. vol. Xiv, i^e partie, p. 40) qui l'a placé dans la nouvelle famille constituée par ce botaniste sous le nom de Cyvtandracées , et l'a ainsi caractérisé : calice à cinq divisions profondes; corolle inl'undibuliforme dont le limbe est quinquéfide et bilabiéj quatre étamines fertiles , plus courtes que la corolle; stigmat bilobé; capsule ovée , renfermée dans U calice, biloculaire, polysperme ; cloisons repliées en dedans de manière à constituer les placentas ; graines sans appeudiecs. L'auteur de ce

LUB

genre en a décrit deux espèces sous les noms de Lo.vonia dis-color et Lox.

hirsuta. Ce sont des Plantes indigènes de Sumatra , dans l'in-térieur de Bencoolen, à feuilles opposées , l'une d'elles plus petite , le plus souvent à côtés inégaux et à fleurs en grappes.

LOYCA. ois. (Molina.) V. Etouh-

NEATJ.

LOYETTE. ois. L'Emérillon en vieux français. (B.)

LTJA. bot. ph an. (Loureiro.) Syn.

de Riz à la Cochinchine ou l'on en cultive cinq variétés ou espèces. Le Froment y est appelé Lua-mi. (b.)

* LUAN. M a ai. Syn. chilien de Guanaque. V. ce mot à l'article Chameau, (b.)

* LUBA.RO. pots. (Delaroche.) Syn. de Perça Labrnx , L. , aux îles Baléares. V. Perche. (b.)

LUBIN. fois. L'un des noms vulgaires du Centropome Loup. (b.)

LUBINIE. Lubinia. bot. phaN.

Genre de Plantes de la famille des Primulacées cl de la Peutandrie Monogynie , L. , établi par Commerson et adopté par Yentennat (Jard. de Cels, p. 96) qui en a tracé le caractère de la manière suivante : son calice est monosépale, persistant, à cinq divisions profondes; la corolle est inonopétale , irrégulière , lubuleuse, et son limbe a cinq lobes un

Eeu inégaux. Les étamines , au nombre de cinq , ont leurs filets attachés à la corolle , leurs anthères ovoïdes et obtuses. Le style est surmonté d'un stigmate obtus. Le fruit est une capsule ovoïde , terminée à son sommet par une pointe , ne s'ouvrant pas naturellement.

Une seule espèce forme ce genre ; c'est la Lubiniaspat/tu/ata, \enl., /oc.

cit., t. 96 , décrite par Lamarck sous le nom de Lysirnachia Mauritiana, 111. Gén., n. 19, 80. C'est une Plante herbacée et bis-annuelle ayant le port du *Convolvulus tricolor*, cl qui a été obser-

vée par Commerson à l'île de Mascareigne et non à Maurice, où-Bory de

LUC 523

Saint- Vincent a remarqué , dans la Relation de son voyage, qu'elle croît dans les rochers volcaniques scorieux des régions inférieures peu éloignées de la mer, et surtout au pays brûlé.

Sa tige fistuleuse, cylindrique et rameuse, porte des feuilles allongées, alternes, obovales , spathulées, entières. Les fleurs sont jaunes, pédonculées , axillaires et solitaires. Cette Plante a autrefois fleuri dans le jardin de Cels, de graines envoyées par André Michaux. Le genre *Lubinia*. est très-rapproché du *Lysirachia*; il en diffère par ses feuilles alternes, sa corolle tubuleuse et irrégulière , et sa capsule indéhiscente.

LUCANE. *Lucanus*. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Lamellicornes, tribu des Lucanides , établi par Linné et restreint par Fabricius et Latreille aux Insectes qui ont pour caractères : point de labre apparent; languette divisée en deux pièces allongées et soyeuses ; menton recouvrant, par sa largeur, la partie inférieure des mâchoires. *Ingidius*, selon Pline, est le premier qui ait donné le nom de *Lucaui* aux Scarabés cornus; Pline s'est servi du mot *Lucanus* pour désigner l'une des principales espèces de ce genre. Geoffroy avait conservé le nom de *Platycerus* que plusieurs auteurs avaient donné à ces Insectes pour désigner ce genre; mais Latreille lui a conservé le premier nom que Scopoli avait donné avant Geoffroy, et qui était adopté par Linné et tous les entomologistes. La tête des Lucanes est plus ou moins grosse ; celle du mâle l'est plus que celle de la femelle; elle est plus large que longue, anguleuse,

souvent irrégulière, avec des élévations plus ou moins saillantes. Le chaperon est assez grand, avancé en pointe; les mandibules sont très-grandes, fortes, cornées , arquées et dentées intérieurement ; celles des femelles sont moins longues que celles des mâles. Les antennes sont composées de dix

524 LUC

articles dont le premier est fort long et dont les derniers forment une massue comprimée , pectinée ou dentée en scie; le corselet est un peu convexe en dessus , arrondi sur les côtés et plus ou moins rebordé; l'écusson est peu visible dans quelques espèces; les élytres sont dures , de la longueur de l'abdomen ; les ailes sont membraneuses , repliées ; et les pâtes sont longues et armées quelquefois d'épines assez fortes ; les jambes des antérieures sont dentées latéralement ; le dernier article des tarses est armé de deux crochets et d'un appendice intermédiaire terminé par deux soies divergentes.

Les Lucanes diffèrent des Lamprolines par les mâchoires qui, dans ceux-ci , sont découvertes jusqu'à leur base ; ils s'éloignent des Platycères

par leurs yeux qui sont coupés par les bords latéraux de la tête , tandis qu'ils sont entiers dans ces derniers.

Enfin , les Paxyls et les Passales s'en éloignent par leur labre qui est très-grand. Les larves des Lucanes sont très-grosses et courbées en arc comme celles des autres Lamellicornes ; elles sont composées de treize anneaux ; leur tête est brune , écailleuse et armée de deux fortes mâchoires avec lesquelles elles rongent le bois dans lequel elles vivent. Elles ont six pâtes écailleuses, attachées aux trois premiers anneaux. Ces larves vivent quatre ou

cinq ans dans cet état; au bout de ce temps, elles se construisent , dans le bois où elles ont vécu , une coque avec la sciure du bois qu'elles ont rongé, s'y métamorphosent en nymphes et n'en sortent qu'à l'état d'Insecte parfait. Après leur dernière métamorphose , les Lucanes meurent bientôt; ils s'accouplent peu de temps après et périssent bientôt. Degér a observé que ces Insectes se nourrissent de la liqueur mielleuse qui se trouve répandue sur les feuilles du Chêne. Ils volent le soir autour des grands Arbres, et les femelles cherchent à y introduire leurs œufs. La principale espèce de ce genre, et la plus commune partout est :

LUC

Le Lucane Cerf- Volant , *Lucanus Cereus* , L. , Fabr., Oliv. (Col., tab. i, n° i , pl. 1 , fig. i); le grand Cerf- Volant (*Platycercus*), Geoff. , Degér. Il est noir; ses élytres sont brunes , ainsi que la tête et le corselet; les mandibules sont grandes , avancées , bifurquées à leur extrémité et unidentées intérieurement dans les mâles; elles sont beaucoup plus petites dans les femelles. Geoffroy et Olivier ont décrit une variété de cette espèce sous le nom de Luc.

Capreolus ; mais il est reconnu que les mâles du *Capreolus* s'accouplent avec les femelles du *Cervus*, et réciproquement. C'est ce qui vient d'être très bien démontré par le burlesque Mémoire de Jean Kœchlin, intitulé : Remarques sur le Lucane ou Cerf- Volant, imprimé à Mulhouse et accompagné d'une planche lithographiée représentant la tête du grand et du petit Cerf- Volant avec celles de différentes variétés qui lient ces deux espèces. Nous ne citerons qu'un passage de ce curieux Mémoire. Le père Trost (*Verzeichniss Eichstadtsclier Insecten*, V. Pater Trost, p.

5a) nous dit : «J'ai trouvé celui-ci (la variété très-petite) dans l'accouplement avec une femelle bien plus grande que lui.

Il y avait encore dans la société plusieurs mâles de différente grandeur; le plus fort lui disputa long-temps la possession de la fiancée , mais en vain, le petit ne voulut pas se désenparer de sa femelle , qui l'emportait sur son dos , si je ne m'étais saisi de toute l'honorable société. » Quoique le Mémoire de Jean Kœchlin soit écrit d'une manière aussi singulière , il n'en est pas moins rempli d'observations curieuses et intéressantes sur les mœurs de ces Insectes.

Le genre Lucane se compose d'une trentaine d'espèces dont le plus grand nombre est propre aux pays chauds de l'Amérique et de l'Afrique. F. , pour leur description , Olivier (loc.

cit.), Fabricius, Latreille, etc. (o-)

LUC A NI DE S. Lucanulcs. ins.

Tribu de l'ordre des Coléoptères,

LUC

section des Pentamèrcs , famille des Lamellicornes, composée en grande partie du genre Lucane de Linné , et ayant pouf caractères : antennes toujours composées de dix articles ayant les feuillets de leur massue déposés perpendiculairement à l'axe, et eu manière de peigne. Les Lucanides volent ordinairement le soir ; leurs larves vivent dans le tronc des vieux Arbres; elles sont presque semblables à celles des Scarabéides. Latreille (Fam. Nat. du Règn. Anim.) divise ainsi celle tribu :

L Labre soit nul ou cache, soit extérieur , mais très-petit ; languette insérée derrière le menton , tantôt cachée par lui , tantôt saillante , grande et bilobée; antennes fortement coudées; mâchoires ordinairement terminées par un lobe membraneux ou coriace , pénicilliforme dans I i plupart, rarement armées de dents i cornées.

f Languette cachée par le menton i ou découverte , mais très-petite et ■ entière ; corps convexe.

Genres : Sinodendre , OEsale.

ff Languette toujours saillante au delà du menton , grande et divisée en deux lobes.

* Corps convexe , du moins dans I les mâles.

Genres : La.mprime, Pholidote.

** Corps déprimé dans les deux •sexes; yeux coupés par les bords lat (oraux de la tête).

Genres : Lucane (Latreille y rap- I porte les genres Figule et OEGule de Mac-Leay fils), INigidie, Dorcus.

Yeux entiers.

. Genres : Cerucuvus , Platycère.

II. Labre toujours découvert , fixe et grand; languette couronnant le i menton, entière; antennes simplement arquées et velues ; mâchoires ' cornées et fortement dentées ; corscllet .séparé de l'abdomen par un étranglement ou intervalle notable.

Genres : Paxille, Passale. V.

tous ces mots. (g.)

LUC 5a5

* LUCCIOLA. iNs. V. Lambyrk d'Italie.

* LUCÉNA. moll. (Ocken.) Syn.

d'Ambrelte. V. ce nîfcw (u.)

LUCER₁N AIRE. Lucernaria. acat.,

Genre de Zoophytes de l'ordre des Acalèphes fixes, olfrant pour caractères : un corps gélatineux , subconique , ayant sa partie supérieure allongée et atténuée en queue dorsale terminée par une ventouse; l'inférieure plus ample , plus large , ayant son bord divisé en lobes ou rayons divergens et lentaculifères ; bouche inférieure et centrale ; des tentacules courts, nombreux, à l'extrémité de chaque rayon. Ce genre a été établi par O.-F. Miiller pour un Animal qu'il découvrit dans la mer du JNord et qu'il fit connaître sous le nom de JLucernaria quadricomis. Tous les naturalistes l'ont adopté. Gmelin le range pauni les Vers mollusques, entre les Méduses! Cuvier le rapproche des Actinies. L.unarck le classe avec les Radiaires dans la division des Radiaires mollasses anomaes ; Schweigger le place entre les Zoanlhes et les Astéries dans sa classe des Radiaires.

Miiller, Fabricius , Montagu, Fleming, ont successivement fait connaître leurs observatious sur les Lucernaires ; mais le travail le plus intéressant sur ces Animaux a été donné par Lamouroux dans un Mémoire inséré parmi ceux du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.

Les Liicerna ires fixées par l'extrémité de leur queue aux corps sous-marins et spécialement aux Thalassiophytes, peuvent néanmoins se déplacer pour s'attacher ailleurs ; elles sont ordinairement pendantes , la bouche en bas, mais elles peuvent

firendre toutes sortes de situations; eur corps aplati ou concave en dessus est conique en dessous et se termine par une portion rétrécie, cylindroïde ou anguleuse , quelquefois contournée, que l'on a nommée Queue, et dont l'extrémité est munie d'une sorte de ventouse qui leur permet de s'attacher d'une manière as-

5a6 LUC

scz inlimcaux corps sous-marins. La peau de cette surface supérieure est lisse ou légèrement plissée; sa transparence laisse voir au travers les or-

fanes contenus dans l'intérieur de Animal; la surface inférieure est plane ou concave , lisse ou plissée, suivant les mouvements ; au centre , existe un tube diaphane, saillant, quadrifide, au fond duquel est une ouverture ronde, et derrière celle-ci , une autre ouverture arrondie dont la circonférence est garnie de plusieurs corps opaques , discoïdes , placés de champ et liés ensemble par une substance membraneuse , irritable: cette sorte d'anneau paraît faire l'office de mâchoires. Tout cet appareil constitue la bouche. Le bord de la portioo élargie du corps drs Lucernaires ou le limbe est divisé plus ou moins profondément en huit rayons portant à leur extrémité et inférieurement un grand nombre de tentacules disposés en bouquet, et terminés par un renflement semi-globuleux. Une espèce a sou limbe divisé en huit parties d'égale longueur; une autre n'a que quatre divisions

principales , et chacune est subdivisée en deux près de son extrémité. Les rayons tentaculifères des Lucernaires sont susceptibles de se contracter et de se replier vers la bouche , ensemble ou séparément ; ils servent , conjointement avec les tentacules, à saisir les petits Animaux dont les Lucernaires se nourrissent. On trouve, en ouvrant le corps des Lucernaires , un sac ou estomac étendu de la bouche jusque vers l'extrémité de la queue ; de la surface de l'estomac partent des canaux ondulés, intestini-formes, se dirigeant vers les rayons du limbe jusqu'à l'origine des tentacules; ils n'ont point d'orifice excréteur dans cette partie et sont de véritables cœcums; ils sont attachés sur des bandelettes de nature fibreuse , et le tout est enveloppé d'une membrane trèsmince. Ils sont au nombre de huit dans une espèce, de quatre seulement dans l'autre, mais probablement ils sont doubles.

LUC

Laniouroux admet , d'après les descriptions des auteurs , cinq espèces de Lucernaires, mais il paraît constaté qu'il n'y a véritablement que deux espèces ,1e Lucemaria quadricomis , Miill. , et le Luc. ocloradiata , Lamx. (É. D..L.)

* LUCERNAIRE. Lucern aria. bot.

crypt. ? {vrlrhrodiées.) Le genre ainsi appelé par Roussel qui ne savait pas sans doute qu'un genre d'Acalèphes portait ce nom , répond à peu près à notre genre Tendaridée. V. ce mot.

LUCERNTJLA. bot.piian. (Gaza.) Syii. de Lychnide. V. ce mot.
(b.)

LUCHERAN. ois. (Albin.) Syn.

d'Efl'raie, Slrix Flammea , L. V.

Chouette. (b.)

LUCHS-SAPHIR. min-. Ce mot, dont la véritable signification est Saphir de Lynx, n'est point, comme on l'avait pensé , une des variétés du Corindon bleu auxquelles on donne le nom de Saphir blanc.

Selon Léman, il désigne le Saphir d'eau des joailliers, que Cordier a déciit sous le nom de Uichroïle. V .

ce mot. (g..N.)

* LUCIE. Lucia. Savigny donne ce nom à la seconde famille de ses Ascidies Télhydes , caractérisée par un corps flottant; orifices diamétralement opposés et communiquant ensemble parla cavité des branchies ; cavité branchiale aux deux extrémités; l'entrée supérieure dépourvue de filets tentaculaires , mais précédée par un anneau dentelé: branchies séparées. Cette famille est divisée en deux sections :

La première, ou Lucies simples, entièrement systématique, ne renferme aucun genre. La seconde, ou Lucies composées , renferme le genre Pyrosomc. P?. ce mot. (e. d..l.)

LUCIFUGES ou PHOTOPHY- GES. ins. Duméril (Zool. Analyt.) désigne ainsi une famille de l'ordre des Coléoptères qui embrasse les premières tribus de la famille des Méla-

LUC

«somes de Latreille. V. Mélasomes.

LCCILIE. Litcilia. bot. phan.

(Genre de la famille des Synanthérées, (Corymbifères de Jus-sieu, et de la Syngénésie superflue de Linné, établi [par H. Cassi-ni (Bullet. de la Société Philomat. , février 1817 ; qui l'a ainsi (Caractérisé : involucre cylindracé , accompagné à sa base de trois bractées, formé d'écaillés imbriquées, scarieuses ; les inté-rieures longues, «étroites , linéaires-aiguës; réceptacle plane et nu ; fleurs du centre peu

■ nombreuses, régulières et hermaphrodites ; étamines dont les appendices supérieurs sont soudés entre eux , et les infé-rieurs longs et filiformes; fleurs de la circonférence sur

■ un seul rang, peu nombreuses , fennelles, et à corolle très- longue ; le style a deux stigmatophores longs et

utères ; ovaires cylindracés , hérissés de longs poils , surmon- tés d'une aigle et composée de poils à peine plumeux, la plu- part bifurqués au som-

■ met.

Ce genre fait partie de la tribu des Gnaphaliées de Cassini , et se place entre le Cheureulia et le Faucis du même auteur, dont à peine on peut le distinguer par les caractérisés» Cassini avoue d'ailleurs que le genre *Lucilia* devra , ainsi que beaucoup d'autres, être réuni au *Gnaphalium* par les botanistes qui n'aiment point la multiplicité des genres. Le.,

deux espèces qui composent celui (dont il s'agit dans cet ar- ticle, sont : *Lucilia aculifolia*, Cass. , ou *Ser-*

ralula aculifolia , Poiret. Cette Plante est indigène de Monte- video; 2° *Luccia microphylla* , Cass. , espèce dou- Ituse établie

sur un individu qui n'existe que dans l'herbier du professeur Desfontaines, et dont la patrie est ignorée. (g.n.)

LUCINE. Lucina. MOLL. Linné avait • confondu les Lucines en partie avec les Vénus, en partie avec les Tellines ;

■ elles ne présentent cependant jamais les caractères de ces deux genres

quoiqu'elles s'en rapprochent; aussi

LUC B

Bruguière les sépara dans les planches de l'Encyclopédie, et sans le caractériser, indiqua ce groupe aux zoologistes; Lamarck l'adopta dans le Système des Animaux sans vertèbres, et lui donna des caractères génériques qu'il reproduisit dans les Annales du Muséum. En publiant l'Extrait du Cours, ce célèbre naturaliste n'apporta aucun changement dans la composition du genre, et n'adopta pas le *Loripes* de Poli. Le premier et le seul démembrement a été proposé sous le nom de *Fimbria*, par Megerle, et ensuite sous celui de *Coibille* par Cuvier dans le Règne Animal; ce genre avec cette dernière dénomination a été généralement adopté des conchyliologues, et entre autres de Lamarck, Férussac, etc.

Le démeinbi cuient des Corbeilles était le seul qu'on pouvait faire en l'appuyant sur de bons caractères, car, malgré la variabilité des caractères extérieurs des coquilles des Lucines, il est impossible, du moins dans l'état de nos connaissances, d'en faire plusieurs coupes génériques; et c'est sans doute après cette ana-

logie, pour ainsi dire forcée, qui lie les espèces de ce genre, que Lamarck , et plus récemment encore Blainville, y ont réuni le Loripède de Poli. Effectivement, la 'J'c//i//alacica, L\n., qui sert de type au savant zoologiste napolitain , présente tous les caractères extérieurs des Lucines , ce qui porte à croire que celles-ci ont les mêmes caractères zoologiques que celles-là, ce qui est indiqué et par la charnière et par les impressions des muscles ou du manteau.

Blain ville, dans son article Mollusque, ne s'est pas contenté de réunir ce seul genre aux Lucines; il y a ajouté les Amphidesmes , et replacé les Corbeilles que Cuvier en avait séparées; quant à ces dernières, peut-être est-ce en juger trop prématurément, puisqu'on ne connaît point l'Animal, et que les coquilles n'ont qu'un seul trait de ressemblance, l'existence des dents latérales à la charnière; il suffit de comparer les

LUC

LUC

caractères de ces deux genres pour se convaincre de leurs différences; quant aux Amphidesmes, elles nous paraissent rapprochées des Lucines d'une manière plus forcée encore; outre qu'elles ont le ligament intérieur comme quelques Lulraires ou Laviguans de Cuvier, et celles entre autres qui se rapprochent de la Galcinelle d'Adanson, caractères que ne présentent jamais les Lucines , quoique quelques-unes aient le ligament très-enfoncé entre des nymphes saillantes qui le cachent en partie audehors ; les Ampidesmes n'ont pas non plus les impressions musculaires des Lucines , et l'impression du manteau est profondément sinueuse, ce qui annonce l'existence de grands siphons et d'un pied

lamelliforme plutôt semblable à celui des Tellines qu'à celui des Lucines. Nous nous abstenons donc d'admettre ce changement , considérant avec le plus grand nombre des conchyliologues modernes que les Lucines forment à elles seules un groupe naturellement caractérisé par l'impression des muscles et le défaut de pli irrégulier, ce qui les distingue des Tellines , par le ligament extérieur, l'impression des muscles et du manteau , ainsi que la disposition des dents cardinales, ce qui les sépare des Amphidesmes, et enfin par la forme des crochets des dents cardinales , la position et la constance des dents latérales, ce qui , joint aux autres caractères, les éloigne des Corbeilles. Ce genre est caractérisé de la manière suivante : coquille suborbiculaire , inéquilatérale , à crochets petits , pointus , obliques; deux dents cardinales divergentes dont une bifide, et qui sont variables ou disparaissent avec l'âge; deux dents latérales dont une est quelquefois avortée , la postérieure plus rapprochée des cardinales ; deux impressions musculaires très-séparées dont la postérieure forme un prolongement en fascie ; l'impression du manteau est simple; ligament extérieur. Si l'on veut admettre le Loripède de Poli comme une véritable Lucine , alors on

pourra caractériser l'Animal de la manière qui suit : corps orbiculaire , symétrique, comprimé, enveloppé par un manteau sinueux sur les bords, entièrement fermé, si ce n'est inférieurement et en arrière ou il se termine par une assez long tube, unique; appendice abdominal fort allongé, flagelliforme ; les branchies à demi réunies en un seul lobe de chaque côté ; bouche sans appendices labiaux.

Ou ne connaît pas encore un très-grand nombre d'espèces vivantes appartenant à ce-genre ; il est beaucoup plus nombreux

en espèces fossiles, et les environs de Paris en offrent plus à eux seuls que tous les autres terrains tertiaires connus si on en juge d'après les collections et les ouvrages publiés jusqu'aujourd'hui ; nous en avons décrit et figuré vingtdeux espèces dans notre Description des Coquilles fossiles des environs de Paris , et nous les avons partagées en plusieurs groupes dont les caractères peuvent également convenir aux espèces vivantes.

Nous proposerons plusieurs changemens en les soumettant toutefois aux conchyliologues , c'est de replacer dans le genre qui nous occupe plusieurs Coquilles que les auteurs rangent habituellement parmi les Vénus de Linné ou les Cythérées de Lamarck. Ce sont pour les espèces vivantes les Cythérées à boid rose et tigérine, et pour les fossiles celle que dernièrement Basierot a nommée *Cytkerea leonina* dans son Mémoire sur les Fossiles des environs de Bordeaux, et une autre espèce encore inédite de la même localité qui a beaucoup de rapport avec la précédente. Si nous examinons ces espèces avec tout le soin nécessaire et comparativement avec les Lucines, nous leur trouverons tous les caractères de ce genre , des coquilles aplaties, orbiculaires , rayonnantes, qui n'ont jamais plus d'une ou deux dents à la charnière ; une dent latérale plus éloignée que dans les Cythérées qui présentent toujours une grande impression mus-

LUC

culaire , antérieure , en forme de languette , avec une impression du manteau simple sans la sinuosité plus ou moins profonde qui se remarque dans les Cythérées au côté postérieur, et qui indique dans ce genre l'existence des siphons; enfin l'intérieur de la coquille parsemé de points enfoncés , entourés d'un cercle plus ou moins régulier, caractère qui se retrouve dans presque toutes les

Lucines , et qui tient probablement à une organisation particulière du manteau; les Coquilles qui présentent toutes un caractère appartenant si essentiellement aux Lucines ne peuvent on aucune manière rester parmi les Cythérées. La seule objection que l'on pourrait faire, c'est que les quatre espèces que nous proposons de restituer aux Lucines n'offrent jamais qu'une dent latérale au lieu de deux qui caractérisent ordinairement les Lucines ; mais cette anomalie dans ces espèces ne saurait être un obstacle pour ne pas admettre leurs rapports naturels , puisqu'elle a lieu assez fréquemment pour d'autres espèces qu'on n'a pas moins rangées dans le genre. Nous citerons pour exemple le *Lucina edptttula* qui n'a ni dents cardinales ni dents latérales; nous pourrions ajouter \e*Lucina JfJenardi*, espèce fossile qui est dans le même cas, et plusieurs autres. Si ces espèces restent parmi les Lucines, lorsqu'à la rigueur elles en présentent moins les caractères, pourquoi celles que nous proposons d'y introduire n'y seraient-elles pas admises?

Le *Lucina carnaria* , Lamarck , ne peut rester parmi les Lucines, elle n'en présente pas les caractères; elle a bien plutôt ceux des Tellines parmi lesquelles on la reportera indubitablement lorsqu'on l'aura examinée avec quelque soin ; ce qui l'éloigne au premier abord de ce genre est l'impression sinueuse du manteau qui a une échancrure très-profonde; ce qui l'en éloigne encore, c'est qu'elle est dépourvue de l'impression musculaire , linguiforme , antérieure ; enfin elle a sur le côté l'inflexion ou le

TOME IX

LUC jj<>

pli des Tellines, il est vrai, très luiblement prononcé, mais il n'en existe pas moins. Après avoir fait ces rectifications que nous pensons être importantes, voici comment nous avons à établir nos coupes :

■ f Coquilles orbiculaires , lisses; quelquefois les dents de la charnière avortées.

a. Espèces qui n'ont ni le corselet, ni la lunule saillants ou indiqués par une ligne.

Lucine édentée, *Lucina edentula*, Lamk. , Anim. sans vert. T. v, pag.

540, n . 5 ; *Venus edentula* , L. , Gmel . , 3286, u. 80; Lister, Conch., lab. 260, fig. 86; Mart., Conch. Cab. T. vu, p. 54, pl. 40 , fig. 427 à 429; Encycl. , pl. 284 , fig. 5 , a , b.c. Elle n'a jamais de dents cardinales , ni de dents latérales. Elle est jaune d'abricot en dedans, ce qui lui a valu chez les marchands le nom vulgaire d'Abricot.

Lucine lactée , *Lucina lactea* , Lamk , Anim. sans vert. , /oc. c//., n.

1 2 ; *Ampludesma lactea* , ibid. , Anim. sans vert. T. v, p. 491, n. 5 ; *Amphidesma lucinalis* , ibid., loc. cit., n. 6; Chemnitz, Conch. T. vi , tab. i3, fig. ia5; Loripes , Poli, Testac. des Deux- Siciles , T. 1 , tab. i5 , fig. 28, 29 ; Encycl. , pl. 286 , fig. 1 , a , b , c. Coquille toute blanche, qui a seulement une ou deux dents cardinales , jamais de dents latérales. Elle est assez mince, subdiaphane. Elle se

trouve vivante dans la Méditerranée, à l'Ile-de-France , et fossile dans les faluns de la Touraine, d'après Lamarck.

Lucine géante , *Lucina gigantea* , N. , *Descript. des Coq. foss. des environs île Paris* , T. 1, p. 91 , pl. i5} fig. 11 , 12. Très-grande Coquille fossile qui n'a jamais de dents à la charnière. Elle se trouve à Parnes, Mouchy, Liancourt et Chaumont , dans le Calcaire grossier.

/S. Espèces qui ont la lunule et le corselet saillans ou indiqués.

Lucine de Ménabdi, *Lucina lilanardi* , N., *Descript. des Coq. foss.*

des environs de Paris, T. 1 , p. 94, n. 6, pl. 16, fig. i5, i4. Espèce fort

530 LUC

belle et fort grande que nous avons trouvée à Maulette, près Houdan, et que nous avons dédiée au savant professeur Ménard de la Groye. Elle est remarquable par la grandeur et la saillie que font sa lunule et le corselet; elle est lisse et n'a jamais de dents à la charnière.

Lucine Aluella, *Lucina Albella* , Lamk., *Ann. du Mus.* T. vu, p. u40, n. 8 , et T. xu , pl. 4a , fig. 6 , a , b ; *ibid.* , N., *Descript. des Coq. foss. des environs de Paris*, loc. cit., pl. 17 , fig. 1, 2. Elle est de Grignon.

Lucine calleuse , *Lucina callosa*, N. ; *Venus callosa*, Lamk. , *Ann. des Mus.* T. vu , p. i30, et T. ix, pl. 32, fig. 6, a, b; *Lucina callosa* , N., *Descript. des Coq. foss. de Paris*, loc. cit., n. 9, pl. 17, fig. 5, 4, 5.

f f Coquilles orbiculaires , couvertes de stries ou de laines concentriques.

a. Espèces dont la lunule et le corselet ne sont ni saillans ni indiqués.

Lucine Ratissoike, *Lucina Radula*, Lamk., Anim. sans vert. T. v, p. 54i , n. 5; *Tellina Radula* , Montagu , Test. Brit. T. il, fig. i, 2; Petiver, *Gazophil.* , tab. g3 , n. 18. Elle a beaucoup de rapports avec la Lucine concentrique que l'on trouve fréquemment fossile aux enviions de Paris , el qui est à peu près de la même taille. Elle vit dans l'océan Britannique.

Lucine concentrique , *Lucina concenlrica*, Lamk., Ann du Mus.

T. vu, p. 2 38 , et T. xu, pl. 42, fig. 4 , a , b ; *ibid.* , Anim. sans vert. T. v, p. 54i,n. 6; *Encycl.*, pl. 283, fig. a , a , b , c; *Lucina concenlrica* , N. , *Descript. des Coq. foss. des environs de Paris* , T. 1 , p. 98 , n. 1 3. Espèce très-commune dans les Calcaires grossiers du bassin de Paris , ornée de lames concentriques, élégantes; la coquille est lentil'orme , assez épaisse.

Lucine sillonnée , *Lucina sulc.ata* , Lamk. , Ann. du Mus. T. vu , p. 240 , n. 9 , et T. XII, pl. 4a, Gg. 9, a, b ; *ibid.* , N. , *Descript; des Coq. foss. de Paris*, loc. cit., pl. i4, fig. 12, i3.

LUC

Coquille arrondie, très-souvent plus longue que large , couverte de sillons arrondis et concentriques. C'est à Parnes , à Mouchy età Château-Rouge qu'elle se rencontre le plus ordinairement. Elle est de la grandeur de l'ongle.

b. Espèces dont la lunule et le corselet sont saillans ou indiqués.

Lucine de la Jamaïque , *Lucina jamaicensis* , Lamk., Anim. sans vert. T. v, p. 538, n. 1 ; *Venus jamaicensis*, Chemnitz, Conch. T. vii, p. 24 , pl. 59 , fig. 408, 409 ; Lister, Conch. , tab. 300 , fig. 137 ; Encycl. , pl. 284, fig. 2, a, b, c. Coquille grande , peu épaisse , d'une couleur fauve en dedans, couverte en dehors de lames peu saillantes, subrégulières, distantes; corselet et lunule très saillans , bien marqués.

Lucine épaisse, *Lucina Pensylvanica* , Lamk. , Anim. sans vert. , loc.

cit., n. 2 ; *Venus Pensylvanica*, L., Gmel. , p. 3283, u. 71; Lister, Conch., tab. 5 , fig. 8; Boni., Mus.

Cæs. Vind., lab. k, fig. 8; Chemnitz, Conch. T. vii , pl. 57 , -fig. 584 , 585 , 396; Encycl., pl. 284, fig. 1, a, b, c. Espèce très- remarquable par son épaisseur, la grandeur de son corselet qui est très-saillant et de la lunule qui est grande , enfoncée et fortement circonscrite; elle est couverte de lames obsolètes, distantes ; elle est toute blanche. C'est dans l'Océan d'Amérique qu'elle se trouve. L'espèce suivante fossile , des faluns de la fouraine et des environs de Bordeaux-, quoique plus petite et plus gonflée, a beaucoup de rapports avec elle.

Lucine Colombi., *Lucina Columbella*, Lamk., Anim. sans vert.

T. v, p. 548, n. 15; Basterot, Mém.

de la Soc. d'Hist. Nat. de Paris, T.

u, première partie , pl. 5, fig. 11.

fff Coquilles orbiculaires qui ont des stries ou des côtes divergentes du sommet à la base.

Lucine Tigéte ine , Lucina Tigerina, N.; Cytherea Tigerina, Lamk., Anim.

sans vert. T. v, p. 574, n. 53 ; Venus Tigerina, L., Gmel., p. 5283, n. 69;

LUC

'Lister, Conch., t. 357 , fig. i?4j iChemnilz, Conch. T. vu, lab. 07, fig. 090, 3gi • Encycl., pl. 277, iig. *, ; a , b. D'après ce que nous avons dit] précédemment, nous rapportons ici 1 cette espèce ; nous ne répéterons pas ! pour quels motifs , puisque nous les . avons exposés.

LUCINE A BORD ROSE , Luci/ia punc- .nta, N.; Cylherea punctata , Lamk., Anim. sans vert., ivc. cit-,n. S1*; Tenus punctata, L. , Gmel. , n. 74; Cheninilz.T. vu , p. i5 , pl. 37, fig. 097 et 5g8 ; Encycl. , pl. 277 , fig. 5, . a, b , c. Cette grande et belle espèce est remarquable autant par son épais- . seur que par ses côtes rayonnantes , aplaties, et par sou bord agréablement coloré en rose purpurin. Linné avait remarqué que dans l'intérieur des valves elle était ponctuée, .d'où le nom qu'il lui imposa. Mous : savons que ces points sont particuliers aux Lucines.

Lucine Lionne , Luci/ia Leonina , '.N.; Cytlierea Leonina, Basterot, Mém.

.de la Soc. d'Hisl. INat. de Paris, T. 11, 1" pai t., p. 90, n. 4, pl. 6, fig. 1 . 'Très-belle espèce fossile très- voisine (de la Liucina

punctata, qui n'en (diffère en rien, si ce n'est par des : stries transverses très-fines , très- • serrées , qui coupent à angle droites 1 côtes plates et rayonnantes. Des individus qui ont conservé leur couleur ■ ont présenté à Basterot des teintes 10- < sées , intenses vers les sommets et (formant des bandes peu distinctes vers les bords. Elle est aussi grande que la précédente. Elle se trouve aux .enviions de Bordeaux.

Lucine divergente , Lucina diva- •ricata, Lanik., Anim. sans vert. T.

w , p. 54i , n. 7; ibiil- , Ann du Mus. IT. vu, p. 229; Tellina diuaticata, IL., Gmel., p. 324i , n. 74 ; Sowerby, Mineral Conchology , t. 4i7 ; Chemnitz, Conch. T. vi, p. i54, pl. 1 3, fig. 1129; Bast. , Mém. de la Soc. d'Hist.

NNat de Paris , T. 11, prem. part. , p. ^86. n. 2 ; Encycl. , pl. 285 , fig. 4 , a , hb; Poli, Test, des Deux -Siciles , pl. ii-5, fig. 25. Espèce petite , remarqua^ 'ble par la manière universelle dont

LÛC 5 m

elle est répandue , se rencontrant dans les mers de l'Inde, de l'Amérique, la Méditerranée, l'Océan ,etfossifedans tous les terrains tertiaires de l'Italie, de la France , de l'Allemagne et de l'Angleterre. (d..h.)

LUCINIUM.BOT.PHAN.(PIukenet.) Sy 11. à'Amy/is bah ami fer a. V-, Baumiek au Supplément. (b.)

* LUCIO ou LUCIOLA. ins. Même chose que Lucciola. f^. Lampyre d'Italie. (g.)

LUCIODONTE. rois. ross. Nom fort improprement donné à de petites Glossopètres que l'on prenait pour des dents de Brochets. (b.)

LUCIOLA. bot. CRYr-T. On a donné quelquefois ce nom à l'Ophiolosse vulgaire , dans l'idée, sans fonement, qu'elle biille pendant la nuit. (b.)

LUCIUS. pois. Nom scientifique du Brochet, y. Esoce. (b.)

LDCULLAN. min. (John.) Pour Lucullite. V. ce mot. (g .n.)

LUCULLITE. min. Une variété de Marbre noir, remarquable par sa fétidité , fut nommée Lucullan par John qui a cru y reconnaître le Marmor Luculleum de Pline rapporté d'Egypte par le consul Lucullus. Ce nom , légèrement modifié en celui de Lucul-lite, a été adopté par Jameson pour la dixième sous-espèce du Calcaire rhomboïde. (g..n.)

LUCUMA. Lucunia. bot. piian.

Genre établi par Jussieu dans la famille des Sapotées, et dans la Pentandrie Monogynie , L. , ayant pour type X Achras rnam-musa de Linné , et qui se compose de six à huit espèces : ce sont des Arbres lactescens, portant des feuilles éparses, très-entières, dépourvues de stipules, et des fleurs solitaires, pédonculées , quelquefois réunies au nombre de deux à trois à l'aisselle des feuilles. Leur calice est à cinq divisions profondes; leur corolle monopétale à cinq divisions; les étamines , au nombre de cinq, offrent entre chacune d'elles,

un appendice filamenteux qui paraît être une étamine stérile. L'ovaire est libre et présente de cinq à dix loges mouospermes. Le fruit est un nuculaine contenant d'un à dix noyaux osseux marqués d'une très-grande aréole ombilicale. Les graines sont dépourvues d'endosperme. Ce genre diffère surtout de l'Achras , par le nombre cinq de ses parties et ses graines dépourvues d'endosperme.

Le *Lucuma mammosa*, Gaerlner fils, Carp. 129, tab. 200 et 204, est un Arbre qui atteint quelquefois une hauteur de ceut pieds ; il croît à Cuba , au Pérou et à la Jamaïque. On le connaît dans nos colonies sous les noms vulgaires de Marmelade naturelle et de Jaune d'œuf. Ses feuilles , qui ont quelquefois jusqu'à deux pieds de longueur, sont allongées , lancéolées, coriaces, très-entières, glabres et portées sur des pétioles d'environ deux pouces de longueur.

Les fleurs sont solitaires, pédonculées , situées à l'extrémité des rameaux. Le fruit est une grosse baie oblongue , mucronée à son sommet, rude à sa face externe , pulpeuse et charnue intérieurement où elle présente une coule-ur jaune rougeâtre; des dix loges de l'ovaire, une seule reste et renferme un noyau très-gros, ovoïde, allongé, terminé en

fiointe à ses deux extrémités , lisse , uisant , et d'une teinte brune claire d'un côté, offrant de l'autre une aréole ombilicale plus claire et qui contient une graine dont le tégument est simple et recouvre un embryon très-gros, dressé , blanc, ayant les cotylédons fort volumineux et la radicule très-petite et obtuse.

Outre cette espèce qui est *Vslchras mammosa* , L. , ce genre en renferme encore huit ou dix autres, toutes originaires de l'Amé-

rique méridionale.

LUDIER. *Ludia*. bot. than. Genre établi par Commerson et Jussieu, d'abord placé dans la famille des Rosacées, mais transporté par Kunth dans sa nouvelle famille des Bixinées.

Ce genre se compose de trois espèces,

.LCD • toutes originaires des îles de France et de Mascareigne. Ce sont des Arbrisseaux rameux, portant des feuilles alternes, dépourvues de stipules, des fleurs blanches, disposées à l'aisselle des feuilles ou le long des rameaux.

Leur calice est monosépale, turbiné à sa base, offrant de cinq à sept lobes (pétaloïdes; les élamines sont extrêmement nombreuses, attachées sur un disque saillant, crénelé. Les élamines, dont les filets sont grêles et capillaires; les anthères presque globuleuses, didymes et à deux loges, sont persistantes. L'ovaire est libre, ovoïde, terminé en pointe à son sommet ou il se confond avec le style; celui-ci se divise à sa partie supérieure en deux, trois ou quatre lanières terminées chacune par autant de stigmates. Coupé transversalement, l'ovaire présente une seule loge contenant un assez grand nombre d'ovules.

attachés à des trophospermes pariétaux dont le nombre est le même que celui des divisions du style. Dans le *Ludia sessiflora* on trouve six ovules attachés par paires à trois trophospermes. Le fruit est une baie peu succulente, uniloculaire et polysperme.

Le *Ludiek taiuabile*, *Ludia heterophylla*, Lamk., Dict. 111., tab. 466, est l'espèce dont on a tiré le nom du genre. Elle est remarquable par la figure diverse de son feuillage aux différentes

époques de son dévelop- [pement. Quand la Plante est fort jeune , les feuilles sont petites, roides , luisantes, fortement dentées et épineuses au sommet de leurs dents comme dans le Houx. Un peu plus tard , les dents disparaissent , les feuilles s'allongent et- deviennent semblables à celles du Myrte ou de l'Oli- < vier. Enfin, quand l'individu est en pleine végétation , elles sont obovales, arrondies, très-entières et pé- i tiolées ; les fleurs sont solitaires, courtement pédonculées, placées à l'aisselle des feuilles. Leur calice est généralement à sept lobes obtus.

Les deux autres espèces de ce genre 1 sont le *Ludia myrtifolia* et *Ludia sessilijlora* de Lamarck. (a. H.)

LTSHD

LUDOLFIA. bot . ru,vN. (VWilldenow.) fr. Auundinauie. (Adanson.) Syn. de Tétragonic. V. ce mot. fB.)

LUDOVIE. Ludovia. bot. i-han.

Ruiz et Pavon, dans la Flore du Chili et du Péron , ont établi sous le nom de *Cartndovica* , un genre nouveau dédié au roi d'Espagne Charles IV, et à la reine Louise son épouse , cl qu'ils placent dans la famille des Palmiers et dans la Monœcie Polyan- drie. Persoon proposa de changer ce nom , un peu long, en celui de *Ludovia*. Mais ce changement ne fut pas adopté par Kunth, qui fit voir que le genre de Ruiz et Pavon n'appartenait pas à la famille des Palmiers , mais bien à ceile des AroïdéesJ Les caractères de ce genre étaient encore imparfaitement connus , quand récemment Poileau de retour à Paris , après un séjour de plusieurs années à Cayenne, en a rapporté deux espèces de ce genre, dont il a exposé les caractères dans le neuvième volume des Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle, p. a5. Plumier est le pre-

mier botaniste qui ait fait mention de ce genre; il en représenta une espèce dans les planches 50 et 51 de ses descriptions des Plantes d'Amérique , mais il ne la décrivit point comme genre distinct. Ruiz et Pavon ont trouvé cinq espèces dont ils ont fait leur genre *Cartudovica*. Enfin Poiteau en a découvert deux , qu'il a décrites avec soin. C'est seulement depuis cette époque que l'on a bien connu la véritable structure de ce genre, dont nous allons donner les caractères tels qu'ils ont été présentés par Poiteau. Les fleurs sont monoïques , disposées sur un spadice cylindrique , enveloppé d'une spathe de plusieurs folioles. Les fleurs mâles réunies par quatre sont placées au milieu des fleurs femelles; leur calice est en cône renversé , ouvert à sa partie supérieure ou il présente un grand nombre de divisions courtes disposées sur deux rangs; les étamines sont fort nombreuses , attachées à la paroi interne du calice. Les fleurs femelles ont

LUD

un calice profondément quadriparti , quatre filamens stériles, très -longs et hypogynes , opposés aux folioles du calice, et que Ruiz et Pavon ont décrits à tort comme quatre styles; un ovaire libre déprimé, tétragon , à une seule loge , contenant un très-grand nombre d'ovules. Le stigmate est sessile, large, discoïde, plane et à quatre angles. Le fruit est une baie uniloculaire polysperme , dont les graines anguleuses sont attachées à quatre trophospermes pariétaux. Les espèces de ce genre sont des Plantes vivaces , quelquefois grimpantes , d'autres fois ayant le port de petits Palmiers. Les deux espèces décrites par Poiteau sont: la *Ludovia* grimpante , *Ludovia funifera* , loc. cit., t. II. C'est une

Plante sarmenteuse et grimpante , dont la tige arrondie , noueuse, presque simple, s'élève sur les Arbres, jusqu'à une hauteur de 40 à 45 pieds , et s'y attache fortement au moyen de racines cauliuaies ou aériennes, courtes et rameuses, qui paraissent remplir l'office de suçoirs. Outre ces racines la Plante parvenue à une certaine hauteur en émet d'autres plus grosses qui descendent perpendiculairement vers la terre. Les feuilles sont alternes, engainantes , longues d'un à deux pieds, divisées plus ou moins profondément en deux lobes , plissées, nerveuses , sèches et. roides comme celles d'un jeune Palmier; le spadice est cylindrique, pédouculé et axillaire. Cette espèce croît à la Guiane près de la rivière de la Mana , et aux environs de la Gabrielle. Les habitans et les Nègres l'appellent Liane franche. La seconde espèce est la Ludovje terrestre , *Ludovia subacautis* , Poit., loc. cit.

Elle a le port d'un jeune Palmier dont la tige n'est pas encore développée. Sa tige ne s'élève guère au-delà d'un pied. Les Nègres l'appellent strouma Cochon. Elle est commune dans les bois humides auprès de la Gabriclle. (a. il.)

LUDUS-HELMONTII. min. V.

Jeux de Van-Helmont.

LUF

LUDWIGIE. *Ludwigia*. bot.phan.

Genre de la famille des Onagraires, et de la Tétrandrie Monogynie , L|., établi par Linné et adopté par tous les autres botanistes. Son calice adhérent par sa base avec l'ovaire infère, se termine par un limbe persistant à quatre lobes allongés; la corolle se compose de quatre pétales* onguculés ; les étamines sont au

nombre de quatre; l'ovaire est à quatre loges polyspermes , sun-
nonté d'un style simple et d'un stigmate lobé. Le fruit est une
capsule ovoïde ou allongée, souvent à quatre angles, couronnée
par les lobes du calice , et s'ouvrantseulemeutpar un trou qui se
forme à son sommet. Ce genre se compose d'un assez grand
nombre d'eST pèces qui croissent surtout dans l'Amérique sep-
tentrionale ou les Indes.

Ce sont des Plantes herbacées , rarement sousfrutescentes à
leur base , portant des feuilles alternes entières et des fleurs axil-
laires. Un assez grand nombre des espèces rapportées d'abord à
ce genre en ont été séparées; ainsi Linné lui-même en a retiré les
espèces qui ont les étamines en nombre double des pétales pour
en faire son genre *Jussiaea*. Les espèces apétales doivent être pla-
cées dans le genre *Isriardia*. Ainsi parmi les neuf espèces décrites
parMichaux (Fl. Bor.

Americ), trois étant dépourvues de corolle doivent être trans-
portées dans le dernier genre; ce sont les *Ludwigia nitida* , micro-
carpa et mollis.

Ce genre mériterait d'être examiné de nouveau avec soin pour
bien déterminer les espèces qui lui appartiennent réellement,
(a.r.)

LUFFA. bot. than. Tournefort et Adanson avaient l'ait un
genre, sous ce nom , de la Papaugaie. Mais Linné l'a réuni au Mo-
mordica en l'appelant *Momordica Luffa*. Plus tard Cavanilles
(Icon. rat:, î, p. 7) a établi dans la famille des Cucurbitacées un
genre *Luffa*, qui nous paraît différent des *Momordica* et qui doit
demeurer distinct. Voici ses caractères :

les fleurs sont monoïques. Les mâles

LUH

ont un calice campanulé , à cinq lanières étroites et caduques, une corolle rnonopétale, régulière, à cinq divisions très-profondes qui simulent une corolle de cinq pétales. Les étamines, au nombre de cinq, sont libres et distinctes les unes des autres. Leurs filets sont attachés sur autant de tubercules glanduleux , alternes avec les divisions de la corolle. Les fleurs femelles ont un calice dont le tube adbère avec l'ovaire qui est anguleux et infère; le limbe et la corolle sont les mêmes que dans les fleurs mâles; les cinq étamines sont ruclimentaires ; le stvle est très-court , terminé par quatre stigmates épais et renflés. Le fruit est une péponide sèche , allongée, marquée de dix angles peu saillans, offrant intérieurement un grand nombre de graines attachées par des filaments à trois trophospermes pariétaux , et s'ouvrant au moyen d'un petit opercule.

Le caractère le plus saillant de ce genre consiste surtout dans ses cinq étamines entièrement libres et distinctes les unes des autres , caractère qui ne se retrouve que dans le genre Gronovia, dans la famille des Cucurbitacées. Quant à la déhiscence par le moyen d'un opercule, Cavanilles ne la donne que comme un caractère incertain , ne l'ayant observée qué sur un fruit qui peut-être n'était pas entier. L'espèce qu'il décrit et figure (*Luffa foetida* , loc. cit., t. 9 et 10) est originaire de l'Inde , mais cultivée aux îles de France et de Mascareigne. Rhéede l'a mentionnée sous le nom de Picirma (Mort. Mal.

8 , p. i5, t. 7) et Rumph sous celui de Petola Betigaknsis (Herb. Amb.

* LUFFA-RADJA. bot. than.

Même chose que *Cailang* des Javanais, à Amboine. V. *Catilang*. (b.)

LUHEA. bot. phan. Genre de la Polyandrie Monogynie, L., établi par Willdenow (Jet. Soc. Nat. Scrui.

Berol., S, p. 40g, t. 5) et adopté par De Caudolle qui l'a placé à la suite de la famille des Tiliacées, et lui a

I.UL

iiiniposé les caractères suivants : involucre court à neuf folioles ; calice divisé profondément en cinq parties ; (cinq pétales ; étamines nombreuses, à filets subulés, velus à la base et réunis en cinq faisceaux auxquels sont adnés inférieurement des processus en forme de pinces ; anthères arrondies ; styles épais, tétrimeres par un stigmate tronqué. Le fruit est inconnu. Ce genre a, selon Ue (Candolle, des rapports, d'un côté ; avec le *Gretvia*, de l'autre avec *Xylocarpus* legraria, ■ genre nouveau formé sur une espèce mexicaine. Il ne se compose (que d'une seule Plante à laquelle Willdenow (Proc. cil. et Spec. Fiant., t. 5, p. 1454) a donné le nom de *Luhca speciosa*. Ses feuilles sont alternes, à trois nervures, marquées de veines, presque cordiformes, obtuses et inégalement dentées ; elles sont portées par des pétioles courts et pubescents.

Les fleurs sont blanches, peu nombreuses, et disposées en grappes terminales. (o..N.)

* LUIDA. bot. cryi't. (Mousses.)

- Ce genre , créé par Adanson dans la I famille des Mousses , est artificiel et mon susceptible d'être adopté. C'est ; parmi les Gymnostorium , Ivissia , .Dicranum, Tortula, Bryu/n, Necliera, Hypnum , Fisside/is , etc., qu'il Ifaut chercher les Luida d'Adanson.

LUJULA- bot. phan. L'un des moins vulgaics de l' Alléluia , Oxalis .Acetosetla. V. Oxalide. (B.)

LULAT. cosch. Linné rapporte à :son Mytilus Modiolus le Lulat d'Aidanson (Voy. auSéné., pl. i£>). Comi me celte espèce de Linné en comprend (plusieurs on ne sait trop de laquelle ion doit maintenant la rapprocher.

iLamarck cite avec doute le Lulat, idans la synonymie du Modiola Fa- .puana, tandis que le Myliltis Mo-

- diolus de Linné, est cité à son Motdiola Tulipes. 11 paraît , d'après la (description d'Adanson , que le Lulat (est une espèce particulière qui n'a I point été suffisamment étudiée des

auteurs. V. M.OD1oL.Ë. (»..u.)

LUM Pô!»

LU LU. ois. Espèce du genre Alouette. V. ce mot. (b.)

LUMACHELLE ou LUM AQU EL- LE, min. On donne ce nom à une variété de Marbre ou Chaux carbonatée susceptible de poli , renfermant des Coquilles pour la plupart brisées et en si grande quantité que ce Marbre en paraît entièrement composé.

Les minéralogistes le désignent sous le nom de Chaux carbonatée granulaire coquillière. f. Chaux. (g..n.)

LUMBRICAIRE. Lumbricaria.

bot. crypt. (Éfydrophjies.) Palisot- Beauvois s'élanl un peu pressé d'établir des genres dans tous les ordres de la Cryptogamie qu'il n'avait que superficiellement examinés , forma son Lumbricaria du Fucus lumbricalis, L. , qui est une Furcellaire de Lamouroux , genre antérieurement adopté par tous les algologues. V.

FuitCELLAinE. (».)

LUMBRICITE. foss. Nom impropre que l'on a donné autrefois à des Serpules fossiles que l'on a comparés ou pris pour des Vers de terre pétrifiés. (D..H.)

LUMBRICUS. anni-l. V. Lombric.

LUMIE. bot. phan. Nom donné à l'une des sections établies parmi les espèces nombreuses du genre Oranger. V. Oranger. (a. r.)

LUMIERE. La cause qui rend les objets visibles à nos yeux a trop d'importance pour que, dans un ouvrage d'histoire naturelle, nous omettons de développer succinctement les principaux phénomènes qu'elle présente, sans pourtant entrer dans les nombreuses recherches qui exigent l'application du calcul et qui constituent l'optique , branche importante de la physique proprement dite.

Quelle est la nature de la lumière ?

Cette question a été un sujet de méditation pour les plus grands physiciens, mais elle n'a pas pu encore être parfaitement résolue. Deux théories, dont nous exposerons seulement les prin-

cipes, ont été embrassées par les savans. La première, due au génie de

LUM

Descartes, a été admise, sans quelques modifications, par des hommes du plus grand mérite, tels que Huygens et Euler, Young et Fresnel. Ils pensent que la Lumière est un fluide extrêmement subtil, un Ether répandu dans l'espace universel, éprouvant de la part des corps que l'on considère comme des sources de Lumière, une action qui lui imprime un mouvement d'ondulation semblable à celui de l'air agité par le son ou à celui de l'eau, lorsqu'on y laisse tomber des corps pesans. Ce mouvement est oscillatoire, de telle sorte qu'à partir du point où commence l'agitation, les molécules du fluide éprouvent d'abord une répulsion qui les éloigne de ce point; ensuite la réaction produite par leur élasticité et celle des molécules sur lesquelles elles s'appuient, les fait rétrograder au-delà de leur première position, et les alternatives se répètent absolument de même que dans la vibration du pendule. L'autre théorie, dont les partisans ont été bien plus nombreux que ceux du Système ondulatoire, reconnaît pour auteur Newton, et a été nommée théorie de l'émission.

On suppose, en effet, que la Lumière, partie essentielle des corps lumineux, est lancée par filets de molécules très-déliées, lesquelles soit directement, soit par la réflexion des corps opaques, viennent exercer sur le fond de l'œil une impulsion constituant la sensation de la Lumière. L'une et l'autre des hypothèses ingénieuses que nous venons d'exposer, expliquent assez

bien le plus grand nombre des phénomènes observés jusqu'ici , mais chacune est sujette à des objections si graves que l'on ne peut se prononcer exclusivement pour l'une d'elles et la regarder comme l'expression de vérités démontrées.

Comme la plupart des sources de la Lumière sont aussi celles du calorique, on a pensé que le premier de ces fluides impondérables n'était qu'une modification du second. Cependant plusieurs corps sont lu-

mineux sans produire la moindre chaleur appréciable; telles sont les substances phosphorescentes. La Lumière de la lune , des planètes et des étoiles , concentrée au moyen de miroirs concaves , n'indique aucunement qu'elle soit accompagnée du calorique ; il y a donc quelque chose de bien distinct entre la Lumière et le calorique ; mais leurs phénomènes sont le plus souvent simultanés, et leur étude ne peut être séparée. Aussi avons-nous eu déjà occasion d'en exposer les principaux, dans les articles Electricité , Feu et Flamme. P[^]. ces mots.

Newton, à l'aide du prisme, décomposa le premier la Lumière en sept rayons diversement colorés , qui se nuancent entre eux et reproduisent artificiellement les phénomènes naturels de l'arc-en-ciel. Ces sept rayons primitifs sont les suivans : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge. Le rayon violet est celui qui est susceptible de la plus grande réfrangibilité , et le rouge de la plus petite. En réunissant tous les rayons en un seul faisceau au foyer d'une lentille, l'illustre physicien reproduisit la Lumière blanche. Cependant le nombre des rayons lumineux primitifs a été réduit par quelques savans à trois, savoir : le "bleu, le jaune et le rouge, suivant les uns, et le rouge, le vert et le violet suivant les autres; enfin d'après Wollaston à quatre, qui sont le rouge, le

vert-jaunâtre, le bleu et le violet. Ces modifications au système de Newton sur la décomposition de la Lumière , ne sont pas universellement admises. En effet, quoique la combinaison variée des trois ou quatre rayons principaux que nous venons de désigner produise les autres couleurs , comme par exemple le jaune et le bleu qui donnent naissance au vert, cependant ces rayons colorés obtenus par la combinaison; offrent assez de différences avec ceux qui sont le résultat de la décomposition du trait primitif. Si l'on soumet

LUM

ces derniers à une seconde réfraction, Us restent simples, tandis que la même opération décompose dans ses éléments le vert formé par la réunion du bleu et du jaune , comme toutes les autres couleurs produites par le mélange des rayons.

La Lumière émauée d'un point lumineux , diverge en rayons rectilignes , qui occupent un espace de plus en plus grand à mesure qu'ils s'éloignent de leur foyer. Un corps opaque placé dans cet espace détermine une ombre par laquelle les objets , situés au-delà et sur une même ligne droite que le corps opaque et le corps lumineux , sont privés de Lumière.

La vitesse avec laquelle se meut la Lumière est tellement extraordinaire , que rien ne peut lui être comparé sous ce rapport. Elle parcourt, en huit minutes treize secondes sexagésimales , la distance moyenne du soleil à la terre, c'est-à-dire plus de quinze millions de myriamètres.

Ce fait a été reconnu en 1675 par Rømer , et confirmé en 17⁸ par Brailley, d'une manière qui ne laisse aucun doute sur la précision du calcul. Lorsque les rayons lumineux tombent sur une surface polie, ils sont renvoyés ou réfléchis, en faisant avec cette surface un angle égal à celui qu'il faisait de l'autre côté en y arrivant. Celle loi que l'on énonce en disant que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, est la base de la théorie des miroirs ou de la catoptrique. En traversant les corps diaphanes, les rayons lumineux sont

souvent détournés de leur route par l'action de ces corps. On donne le nom de réfraction au changement de direction qu'ils éprouvent alors et qui les fait paraître comme brisés.

Ce phénomène se présente toutes les fois que les rayons passent d'un corps ou milieu dans un autre de densité différente et qu'ils en rencontrent la surface extérieure dans une direction oblique. Ainsi , pour n'en citer qu'un exemple dont l'observation est très-vulgaire, lorsqu'on plonge obliquement et en partie un bâton dans

l'eau, il paraît brisé à l'endroit où il y entre. C'est sur cette propriété de la Lumière qu'est fondée la dioptrique. En se servant de verres dont la densité est plus ou moins forte, et dont les surfaces offrent des courbures en divers sens , on modifie à volonté la divergence ou la convergence des rayons lumineux , de sorte qu'ils se réunissent à un point plus ou moins rapproché que l'on désigne par le mot de foyer. Ainsi la forme convexe des verres rend convergens les rayons incidens qui sont parallèles, tandis que la forme concave les rend divergens. C'est à la réfraction de la Lumière qu'il faut attribuer le phénomène du crépuscule ; quand le soleil n'est pas encore descendu beaucoup au-dessous de l'horizon

zon , ses rayons rencontrant la couche supérieure de l 'atmosphère sous de petits angles , et sont réfléchis vers la surface de la terre, et produisent une faible Lumière. Un phénomène qui a frappé de tous temps les voyageurs et que les marins connaissent sous le nom de Mirage, est encore dû à la réfraction de la Lumière , laquelle réfraction se convertit en réflexion , parce que les rayons passent d'un milieu plus dense dans un autre qui est plus rare. Lors de la fameuse expédition des Français en Egypte, il fit plusieurs fois illusion aux soldats altérés qui avaient sous leurs yeux la perspective désespérante d'un lac immense fuyant devant eux à mesure qu'ils s'avançaient au travers des plaines sablonneuses de l'Afrique.

L'illustre Monge a décrit ce phénomène et en a donné une théorie très-satisfaisante. L'air qui repose sur le sol brûlant de ces contrées, se dilate et forme une couche peu considérable, parce que ce fluide n'est pas bon conducteur du calorique. Au-dessus, de cette couche est l'air atmosphérique non dilaté et conséquemment plus dense; alors les rayons solaires, qui l'ont traversé, se réfléchissent à son contact avec la première , se relèvent et présentent à l'œil l'image

du ciel en déroband la vue du terrain. D'un autre côté les villages placés sur les monticules et tous les objets qui s'élèvent au-dessus de la couche d'air dilaté , envoient des rayons réfléchis à la jonction des deux couches et y peignent des images renversées. L'illusion est alors complète , l'observateur ne voit plus qu'un grand espace bleuâtre formé par la réflexion du ciel, parsemé de villages et d'Arbres aux pieds des quels paraît leur image renversée.

Mais à mesure qu'il s'approche de ces îles apparentes , l'inclinaison des rayons émanés du sol augmente assez pour arriver à son œil , les bords de la fausse inondation se reculent, et le mirage va plus loin se reproduire.

Il est encore un autre ordre de phénomènes de la Lumière qui ne se développent que dans certaines substances , et qui tiennent à des circonstances délicates qu'il est quelquefois assez difficile de faire naître ou d'apercevoir. Nous voulons parler de la double réfraction et de la polarisation que présente avec le plus d'évidence la variété de carbonate calcaire, connue sous le nom de Spath d'Islande; mais qui peut aussi s'observer dans plusieurs autres Minéraux cristallisés, tels que le Quartz, la Baryte sulfatée, le Soufre, etc. Le premier de ces phénomènes étant lié à l'étude de la minéralogie sera traité dans un article à part. V.

Réfraction double. Quant au second, son examen fort intéressant pour les physiciens , ne peut être utile au naturaliste , et conséquemment ne doit pas être développé dans cet ouvrage. Nous en dirons autant de l'inflexion ou diffraction de la Lumière, des couleurs accidentelles et des ombres colorées.

La Lumière exerce une véritable action chimique sur divers composés dont elle désunit les principes; dans d'autres cas elle détermine la combinaison des corps simples, et elle fait subir une forte altération à certaines surfaces colorées. Son influence est souvent égale à celle

d'une haute température; ainsi le plus léger rayon du soleil opère la combinaison intime d'un mélange de Chlore et d'Hydrogène, avec détonation et production d'Acide hydrochlorique. Le chlorure d'Argent passe du blanc au noir , et subit une décompo-

sition complète , avec une promptitude qui dépend de l'espèce de rayons auxquels ce corps est soumis , car le rayon violet est celui dont l'action décomposante est la plus énergique. Cette faculté décroît ensuite à partir du rayon violet; ce qui est l'inverse de la faculté calorifique, et qui tendrait à faire distinguer les rayons lumineux en chimiques et en calorifiques. De plus on a reconnu que les facultés chimiques s'étendent un peu au-delà du rayon violet dans un espace obscur.

C'est encore à une action chimique que l'influence de la Lumière sur les êtres organisés a été assimilée.

Nous ne voulons pas ici parler de la manière dont elle se comporte dans l'œil des Animaux, ou des phénomènes de la vision; un article particulier sera consacré dans la suite à l'exposition de cette importante fonction physiologique; mais nous fixerons eu ce moment notre attention sur les effets que la Lumière produit principalement sur les Végétaux. Cet agent physique paraît être la cause de la coloration des parties vertes dans les corps organisés. C'est lui qui détermine la décomposition de l'Acide carbonique continuellement versé dans l'atmosphère par la combustion et la respiration des Animaux, qui favorise ainsi l'émission de l'Oxigène et fixe dans les Plantes le carbone, base de la couleur verte.

Lorsqu'on place une Plante verte et vivante dans de l'eau chargée d'Acide carbonique et qu'on fait intervenir les rayons du soleil, l'Acide carbonique est décomposé, son Oxigène se dégage , et la Plante augmente en carbone dans une proportion précisément semblable à celle qu'elle contenait l'Acide carbonique avant sa décomposition. C'est ce qui résulte de

LE M

plusieurs expériences faites par Th.

de Saussure. Les rayons les plus réfrangibles sont aussi ceux précisément qui exercent le plus d'influence sur le dégagement de l'Oxigène , et par conséquent le rayon violet possède cette propriété avec le plus d'énergie. Il est très-probable que l'Acide carbonique est aussi décomposé dans les parties vertes qui ne sont exposées qu'à une Lumière diffuse, mais cette action est trop lente pour que nous puissions l'apprécier par nos instrumens. Si nous avons acquis quelques connaissances sur la coloration des parties vertes des Végétaux, il faut avouer que nous ignorions absolument quelle est la cause de la coloration des fleurs. La Lumière n'influe pour rien sur ces organes délicats, car, exposés à une obscurité totale , ils se colorent également ; seulement les couleurs sont un peu plus pâles, parce que le Végétal languit dans tous ses organes, et ne communique pas autant de vigueur à la fleur. Une fleur de Tulipe, même dans ce dernier cas, deviendrait aussi belle et aussi riche en couleurs que si elle eût végété à la faveur de la grande Lumière. L'obscurité n'empêche pas absolument l'émission des odeurs dans les Plantes; mais elles en exhalent davantage lorsqu'elles sont frappées par les rayons du soleil. Connaissant la grande part que la Lumière a dans la coloration en vert des Végétaux, on peut déjà pressentir ce qu'ils deviendront si on les soustrait à l'action de ce principe; la vie ou plutôt la simple végétation ne sera pas suspendue , la succion aura toujours lieu, mais l'émission ne sera plus aussi active , l'Acide carbonique sera absorbé sans décomposition, et il en résultera un véritable effet hydrique qui se communique dans toutes les parties du Végétal, les blanchit, et désarticule les feuilles qu'il attaque parti-

culièrement. Ce phénomène , connu dès la plus haute antiquité, a été désigné sous le nom d'Etiollement. V. ce mot.

La tendance des Plantes à se diriger

LU M 65 g

vers la Lumière est un phénomène digne d'exercer la sagacité des physiologistes. Les agriculteurs et les jardiniers ont le plus souvent attribué à l'air les effets de la Lumière , comme ils ont rapporté les effets de l'air à la Lumière. Cependant l'expérience démontre bien clairement que ces deux agens exercent chacun une influence particulière. En effet, si dans une cave disposée de manière à ce qu'il y ait deux soupiraux dont l'un ouvert donne passage à l'air, et l'autre fermé

par un vitrage ne laisse pénétrer que la Lumière , toutes les branches d'un Végétal placé entre ces deux soupiraux, se dirigeront du côté du soupirail vitré. La racine des Végétaux paraît au contraire fuir la Lumière ; cette aversion pour la Lumière est sans doute une cause très-puissante de sa marche descendante que la plupart des physiologistes ont uniquement attribuée à la pesanteur.

Les racines des Végétaux s'enfoncent dans le sol , parce que l'obscurité leur convient autant que la Lumière plaît à la tige et aux branches. Une expérience ingénieuse de Dutrochet, sur la germination d'une graine de Guai collée contre les vitres d'un appartement, tend à confirmer notre assertion. 1. Germination. Le sommeil des Plantes est encore un phénomène très-remarquable qui paraît presque entièrement dû à l'action de la Lumière. C'est le hasard qui , comme dans bien d'autres phénomènes , a fait découvrir celui-ci. Un rapporte que Garcia ab Horto cultivait,, dans

un vase, le Lotus urnilhopodioides , et qu'un soir qu'il se le fit apporter par son domestique , il fut bien surpris de n'y plus apercevoir de fleurs. Il s'emporta contre son jardinier et fit remporter le vase. Le lendemain . il retourna visiter sa Plante et la trouva couverte de belles fleurs. Sa surprise fut alors plus grande, et il se proposa de bien l'examiner pendant la nuit suivante. Effectivement, en déroulant les feuilles, il retrouva les fleurs recouvertes par ces dernières qui étaient alors en état de soin-

540 LU M

meil. Considéré dans sa généralité ce sommeil des Végétaux n'est point causé, comme celui des Animaux, par la fatigue ni par une action nerveuse , puisqu'il est impossible de donner la position diurne à une feuille qui a pris la position nocturne sans la casser; elle y reste dans un état de fixité et de rigidité imperturbable. Il n'est pas non plus déterminé ni influencé par la plus ou moins grande humidité de l'air. De tous les agens qui influent sur le repos des feuilles, le seul connu est donc la Lumière.

L'on peut, en effet, par une Lumière artificielle , ebanger l'heure de ce sommeil. C'est ce qui résulte des expériences intéressantes du professeur De Candolle sur la Belle de nuit et la Sensitive, dont les fleurs de l'une finirent par s'accoutumer à dormir pendant la nuit, et les feuilles de l'autre sommeillèrent enfin durant la journée. En général , une Lumière plus ou moins vive accélère ou retarde le sommeil des Plantes. Enfin ce qui achève de nous convaincre que c'est à la Lumière qu'il faut attribuer ce phénomène, d'ailleurs si diversifié dans les Végétaux , c'est que les espèces signalées comme ayant résisté aux expériences , ont fini par céder aux soins plus attentifs de quelques observateurs. Ainsi VOxalisAcetuseLla et ses congénères que le professeur De Can-

dolle regardait comme les seuls Végétaux dont on ne pouvait troubler le cours ordinaire du sommeil , ont été forcés, pour ainsi dire, par Bory de Saint-Vincent, d'accuser

au'ils étaient sensibles à l'influence , e la Lumière; celle-ci était plus éclatante, il est vrai , que celle dont on s'était servi dans les expériences antérieures. V. Anthèse. (g..n.)

* LUMINET. i!or. phan. (Olivier de Serre.) Syn. de l'Euphrase officinale, (d.)

*LUMNITZERA. bot. piiAN.Willdenow établit sous ce nom , dans le j\lagasin des Curieux de la Nature de Berlin , un genre qui paraît devoir

LTJN

être réuni au Cactuicia d'Aublet. Tr.

Cacoucieb. (G..N.)

LUMP ou LOMPE. pois. Espèce et sous-genre de Cycloptère. ce mot. (B.)

* LUMPÈNE. pojs. Espèce de Blennie. V. ce mot. (b.)

LUNAIRE. Lunaria. bot. piian.

Ce genre de la famille des Crucifères, et de la Télradynamie siliculeuse, L., a été placé dans la tribu des Alyssinées ou Pieuro-rhizées Laliseptées par De Candolle {Sysf. Regn. Vegct. T. il ,

?t. 280) qui l'a ainsi caractérisé : calice fermé , et offrant deux gibbosités en forme de sacs à la base ; pétales onguculés à limbe obovale; étamines dont les filets sont libres et sans appendices ; silique ou silicule pédicellée, elliptique ou oblongue, bordée par

les placentas en forme de nervures , plane, biloculaire, à cloison membraneuse, persistante , à valves planes sans nervures, et surmontée d'un style filiforme persistant; graines éloignées entre elles , ceintes d'une aile membraneuse , portées par des cordons ombilicaux adnés à la cloison, à cotylédons planes, foliacés et accombans. Ce genre se rapproche des Cardamiues par les valves sans nervures de son fruit, mais il en diffère essentiellement par ses graines bordées d'une aile membraneuse.

Il offre aussi des rapports avec le *Macropodium* par sa silicule pédicellée et avec le *Savignya* par la structure de cette silicule; mais il se distingue du premier, par ses valves sans nervures, et du second par son calice à deux renflemens à sa base , et par ses cordons ombilicaux adnés à la cloison. Le *Savignya* a été nouvellement constitué par De Candolle sur une Plante d Egypte que Delile avait placée parmi les *Lunaires*.

V. *Savignye*. Outre ce genre , le *Ricotia* de Linné , que Gaertner , Roth et Desvaux avaient réuni aux *Lunaria*, en a été de nouveau séparé et admis par la plupart des auteurs modernes. V. *Ricotie*. Après ces retranchemens , le genre *Lunaria* est

LUN

maintenant réduit à deux espèces qui, parmi les Crucifères , sont des Plantes assez remarquables pour que nous en donnions une courte description.

Toutes deux sont cultivées dans quelques jardins, à cause des panicules brillantes et comme satinées que forment les cloisons

persistantes des fruits , lorsque les valves s'en sont séparées.

La Lunaire vivace , *Lunarici rediviva*, L., a une racine vivace du collet de laquelle les tiges s'élèvent chaque année. Ses feuilles sont très grandes , légèrement velues , les inférieures opposées , les supérieures le plus souvent alternes et poitées sur de longs pétioles ; elles sont ovales cordiformes , acuminées , et dentées en scie. Les fleurs exhalent une odeur agréable; elles sont d'un rose clair ou même quelquefois d'un pourpre assez vif, marquées de veines longitudinales plus foncées, et disposées en panicules terminales sur de longs pédoncules. Le fruit peut être considéré plutôt comme une silique que comme une silicule; il est lancéolé et atténué aux deux extrémités. Cette Plante croît naturellement dans les montagnes un peu élevées et ombragées de l'Europe.

La Lunaire bisannuelle , *Lunaria biennis*, Moench et D. C; *Lunaria annua* , L., diffère principalement de la précédente espèce par sa silicule elliptique et obtuse aux deux extrémités. Sa racine simple , fusiforme et épaisse , s'élève une tige rameuse , droite, scabre , garnie de feuilles,

(■étiolées, cordiformes, acuminées , les supérieures atténuées , ovales , et dentées en scie. Les fleurs sont inodores , et leur couleur est violette, lilas, blanche dans une variété. C'est surtout dans cette Plante que les cloisons, après la chute des valves , offrent un aspect argentin qui lui a valu les noms de Satinée et Passesalin. On la nomme aussi vulgairement grande Lunaire , Médaille de Bulbonac. Elle est indigène des contrées montagneuses et boisées de la

LUN 54 k

Suède , de l'Allemagne , de l'Alsace et de la Suisse. (g..n.)

LUNAIRE, bot. crypt. {Fougères.)

V. BoTRYCHIUM

*LUNANÉE.Z/W«n«en,.BOT. phan.

Genre établi par DeCandolle {Prodr.

Syst. Veg.y i, p. 92) qui l'a placé à la fin de la famille des Térébinthacées , et l'a ainsi caractérisé : fleurs pohgam.es; calice coloré , divisé profondément en cinq lobes épais, velus extérieurement; corolle nulle ; disque concave , à dix dents ; dix clamimines insérées sur le disque, à anthères réunies extérieurement au moyen des dents du disque; ovaire presque arrondi , couronné par cinq stigmates ; capsule presque ovale , bossue, semiloculaire et bivalve; graines attachée-; par le dos, imbri-

guées et anguleuses. Ce genre a été édié à Lunan, auteur d'un ouvrage sur les Plantes de la Jamaïque et qui a donné une description de l'unique espèce dont il se compose. Rafinesque a constitué le même genre sous le nom A'Edwardia , lequel a dû être changé à cause de sa ressemblance avec le mot Edwardsia déjà employé pour un genre de Légumineuses. Ce dernier auteur, dont l'autorité n'est pas d'un grand poids , regarde ce genre comme voisin du Po/z/w/Via. Le Lunanea JJic/iy, I). C. , Edwardia lurida, Rafinesque , est une Plante originaire de Guinée, et introduite dans les Antilles ou on la nomme Bichy. Ses feuilles sont alternes , pétiolées , oblongues , acuminées, glabres, ondulées et veinées. Les fleurs sont disposées en grappes composées , d'une

couleur jaune marquée de stries purpurines, et exhalent une mauvaise odeur. • (g..n.)

LUNARIA. bot. phan. V. Lunaire.

LUNE. pois. V. Chbysotose et Mole.

LUNE. INS. Espèce de Bombyx. V.

ce mot. (g.)

LUNE D'EAU, bot. phan. L'un-

K4a LUN

des noms vulgaires du Nénuphar blanc. (b.)

LUNETIÈRE. bot. piian. Syn. de Biscutelle. V. ce mot. (b.)

LUNETTE, mam. Espèce de Chauve-Souris du genre Phyllostome. V~.

ce mot. (b.)

LUNOT. conçu. La Venus Senega- Icnsis de Gmelin (pag. 0282 , n. 67) est la même Coquille que le Lunot d'Adanson (Voy. au Se'nég. , pl. 17 , lig. 11). (D..H.)

* LUNULARIA. bot. crypt.

(Hépatiques.) Micheli est le créateur de ce genre, réuni par Linné au Marchanda , dont il a ensuite été séparé par Raddi qui le caractérise ainsi : gaine ou involucre universel membraneux, réticulé, diversement découpé , situé sur la fronde , entr'ouvrant la base d'un pédoncule fructifère, et contenant des filamens articulés et comprimés. Périssporanges tubuleux au nombre de quatre, à l'extrémité du pédoncule fructifère, fixé à un réceptacle

commun qui s'ouvre en croix. V. Hépatiques. Le *Marchantia cruciata* est le type et l'espèce unique de ce genre qu'Adanson avait conservé et très-bien caractérisé. (a. f.)

LUNULE. *Lunula*. conçu. Les conchyliologues sont convenus de donner ce nom à un espace plus ou moins grand, plus ou moins enfoncé, qui se voit en avant des crochets des Coquilles bivalves régulières. La Lunule présentant diverses formes et d'autres particularités, nous renvoyons à l'article Conchyliologie ou nous les avons indiqués. (d..h.)

LUNULE, pois. Espèce du genre Dénier. V. ce mot. On appelle ainsi un Labre , un Pleuronecte et quelquefois la Mole. (b.;

* LUNTJLWE. *Lunulina*. INF. Genre intermédiaire aux Arthrodiées et aux Microscopiques Gymnodés, de la famille des Bacillariées , dont les caractères ont été exposés à l'article ou

LUN

l'établissement de cette famille a été proposé (T. 11, p. 128 de ce-Dict., Toutes vivent parmi les Conferves et souvent entre les Ectospermes, ou pénètrent dans cette mucosité des eaux dont nous avons formé notre genre Chaos. Leurs mouvemens sont lents, et tellement obscurs que Millier lui-même eut beaucoup de peine à les distinguer. Nous en connaissons cinq espèces bien constatées : 1^o *Lunulina diaphana*, N . , *Echinella acuta*, Lyngb., TenC, p. 29, tab. 69, fig. 9, qui habite sur le *Confirma glomerata*, L., où elle se réduit en paquets jaunâtres; 2^o *Lunulina olivacea* , N., *Echinella*, *olivacea*, B. Lyngb., Tent., p. 209, pl. 70, f. 7, dans les marais ; 5^o

Lunulina Mougeotii , N. {f. pl. de ce Dict.); Fibrio lunulatus , Miiller, lu/'., pi. 7, f. 8, Encycl., pl. 3, f. 21, parmi VOscillaria inuestiens de Mougeot qui croît dans les eaux des Vosges; 4° Lunulina vulgaris , N.

{V~. planches de ce Dict.), verte avec un tache oblongue transverse au centre, diaphane et remplie de molécules hyalines éparses , parmi les Ectospermes des eaux de la vallée de Montmorency ; 5° Lunulina monili- _/è/-fl,N., Vibrio Lunula, Miill., In/., pl. 7, fig. 9-12 (fig. i3-i5, excel.), Encycl., pl. 3, fig. 22-24, 25 (23, 24 et 26, excel.), parmi les Conferves, plus grande que la vulgaire, moins verte . avec ou sans tache diaphane , la molécule hyaline disposée en série longitudinale et non éparse. (b.)

LUNULITE. Lunulites. folyp.

Genre de l'ordre des Millépores dans la division des Polypiers entièrement pierreux. Caractères : polypier pierreux , libre, oibiculaire, aplati, convexe d'un côté , concave de l'autre ; surface convexe , ornée de stries rayonnantes et de pores entre les stries; des rides ou des sillons divergens à la surface concave. Ce genre , établi par Lamarck , ne renferme que deux espèces : la Lunulite ra\onnée et la humilité urcéolée, toutes deux fossiles des terrains tertiaires des environs de Paris. (e. d..l.)

LUP

* LUNTIA. bot. ni an. (Neckcr.) V. Croton.

LDPA. crust. y. Lupée.

LUPARIA. (Le Bouc.) Syn. d'Acouit Tue-Loup. (b.)

LUPÉE. Lupa. crdst. Genre établi par Leach aux dépens du genre Portunus de Fabricius, et n'en différant que par le test qui est plus large et découpé en avant et de chaque côté , de neuf dents au lieu de cinq , et dont l'angle latéral est fort aigu.

Les Crustacés de ce genre vivent comme les Portunes; on les rencontre ordinairement à de très-grandes distances en mer; au rapport de Bosc , celui qui a reçu le nom de Pélagique , nage presque continuellement avec faillité et même une sorte de grâce :

les Varecs et autres Plantes de l'océan Atlantique lui servent de points de repos. L'espèce qui sert de type à ce genre est :

La Lupée PÉLAGIQUE, L. Pelasgica, Leach; Cancer Pelasgicus, Liun.; Portunus Pelasgicus , Fabr. Latr.; Cancer Cedo-nulli , Cancer reticulatus , Herbst. Dessus du test finement chagriné, d'un gris verdâtre ou d'un rougeâtre violet et tacheté de jaunâtre. Pâtes colorées de même en dessus, avec les doigts et les tarsi rouges. Dents frontales et celles des bords latéraux, les deux dernières exceptées, courtes, les deux du milieu plus petites. Cloison des antennes intermédiaires avancée en pointe; trois fol les dents spiniformes au côté interne du bras. Impression dorsale ordinaire assez forte. Cette espèce se trouve à Pondichéry, sur les côtes de la Nouvelle-Hollande et non dans l'Océan comme le disent Linné et Fabricius. Le Portunus Pelasgicus de Bosc, Cancer Pelasgicus de Degér, n'appartient pas à cette espèce; c'est la Lupée Diacanthé de Latreille. V . , pour plus de détails, le mot Portunt..

LUPERE. *Lupcrus*. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères , section des Tétramères , famille des Cycliques , liibu des Galérucites , établi par

LUP SU

Geoffroy et ensuite par Olivier, et ne différant des Galéruques avec lesquelles Latreille les a réunis (Règn.

Anim. de Cuv.) que par les antennes qui sont au moins de la longueur du corps , composées d'articles cylindriques , tandis qu'elles sont plus courtes et composées d'articles en cône renversé dans les Galéruques. Les deux derniers articles de leurs palpes maxillaires diffèrent peu en longueur, tandis que le pénultième est dilaté et le dernier beaucoup plus court et tronqué dans le genre Adorie. Les Altises s'en distinguent par leurs cuisses postérieures qui sont propres au saut tandis qu'elles sont simples dans les genres précédons. Les Lupères ont le corps mou , plus allongé que celui des Galéruques et des Altises; ce sont de petits Insectes qui se tiouvent sur les feuilles des Ormes et de plusieurs autres Arbres. Leur démarche est lente, mais ils volent assez bien. Leur larve est courte , un peu ovale; elle est munie de six pâtes et d'une tête écailleusc, et le leste de son corps est mou et d'un blanc sale. Ce genre est peu nombreux en espèces. Dejean (Cat. des Col. , p. 118) en mentionne douze.

Celle qui sert de type au genre, et qui est la plus commune à Paris, est :

Le LUFÈRE FLAVIPÈDE , L. Flavipes , Oliv. (Col., t. 4, n. 75 bis, pl. 1, fig. 1); *Crioceris flavipes*, Fabr., Panz. (fasc. 5j, fig. 4 et 5 j; long de près de deux lignes : corps noir ; antennes noires beaucoup plus longues que le corps dans le mâle, guère plus longues que le corps et fauves dans la- femelle; corselet noir dans le mâle , rougeatre dans la femelle ; élytres noires et pâtes fauves dans les deux sexes. (g.)

* LUPERIA. bot. i'han. (De Candolle.) Sous-genre de *Maitliola*. V.

ce mol. (b.)

* LUPIN, ois. Syn. de Tadorne, espèce de Canard. fr. ce mot. (b.)

LUPIN. *J. upinus*. bot. phan. Genre de la famille des Légumineuses ,

S 44 LUP

place dans la Diadelphie Décandrie, L., quoiqu'il présente les caractères de la Mouadelphie , établi par Tournefort et. adopté par tous les botanistes modernes , avec les caractères suivans : calice divisé très-profondément en deux lèvres ; corolle papilionacée , dont l'étendard est cordiforme , presque arrondi, réfléchi et comprimé sur les parties latérales , les deux ailes ovales, souvent aussi longues que l'étendard et conniventes vers le sommet de leur bord inférieur ; la carène acuminée ; dix lamines dont les filets sont réunis en un seul faisceau , et les anthères de diverses formes , savoir : cinq précoces arrondies et cinq tardives ob-

longues ; style subulé , ascendant , terminé par un stigmale obtus et velu; légume coriace, oblong, comprimé , obliquement toruleux. Dans son *Proc/romus Systematis Vegetabilium* , le professeur De Candolle a placé le genre *Lupinus* parmi les Phaséolées, cinquième tribu de la famille des Légumineuses.

Il en a décrit trente-six espèces distribuées en deux sections , d'après leurs feuilles digitées ou entières. Le nombre, des espèces connues du temps de Linné n'était que de huit seulement, toutes indigènes du bassin de la Méditerranée et de l'Europe occidentale , à l'exception du *Lupinus përennis* qui croît dans l'Amérique du nord et du *L. integrifolius* qui a pour patrie le cap de Bonne-Espérance. Les espèces que les auteurs ont décrites postérieurement à Linné sont pour la plupart indigènes de l'Amérique, soit méridionale , soit septentrionale : une ou deux seulement qui ont été décrites par Loureiro croissent sur la côte orientale d'Afrique et en Cochinchine.

Le *Lupinus albus* , L., est l'espèce, la plus intéressante, puisqu'elle est un objet considérable de culture dans les contrées australes de l'Europe. Cette Plante s'élève à la hauteur d'environ un demi-mètre. Sa tige est herbacée , droite, cylindrique, un peu rameuse supérieurement et légèrement velue. Elle a des feuilles

LDP

alternes, composées de cinq à sept folioles obovales-oblongues , couvertes en dessous, et principalement sur les bords, de poils fins, couchés, luisants et légèrement argentés. Les fleurs sont blanches , assez grandes , alternes et disposées sur des pédicelles en épis terminaux. Le *Lupinus albus* a l'avantage de réussir dans

des terrains maigres , pierreux et sablonneux. Ses graines éiaient un mets assez en usage sur les tables des anciens , et leurs poêles en ont célébré l'excellence , quoique, si nous consultons seulement notre goût , nous n'y trouvions qu'un aliment grossier et difficile à digérer. Cependant les Lupins jouissent encore en Italie de loute l'estime qu'ils avaient dans l'antiquité ; c'est , à ce que nous apprend notre collaborateur A. Richard , une friandise très recherchée des Florentins qui les mangent après les avoir fait légèrement bouillir et détremper dans de l'eau salée. La farine de Lupin faisait partie des quatre farines ré.-olutives des anciennes pharmacopées. C'est un maturatif qui n'a pas beaucoup d'avantages sur la plupart des autres farines de Légumineuses. Dans les enviions de JNaples, on cultive en abondance le *Lupinus Tennis* de Forskahl, que l'on donne aux Chevaux comme un excellent fourrage vert. Deux autres espèces peuvent être considérées comme Plantes d'ornement , en raison de la beauté de leurs fleurs et de leurs feuilles. Ce sont les *Lupinus varius* et *lu/eus* de Linné. Le premier a des fleurs assez grandes, d'une belle couleur , le plus souvent bleue , quelquefois purpurines. Le second est remarquable par ses fleurs jaunes qui exhalent une odeur analogue à celle de la Giroflée.

LUPINASTER. iiot. than. Le *Trifolium Lupinaster*, L., avait été érigé par Adanson en genre distinct , que tous les auteurs ont négligé, excepté Moench qui en proposa le rétablissement. Seringe {in De Candolle Prochom. Syst. Fcget. , s, p.

302) l'a considéré, avec juste raison ,

LDR

comme une simple section du *Trifolium*; section remarquable par ses fleurs très-grandes, ses pétales épais, persistans , rouges, blancs ou jaunes; ses folioles coriaces , au nombre de trois à sept, à plusieurs nervures.

C'est à cette section qu'appartiennent, outre l'espèce qui lui a donné son nom , les *Trifolium alpinum* et *Trifolium pratense*. 1T. Trèfle. (g..N.)

LUPINELLE. bot. phan. Nom vulgaire du Trèfle incarnat et du Sainfoin. (b.)

LUPIN DS. bot. phan. r. Lupin.

LUPON. MOLii. Tout porte à croire que le *Cypraea Lota* de Linné, de Joruguière et de Lamarck, est la même Coquille que le Lupon d'Adanson (*Voy. auSéuég.*, pl. 5, fig a; . (b..H.)

* LCPSEA. bot. phan. (Necker.) Sous-genre de Centaurées répondant au *Cervodilium* -deLinné. (b.)

* LUPULARIA. bot. phan. Seringe (in *De Candolle Prodrum*.

Sysl. Veget., 2, p. 172) nomme ainsi la seconde section qu'il établit dans le genre *Medicago*, et qui est caractérisée par ses gousses en forme de rein, de faux ou de cuiller, glabres ou pubesceules, à bords entiers. Elle renferme quinze espèces dont les plus remarquables sont les *Medicago sativa* , *Lupulina* et *arboorea*. P'. Luzerne. (g..N.)

LUPULINE. *Lupulina*. bot. phan.

Espèce du genre Luzerne. (b.)

* LUPULINE. bot. chim. Ou a donné ce nom à la matière jaune et cétacée qui recouvre les écailles des cônes du Houblon , et qui paraît en être le principe actif, f. Houblon, (a. r.)

LUPULUS. bot. phan. F. Houblon.

LDPUS. mam. P'. Loup au mot ,Cuien.

* LURILV/E. bot. phan. Dans ses Fragmcns d'ordres naturels, Linné nommait ainsi un groupe dans lequel il avait léuni la plupart des Plantes

TO>tE IX.

ui foi ment aujourd'hui la famille es Solanées; mais entremêlées de plusieurs genres qui ont été dispersés dans d'autres familles naturelles.

V. Solanées. (A. n

* LUSSAO DE MA. rois. Syn.

à'Esox Sphyroena, L. , cbez les pêcheurs du golfe de Gênes. V. Sphybéne.

* LUSSAQ. bot. phan. L'un des noms arabes du Torskahlea tenacissi-

mà. P'. FOSKAHLEA. (B.)

LUSTRE D'EAU, bot. phan. Nom vulgaire de l'Holtone des marais; on l'étend quelquefois aux Charagnes.

LUTAIRE. *Lutaria*. bot. crypt.

{Jrthrodiées.) Le genre ainsi nommé par Beauvois qui se hâta de diviser les Algues aquatiques sans les avoir assez examinées, ne convient, par ses caractères, à aucune production de la nature, ou convient à beaucoup qui sont très-différentes entre elles. On peut deviner seulement que 'sous Ce nom il entendait désigner des Oscillaires qui croissent au bas des murs humides et certaines Conferves. (b.)

LUTEOLA. bot. phan. Nom scientifique de la Gaude 011
Herbe à jaunir que Toui nefort avait séparée des autres Résédas pour en former un genre qui ne fut pas conservé par Linné. (b.)

LUTH. rept. chél. Espèce de Tortue de mer. P~. Tortue. (b.)

LUTHEUX. ois. Même chose que Lulu. V. ce mot. (b.)

LUTJAN. *Lutjanus*. rois. Genre établi par Bloch qui lui donna un(nom chinois , on ne sait trop par quelle raison , et qu'adopta Lacépède en y comprenant un grand nombre d'espèces que Cuvier n'y a point conservées. Ce savant en a séparé les Diacopes, les *Pristipomes* , et surtout les Poissons dont il a formé le sous-genre *Crénilabre* , rapporté à sa véritable place dans la savante Histoire du Règne Animal (T. 11 , p. 262). Réformé par l'auteur de cet immortel

«ouvrage, le genre dont il est question, placé dans l'ordre des *Acanihoptérygiens* , y fait partie de la quatrième tribu de la première section de la famille des *Percoïdes*, *Acanthopomes* de Duvrier il. Ses caractères consistent : dans les ventrales situées nu-dessous des pectorales; uu corps épais tuais comprimé ; l'opercule denté mais sans piquans; la dorsale souvent armée; la gueule

bien fendue, dépourvue de lèvres charnues; des dents en crochet aux mâchoires , et point de dents en velours derrière ces dents en crochet. Pai' cette manière de les caractériser , le nombre des Lutjans se trouve considérablement diminué, encore qu'il ne laisse pas que de demeurer considérable. Ce sont des Poissons d'assez petite taille, de forme élégante , et surtout remarquables par la richesse, l'éclat et la variété des nuances dont ils sont parés. La plupart vivent solitaires dans les iners des îles de l'Inde, de la Chine et du Japon méridional. Ils s'y tiennent parmi les rochers , dans les creux et les fentes , ne sortant guère de leur obscure retraite que par le plus beau temps , pour nager avec agilité parmi les Hydrophytes , dont les plus tendres forment leur principale nourriture. La chair en est fort estimée ; on en trouve aussi quelques-uns dans les mers d'Arabie , ainsi qu'aux Antilles. Le Perça Ascensions , L., de l'île rie l'Ascension, non loin de Sainte-Hélène dans le grand Océan, fait partie de ce genre, dont les principales espèces sont : le Lu tj anus Blocliii; le Lu tj anus Lutjan , Bloch , pl. 245 ; — l'Ecureuil , Lu tj anus Sciurus, Lac, Perça formosa, L.; — l'HAMun, Lutjanus Hamur, Lac, Sciœna, Forsk. ; — Lutjanus ellipticus y Lâte.j l'un des A titillas de Bloch, qui ne sont que des Lutjans; — Lutjanus Sarnbra , Cuv., l'un des Alpestes de Schneider, qui sont aussi de simples Lutjans, etc.

Le Lutjan Gymnocéphale figuré par Lacépède, T. m, pl. 33, f. a, nous paraît devoir être repoussé de ce genre puisqu'on n'y voit aucune dentelure

à l'opercule; il appai tiendrait alors au Dente.v. Pr. Denté. (b.)

LUTRA. mam. V. Loxjtru.

L U T II A 1 R E . Lutra ria . conch . Linné avait confondu les Coquilles de ce genre pa i mi ses Mactres et ses M s es. Bruguière ne les sépara pas non plus de ces genres , ou plutôt il les mit toutes parmi les Mactres. Lamarck sépara le premier ces Coquilles, et en forma le genre qui nous occupe sous le nom qu'il poite encore aujourd'hui. C'est dans le Système des Animaux sans vertèbres qu'il le caractérisa. De Roissy l'adopta dans la continuation du Buffon de Sonnini, et le

S laça , comme, Lamarck, à côté des lactres. Dans la Philosophie Zoologique , Lamarck établit la famille des Mactracées , dans laquelle ce genre fut compris avec les Eryciues , les Ongulines, les Crassatelles et les Mactres. Dans l'Extrait du Cours , cette famille et les rapports des Lutraires ne changèrent pas. Cuvier n'adopta pas cet arrangement , et le genre Lutraire dont il sépara une partie des Lavignons {V. ce mot) fut pour lui un sous-genre des Myes qui elles-mêmes font partie de la famille des Enfermées. Elles furent donc séparées des Mactres. Dans son dernier ouvrage , Lamarck apporta quelques changemens dans la famille des Mactracées {P~. ce mot); mais il laissa toujours les Lutraires en rapport avec les Mactres. Blainville cuL à l'égard des Lutraires une opinion à peu près semblable à celle de Cuvier, c'est-à-dire qu'il les sépara des Mactres. Celles-ci, sous le nom de Lntiicoles, se trouvent dans la fn~ mille des Pyloridés ; celles-là dans celle des Couchacés avec les Vénus , etc. L.Hreille a également séparé les Lutraires des Mactres ; sanslcs mettre dans leurs rapports anatomiques , il les a transportées de la famille des Mactracées dans celle des Myaires qui se trouve composée des genres Lutraire, Auatine cl Mye. Le genre Lutraire, à ne considérer que l'Animal, est certainement beaucoup plus voi-

LUX

sin des Myes que des Macracs ; mais si on s'attache plus particulièrement aux rapports que peut offrir la charnière, il sera incontestablement trèsvoisin des Mac très. Ce sont ces deux différentes manières de considérer les rapports des Mollusques qui ont fait naître les différentes opinions que nousavons rapportées. Quelle que soit celle que l'on adopte , voici de quelle manière ce genre peut être caractérisé , et d'après l'Animal et d'après sa coquille: Animal très-comprimé ; le manteau fendu dans tout son bord inférieur terminé en arrière par un long tube; un pied subantérieur , petit et sécurifbrine. Coquille inéquilatérale , transversalement oblongue ou arrondie, bâillante aux extrémités latérales; charnière ayant une dent comme pliée en deux , ou deux dents dont une est simple, et une fossette adjointe, deltoïde, oblique, saillante en dedans; dents latérales nulles ; ligament intérieur fixé clans les fossettes cardinales. A l'exemple de Lainarck, nous diviserons les Lutraires en deux sections établies d'après la forme de la coquille; la première comprendra celles qui sont transversalement oblongues , et la seconde les Coquilles ou biculaires ou subtrigones.

f Coquille transversalement oblongue.

Luthaire solexioïde , *Lutraria solenoides* , Lamk. , Anim. sans vert.

T. v, p. 468, n. 1 ; *Mya oblonga*, L., Gmel. , p. 323; Cheinnitz, Conch.

T. VI , lab. 2 , fig. 1 a. Coquille qui a assez bien la forme d'un Solen ; elle se trouve sur nos côtes, enfoncée dans le sable. Elle

est couverte d'un drap marin grisâtre. D'après Lamarck, son analogue fossile se trouverait au Mont-Marius, près de Rome.

ff Coquille orbiculaire ou subligone.

Lutrine Calcinelle , *Lutaria piperala* , Lamk., loc. cit., n. 5; *Mactra piperala* , Gmel. , p. 516i ; la *Calcinelle* , Adanson , Voy. au Sénégal , p. 222, tnb. 17, fig. 18; *Mya hispa-*

nica, Chemn., Conch. T. vi , lab. 5 , fig. 21. Espèce, à ce qu'il paraît, assez répandue dans la Méditerranée, l'Océan et les mers du Sénégal. Elle est fort aplatie , même transparente, jaunâtre; les dents de la charnière sont très-petites. (d..h.)

* LUTRICOLA. Lutrícola. mou.»

Dénomination sous laquelle Blainville , dans son article Mollusque du Dictionnaire des Sciences Naturelles, range le genre Ligule de Leach et le genre Lutrine de Lamarck. Il est bien probable, du moins autant qu'on en peut juger d'après le petit nombre d'espèces , que ce genre Ligule de Leach n'est point du tout le même que celui de Montagu , puisque celui ci correspond aux Amphidesmes de Lamarck. V. Amphidesme et Ligule. (n..H.)

LUTRIX. rept. orn. Espèce du genre. Couleuvre, f. cc mot. (b.)

* LUVARUS. pois. r. Louva-

REAU. (B.)

» LUXEMBOURGIE. Luxemburgia. rot. p. an. Aug. de Saint-Hilaire appelle ainsi un genre nouveau de Plantes brésiennes, voisin du *Sauvagesia* et faisant partie du groupe que ce savant botaniste a nommé Sauvagesiées*. Voici les caractères qu'il assigne à ce nouveau genre (Mémoires du Musée, g, p. 352 j. Le ca-

lice est formé de cinq sépales inégaux et caducs; la corolle de cinq pétales hypogynes, sessiles. Les étamines sont en nombre défini ou indéfini, linéaires, à quatre faces, s'ouvrant à leur sommet par deux pores et toutes réunies en une masse concave et penchée d'un côté. Le style est subulé et courbé, terminé par un stigmate simple. L'ovaire est allongé, trigone, courbé, appliqué sur un disque hypogyne. Cet ovaire présente une seule loge polysperme. Le fruit est une capsule triloculaire, polysperme.

dont les valves ont leurs bords rentrants et séminifères, mais ne formant pas des cloisons complètes. Les graines sont bordées d'une membrane et

LUZ

renferment un embryon dressé au centre d'un endosperme peu épais, et dont la radicule est tournée vers le bas.

Ce genre se compose de deux espèces seulement. Ce sont des Arbustes rampants, très-glabres, portant des feuilles alternes, dentées, cuspidées, à nervures latérales, parallèles et très-rapprochées et accompagnées à la base de leur pétiole de deux stipules ciliées et caduques. Les fleurs sont jaunes, terminales et en grappes. Ces deux espèces ont été nommées, l'une, *Luxemburgia oclandra*, qui a ses feuilles presque sessiles, lancéolées, étroites, et ne présente des lamines seulement dans chaque fleur; et l'autre, *Luxemburgia julyandra*, dont les feuilles sont pétiolées, elliptiques, allongées, et les fleurs polyandres. Ces deux espèces croissent au Brésil. (A.R.)

LUZERNE. *Medicago*. bot. titan.

G-eine de Plantes très-nombreux en espèces et qui appartient à la famille des Légumineuses, et à la Diadelphie Décandrie, L, Voici ses caractères :

lecalicey est presque cylindrique, à cinq dents effilées; la corolle papilionacée; l'étendard redressé, entier, les ailes onguiculées et la carène un peu éloignée de l'étendard; le fruit est une gousse uuiloculaire , polysperme, falciforme, ou le plus souvent contournée en spb aie plusieurs fois sur elle-même. Les espèces de ce genre sont fort nombreuses. Seiinge, dans le second volume du P/odrnits Systemalis du professeur De Cnndolle , en a mentionné soixantediX-liuil'. Elles croissent dans toutes les parties de l'Europe , mais plus communément dans les régions qui avoisinent le Bassin delà Méditerranée. Ce sont des Plantes annuelles ou vivaces, quelquefois ligneuses , ayant des feuilles alternes, pétiolées, composées de trois folioles, le plus souvent dentées. Les deux stipules qui accompagnent chaque pétiole à sa base sont ordinaii cinent plus ou moins profondément dentées. Les fleurs, qui forment des épis généra-

LDZ

lement denses et souvent ovoïdes ou globuleux, sont jaunes ou quelquefois violettes. Ce genre a la plus grande ressemblance avec les Trèfles, surtout par le port, au point que i habitude seule peut faire distinguer les petites espèces de Tiède d'avec certaines Luzernes. Mais le fruit est fort différent dans ces deux genres, car, dans les Trèfles, la gousse est très-courte , contenant une ou deux graines seulement, et entièrement recouverte et cachée par le calice, qu'elle ne dépasse pas. Parmi les nombreuses espèces de

ce genre , nous n'en décrivons ici que quelquesunes des plus intéressantes par leurs usages. Telles sont les suivantes :

Luzerne cultivée , *Medicago saliva* , L. Cette espèce , la plus commune de toutes , est vivace. Sa racine blanche et pivotante acquiert quelquefois une longueur de six à huit pieds et même davantage. Sa tige est herbacée et souvent presque sousfrutescente à sa base, rameuse, haute d'environ deux pieds , glabre , portant des feuilles alternes , composées de trois folioles obovales , allongées, mucronées , et des stipules lancéolées et dentées. Les fleurs sont violettes , quelquefois mélangées de jaune , formant des épis terminaux.

Les fruits sont lisses, contournés en hélice , finement réticulés, contenant plusieurs graines irrégulières et brunâtres. Cette Plante fleurit pendant tout l'été. On la cultive fort abondamment dans les prairies artificielles , et c'est une des Plantes dont la culture offre le plus d'avantage. En effet, terme moyen dans Un bon terrain, une luzernière doit durer au moins de dix à douze ans. Or, pendant tout ce laps de temps , elle n'exige aucune culture et par conséquent aucun frais , donne d'abondantes récoltes et n'épuise pas le sol. Ses racines pivotantes s'enfoncent profondément, en sorte que lorsqu'on détruit un champ de Luzerne, on peut y faire ensuite au moins deux récoltes de Céréales sans être obligé de fumer. Mais tous les

LUZ

terrains ne conviennent pas «gaïement à sa culture. Il lui faut, en général , un sol léger , mais substantiel et surtout profond , sans

quoi ses racines ne pouvant s'étendre, la Fiante languit et ne donne que de pauvres récoltes. Quand on veut former une luzernière, il y a certaines précautions à prendre qui eu assurent le succès. Ainsi on dévia choisir de préférence un champ ou l'on viendra de cultiver des racines potagères ou toute autre Plante dont la culture exige le sarclage , car alors on aura un champ mieux purgé de mauvaises Hérhes. il faut que la terre soit préparée au moins par deux labours bien profonds On' doit ensuite en Unir la surface au moyen de la herse et du rouleau avant de semer la graine. Celle-ci se sème à la volée, et il en faut environ de vingi-cinq à trente Unes pour un arpent. Beaucoup de cultivateurs sont dans l'usage de semer de l'Avoine en même temps que la Luzerne. Cette méthode a l'avantage de protéger les jeunes plants de Luzerne contre la trop grande ardeur du soleil , parce que l'Avoine pousse plus rapidement, et de ddhrier pour la première année une récolte qui convie les frais de la culture. La graine de Luzerne doit être recouverte aussitôt qu'elle est répandue sur la terre au moyen d'une lierse armée de branches d'épines.

En général, il ne faut pas couper la Luzerne la première année de sa végétation, afin que ses pieds prennent plus de force et tal-leut davantage.

Lorsqu'une luzernière semble s'arrêter, on lui redonne de l'activité en y étendant du plâtre; ce sel calcaire y produit un effet .surprenant.

Luzerne Lui'uline, Medicago Lujuili/ia, L. , vulgairement Minette.

Cette espèce , excessivement commune dans les champs , se distingue facilement par sa tige grêle, rameuse , couchée, ayant ses feuilles composées de trois folioles obo val es , cunéiformes, dentées au sommet ; ses stipules lancéolées, entières; ses Hem s petite* , jaunes , formant des épis

LUZ r»4()

ovoïdes , auxquels succèdent des gousses réniformes , mono-spermes , réticulées et noires. Ceite espèce , que l'on connaît sous les noms de Trèfle jaune ou 'Trèfle noir, commence à se répandre chez les cultivateurs soi-

fntux. Elle remplace le Trèfle dans assolement des mars. Elle a l'avantage de pouvoir se développer , même dans les terrains les plus maigres. Sou fourrage est excellent pour les bestiaux , et son pâturage est un des meilleurs pour les Moutons. Elle se sème eu même temps que les mars et à raison d'enviion trente livres par hectare.

Luzerne en Arbre , *Medicago arborea* , L. Cette belle espèce croît dans le midi de l'Italie, oii elle forme un Arbrisseau de sept à huit pieds de hauteur. Ses feuilles sont composées de trois folioles cunéiformes, mucronées , velues et soyeuses; ses fleurs sont jaunes, réunies en bouquet au sommet des rameaux. Ses gousses sont planes el contournées en hélice.

Cette I lanle paraît être le Cytise des anciens. Les bestiaux sont très-avides île son feuillage. Ou la cultive quelquefois dans les jardins comme Plante d'agrément. (a. r.)

LUZIOLA. bot. rnAN. Genre établi par Jussieu dans la famille des Graminées et la Monœcic Polyandrie, L., pour une Plante ob-

servée par Dombey au Pérou, et retrouvée depuis par Humboldt et Boupland au Mexique. La *Luziola Veruviana* , Juss., Pei s. , Sjn., 2, p. 576, ou *Luziola Mexicana* , Kunth (in Huinh.

Aot: Gen. 1, p. 199), est une Plante vivace selon Kunth, annuelle selon Jussieu , dont les fleurs monoïques forment des panicules distinctes.

Leurs épillets sont uniflores; la lépicène formée de deux écailles mutiques , suis glume. Dans les fleus mâles on compte un grand nombre d'élamines , et dans les fleurs femelT les le style, profondément biparti , se termine par deux stigmates. Ce genre nous semble encore assez im parfaitement connu» (À. R.)

6>50 LUZ

LUZULE. *Luzula*. bot. fhan. De Caudolc , dans la Flore Française, a se'paré du genre *Juncus* les espèces qui ont, avec des feuilles planes et ciliées, un calice formé de six écailles glumlacées , accompagné de deux bractées; six étamines ; un" ovaire uuiloculaire trispenné, surmonté de trois stigmates; et pourfruil une capsule à une seule loge, coulçant trois graines , et s'ouvrant en trois valves. Ce genre , assez nombreux en espèces , diffère îles Joncs proprement dits, non-seulement par ses feuilles planes et ciliées , mais encore par la structure de sa capsule.

Les espèces de ce genre qui croissent en Francessont : *Luzula nivea* , *albida* , *lutea* , *spadicea* , *spicata* et *pediformis* , qui habitent les hautes chaînes de montagnes, et les *Luzula campes!*/ U , *vernalis*, *Forsteri* et *maxima* , qu'on trouve d;ins les bois et les plaines. (a. n.)

LUZURIAGA. bot. fhan. Genre de la famille de ^ Asparaginées , fondé par Ruiz et Pavon, et adopté par Robert Brown qui l'a caractérisé de la manière suivante : le calice a six divisions profondes éialées , égales-, dépourvues de poils et caduques. Les étamines, au nombre de six , sont insérées à la base des divisions du calice ; leurs filets sont filiformes, glabres , recourbés à leur sommet. Leurs anthères sont rapprochées , sagittés et plus longues que les fdets. L'ovaire esl à trois lo;'es renfermant un petit nombre d'ovules ; il se termine

(>ar un style filiforme et à trois sillons ongitudtnaux , et par un stigmat simple. Le fruit est charnu et contient un petit nombre de graines globuleuses.

Les espèces rie ce genre sont des Arbustes volubiles, à feuilles marquéesdenervures proéminentes; leurs fleurs sont en cymes ou en ombelles terminales ou axillaires , portées suides pédicelles articulés à leur base.

Le fruit ; qui est noir, ne renferme quelquefois qu'une seule graine.

Robert Brown indique deux ospè-

LYC

ces nouvelles de ce genre qui croissent l'une et l'autre aux environs de Port Jackson; l'une qu'il appelle Luzuriaga cymosa , et qui a ses fleurs disposées en cymes terminales; l'autre Luziiriaga mpntana don (les fleurs forment des ombelles axillaires et pédonculées. Selon le même botaniste, il serait possible que les deux espèces australiennes appartenissent à un genre différent du vrai Luzuriaga rmé sur une Plante du Pérou, (a.b.)

LYCANTHIEMUM et LYCHN- THEMON. bot. piian. Syn. de Srilax aculeala. V. Salsepareille.

LYCAON. mam. Nom scientifique d'une espèce du genre Chien. P", ce mot. (b.)

* LYCASTYS. Lyncastys. annel. Savigny (Système des Aunel., p. 45, note) propose d'établir sous ce nom un nouveau genre dans la famille des Néréides; il se rapprocherait desLycoris par l'existence dedeux mâchoires, et serait caractérisé ainsi : antennes courtes , les deux extérieures plus grosses, inarticulées; huit cirres ou quatre paires de cirres teutaculaires moniliformes; les cirres supérieurs, et les deux styles également moniliformes ; une seule rame à chaque pied; les cirres inférieurs très-courts. Ce genre esl fondé sur la Nercis armillaris de Miiller (Von Jf urm., p. io4 , tab. 9, fig. i-5) et d'Otbon-Fabricius (lauii. Groeil., n° 276). Savigny n'a pas eu occasion d'examiner luimême cette espèce; ce qu'il en dit est puisé dans la description et les figures des auteurs précités. (aud.)

*LYCHAUS. fois. On ne sait à quel Poisson du Nil les anciens et Strabon particulièrement ont donné ce nom . (B')

LYCHNANTHUS. bot. fhan.

(Ginelin.) V. Cucubale.

LYCHN1DVEA. bot. fiian. (Dillen.)Syn. de Phlox. (Mœnch.) Syn.

de Manulea tume/itusa , L. (B.)

LYCHNIDE. Lychnis. bot. fhan.

Ce genre de la famille des Caryophyl-

LYC

lées c l de la Décandrie Pentagynie, L., offre pour caractères essentiels : un calice tubuleux à cinq dents et nu ; cinq pétales onguculés formant une corolle tubuleuse , dont l'entrée est le plus souvent couronnée par des appendices; dix étamines ; cinq styles ; capsule dont le nombre des loges varie de un à cinq , sessile sur le réceptacle ou supportée par un anthophore allongé. Le genre *Lyclinis* étudié récemment par Seriège (in De Candolle *Ptvdum. Syst. V egl.* , I , p. 387) se compose de vingt-une espèces, y compris celles qui l'ont fait les genres *Agruste/mna* de Linné et *G'uhago* de Desfontaines Ces espèces sont distribuées en quatre sections qui avaient déjà été indiquées par De Candolle dans la seconde édition de la Flore Française.

La première section , nommée *Viscaria*, est caractérisée par son calice cylindrique en massue; par sa capsule à cinq fausses loges , cl par son anthophore allongé. Elle ne renferme qu'une seule espèce , *Lychnis Viscaria*, L. , jolie Plante à fleurs rouges , dont la tige est très-visqueuse audessous des articulations; Elle croît dans les prés et les bois de certaines localités de l'Europe , très-abondamment surtout près de Fontainebleau.

Cette section ne nous semble guère distincte de la suivante.

Dans la seconde section qui a reçu le nom *A' Enlyc/titis* , le calice est cylindrique en massue , la capsule uniloculaire, les pétales munis d'un appendice près de l'entrée de la corolle, l'anthophore allongé ou quelquefois un peu raccourci. Ce groupe renferme cinq espèces que l'on peut regarder comme les types du genre. Ce sont des Plantes remarquables par leur beauté , et presque toutes cultivées dans les jardins. La *Lychnis* j".

Croix de Jérusalem , *Lycmis chalcedonica* , L. , est l'espèce la plus commune. Cette Plante a des feuilles lancéolées , cordiformes , amplexicaules et légèrement velues; ses belles fleurs, dont la couleur est ordinairement d'un rouge écarlate , mais qui varie

LYC 55 1

quelquefois du rose au blanc , sont réunies en tête, et leurs pétales sont divisés en deux lobes. Elle est originaire du Japon et des contrées orientales de la Russie asiatique. On cultive aussi dans quelques jardins d'Europe, les *Lychnis grandiflora* , Jacq., cl. Jy. vulgaris , Fisch., qui croissent naturellement en Ionie dans les mêmes régions que le *Lycnis chalcedonica* , et dont la beauté et les dimensions de la fleur l'emportent beaucoup sur celles de cette dernière espèce. C'est encore à cette section qu'appartiennent les *Lycmis flusilis*, L., et *L. coelivsa*, Fucyl. La première , qui croît dans les Alpes, est une Plante charmante, à fleurs roses réunies en une tête large et comme ombellée , à feuilles recouvertes par un duvet soyeux. La seconde. : , que Linné plaçait parmi les *Agrastemma*, croît dans la Sicile et sur les côtes méditerranéennes de l'Afrique. C'est une Plante dont la tige est dichotome et très rameuse , les fleurs roses , solitaires et terminales.

La troisième section , désignée sous le nom d' *Agrastemma* , quoique la plupart de ses espèces ne se rapportent pas au genre ainsi nommé par Linné, est ainsi caractérisée: calice ovoïde à dents très-courtes ; capsule uniloculaire (quinqueloculaire ?) ; anthophore très-court ou nul. On y compte treize espèces dont la majeure partie habite les contrées montagneuses du nord de l'ancien continent. Une espèce a été trouvée au détroit de Magellan ,

et quelques-unes dans le midi de l'Europe. C'est dans cette section que viennent se ranger les *Lychnis sylvestris*, *diuica* et *Juliscu- culi*, si vulgaires en France: la première dans les forêts, la seconde en tous lieux, la troisième dans les marais. On a aussi placé dans cette section le *Lychnis curunnaria*, Lamarck, *Agrostemma coronaria*, L., que l'on cultive comme Plante d'ornement, et qui croît naturellement dans les Alpes et dans l'Orient. Cette espèce a une tige dichotome, des feuilles cotonneuses, et des fleurs ordinairement d'un rouge foncé.

552 LYC

Enfin la quatrième section se compose du genre *Githago* de Desfontaines. Le calice est cylindrique, campanule, coriace, découpé en cinq lanières très-longues; les capsules sont uniloculaires et sessiles. Cette section ne contient qu'une seule espèce, *Lychnis Githago*. Lamk., *Agrostemma Githago*, L., Plante fort commune dans les moissons de l'Europe.

Le *Lychnis lusitanica* de Miller est encore trop peu connu pour qu'on ait pu le classer dans une des sections que nous venons d'énumérer.

LYCHNITES. min. Pline désigne sous ce nom une Pierre précieuse qu'on trouvait en Carie et dans l'Inde. On en faisait des coupes et autres vases à boire; son éclat était vif, rougeâtre et semblable à celui des corps absolument chauffés au feu: c'était peut-être la variété de Tourmaline appelée Rubellite. (b.)

LYCHNITES. min. Le Marbre de Paros était ainsi nommé quelquefois chez les anciens. (h.)

LYCHNITIS. bot. phan. Espèces des genres Molène et Phlo-
mide. f. ces mots. (b.)

LYCHNOIDES. bot. phan. (Rai.) Syn. de Phlox.
(Vaillant.) Syu. d'une espèce du genre Arenaria. (b.)

LYC1ET. Lycium. bot. phan. Ce genre de la famille des Sola-
nées et de la Pentandrie Monogynie , L. , présente les caractères
suivans : calice urcéolé , à cinq dents régulières ou quelquefois ir-
régulièrement divisé en trois ou cinq découpures peu profondes ;
corolle infundibuliforme ou tubulcuse , dont le limbe quelquefois
plissé offre cinq ou dix divisions ; cinq étamines le plus souvent
saillantes hors de la corolle, à anthères déhiscentes longitudina-
lement ; stigmate pelté, déprimé; baie biloculaire appuyée sur le
calice persistant ; graines nombreuses attachées à des placentas
adnés. Ces caractères ont été tracés par Kunth qui, dans ses Nova
Gen, Pl. œq., a décrit plusieurs espè-

LYC

ces nouvelles de ce genre , et a dû en conséquence modifier les
caractères anciennement admis d'après les différences que les
fleurs de celles-ci présentaient. Ce sont des Arbres ou des Ar-
bustes le plus souvent épineux , à feuilles très-entières, quelque-
fois fasciculées. Les fleurs dont les corolles sont roses, purpu-
rines, violettes, jaunâtres ou blanchâtres, sont portées par des
pédoncules extra-axillaires ou terminaux, solitaires , gémisés,, en
ombelles ou en corymbes. Les ' espèces de Lyciets , décrites dans;
les auteurs , sont au nombre de trente environ répandues sur des
points très-éloignés du globe: mais la plupart habitent les pays
chauds de l'Amérique méridionale et du cap de Bonne-Espérance
; quelque;-unes se trouvent en Sibérie, en Chine, en Europe et

dans l'Afrique septentrionale. Kumb', 7ac. cit., les a distribuées en deux sections : la première a le calice irrégulièrement divisé en un nombre de dents qui varie de trois à six, quelquefois cependant, comme dans le *L. boerrhaaviœfulum* , à cinq dents régulières; la corolle est tubuleuse „ infundibuliforme , à limbe ouvert et quinquépartite ; les étamines sont saillantes. C'est à cette section qu'appartiennent les espèces qu'on doit regarder comme types du genre , telles que les *Lycium eu/opœum*, *barbarum* , *chinense* , etc. Les deux premières croissent dans nos contrées méridionales et en Barbarie; on les cultive aux environs de Paris et dans presque toute l'Europe pour en former des haies vives, très-fourrées, garnies d'un feuillage vert-lisse élégant, de fleurs rougeâtres qui durent une bonne partie de l'année, et auxquelles succèdent un grand nombre de baies rouges qui ressemblent de loin à celles de l'Épinevinette. Kunth indique en outre comme congénères de cette section le *Ceslrum campaiiulatum* , L. ; *Yslitipa arborescens* , Jacq. , et plusieurs espèces nouvelles du Pérou. La seconde section est caractérisée par son calice conipanulé , à cinq dents régulières ,

LYC

fiar sa corolle tubuleuse , infundibuliforme , dont le limbe est dressé, quinquéfide , et par ses étamine's non saillantes. C'est à cette section qu'appartiennent les *Lycium afrum*, L. , *L. fuc/isioides* , Humb. et Bonpl.

{Pl.œquin. 1 , p. j47, t. 4a); *L. horriduin* , Kunth , et quelques autres Arbrisseaux épineux indigènes du Pérou , décrits par Puiiz et Pavon et par Kunih. (i>..N.)

LYCIOIDES. bot. piian. Premier nom donné par Linné à un Arbuste qui est devenu pour lui plus tard un Sidéroxyle qui a conservé ce nom comme spécifique. (b.)

LYCIUM. bot. pu an. y. Lyciet.

LYCOCTONUM. bot. piian. C'est-à-dire Tue -Loup, espèce du genre Aconit, y. ce mot. (b.)

LYCODONTES. ross. Glosso-

TÈTRES.

* LYCOESTA. crust. Genre de l'ordre des Lamodipodes établi par Savigny , et dont nous ne connaissons pns les caractères. (g.)

LYCOGALA. bot. crypt. {Champignons.) Micbeli est le fondateur de ce genre qu'il ne fi\ut pas confondre avec celui formé sous le même nom par Adanson ; il est placé dans la classe des Champignons anioearpes , ordre des Uei matocarpes e la méthode de Persoonj dans les Mycétodéens de Link , et dans les Lycogalactes d'Erhenberg. Ses caractères sont d'avoir un péricidium sous-arrondi , membraneux, lisse, réticulé sur sa surface interne , renfermant une masse pulpeuse d'abord liquidequidevient une poussière avec des filamens à l'époque de la maturité. On trouve ces petites Plantes sur les écorces et les bois décomposés.

Neuf à dix espèces sont décrites dans les auteurs ; nous nous contenterons de faire connaître les deux suivantes :

LyCOGALE COULEUIt (JE VERMILLON,

Lycogala miniata, fers. , Oûs. myc a, p. a6; Lycocpe/dou epidendrum , Linné; Spec. i654; Bull. Champ. ,

LYC 553

p.]45 , t. 505. Cette Plante est de la grosseur d'un pois , sessile, aplatie, d'abord rouge ou orangée, mais grisâtre , remplie d'une humeur visqueuse ou se trouvent quelques filaments. Elle croît en groupes sur le bois mort.

Lycogale argentée , *Lycogala argentea* , D. C. , Fl. Fr. , 707 ; *Lycoperdon fuscum*, Huds. Elle est grosse comme un pois, sa forme est variable, aplatie, sphérique ou turbinée , puis brune, à surface le plus ordinairement lisse; elle, renferme des gongyles bruns; on la trouve aussi sur les bois morts. Les trois variétés indiquées par les auteurs nous paraissent être peu distinctes.

Le genre qu'Adanson avait formé sous le même nom réunissait des Plantes fort différentes qui maintenant sont placées dans les *Fuligo* et les *Fungi* arum. (a . F.)

LYCOMELA. bot. piian. (Heister.) Syn. de *Solanum Lycopersicum*.

V. Morelle et *Lycopersicum*. (b

LYCOPK. *Lycopus*. bot. piian.

Genre de la famille des Labiées, et de la Diandric Monogynic, L. , ainsi caractérisé : calice tubuleux à cinq divisions peu profondes ; corolle tubuleuse à quatre lobes presque égaux entre eux , si ce n'est le supérieur qui est plus large et écarté; deux étamines fertiles très-écartés. Ce genre est facile à distinguer parmi les autres Labiées à deux étamines fertiles et à deux avortées; il a

un port tout particulier analogue à celui de quelques Menthes ; ses fleurs sont petites < sessiles et articulées dans les aisselles des feuilles. On en compte quatre espèces , deux européennes et deux qui habitent l'Amérique du Nord.

Le Lycope vulgaire , *Lyc. europæus*, L. , a des feuilles sinuées, dentées en scie, marquées en dessus de points résineux. Cette Plante est très-: commune sur les bords des fossés et le long des rivages dans toute l'Europe et même en Amérique. L'autre espèce européenne (*Lyc. communis*) qui croît en Italie et en Hongrie,

LYC

a beaucoup de rapports avec la précédente. (G.N.)

LYCOPERDACEES. *Lycoperdaceæ*. bot. crypt. Les Piales qui composent cette famille avaient été réunies pendant long-temps aux vrais Champignons. Persoon en formait , sous le nom de *Fungi Angiocarpi* , une section où il plaçait également les Urédinées qui nous paraissent en différer par beaucoup de caractères.

Link, en établissant la tribu des *Gymnomyci*, lui donna presque les mêmes caractères et les mêmes limites; mais le nom de *Lycoperdacées* nous paraît plus en rapport avec les dénominations adoptées pour les Familles Naturelles. Il a déjà été employé par Mérat dans sa Flore des environs de Paris, mais cet auteur n'a pas circonscrit cette famille comme nous le faisons; elle correspond exactement à la division des *Angiocarpes* de Persoon. Le caractère essentiel des *Lycoperdacées*, est d'avoir les sporules renfermées dans un péricarpium ou conceptacle fibreux, formé par des filamens entrecroisés. Ces filamens très-fins, presque byssoides, composent par leur entrecroisement une ou deux couches distinctes , quelquefois même séparées à la maturité et qu'on dé-

signe par le nom de péricarpium externe et interne ; ce péricarpium , lorsque la Plante est arrivée à son développement complet, ou se détruit irrégulièrement. , ou s'ouvre au sommet avec régularité ; il renferme une masse de séminales très-fines, mêlées à des filamens plus ou moins nombreux , analogues à ceux qui composent le péricarpium. Ces sporules paraissent tout -à -fait libres , à cette époque on ne les voit pas adhérer aux filamens. Le mode de développement des sporules n'a encore été bien étudié dans aucun genre de cette famille , de sorte qu'on ne sait pas si ces sporules étaient d'abord renfermées dans l'intérieur des filamens, ou de vésicules qui en dépendaient et qui se seraient détruites , ou si elles adhéraient à la surface des

LYC

filamens qu'on observe presque toujours entremêlés avec les sporules.

On sait seulement que les Plantes de cette famille commencent en général par être liquides, et comme laiteuses intérieurement à l'époque de leur accroissement qui est ordinairement très-rapide , et qu'elles se dessèchent et se solidifient pour ainsi dire plus tard pour passer ensuite à l'état fibreux et pulvérulent à l'époque de la dispersion des séminules. C'est en général dans ce dernier état qu'on les a observés , mais de même que la structure du fruit ne peut être bien étudiée que dans l'ovaire , de même c'est par des observations microscopiques faites sur ces Plantes avant leur développement complet qu'on pourra se former une idée exacte de leur organisation. Il est assez probable que les sporules sont d'abord renfermées dans des vésicules membraneuses, qui se détruisent ensuite et qui persistent seulement dans quelques espèces. Ainsi Dittmar a observé ces vési-

cules dans le *Licea strobiliaa* et dans le genre *Polyangium* ; Ehrenberg les a figurées dans quelques *Erysiphe*; Link les indique dans le genre *Truffe* et dans quelques Plantes voisines de ce genre. La forme et la structure du péricarpium , son mode de déhiscence , la disposition des séminules permettent de diviser cette famille en quatre tribus ; la première forme, sous plusieurs rapports, le passage de cette famille à celle des Mucédinées , les filaments qui les composent n'étant le plus souvent unis que très-faiblement, et le péricarpium se détruisant très- promptement et presque complètement. La structure des Plantes qui composent la dernière tribu est encore très-mal connue, et ce n'est qu'avec doute que nous les rapportons ici; plusieurs auteurs , et Fries en particulier, les placent parmi les vrais Champignons auprès des *ïremelles* ; il n'admet dans la famille des Lycoperdacées que les genres doués d'un vrai péricarpium fibreux et déhiscent, et il regarde les *Sclérolices* comme ayant des sporules

LYC

LYC

éparses à la surface ; rien ne prouve encore cette opinion , et on passe d'une manière si naturelle des vraies Lycoperdacées aux *Sclerolium* , par les genres *Tubec* et *Rhizoctonia* dont le premier est évidemment voisin du *Scleroderma* et du *Pisocarpium* , tandis que le dernier diffère à peine des *Sclerolium* , qu'il nous paraît plus naturel , pour le moment , de laisser ce groupe des *Sclérolées* à la fin des Lycoperdacées , qu'il lie avec les *Tremellinées* qui commencent la série des vrais Champignons.

Ve Tribu. — *Fuliginées*.

Péridium sessile, irrégulier, finissant par se détruire ou tomber entièrement en poussière, ne renfermant que peu ou point de filameus mêlés aux sporules et commençant par être complètement Uuides intérieurement.

Genres: Tric/wderma, Link; jVyrothecium , Link ; Diefwspuritim , Nées ; A rnphisporium , Link; Stroiigilium , Uitlinar; Dermodium , Link; Diphlerium, Elucnb., Sjiu maria, Pers. ; fuligo , Pers.; Pittucarpia , Link; Lycogala , Pers.; Lignidiitm , Link; Licea , Link.

IL' Tribu. — Lycotekdacées vraies.

Péridium ordinairement pédicellé et d'une forme déterminée , s ouvrant régulièrement, renfermant des filamens nombreux mêlés aux sporules.

§ i . Trichiacées.

Genres : Gnygma , Pers.; Physarurn, Pers.; Cionium, Link; Diderma, Pers. ; Didymium , Scirad. ; Tricliia , Pers. ; Leocarpus , Link; Leatigium , Link; rateriurn , Trentepobl ; Cribla ri a , Se h ra d . ; Dicty dium , Se h ra d . ; Arcyria , Pers.; Sternonitis, Pers.; Ciirulus , Mart.

§ a. Lycoperdiuces.

Js/eroplora, Dit! m.; Titlostorna , Pers. ; Lycopenlon , l'ers. ; Poda.vis , Desv. ; Bot'ista , Pers. ; Actigea , Manu. ; Geastru/n , Pers. ; JHyriosloma , Desv.; Steerebeckia , Link; Miire-

myces, Nées. ; Calostoma , Desv. ; Diploderma, Link ; Scleroderma , Pers.; Pisoccrpium , Link.

IIIe Tribu. — Angiog astres.

Péridium renfermant un ou plusieurs péridiums secondaires (péridioles) remplis de spores sans mélange de filaments.

§ Carporolées.

Thelotrema, Tod. ; Splachnobolus, Tod. ; Atractodes, Tod.

• § 2. Nidulariées.

Cyatium, Hali. ; Nidularia, Fries ; Polypodium, Link; Polyporiococcium, Fries ; Arachnium, Schwein.

§ 3. Tuberculeuses.

Elvela, Link; Polyporus, Fries; Rhizoglyphus, Fries; Tuber, Pers.

IVe Tribu. — Sclerotiales.

Péridium indéhiscent rempli d'une substance compacte, celluleuse, entremêlée de spores peu distinctes.

Rhizoglyphus, Link; Sclerotium, Tod. ; Sclerotia, Fries; Xylaria, D. C ; Acinula, Fries; Pyrenopeziza, Tod.

Quant à la distribution géographique de ces Végétaux, on n'a pas des matériaux suffisants pour pouvoir bien l'établir ; cependant il paraît que cette famille présente son maximum dans les régions tempérées, et qu'elle est moins nombreuse dans les régions très-froides et dans la zone torride; en effet on connaît à peine deux ou trois Plantes de cette famille dans les pays tropicaux, d'où on a déjà rapporté un assez grand nombre de vrais Champignons, et le nombre de leurs espèces ne paraît pas augmenter vers le Nord, comme on l'observe pour la

plupart des autres familles de Crépètes.

togames celluleuses. (ad. b.)

♦ LYCOPERDASTRUM. bot.

crypt. {Champignons.) Micheli a fondé ce genre, dans la famille des.

Champignons, pour des Lycoperdi-

556 LYG

nées groupées par les modernes sous le nom de Scleroderma. (a. f.)

LYCOPERDINE. Lycoperdina.

ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Trimères, famille des Fongicolés, établi par Latreille aux dépens du genre Endomyque de Fabricius et d'Olivier, et s'en éloignant par les antennes qui sont presque moniliformes, insensiblement plus grosses vers leur extrémité, et dont les deux derniers articles, plus grands que les précédents, forment seuls la massue, au lieu que dans les Endomyques la massue est composée des trois derniers articles. Les, Lycoperdines vivent dans les Champignons qui portent le nom de Vesset-Loups ou Lycoperdons, tandis que les Eudomyques se trouvent sous les écorces des Arbres. Ce genre se compose de cinq à six espèces, dont une seule est

Propre à l'Amérique et les autres à Europe; La plus commune à Paris et celle qui sert de type au genre, est :

La Lycoperdine large bande, L. si/cincia, Latr. ; Endomychus succinctus, Oliv. (Col., t. 5, n° 100, pl. 1, fig. 5); Endomychus fasciatus, Fabr. D'un rouge fauve, avec une large bande noire traversant les élytres. (g.j)

LYCOPERDITES. polyp. foss.

Guettard à décrit sous ce nom plusieurs Alcyons ou Eponges fossiles, dont la forme présente quelque ressemblance avec les Cryptogames d'à genre Lycoperdon. (E. d..l.)

* LYCOPERDOIDES. bot. crypt.

(Champignons.) Micheli donne ce nom à des Champignons très-voisins des Lycoperdons. Les espèces qu'il y à placées ont servi plus tard à former les genres Pisocarpium , Pisolilhus , Polysacctm et Polypera. ff.. ces mois.

LYCOPERDON. bot. crypt.

[Champignons.) Vulgairement Vesse de Loup. Les Lycoperdons sont des Champignons ordinairement terrestres , globuleux , qui acquièrent

LYC

souvent des dimensions considérables. On les caractérise ainsi : péricidium le plus souvent globuleux ou turbiné, charnu dans le premier âge, ensuite pulvérulent, s'ouvrant à la maturité vers leur sommet, renfermant une poussière abondante , verte ou brunâtre, entremêlée de filaments:

Ils font partie des Champignons angiocarpes ou gastromyciens ; c'est le type du groupe des Lycoperdaceées de la méthode de Liuk.

On croit, mais sans fondement, que le Cramois de Théophraste était un Lycoperdon. Les anciens n'ont point fait connaître ces fongosités si communes; ce n'est guère que vers le

moyen âge. que l'on a étudié les Lycoperdons. L'effet qu'ils produisent, quand on les écrase à leur maturité, leur a fait donner le nom de Crépité us Lupi que l'on a depuis grécisé. Tournefort a le premier établi le genre Lycoperdon qu'il caractérise en Champignon charnu, puis pulvérulent. Il serait fastidieux de mettre sous les yeux de nos lecteurs les changements survenus à ce genre depuis Tournefort. Micheli est le premier qui le modifia, en créant les genres Geastrum, Carpobolus, Lycogala et Tuber qui ont été conservés, et Lycoperdastum et Lycoperdoides

qui ont été rejetés ou rétablis sous d'autres noms. Linné, en augmentant le nombre des espèces, le rendit tellement hétérogène, que ce genre a donné naissance aux genres suivants :

Lycoperdon, Tulostoma, Scleroderma ou Hypogaeum (Lycoperdastum de Micheli), Polysaccum, Bovista, Baltarca, Geastrum, Onygena, Tuber, Sphærobolus, Mcidium, Lycogala, Trichia, Peziza, Physarum Slic/is, Sclerotium et Sphœria, qu'on s'étonne de voir figurer dans cette réunion de genres assez naturels. Depuis l'époque de ce travail, de nouveaux genres ont été formés; ils ont été énumérés en parlant du groupe dont ils font partie. Tr. Lycoperdacees. Nous croyons plus utile de faire connaître quelques espèces que de discuter longuement la

LYC

validité de ces genres qu'on peut étudier à leurs articles respectifs.

Lycoperdon gigantesque, Lycoperdon giganteum, Balsch, Elench., 2^e 7, fig. 165; Bovista gigatitea, Née?, Syst., tab. 11, fig. 14. Presque sans pédicule, globuleux, grand, d'un blanc pâle, couvert de squammules éparses. Quelquefois cette espèce atteint

deux pieds de diamètre; ce qui est au resle assez rare. Paulet croit que, jeune, elle peut être mangée impunément. On peut en préparer un bon amadou. Elle se trouve en automne parmi les gazons dans les prairies, sur les collines, etc.

Lycoperdon en forme d'outre , *L. utriforme* , Bull., Champ., p. 155, tab. 450, fig. 1. A péricidium court, cylindrique, renflé, sans pédicule apparent , un peu plissé à la Base, du volume d'un œuf, de couleur bistrée , sans écailles marquer , fixée à la terre par de petites racines; sa chair est ferme et épnis-c. On trouve cette espèce sur la terre dans les environs de Paris et dans toute la France. (■*••*•)

* LYCOPERDONÉES. bot.

crypt. [Champignons.) Le docteur Mérat, dans sa Flore des environs de Paris, a créé, sous ce nom, un groupe dans la famille des Champignons. Il renferme les genres *Uredo*, *Gymnosporangium*, *Bullaria*, *Fuccinia*, (*Ecidium* , *Ilœslalia* , *Mucor* , *Licea* , 77/*bulina*, *Trichia*, *Stemunitis*, *Diderma*, *Reticularia* , *Lycogala* , *Geastrum* , *Tulostoma* , *Onygena*, *Pilobolus*, etc.

V. Lycoperdacées. (a. F

LYCOPERSICDM. bot. phan. Ce genre de la famille des Solanées et de la Pentandrie Monogynie , L. établi par Tournefort , fut réuni aux Solanum par Linné et Jussieu. Dans sa Monographie des Solarium , Dunal le rétablit , et il a été admis par Kunth avec les caractères suivans : calice à cinq ou six divisions très-profondes; corolle rotacée dont le tube est très-court , le limbe à cinq

ou six lobes ; cinq étamines à anthères conique* , réunies entre elles au moyen d'une

LYC 557

membrane allongée , déhiscentes par une fente longitudinale intérieure; stigmate presque bifide; baie à deux ou trois loges renfermant des graines velues. Ce genre se compose de Plantes herbacées , dépourvues d'aiguillons , et couchées sur la terre; leurs feuilles sont imparipennées ; les pédoncules solitaires, placés hors des aisselles des feuilles , portent plusieurs fleurs de couleur ordinairement jaune. Parmi les nombreuses espèces de ce genre , dont plusieurs croissent dans l'Amérique méridionale , nous citerons seulement comme la plus intéressante , celle que Linné a nommée *Solanum Lycopersicum* , et qui est appelée vulgairement Tomate. Cette Plante a une tige inerme herbacée, des feuilles pinnées incisées , des fleurs en grappes , et des fruits glabres, toruleux, très-volumineux et de couleur rouge : elle est originaire des pays chauds de l'Amérique , et on la cultive dans l'Europe méridionale, à cause de ses fruits dont le suc est employé à divers usages culinaires.

LYCOPHIS. MOLL. (Montforl.) Syn. de Lycophre. F", ce mot. ID..H.)

LYCOPHRE. polyp. ^-.Licopiire.

LYCOPHTHALMOS. arin. La Pierre semblable, selon Plin, à un OEil de Loup , et qu'il mentionne sous ce nom , paraît être une Cornaline. (B.)

LYCOPODE. *Lycopodium*. rot.

crypt. (Lycopodiacées.) Cegeuie, type de la famille des Lycopodiacées, qu'il compose presque à lui spiiI, est, sans aucun doute , l'un des plus singuliers du règne végétal , et un de ceux dont la structure mérite le plus de fixer l'attention des botanistes.

D'abord placé par Linné parmi les Mousses dont il a le port, il fut ensuite rangé par Jussieu parmi les Fougères dont sa fructification le rapproche davantage, et enfin il devint le type d'une famille distincte , établie en premier par Swarlz, et de-

55S LYG puis adoptée par tous les botanistes.

Des différences très -r remarquables dans le port et dans quelques-uns des caractères de la fructification ont engagé plusieurs botanistes à diviser ce genre su plusieurs ; S\var:z le premier en sépara le Lycoporllum nudum de Linné , qui devint le type de son genre Fsiloti/m. Bérnhardi, en 1801, le divisa en deux genres, fondés sur l'intlorescence axillaire dans les uns, auxquels il donna le nom de Huperzia, etspicifonne dans les autres auxquels il conserva le nom de Lycopodium. En i8o5 , Palisot-Beauvois, combinant l'inflorescence avec la structure des capsules, forma, aux dépens des Lycopodes , six genres , sous les noms de Plananthus , Selaginella , Lepidotis , Gyninogynuin , Diplostachiuni et Stachygynandrum.

De ces six genres , le Gymnogynum est tout-à-fait inconnu aux botanistes, ayant été établi sur une Plante de Saint-Domingue que Palisot-Beauvois lui-même n'avait pas rapportée en France et qui n'a pas été, à ce que nous sachions , observée depuis. Les genres Plananthus et Lepidotis , dans lesquels on n'a encore découvert que îles capsules bivalves, analogues à celles que plusieurs observations font regarder avec beaucoup de prob ibilité

comme des organes mâles dans les autres genres, 11e di fièrent que par l'inflorescence axillaire dans le premier et en épis simples ou rameux dans le second.

Dans les genres *Selaginella*, *Diplostachium* et *Stachygynandrum*, on a observé, réunies sur le même individu, des coques réniformes , bivalves, renfermant un grand nombre de grains très - fins, libres, analogues aux grains de pollen des fan les phanérogames, et des capsules trivalves , suivant Palisot , à quatre valves suivant Brotero, et renfermant trois à quatre graines. Ces genres ne diffèrent donc qu'en ce que dans le premier les organes mâles et femelles sont mêlés à l'aisselle des feuilles, et ne forment pas d'épis bien distincts , tandis que dans le second les fleurs

LYC

mâles et femelles composent des épis distincts, et qu'il n'existe qu'une seule capsule femelle à la base d'un épi composé de coques mâles. R. Brown, dans son *Prod. de la Fl. de la Nonv.-Hol.* , n'a pas adopté ces divisions, mais a divisé ce genre en deux sections, l'une renfermant les espèces où on n'a découvert que des capsules d'une seule forme , l'autre comprenant les *Lycopodes* à capsules de deux sortes (mâles et femelles) , divisions qui mériteraient d'être élevées au rang de genres, si on avait bien prouvé l'absence des capsules à graines peu nombreuses dans la première section. Après avoir indiqué les divisions qu'on a établies dans le genre *Lycopode*, examinons avec soin la structure de quelques-unes des espèces qui ont servi de type à ces divisions.

Le *Lycopodium denticulatum*, parfaitement décrit par Brotero dans les *Transactions Linnéennes* (vol. v, p. 162), est une des espèces les mieux caractérisées du genre *Diplostachium* de Palisot-

Beauvois; elle est commune dans le midi de l'Europe ; les tiges font grêles , rampantes , couvertes de feuilles distiques insérées sur quatre rangs, mais dont les deux rangs supérieurs sont composés de feuilles beaucoup plus petites, ressemblant presque à des stipules. Les fructifications forment des épis terminaux, dont la partie supérieure est composée de fleurs mâles et la partie inférieure de fleurs femelles (selon Brotero qui, avec raison, n'admet pas, comme Palisot-Beauvois, que certains épis soient entièrement mâles et d'autres entièrement femelles).

Les fleurs mâles consistent en coques ou anthères à une seule loge, bivalves, réniformes , insérées à l'aisselle des bractées supérieures et plus petites que les capsules; chaque anthère renferme un grand nombre de grains de pollen , trois cents environ suivant Brotero; ces grains ne se rompent pas par l'action de l'eau , mais s'ouvrent avec élasticité; ils ont la forme d'un tétraèdre lisse à angles

LYC

légèrement arrondis, à surfaces convexes; leur couleur est d'un rouge orangé. Les fleurs femelles, qui sont en moins grand nombre que les mâles , et placées à la base des mêmes épis, sont formées par des capsules solitaires à l'aisselle des feuilles ou des écailles de la base de l'épi; ces capsules sont ovales , obtuses , triangulaires ou presque quadrilobées.

Elles présentent des deux côtés et vers leur base deux sillons linéaires , couverts d'une substance onctueuse. Brotero regarde ces sillons comme des stigmates: les ovules même, très-développés , sont remplis d'un liquide oléagineux qui finit par se concrétiser en une sorte de péricarpe granuleux. La capsule mûre est

quadrilobéc et se divise en quatre valves, dont deux plus petites et deux plus grandes; elle renferme quatre graines qui paraissent adhérentes à un placenta central ; leur tégument est mince, dur, réticulé, et présente trois côtes saillantes , très- marquées , parlant d'un même point qui est probablement celui de l'insertion de la graine et s'étendant en divergeant jusque vers la zone moyenne de cette graine. Lorsqu'on fait germer les graines de cette Plante, la jeune Plante qui en sort est pourvue de deux cotylédons opposés , tout-à-fait semblables à ceux des Plantes dicotylédones (A. la figure donnée par Salisbury , Traits. L'uni- , vol. xu , tab. ig). Plusieurs espèces rangées par Palisot-Beauvois dans son genre *Diplostachyum* correspondent parfaitement avec la Plante que nous venons de décrire; tels sont les *Lycopodium helveticum* , *L. apodi- m.*, *L. radioans* , L.

Toutes ces Plantes diffèrent du caractère donné par cet auteur au genre *Diplostachyum* par la réunion des fleurs mâles et des fleurs femelles dans les mêmes épis, et, sous ce rapport, ce genre ne diffère nullement du genre *Selaginella* du même auteur, qui devrait nécessairement lui être réuni , car il ne diffère des espèces citées précédemment que par son port et par son pollen composés de

LYG 55n

grains ordinairement réunis trois par trois et bérissés de papilles très-nombreuses et très-saillantes; mais on ne peut donner beaucoup d'importance à ce caractère , car nous avons également observé un pollen bérissé sur une Plante qu'on ne peut regarder que comme une variété du *Lycopodium denticulatum* ou du *Lyc.*

helveticum. Du reste le Lyc. selaginoides , qui seul composait le genre Selaginella , présente des capsules tout-à-fait semblables par leur forme et leur organisation à celles du Lyc.

denticulatum.

Quant au genre Stackygynandrium, plusieurs des espèces que Palisot Beauvois y avaient placées devront probablement être reportées parmi les Lycopodes à coques toutes semblables , et les autres devraient être réunies avec les espèces qui composaient les deux genres que nous venons d'examiner. En effet ces Plantes présentent de même des épis mâles au sommet et femelles à la base; les capsules femelles sont seulement moins nombreuses et d'une forme un peu différente.

Elles renferment également quatre graines; mais ces graines, au lieu d'être opposées en croix comme dans les autres espèces , sont placées trois au fond de la capsule et une à son sommet, ce qui lui donne la forme d'un tétraèdre arrondi. Les espèces qu'on pourrait regarder comme type de ce genre sont les Lyc. alpinum, jacobellatum , plumosum , etc. , etc.

Les Lycopodes dont Palisot Beauvois formait les deux genres Vlnanthus et Lepidotia , genres qui ne diffèrent que par le port, n'ont offert jusqu'à présent qu'une seule sorte d'organes de fructification; ce sont des coques bivalves, tout-à-fait analogues pour leur forme extérieure à celles que nous avons regardées comme des organes mâles; ces coques renferment également un grand-nombre de grains très-fins; mais ces grains, au lieu d'affecter comme ceux des coques mâles des Lycopodes à organes doubles une forme presque toujours triangulaire, sont arrondis , sphériques

on

ovales; jamais ils ne sont hérissés de papilles; mais cependant, de même que les grains de pollen, ils sont parfaitement libres et n'adhèrent par aucun moyen aux parois de la capsule.

Ils sont toujours transparens et incolores. Willdenow assure que cette poussière provenant du *Lycopodium clauatum* a germé et reproduit la Plante dont elle provenait; cette poussière diffère en outre de celle des *Lycopodium selaginoides*, *helueticum*, etc., en ce qu'elle ne se rompt pas dans l'eau, tandis qu'une grande partie des granules du *i. selaginoides*, en particulier, finissent par s'ouvrir au bout de quelque temps et par laisser échapper lentement, il est vrai, une substance granuleuse et oléagineuse, comme on l'observe sur le pollen des Plantes phanérogames.

On voit donc que, malgré l'analogie apparente qui existe entre les organes uniformes des Lycopodes à une seule sorte de capsule et les organes mâles des Lycopodes à sexes distincts, ces organes devraient plutôt être regardés comme des capsules femelles que comme des organes mâles, ainsi que Palisol-Beauvois l'avait fait.

Il nous paraît résulter de cette comparaison de la structure des divers groupes de Lycopodes, qu'on devrait non pas les diviser en cinq ou six genres comme quelques auteurs l'ont fait, mais en deux : l'un auquel on réserverait le nom de *Lycopodium* renfermerait toutes les espèces qui n'ont qu'un seul genre de capsule, sortes d'involucre qui probablement se forment dans la jeunesse de la Plante les organes mâles et femelles comme les involucre du *Marsilea*, de la *Pilulaire*, des *Prêles*; l'autre pour lequel on pourrait adopter le nom de *Stachygynandrum* donné par Pali-

sot - Beauvois , comprendrait toutes les espèces à sexes séparés dans des capsules ou involucre diffèrents. Nous ferons observer qu'il est fort probable que dans ces Plantes et dans plusieurs autres , Cryptogames dont les sexes sont distincts et séparés, et dont cependant

LYC

l'organe femelle ne présente ni stigmate ni aucun point propre à l'absorption du pollen, la fécondation a lieu après la dissémination des graines ou du moins après l'ouverture des capsules, ainsi que Savi l'a annoncé pour le *Salvinia*. (V. ce mot

et MANSilÉACÉES.)

Si après avoir étudié les organes de la reproduction de ce genre curieux , nous jetons un coup-d'œil sur la structure de ses organes végétatifs, nous verrons qu'ils ne diffèrent pas moins de ceux des autres Végétaux ; la tige, souvent rampante, émet des rameaux tantôt plusieurs fois dichotomes comme dans la plupart des vrais Lycopodes, tantôt à rameaux plusieurs fois pinnés et disposés en éventail dans un même plan : tels sont la plupart des *Stachygy nandrum*. Les feuilles, presque toujours sétacées, aiguës, entières, assez épaisses, sont toujours lisses , elles ont l'aspect de celles des grandes Mousses , ou dans les espèces les plus fortes elles ressemblent aux feuilles des Conifères ; tantôt elles sont insérées par verticilles obliques ou en spirale tout autour de la tige; tantôt elles sont disposées sur quatre rangs dont deux plus petits forment des sortes de stipules qui alternent avec les grandes feuilles : c'est le cas de la plupart des *Stachygy nandrum*. Ces feuilles sont quelquefois sans nervures , , mais le plus souvent elles sont parcourues par une seule nervure moyenne ;

les pores corticaux sont très-visibles, assez grands , de forme elliptique: ils existent sur les deux faces des feuilles"; la structure intérieure des tiges est très-uniforme et fort différente de celle de la plupart des autres Végétaux; au centre on observe un faisceau très-serré de vaisseaux simples, cylindriques , réunis par un peu de tissu cellulaire très-dense; ces vaisseaux n'ont la structure d'aucun des vaisseaux observés dans les IMantes phanérogames, ils ont été désignés par Thomson {Lectures un Butany, T. 1 , 1 832) sous le nom de vaisseaux annelés :

en effet ils paraissent composés

LYC

d'anneaux successifs, parallèles et non en spirale. Thomson attribue ces anneaux à des pores linéaires, transversaux; mais cette opinion ne paraît ni probable ni en rapport avec ce que j'ai observé sur ces Plantes; autour de ce faisceau central de vaisseaux se trouve une couche de tissu cellulaire extrêmement lâche qui se détruit promptement de manière à donner à ces tiges l'aspect fistuleux avec un axe central souvent déjeté sur un des côtés; enfin la circonférence est composée d'une couche

J'ai dû ou inoins épaisse d'un tissu cellulaire assez dense , sans vaisseaux , à cellules allongées et presque fusiformes ; la partie extérieure surtout est très-dense et composée de cellules très-petites , elle forme une sorte d'écorce ; ce tissu cellulaire est traversé de distance en distance par des vaisseaux qui de l'axe central se portent dans les feuilles; mais il ne paraît renfermer aucun vaisseau qui lui soit propre.

Les Lycopodes n'atteignent pas en général une taille très-considérable; les plus grandes espèces ont deux à trois pieds

d'élévation. On en connaît plus de cent vingt ; ils habitent toutes les régions du globe depuis la zone polaire jusqu'à l'équateur; mais us suivent sous le rapport de leur distribution les mêmes lois que les Fougères avec lesquelles ils ont de grands rapports; ainsi peu nombreux dans le Nord ils sont limités dans ces régions froides à quelques espèces basses et rampantes , telles que *Lycopodium alpinum* , selaginoides , etc.; ils sont rares dans les plaines des régions tempérées; dans les régions équinoxiales au contraire leur nombre devient beaucoup plus considérable, et ils paraissent de même que les Fougères dominer dans les îles où la végétation est beaucoup plus pauvre en Fiantes phanérogames: ils atteignent aussi dans ces climats féconds une taille beaucoup plus élevée : c'est là que croissent les *Lycopodium complanatum*, *flabellatum* dont le port rap-

tome ix

LYC . S&f pcell en petit plusieurs de nos Conifères, (ad. B.)

* LYCOPODIACÉES. bot. crypt.

Cette famille établie par Swartz et adoptée depuis par tous les botanistes, n'est presque composée que du genre Lycopode. et de quelques genres qu'on en a démembrés. Tels sont les deux genres *Tmesipteris* et *Psilotum* {*Bernhardia*, Willd. }; on doit encore y rapporter, ainsi que l'a fait De Candolle, le genre *Isoetes* dont l'organisation a les plus grands rapports avec celle des Lycopodes. Quant au genre *Dufourea* de Bory de Saint-Vincent rapproché par Willdenow des Lycopodes , il a été reconnu depuis pour une Plante phanérogame, voisine de la famille des Juncées.

Cette famille se trouverait donc composée de quatre genres ou de cinq, si on divisait le genre Lycopode, comme nous pensons que ce serait convenable , en deux genres fondés sur la structure des capsules. Ou pourrait distribuer ces genres ainsi :

f Capsules indéhiscentes.

Isoetks.

|f Capsules régulièrement déhiscentes.

Stacuygynandhum, Lycopodium, Taies ifteris , Psilotum.

La première section forme pour ainsi dire le passage aux Marsiléacées et surioul à la section des Salviniées {Salvinia et s/zo//a), dont l'Isoetes se rapproche par sa manière de croître, c! par ses capsules ou plutôt ses involucre indéhiscens; les derniers genres de la seconde section ont au contraire plus d'analogie avec les Fougères, et surtout avec les Ophioglossées.

Les LyOôpodiâcées sont principalement caractérisée^ par leurs capsules ilacces à l'aisselle des feuilles ou des u nctées, éparses ou formant des épis distincts; tantôt ces capsules, toutes semblables , renferment un grand nombre de séminules auxquelles étaient probablement mêlés dansleur premier développement les grains

SGu LYC

de pollen , ainsi que cela s'observe dans les involucre du Marsilea et du Pilularia ; tantÔL ces organes sont réunis dans des capsules de deux sortes , les unes ne renfermant que des grains de pollen , et les autres ne contenant que des scminules beaucoup plus grosses que les grains des premières : c'est le cas de i'Isoetes

et du *Slachygy nandrum* dans ces deux genres, et surtout dans le premier, il est à présumer que la fécondation a lieu après la dispersion des graines, comme cela a lieu dans le *Salvinia* et probablement dans *Y Azolla*- Du reste la structure des graines est parfaitement la même dans *Ylsoetes* et dans les *Slachygy nandrum*, dans les uns et les autres elles sont sphériques, blanches, et présentent trois côtes rayonnant d'un même point. Dans les autres genres la ténuité des graines rend difficile de les observer; cependant on reconnaît toujours une forme un peu trigone qui paraîtrait indiquer également ces trois côtes. La structure des tiges et des feuilles est la même dans toutes ces Plantes, si ce n'est que celles de *Ylsoetes* sont dépourvues de pores corticaux comme toutes les feuilles des Plantes submergées. La tige présente toujours les vaisseaux réunis en un faisceau au centre, et entourés d'une couche fort épaisse de tissu cellulaire plus dense vers la circonférence. La distribution géographique de cette famille est la même que celle que nous avons indiquée pour les Lycopodes en particulier; les deux genres *Psilotum* et *Tmesipteris* ne se trouvent qu'entre les tropiques ou à peu de distance de cette zone à la Nouvelle-Hollande et à la Nouvelle-Zélande d'un côté, et le *Psilotum* jusque dans les Florides de l'autre.

Un des faits les plus remarquables offerts par cette famille, mais qui n'a été observé, il est vrai, jusqu'à présent que sur une seule espèce, c'est la germination dicolylédone de ces Plantes; ce fait annoncé par Lirotero, vérifié par Salisbury qui en a donné une bonne figure (Trans. Soc. Linnéenne, T. xn), a été remarqué sur le *Lyc. denticulatuni*; il tendrait à éloigner ces Plantes des Fougères et annoncerait peut-

LYC

néenne, T. xn), a été remarqué sur le *Lyc. denticulatuni*; il tendrait à éloigner ces Plantes des Fougères et annoncerait peut-

être, entre ces Végétaux et les Conifères , des rapports que leur port semblerait indiquer , et que quelques autres caractères paraîtraient faire ressortir; peut-être cette famille est-elle destinée à suivre le sort des Cycadées qui , d'abord confondues avec les Fougères , furent ensuite placées parmi les Phanérogames monocotylédones, et dont le célèbre Richard a si bien prouvé depuis les rapports avec les Conifères.

Lycopodiacées fossiles. — Plusieurs auteurs ont indiqué comme appartenant à la famille des Lycopodiacées, des Végétaux dont les restes ont été trouvés dans différents terrains. Nous avons partagé cette opinion en rapportant à cette famille plusieurs Piaules du terrain houillier et quelques autres trouvées dans des terrains plus nouveaux. Eu effet , cette famille paraît une de celles qui s'est développée en premier sur la terre, niais avec des caractères assez différents de ceux qu'elle offre maintenant pour exiger une comparaison minutieuse , afin de donner quelque degré de certitude à cette détermination .

Examinons d'abord ceux de ces Végétaux qui se rencontrent dans la formation houillière; c est dans ce terrain que cette famille paraît prédominer, et le nombre des espèces , ainsi que leur état de conservation, nous mettra à même de les mieux caractériser.

Ou rencontre en grande quantité , dans les terrains bouilliers, et peut-être plus particulièrement dans ceux' du nord de l'Allemagne, de la Belgique, de l' Angleterre et des Etats- Unis , des tiges cylindriques ou légèrement elliptiques lorsqu'elles sont perpendiculaires aux couches, tout-à-fait planes lorsqu'elles sont parallèles à ces couches. Le diamètre de ces tiges ou de ces rameaux varie , probablement suivant les espèces et

LYC

suivant la partie de la Plante, depuis quelques millimètres jusqu'à 5-6 décimètres. Lorsqu'on observe ces tiges clans les couches qui les renferment, on voit qu'elles sont toujours rameuses , le plus souvent diclioiomes , quelquefois pinnées. On en a mesuré , dans les mines des environs de Dusseldorf , qui atteignaient jusqu'à 70 pieds de long. Elles ne présentent d'articulation dans aucun point de leur étendue. Leur surface est couverte d'une écorce de charbon très-mince , très-régulière; l'intérieur est entièrement remplacé par de la roche , et ne conserve aucune trace de structure végétale; l'écoice offre des mamelons rhomboïdaux disposés en quinconce , vers La partie supérieure desquels on remarque une cicatrice d'insertion de forme variable , mais toujours plus large que haute et marquée d'un ou de trois points vasculaires. Telle est la structure des grosses tiges; elles paraissent se terminer intérieurement par plusieurs racines dichotomes. INous avons observé quatre racines disposées en croix sur une base de tige très-grosse des environs de Glasgow , que nous présumons appartenir à ce genre. Mais lorsqu'on rencontre des portions de rameaux plus jeunes , soit qu'ils fassent suite à ces liges , soit qu'ils soient isolés , on peut étudier avec plus de succès la structure de ces Plantes. Sur ces rameaux , on retrouve en plus petit la même organisation de l'écorce; mais en outre, on rencontre presque toujours une partie des feuilles qui s'inséraient sur ces sortes de mamelons; ces feuilles sont linéaires ou sétacées, plus ou moins longues, souvent courbées en faucille, très-aiguës , et traversées par une seule nervure moyenne; leur tissu paraît assez épais et coriace. Dans d'autres espèces , les feuilles ne semblent être que des sortes de tubercules courts et aigus , mais c'est le cas le plus rare Ces Végétaux , que nous avons d'abord

désignés sous le nom de *Sagenaria*, ont été nommés à la même époque par

LYC 56S

Strenberg, *Lepidodendron* , nom que nous sommes portés à adopter. Si nous comparons ces Végétaux à ceux que nous connaissons actuellement , nous ne trouverons que deux familles avec lesquelles ils aient de nombreux rapports; ce sont les Lycopodiacees et les Conifères. Us s'éloignent des premières par la grandeur, des secondes par un caractère plus important, l'absence d'accroissement en diamètre , accroissement qui eût détruit les traces des insertions des feuilles sur les tiges, bien longtemps avant que ces tiges eussent pu acquérir un diamètre de 5 à 6 décimètres. Ils diffèrent encore des Conifères par leur division dichotome , mode de division qu'on n'observe dans aucune Plante de cette famille , et qui est au contraire si commune dans les Lycopodes ; du reste , la forme et la disposition des feuilles s'accordent également bien avec l'une et l'autre famille; en effet, nos Plantes fossiles ont des feuilles tout-à-fait semblables d'une part à celles des *Araucaria* d'Amérique , et de l'autre à celles des *Lycopodium verticillatum* , *ulicifolium* , etc.

Deux autres caractères nous font encore pencher pour l'affinité avec les Lycopodiacees : i° la manière dont les tiges de ces Végétaux sont remplies d'une roche semblable à celle qui les environne , peut faire présumer qu'elles étaient fistuleuses ou composées intérieurement d'un tissu cellulaire très— lâche qui s'est détruit promptement. Si on examine les tiges des Lycopodes vivans

, et particulièrement des espèces à tiges épaisses et dichotomes , on verra qu'elles consistent en une écorce d'un tissu cellulaire très-dense , plus ou moins épaisse , et en une cavité assez large, au centre ou sur les côtés de laquelle se trouve un axe cylindrique formé par un faisceau de vaisseaux. On conçoit qu'il peut avoir existé des espèces , dont la tige, beaucoup plus grosse , présentât une cavité beaucoup plus grande, qui aurait été remplie par la roche envi-

564 LYC

ronnante. Il est au contraire très-difficile de concevoir comment l'intérieur d'une tige pleine et ligneuse comme celle d'un Pin ou de tout autre Arbre de la famille des Conifères aurait pu se détruire et être remplacée par une substance étrangère , sans que l'écorce, beaucoup moins dense, qui l'entoure, se fût détruite en premier; aussi ne trouvons-nous aucun exemple de ce mode de pétrification dans les bois évidemment dicotylédons. Le dernier fait qui nous porte à admettre ces Végétaux pour des Lycopodiacées , consiste dans la disposition des feuilles de quelques Plantes de ce genre ap-

partenant également au terrain houiller. Dans ces échantillons , les feuilles sont distiques et alternativement plus grandes et plus petites, absolument comme dans certains Lycopodes , tels que le *L. flabellatum*.

Si après avoir ainsi comparé les organes de la végétation des Végétaux avec ceux des Lycopodes , nous cherchons parmi les autres débris de Végétaux fossiles du même terrain ceux qui pourraient se rapporter à leurs organes de fructification , nous trouverons deux sortes de fruits ,

3 ni, malgré leur grande différence de forme, nous paraissent appartenir à des Végétaux de cette famille.

Les premiers sont des fruits comprimés , presque lenticulaires, cordiformes à la base , qui ont , avec les coques bivalves des Lycopodes, la plus grande analogie , et qui n'en diffèrent également que par une taille beaucoup plus considérable , différence qui s'accorde avec celle que nous avons observée dans les tiges. Les seconds sont des cônes ou épis formés d'écaillés imbriquées, écailles qui paraîtraient creuses ou composées de deux écailles soudées comme celles des Araucaria, et renfermer dans leur intérieur une coque probablement membraneuse et remplie de graines nombreuses; structure qui est pour ainsi dire intermédiaire entre celle des Lycopodes à épis et celle de l'Isoetes, et qui, d'u-

LYC

De l'autre part , a une grande analogie extérieure avec celles des cônes des Araucaria . mais qui nous paraît en différer essentiellement par la forme et la disposition de la substance renfermée dans les écailles , qui ne paraît pas être une seule graine régulière et compacte comme celle des Conifères, mais une agglomération de séminules dans une coque, comme on l'observe dans les Lycopodiacées.

Tels, sont tous les caractères qui, réunis , nous portent à regarder les Végétaux du terrain houillier qu'on a désignés sous le nom de Lepidodendron comme des Lycopodes arborescens , et à nous éloigner en cela de l'opinion de Rhodé qui les regarde comme des Cactus, et de celle de Martius qui les nomme Lychnophorites,

et les admet pour les analogues du genre de Composées du Brésil , qu'il a nommé Lyc/mophora.

Il serait trop long de développer tous les caractères qui les distinguent de ces Végétaux; la description que nous avons donnée de ces Fossiles suffira pour que tout botaniste puisse voir combien ils s'éloignent de ces diverses familles.

Ces immenses Végétaux paraissent bornés au terrain houillier, peut-être en rencontre-t on quelques-uns dans les terrains de transition , et par conséquent à une époque un peu antérieure au dépôt de la Houille, mais ils ne paraissent t pas a voir persisté plus tard que cette grande formation.

Dans les terrains plus nouveaux, on retrouve quelques Plantes qui peuvent encore se rapporter à la famille des Lycopodiacées , mais alors ces Végétaux ne dépassent plus la taille de ceux que nous voyons encore sur la terre, et leur nombre est beaucoup moins considérable. Quant aux Plantes fossiles des Schistes bitumineux de A.Jausfeld que plusieurs auteurs ont regardées comme des Lycopodes fossiles, nous ne saurions partager cette opinion. Dans ces Fossiles, les feuilles sont disposées sans ordre; elles sont minces ou charnues, mais n'ont jamais l'aspect coriace de

LYC

LYC

celles des Lycopodes ; enfin, on n'y voit aucune trace de nervures, caractères qui nous portent à les considérer plutôt connues des Algues voisines des Caulerpa à feuilles imbriquées, telles que le Caulerpa Lycopodioides, que comme des Lycopodes.

(ad. b.)

LYCOPO DITES, bot. crypt. V.

LYCOrODIACÉES FOSSILES.

LYCOPODIUM. bot. phan. y.

Lycopode.

LYCOPSIDE. Lycopsis bot.

piian. Genre de la famille des Borraginées et de la Pentandric Monogynie, Caractérisé par un calice tubuleux à cinq divisions, une corolle monopétale inl'undibulilbrme , avant le tube grêle cl recourbe en arc, le limbe à cinq lobes et l'entrée du tube garnie fie cinq appendices convexes et connivns. Ce genre se coinpose d'un petit nombre d'espèces ayant absolument le port des Buglosses, dont il ne diffère que par la courbure du tube de la corolle, qui est droit dans les Buglosscs. Ce sont des Plantes herbacées , annuelles ou vivaces; hérissées de poils comme la plupart des autres Borraginées , et portant des fleurs violettes , disposées en grappes terminales.

L'espèce la plus commune dans nos climats est le Lycopsis aix-ensis, L. , qui croît partout dans les champs incultes et sur le bord des chemins.

Elle fleurit pendant la plus grande partie de la belle saison. Aux environs de Naplcs elle est remplacée par le Lycopsis bullata de Cyrillo, qui en diffère surtout par ses feuilles offrant un grand nombre de bullosités blanchâtres , et par ses fleurs plus grandes, (a. b.)

LYCOPUS. bot. ni an. r. Ly-

COPE

LYCORIS. Lycoris. anei.. Genre de l'ordre des Néréidées, famille des Néréides , section des Néréides Lycoriennes , établi par Savigny (Syst.

des Annelides , p. 12 et 20) qui lui donne pour caractères distinctifs :

trompe sans tentacules à son orifice; antennes extérieures plus grosses que les mitoyennes; première et seconde paires de pieds converties en quatre paires de cirres tentaculaires ; des branchies distinctes des cirres. Les Lycoris s'éloignent de tous les autres genres de la même famille par la présence des mâchoires; elles partagent ce caractère avec les Nephthys dont elles se distinguent cependant par l'absence de tentacules à l'orifice de la trompe.

Le genre Lycoris est un des plus naturels de la classe des Annelides.

Toutes les espèces qui le composent ont des caractères assez tranchés et que Savigny a fort bien fait ressortir. Leur corps est linéaire, plus ou moins convexe en dessus, à segments très-nombreux; le premier des segments antérieurs est plus grand que celui qui suit; la tête est peu convexe, rétrécie par devant et libre; la bouche se compose d'une trompe grosse à la base, et partagée en deux anneaux cylindriques , le second plus petit , et garnie sur l'un et l'autre de tubercules ou points saillants durs et cornés; les mâchoires sont cornées , avancées, dentelées, courbées en faucille et pointues. On voit quatre yeux très-distincts, noirs ou de couleur brune et placés latéralement deux en avant et deux en ar-

rière. Il existe des antennes incomplètes; les mitoyennes sont courtes, filiformes, rapprochées et insérées devant le front , de deux articles , le second très-petit; l'antenne impaire manque, les extérieures sont beaucoup plus grosses et un peu plus longues que les mitoyennes, comme urcéolées , insérées sous les côtés de la tête, également de deux articles, le second petit et obtus; les pieds sont très-dissemblables ou de plusieurs sortes; les premiers et les seconds ne sont point ambulatoires et se trouvent privés de soies; ils sont convertis en quatre paires de cirres tentaculaires; les pieds suivans sont ambulatoires et les derniers ont la forme des stylets : les cirres tentacu-

566 LYC

Jaires qui sortent chacun d'un article distinct et qui s'insèrent au bord antérieur d'un segment commun formé par la réunion des deux premiers segments du corps , sont allongés , sétacés , inégaux; les deux premières paires ont moins de longueur que les deux suivantes , et le cirre supérieur de chaque paire est plus long que l'inférieur ; les pieds ambulatoires ont deux rames séparées ; la rame dorsale pourvue d'un seul faisceau de soies , manque à la première et à la seconde paire; la rame ventrale est munie de deux faisceaux; les soies sont torses ou courbées à leur pointe, et garnies la plupart d'une barbe terminale; les cirres sont subulés , inégaux, et les inférieurs plus courts; les pieds stiliaires consistent en deux filets sétacés et terminaux; les branchies se composent essentiellement, pour chaque pied ambulaire de trois languettes ou branchioles charnues ; la première de ces languettes est située sous le cirre supérieur; la seconde sous la rame dorsale et disparaît avec elle; la troisième ou la plus inférieure , sous la rame ventrale. L'anatomie a fait voir que l'œsophage des

Lycoris était accompagné de poches assez courtes et épaisses; elles manquent dans quelques genres de la famille des Néréides. Les espèces de ce genre, connues sous le nom de Scolopendres marines , sont très-nombreuses ; Savigny en décrit plusieurs nouvelles : la Lycoris loruliê, Lyc. lobulata, des côtes de l'Océan ; la Lycoris pddopuyele, Lyc. podophylla; la Lycorisfolliculéf. , Lyc.

foUiculaia ; la Lycoris fardée , Lyc.

fucata , espèce de l'Océan ; la Lycoris nébuleuse , Lyc. nebula-, la Lycoris fauve , Lyc. fulva ; la Lycoris bougeatiu:, Lyc. rubida , du "Vovage de Péron. Savigny figure et décrit deux espèces nouvelles du golfe de Suez : la Lycoris Egyptienne, Lyc. Ar<gyiia, pl. 4, lig. i de l'Ouvrage d'Egypte; elle est commune dans la mer Rouge sous les Fucus, entre les racines des Madrépores , dans les interstices des pierres, cl elle

LYC

se loge dans un fourreau membraneux ; la Lycoris messagère , Lyc.

nunUa, v\, 4, fig. 5, Ouvrage d'Egypte. Elle est très-agile. Savigny ne lui » point vu de fourreau. Parmi les espèces connues, et que cet auteur rapporte au genre Lycoris , nous citerons : la Nereis pulsatoria , Montagu,Leach; la Nereis margaritacea , Leach (Encycl. Brit. Suppl. T. I, p. 45i , tab. 26, fig. 5); les Nereis pelagica , incisa , fimbriata et ap/troditoides de Gmelin. La Nereis versicolor de Miiller^ora Kurin.,^ . io4, tab. 6, lig. i-6) a beaucoup de rapport avec le genre Lycoris, et ne paraît en différer que par une antenne impaire exactement située entre les deux antennes mi-toyennes. Cette organisation pourrait donner lieu, suivant Savigny, à une simple tribu.

(aud.)

LYCOSE. *Lycosa. arachn.* Genre de l'ordre des Pulmonaires , famille des Aranéides , section des Dipneumones, tribu des Citigrades , établi par Latreille et adopté par Walkenaër et tous les entomologistes. Ses caractères sont : yeux disposés en quadrilatère aussi long ou plus long que large, et dont les deux postérieurs ne sont point portés sur une éminence ; première paire de pieds sensiblement plus longue que la seconde.

Ces Araignées ressemblent beaucoup aux Dolomèdes de Latreille ; mais elles en diffèrent par la manière dont les yeux sont placés sur le thorax, et par les pales dont la seconde paire est aussi longue ou plus longue que la première. Elles s'éloignent des Saltiques et autres genres voisins par des caractères de la même valeur. Les yeux des Lycoses forment un quadrilatère; ils sont disposés sur trois lignes transverses : la première formée de quatre et les deux autres de deux. Les quatre derniers composent un carré dont le côté postérieur est de la longueur de la ligne formée par les antérieurs , ou guère plus long ; les deux postérieurs ne sont point portés sur des tubercules comme ceux des Dolomèdes. La

LYC

Levrière des Lycoses est carrée , plus haute que large. La longueur de leurs pales va dans l'ordre suivant : la quatrième paire la plus longue, la première ensuite, la seconde et la troisième qui est la plus courte. Leur corps est couvert d'un duvet serré et leur abdomen est de forme ovale.

Les Lycoses courent très-vite; elles habitent presque toutes à terre, ou elles se pratiquent des trous qu'elles agrandissent avec

l'âge, et dont elles loitilient les parois intérieures avec une toile de soie , afin d'empêcher les éboulctnens. D'autrcss'établissent dans les fen!es des murs , les cavités des pierres , etc. Quelques-unes (L.

Allodrome) y font un tuyau composé d'une toile fine, long d'environ cinq centimètres , etrccouvertàl'extérieur de parcelles de terre; elles ferment ce tuyau au temps de la ponte. Toutes se tiennent près de leur demeure et y guettent leur proie sur laquelle elles s'élancent avec une rapidité étonnante. Ces Aranéides passent l'hiver clans ces trous, et, suivant Olivier, la Lycose Tarentule a soin d'en boucher exactement l'entrée pendant cette saison. Les Lycoses sortent de leurs retraites dès les premiers jours du printemps , etellescherchent bientôt à remplir le vœu de la nature en s'accouplant : suivant les espèces et suivant la température du printemps, l'accouplement a lieu depuis le mois de mai jusqu'à la mi-juillet. D'après Clerck , les deux sexes de celle qu'il nomme monticola préludent par divers petits sauts. La femelle s'élant soumise, le mâle, par le moyen d'un de ses palpes , rapproche de son corps et un peu obliquement son abdomen; puis, se plaçant par derrière et un peu de côté , se couche sur elle , applique doucement et à diverses reprises son organe générateur sur un corps proéminent (que Clerck nomme trompe) de la partie sexuelle de la femelle, en faisant jouer alternativement L'un de ses palpes , jusqu'à ce que les deux individus se séparent par un sautillement très-preste. Les Lycoses pondent des ceui's ordinairement sphéri-

LYC 567

«[lies, et variant en nombre, suivant les espèces , depuis vingt à peu près jusqu'à plus de cent quatre-vingts.

Ces œufs, à leur naissance , sont libres; mais la mère les renferme bientôt dans un sac ou cocon circulaire , globuleux ou aplati , et formé de deux calottes réunies par leurs bords.

Ce cocon ou sac à œufs est toujours attaché au derrière de la femelle par les filières, au moyen d'une petite pelole ou d'un lien de soie. La femelle porte partout avec elle toute cette postérité future , et court avec célérité malgré cette charge. Si on l'en sépare , elle entre en fureur, et ne quitte le lieu où elle a fait cette perte qu'après avoir cherché longtemps et être revenue souvent sur ses pas. Si elle a le bonheur de relrouver son cocon , elle le saisit avec ses mandibules , et prend la fuite avec précipitation.

Les œufs des Lycoses éclosent en juin et en juillet. Degée, qui a beaucoup observé les Araignées, présume que la mère aide les petits à sortir de leur œuf, en perçant la coque. Les petits restent encore quelque temps dans leur coque générale; ce n'est qu'après leur premier changement de peau qu'ils abandonnent leur demeure et montent sur le corps de leur mère où ils se cramponnent; c'est surtout sur l'abdomen et sur le dos qu'ils s'établissent de préférence, en s'y arrangeant en gros pelotons qui donnent à la mère une figure hideuse et extraordinaire. Par un temps serein et vers la mi-octobre , Lister a observé une grande quantité de jeunes Lycoses voltigeant dans l'air.

Pour se soutenir ainsi , elles faisaient sortir de leurs filières , comme par éjaculation , plusieurs fils simples ou l'orme derayous de comètes, d'un éclat extraordinaire et d'un pourpre brillant. Ces petites Araignées faisaient mouvoir , avec rapidité et en rond au-dessus de leur tête, leurs pales , de manière à rompre leurs fils, ou à les rassembler en petites pelotes d'un blanc de neige. C'est, soutenues par ce petit ballon, que les jeunes Lyco-

r>cs lyc

ses s'abandonnaient clans l'air et étaient transportées à des hauteurs considérables. Quelquefois ces lous fils aériens sont réunis eu forme de cordes embrouillées et inégales, et deviennent un filet avec lequel ces Aranéides prennent de petites Mouches et d'autres Insectes île petite taille.

Le genre Lycose renferme un assez grand nombre d'espèces; il en est surtout une qui est très-commune aux environs de iarente , et qui jouit d'une grande célébrité , parce que le peuple croit que son venin produit des accidens très-graves. Nous parlerons de ces prétendus accidens en traitant de cette espèce. Latreille divise ce genre ainsi qu'il suit :

I. Ligne antérieure des yeux pas plus large que l'intermédiaire.

■f Yeux de la seconde ligne très-sensiblement plus gros que les deux de ta ligne postérieure.

Lycose Tarentule , cosa Ta~ rentula, Latr. , Walck. ; Aranea Tarentula, Linn., Fabr., Albin. (Aran., tab. 3g). Elle est longue d'environ un pouce, entièrement noire, avec le des.-ous de son abdomen rouge et traversé dans son milieu par une bande noire. Cette Araignée , étant très-célèbre , a été figurée par une foule d'auteurs , mais si mal, qu'il semble que plusieurs d'entre eux se spient plus à exagérer ses formes hideuses afin d'inspirer plus d'horreur

{}Our elle et d'accréditer, parce moyen , es absurdités qu'ils oui débitées sur les propriétés de son venin. Il serait •trop long de mentionner ici les noms des auteurs qui ont parlé de la Tarentule, et qui l'ont figurée. Nous dirons seulement que , selon les

uns , son venin produit des symptômes qui approchent de ceux de la fièvre maligne ; selon d'autres , il ne procure que quelques taches érysipélateuses , et des crampes légères ou des fourmillements. La maladie que le vulgaire croit que la Tarentule produit par sa morsure , a reçu le nom de Tarentisme, et l'on ne peut la guérir

LYC

qui par le secours de la musique.

Quelques auteurs ont poussé l'absurdité jusqu'à indiquer les airs qu'ils croient convenir le plus aux Tarentolati : c'est ainsi qu'ils appellent les malades. Samuel Hufenreffer , professeur d'Alm , les a notés dans son Traité des Maladies de la peau. Baglivi a aussi écrit sur les Tarentules du midi de la France ; mais on est bien revenu de la frayeur qu'elle inspirait de son temps, et aujourd'hui il est bien reconnu que le venin de ces Araignées n'est dangereux que pour les Insectes dont la Tarentule fait sa nourriture. Cette espèce se trouve dans l'Italie méridionale.

Il existe dans le midi de la France une espèce de Lycose qui diffère très-peu de celle que nous venons de décrire, et qu'Olivier a confondue avec elle; c'est le *Lycosa Melanogaster* de Latreille (*JL Tarentula Narbonensis*, Walck.). Elle est un peu plus petite que la précédente, et en diffère surtout par son abdomen qui est tout noir en dessous , et dont les bords seulement sont rouges. Chabrier (Soc. Acad. de Lille, 4e cah.) a publié des observations curieuses sur cette espèce.

f-f- Les quatre yeux postérieurs presque de même grandeur.

Lycose Allodrome, L. Allodroma% Latr., Walck. (Ifisl. des Ara-
néides, fasc 1 , tab. 4 la femelle), Clerck (Aran. Suec, pl. 6, t- a).
C'est la plus grande des environs de Paris. Son corselet et son ab-
domen sont d'un rouge mélangé de gris et de noir. Les pâtes sont
marquées de rouge et de noir.

IL Ligne antérieure des yeux plus large que l'intermédiaire.

Lycose Pirate, L. F7/y7/'c<i, Walck.; Clerck (Aran. Suec, pl.
6, tab. 4 le mâle, et tab. 5 la femelle). Corselet verdâtre, bordé
d'un blanc très-vif; abdomen noirâtre , entouré de chaque côté
d'une ligne blanche avec six points blancs sur le dos. Elle paraît
avoir des rapports avec les Dolomèdes

LYC

aquatiques, et court sur la surface de l'eau sans se mouiller. F.
pour les autres espèces Walckenaer, Latreille, Olivier, Clerck ,
etc. (g.)

LYCOSTAPHYLLON. bot. fran.

(Cordus.) C'est-à-dire Raisin de Loup.

Syn. de T-iburnum Opulus , L. P~.

Viorne. (b.)

* LYCOSTOMUS. pois. C'est-à-dire Gueule de Loup. L'un des
noms de l'Anchois dans l'antiquité, (b.)

LYCTE. Lyctus. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères ; section
des Tétramères, famille des Xylophages, tribu des Trogos-
phages , établi par Fabricius et adopté par Latreille qui lui donne pour
caractères : antennes de la longueur du corselet et de la tête,

ayant la massue composée de deux articles ; mandibules saillantes; corps étroit et allongé. Ces Insectes ont été confondus avec les Ips par Olivier, et avec les Ditoma par Illerbst. Les Lyctes, tels qu'ils sont adoptés ici , diffèrent des Ditomes par les antennes qui, dans ceux-ci , sont plus courtes que la tête et le corselet , et par les mandibules qui sont cachées ou peu découvertes dans ces derniers. Ils s'éloignent des Colydies, des Trogossiles , des Merix et des Latridies , par les antennes qui , dans ces genres, ont la massue composée de trois ou quatre articles. Les Lyctes sont des Insectes de petite taille , et le genre se compose de peu d'espèces. Ces Coléoptères vivent dans le bois sec , et on les trouve sous les écorces et sous les éclats des pièces abandonnées ou travaillées. Dejean (Cal. des Col., p. 100) en mentionne quatre espèces, toutes d'Europe ; la plus commune à Paris et celle qui sert de type au genre, est :

Le Lycte canaliculé, *L. canaliculatus*, Fabr.; *Ips oblongus* , Oliv.

(Col, t. a, no 18, pl. 1, fig. 3). Cet Insecte est long d'une ligne et demie à deux lignes ; son corselet est presque aussi long que large , dentelé sur les bords et marqué au milieu d'une fosse allongée ; il est d'un brun roussâtre , pubescent ; les élytres sont

LYC 569

de la même couleur et ont chacune neuf à dix lignes élevées. (g.)

LYCURE. *Lycurus*. bot. piian.

Le professeur Kunth {In Humb. Nov.

Gen. i.p. i4i) appelle ainsi un genre nouveau de Graminées et de la Triandrie Digynie, L., auquel il donne les caractères qui suivent : les fleurs sont disposées en épi ; les épillets sont géminés , uniûores; l'un est hermaphrodite et pédicellé , l'autre mâle ou neutre , est presque sessile , de la même forme et de la même structure que le premier , mais plus petit. La lépicène se compose de deux valves oblongues, membraneuses, concaves, inégales, l'Inférieure un peu plus longue, bi ou plus rarement triade,, ayant ses divisions terminées par une arête; la supérieure acuminée et aristée , quelquefois bidentée ; l'arête naissant entre les dents. La glumeest formée de deux paillettes lancéolées , acuminées , concaves , membraneuses , presque'égales ; l'inférieure aristée , fa supérieure mutique. Les élamines sont au nombre de trois, ayant des anthères linéaires. L'ovaire est surmonté de deux styles portant chacun un stigmate en foi me île pinceau.

Le fruit est nu. Ce genre a le port du F/ilcum; mais il se rapproche beaucoup de {(Egopogon, dont il diffère par la structure de ses Ueurs.

Il se compose de deux espèces ; l'une , Lycurus Phleuides , Kunth , loc. cil. , tab. 45 , a son chaume dressé et ses arêtes li ès-longues ; elle croît dans les lieux tempérés du Mexique.

L'autre , Ljcurus V halaroides ,Kun th , loc. cit., a ses chaumes ascendans , ses aiètes de la longueur des glumes et des paillettes ; elle croît dans les lieux monlueux auprès de Valladolid daus la province de Mechoacan au Mexique. (a. r.)

LYCUS ou LYQUE. Ljcus. ins.

Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des.

Serricornes, division des Malacodermes , tribu des Lampyrides, établi par Fabricius, et ayant pour caractères : antennes très-rapprochées à leur

57c> LYC

base et très-comprimées ; tête rétrécie et prolongée en avant en forme de museau; palpes maxillaires beaucoup plus longs que les labiaux; bouche très-petite; corps étroit et allongé ; élytres ayant leur extrémité postérieure très-élargie dans plusieurs espèces exotiques, surtout dans les mâles; corps mou , étroit et allongé.

Les Lycus ressemblent beaucoup aux Omalydes , aux Lampyres et aux Téléphores ; mais ils en diffèrent essentiellement par la partie antérieure de la tête qui est en forme de trompe , tandis qu'elle est simple dans ceux-ci.

Ils ont en général le corps oblong , déprimé et la tête inclinée; leur corselet aplati et leurs élytres flexibles , quelquefois réticulées et souvent très-dilatées postérieurement. On rencontre ces Insectes sur les fleurs; ils en retirent les sucs avec leur bouclie avancée en trompe qu'ils enfoncent dans les corolles.

Les Coléoptères qui composent ce genre ont été confondus par tous les entomologistes avec' les Lampyres et les Téléphores. Fabricius les en a séparés , et leur a donné le nom de Lycus qui avait été appliqué par quelques auteurs grecs à plusieurs êtres différents. Hésychius l'a employé pour désigner une espèce d'Araignée ; Athénée l'emploie pour une espèce de Poisson ; Aristote l'applique à un Oiseau, et Homère appelle ainsi le Loup. Les Lycus forment un genre composé d'une cinquantaine d'espèces, dont le plus grand nombre appartient aux pays chauds de l'ancien et du

nouveau continent; on en trouve une espèce aux environs de Paris. Sa larve est très-noire, linéaire, trèsaplatie , avec le dernier anneau rouge en forme de plaque , ayant à son extrémité deux espèces de cornes cylindriques comme articulées et arquées en dehors; elle a six pâtes, et se trouve sous les écorces du Chêne.

C'est :

Le *Lycus sanguin* , *L. sanguineus*, Fabr., Latr. (Hist. Nat. des Crust. et des Ins. T. ix, p. 87 , pl. 75 > f- 6)"> /-y eus rufipeniis , Latr. {Gen. Crust.

LYE

et Ins. T. 1, p. 256); le Ver luisant rouge, Geoff.: Lampyre rouge velue, Uegéer(Inst. T. iv,p.47). Il est noir; les bords latéraux du corselet et les élytres sont d'un rouge sanguin; elles ne s'élargissent pas sensiblement à leur extrémité comme dans le *Lycus latissimus* de Fabr. f. pour les autres espèces Latreille, Olivier et Fabricius. (g.)

LYDA *Lyda*. ins. Genre de l'ordre des Hyménoptères établi par Fabricius, et auquel La treille a donné le nom de *Pamphilus*. ^ .cemol. (g.)

LYDIENNE, min. La Pierre de touche ou de Lydie est quelquefois nommée simplement Lydienne. C'est une variété de Cornéenne. V. ce mot.

* LYDUS. *Lydus*. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Hétéromères, famille des irachélides, tribu des Cantharidies ,

établi par Megerle et adopté par La treille. (Fajn. Nat. du Règne Anim.) Ces auteurs ne donnent pas les caractères de ce genre. L'espèce qui lui sert de type est le *My labris algincus* de Fabricius ; son *My labris trimaculatus* appartient aussi à ce genre. (g.)

* LYELLIÀ. bot. crypt. {Mousses.) Robert Brown , dans les Actes de la Société Linnéenne de Londres, a créé ce genre très-rapproché du *Dawsonia* par la forme et la structure de la capsule , mais très - différent par son péristome. Il est ainsi caractérisé :

orifice de l'urne sans dents, fermé par un épiphragme dont le centre se sépare du bord élargi , et reste attaché à la columelle qui , en se raccourcissant , le tire en dedans. L'urne est convexe d'un côté , plane de l'autre , recouverte d'une coiffe , velue au sommet, et fendue latéralement. Le péristome est horizontal et fermé par l'opercule interne ou épiphragme. Ce genre ne renferme encore qu'une espèce particulière au Thibet. Elle a le port d'un *Polytric*, et forme des touffes hantes de trois ou quatre pouces. Elle a reçu le nom spéci-

LYG

que de *crispa*. Son port la rapproche du *Polytrichum conturtum*. (a. F)

LYGÉ. Ljgeum. bot. phan. Genre de la famille des Graminées et de la Triandric Monogynie , L., offrant plusieurs particularités dans son organisation et que le professeur Richard a le premier fait connaître d'une manière précise clans les Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle de Paris (An vu, p. 28). Ce genre ne se compose que d'une seule espèce, *Lygeum Spart uni*, L., Rich., lue.

cit., t. 3. Cette Plante est vivace ; ses chaumes dressés, fermes, cylindriques, sont hauts d'un pied à un pied et demi , n'offrant généralement qu'un seul nœud, d'où part la dernière feuille; celles-ci rapprochées à la partie inférieure du chaume sont dressées et recourbées, linéaires , subulées et presque cylindriques; le sommet du chaume se termine par une enveloppe solitaire, foliacée, verdâtre , striée , longue d'environ deux pouces , amincie à sa partie supérieure , enroulée sur elle-même , laissant sortir les étamines et les stigmates par son sommet. Cette enveloppe contient deux, très-rarement trois fleurs appliquées l'une contre l'autre dans toute leur longueur, couvertes à leur base de longs poils soyeux et blancs. Chaque fleur offre une glume à deux valves inégales, l'extérieure embrassant l'intérieure, linéaire, lancéolée, très-aiguë, carénée, formant par sa base avec celle de la seconde fleur un tube ovoïde ; la valve intérieure , une fois plus longue que l'externe, est étroite, aplatie, linéaire, bifide à son sommet et roulée sur les filets staminaux et le

stilet. Le tube formé par la base de la valve externe des deux fleurs est biloculaire , la cloison étant formée par la valve interne, dont les bords tapissent la face interne du tube.

Les étamines au nombre de trois sont insérées tout-à-fait au fond du tube au-dessous de l'ovaire; leurs anthères longues de près d'un pouce sont étroites et prismatiques. L'o-

LYG b7i

vair élevé par un très-petit support qui lui est commun avec les élamines, est fusiforme , très-petit et à peine distinct du style. Celui-ci est à peu près de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple, subulé , qui se confond avec le style.

Le fruit est renfermé dans l'enveloppe :-palhiforme , qui se fend longitudinalement ; il se compose du tube de Ja glume qui a augmenté , est devenu cartilagineux , offre deux loges chacune contenant un fruit. Ce tube, formé par les glumes, a été pris pour un péricarpe biloculaire, provenant d'un ovaire infère. Le Lygé Sparte est originaire des contrées méditerranéennes de l'Europe. (a. h.)

LYGEE. Lygœus. INS. Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères , famille des Géocorisés , tribu des Longilabres , établi par Fabricius, adopté par Lalreille et tous les entomologistes , et ayant pour caractères : deux ocelles très-écartés entre eux ; antennes toujours filiformes, insérées sur les côtés de la tête dans la ligne qui va des yeux à la base ou au-dessous du bec. Tête non rétrécie postérieurement en manière de col, plus étroite que le corselet; ce dernier rétréci en avant , trapézoïde. Les Lygées ressemblent beaucoup aux Corées, avec lesquelles Fabricius a confondu quelques espèces.

Mais ces dernières Punaises s'en éloignent par la manière dont leurs antennes sont insérées. Les Néides s'en distinguent très-bien par leurs antennes coudées : les Alydes de Fabricius diffèrent des Lygées par la forme étroite et allongée du corps; les Béryles ont les antennes coudées , les Myodoques s'en distinguent par la tête qui est rétrécie en arrière , et les Saldes par leur tête qui est transversale. Les antennes des Lygées sont ordinairement filiformes, insérées à la partie inférieure des côtés de la tête et composées de quatre articles cylindriques; le bec est assez long, de quatre articles; il renferme un suçoir de quatre soies. La tête est pe->.

titej elle porle deux ocelles saillans , écartés l'un de l'autre et places enre les yeux qui sout petits. Le corps est en ovale allongé; le corselet est trapézoïdal , un peu rebordé avec les côtés extérieurs un peu arrondis. L'écusson est triangulaire , et les élytres dépassent l'abdomen et sont de la même largeur que lui. L'abdomen est composé de segmeus transversaux dans les deux sexes. Les pâtes sont simples, assez longues , avec des tarses de trois articles terminés par deux crochets et munis d'une pelote bilobée dans leur entre-deux. Le genre Lygée se compose d'un assez grand nombre d'espèces ; parmi celles des environs de Paris, nous citerons :

La Lygée Croix de Chevalier, L. equestris , Eabr.; L. Cime.v eqtt esiris, Linu. Longue de cinq ligues, rouge, à taches noires avec bipartie membraneuse des élytres brune tachetée de blanc. On trouve une autre espèce qui est très-commune et qui a été nommée L. apte rus , parce que, ordinairement, elle est sans ailes; très-rarement elle est munie de ces organes. (g.)

LYGEUM. bot. phan. V. Lige.

LYGINIA. bot. phan. (R. Brown.) Syn. du Schoenodorum de Labillardière. V. ce mot. (b.)

LYGISTE. Lygistum. bot. phan.

Ce genre de la famille des Rubiacées et de la Tétrandrie Mouogynic, L., fut établi par P. Browne {Pl. Jam.

i4a, t. 5, f. 2) et adopté par Swartzet Lamarck. Linné l'avait cependant réuni au Petesia duquel il diffère surtout par son fruit capsul'aire. Jussieu l'a rapporté au genre Nacibea d'Aublet, qui a encore pour synonyme le Manetia de Mutis et Linné. Indépen-

damment du *Lygistum axillare* sur lequel le genre a été établi , Lamarck (Illustr., p. a86) a décrit une autre espèce qu'il a nommée *Lygistum spicatum*, et qui , selon Kunlb, doit être placée parmi les *Coccocypsilum*. F. Nacibée et *Coccocypsilum*.

LYGODIE. *Lygodium*. -rot. crypt.

LYG

{Fougères.) Le genre établi sous ce nom par Swartz dans son Synopsis Filicum , et à peu près à la même époque par Willdenow sous celui à' *Hydroglossum* , avait d'abord été confondu par Linné avec les *Ophioglosses* , dont il diffère cependant par une infinité de caractères, et depuis il l'ut distingué presque'en même temps par plusieurs naturalistes. Ainsi Swartz le nomme *Lygodium* , Willdenow *Hydroglossum* , Cavanilles *Ugena*, Mirbel *Ramordia* ; Richard , dans la Flore de Michaux, désigna une de ses espèces sous le nom de *Cteisium* , et bernhardi en forma ses genres *Odontapieris* et *Gisopteris*. Le nom de *Lygodium* éiant un des plus anciens, et ayant été établi dans un travail général sur la famille des Fougères , a été adopté par presque tous les botanistes. Les Plantes de ce genre sont toutes grimpantes , et elles diffèrent en cela de presque toutes les Fougères , car elles ne rampent pas sur les troncs des Arbres à la manière de certains *Polypodes* et de plusieurs autres Fougères, mais elles ont leur racine en terre, et leur tige, réellement grimpante, s'entortille autour des Arbrisseaux et des Graminées. Les feuilles sont alternes , mais se bifurquent près de la base, de manière à paraître opposées au premier aspect; elles sont deux ou trois fois pinnées , à pinuules souvent cordiformes et pétiolées. Une espèce de l'Amérique septentrionale , le *Lygodium palmatum*, a les feuilles simples et seulement divisées en plusieurs lobes; c'est elle qui a

servi de type aux genres *Rarnondia* , *Cteisium* et *Cistopteris*. Dans les frondes fertiles le limbe de la feuille disparaît en grande partie, tandis que la plupart des nervures se prolongent en autant d'axes saillans qui portent sur leurs côtés une double rangée d'écaillés alternes, distiques, à l'aisselle de chacune de quelles se trouve une capsule. Ces capsules sont analogues à celles des *Sc/iizea*, des *Anémia*, etc. Elles sont ovoïdes et pourvues à leur sommet d'un large anneau élastique

LYM

en forme île calotte à stries rayonnantes. Toutes les espèces de ce genre, à l'exception de deux, croissent entre les tropiques; elles sont particulièrement très-abondantes dans les Moluques où elles couvrent quelquefois de grands espaces en s'enlaçant aux chaumes des Graminées; les deux espèces qui supportent un climat plus vigoureux sont : le *Lygodiurn palmatum* qui croît jusqu'en Pensylvanie, et le *Lygodium japonicum* qui habite la Chine et le Japon.

(ad. ji.)

LYGOTII1LES ou TÉNÉBRICO- LES. ins. Famille de l'ordre des Coléoptères, établie par Uuméril, et correspondant à la tribu des Ténébrionides de Latreille. V. Ténébrionites.

LYGOS. bot. ni an. Sous ce nom, appliqué autrefois par Dioscoride à la Plante que Linné a nommée *V itex* .*Ignus-castus* , Mentzel et Adanson ont proposé un genre établi sur le *Sjpaflium Junceum* , L. V. Genêt.

LYMEXYLON. *Lymexylon*. ins.

Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pen ta mères , famille des Scrricornes Malacodermes , tribu des Lime-Bois, établi par Fabricius aux dépens des Cantharis et des Melues de Linné, et ayant pour caractères :

palpes maxillaires beaucoup plus grands que les labiaux , pendans, très-divisés , et comme en peigne ou eu forme de houppe dans les mâles; mandibules courtes , épaisses; antennes simples, filiformes ou en fuseau, les articles du milieu étant un peu plus grands ; tous les articles des tarsi entiers ; corps cylindrique , long, avec la tête presque globuleuse, inclinée , distinguée du corselet par une espèce d'étranglement ou un cou.

Les Lymexylons se distinguent des Cupes et des Rhysodes, par les palpes, qui dans ceux-ci sont peu saillans, semblables dans les lieux sexes et à articles simples; ils diffèrent den Hylccoetes par leurs antennes qui ne sont pas en scie comme dans cis derniers, et des Alractocères, parce que

LYM 573

ceux-ci ont les élytres tronquées et courtes comme les Staphylins. Les larves des Lymexylons causent un grand dommage aux Chênes et aux bois de construction de la marine ; elles vivent dans l'intérieur du bois, le percent el le sillonnent dans tous les sens. L'espèce de ce genre la plus connue et la plus nuisible est :

Le Lymexylon naval, L. navale, Fabr., la femelle; L. flavipes , Fabr., le mâle. Il est d'un fauve pâle, avec la tête , le bord extérieur et l'extrémité des étuis noirs ; celte dernière couleur domine dans le mâle.

Cette espèce se trouve dans toute l'Europe sur le Chêne. (c.)

LYMNANTHEMUM. bot. piian.

Pour Limnanthus. r. ce mot. (b.)

LYMN'.EA. ■ ■!... Pour Liinincea.

C'est à touque plusieurs auteurs ont écrit ce mot avec un Y, et il en est peu sur l'orthographe duquel on ait plus varié; voici les exemples qu'en rapporte Baslerot dans son intéressant Mémoire sur les Fossiles du sudouest de la Erance, inséré parmi ceux de la Société d'Histoire Naturelle de Paris : Lymnœa, Lamarck, Deshayes; Lu/meus , Sosverby , Brongniart ; Lymniieus, Draparuaud, Brongniart , Défiance ; Lymneaj Sowerby , Blaiuville; Lymnœus, Cuvier , Bowdich ; Lymnœus, iMoutl'ort ; Limnœa , Desmarcest , Férussac. C'est cette dernière manière, qui est la plus convenable. (D..H.)

LYMNE. pots. Espèce du genre Raie. K. ce mot. (b.)

* LYMNIAS. ini-.? polyp.? Le genre, formé sous ce nom par Oken qui se borne à lui assigner pour caiactères : corps pourvu de deux rames et contenu dans une loge opaque et mince , paraît appartenir aux Rotifercs. Le savant professeur d'Iéna n'en cite qu'une espèce qu'on trouve parmi le Cératophylles. ' (u.)

LYMNOEUS. moll. (Monlfort.)

Pour L'unnœa. V. Lymnjea. (b.)

LYMNOKEE. Lymnumi. ACAL.

M LVM

Genre do Médusaires établi par Péron et Lesueur dans leur division des Méduses agastriques pédonculées et tentaculées. Ils lui

donnent pour caractères : des bras bifides, groupés à la base du pédoncule et garnis de suçoirs nombreux en forme de petites vrilles. Ce genre n'a point été adopté. 1 Cuvier le réunit aux Rhizoslomes , et Lamarck aux Dianées. V. ces mots.

* LY MNORÉE . Lymnorea . polyp .

Genre de l'ordre des Actinaires dans la division des Polypiers sarcoïdes.

Caractères : polypier fossile , en masse irrégulière , subglobée ou presque globuleuse, adhérent par sa base, présentant en dessous une sorte de tégument membraniforme, peu épais, irrégulièrement plissé en travers et ondulé; dans son intérieur un lissu spongieux , grossier, très-serré et finement lacuneux; à sa surface supérieure de gros mamelons de même tissu que l'intérieur, plus ou moins nombreux et saillans , percés à leur sommet d'un oscille peu profond, arrondi ou fendu en étoile. L'espèce unique qui constitue ce genre n'est pas très-rare dans certaines localités du Calcaire à Polypiers des environs de Caen ; elle est entièrement calcaire , mais non changée en Spath; sa grandeur est peu considérable (de cinq ou six lignes à un pouce et demi). Sa forme varie considérablement ; il n'y a peut-être pas deux individus semblables; tantôt elle se présente en masse presque globuleuse , le tégument inférieur est alors peu étendu; tantôt elle est presque digitée et le tégument la recouvre jusque près des mamelons ; on trouve entre ces deux extrêmes tous les intermédiaires. L'espèce d'enveloppe extérieure ou tégument membraniforme est, comme tout le reste, entièrement calcaire, très-peu épais-, sans aucunes porosités, irrégulièrement plissé en travers; il embrasse intimement le tissu spongieux intérieur ; sur quelques échantillons il

semble s'interrompre , puis reparaître par zones; on voit dans ces espaces

LYM

le tissu intérieur à nu. On peut se faire une idée de celui-ci en le comparant à la substance spongieuse des os , mais il est beaucoup plus serré , les vacuoles sont plus petites , les fibrilles et lamelles courtes et presque conduentes; en dessus cette structure lui donne un aspect poreux ; mais en l'examinant attentivement, on s'aperçoit que ces porosités n'ont rien de régulier. La forme extrêmement variable des Lymnorées et la présence d'une sorte de membrane extérieure avaient porté Lamouroux à croire que ces Polypiers étaient mollasses , charnus et contractiles ; aussi les a-t-il rangés dans l'ordre des Polypiers Aclinaires. Cette opinion nous semble peu soutenable; il faudrait d'autres preuves pour faire admettre la pétrification calcaire de corps tout-à-fait charnus; il faudrait que ces Animaux eussent été saisis, englobés , pénétrés instantanément par la gangue qui les entoure; on les trouverait en place sur les corps où ils étaient attachés ; tandis qu'ils sont toujours confusément mêlés avec des Polypiers ou autres corps marins plus ou moins cassés par le déplacement. Ils sont quelquefois couverts de Serpules , de plaques de Polypiers encroûtans de la famille des Escharres, de petites Coquilles et spécialement de l' *Ostrea terebratuloides* , DeFr. Lamouroux pensait que cette sorte de tégument membraniforme que l'on remarque à la surface des Lymnorées était analogue à l'enveloppe extérieure des Actinies et propre à remplir les mêmes usages. Un examen attentif des Lymnorées détruit bientôt cette supposition. D'ailleurs on peut également remarquer que la surface inférieure de quelques Polypiers lamellifères vivans ou fossiles présente une

apparence de membrane calcaire plissée transversalement; nous avons vu cette disposition sur des Aslrées qui avaient produit des expansions latérales ; la surface inférieure de ces expansions offrait , d'une manière très manifeste , cet aspect membraneux dont nous parlons? Quant à la forme

LYM

excessivement variée des Lymnorées que Lamouroux attribuait aux divers états où se trouvaient ces Polypiers lorsqu'ils avaient été saisis, ou peut objecter qu'un grand nombre de Polypiers pierreux actuellement vivans dans les mers offrent cette particularité. La plupart des Polypiers fossiles des environs de Cnen , bien reconnus par Lamouroux lui-même pour avoir été de nature pieireuse, sont dans ce cas. Plusieurs Millépores de cette localité se présentent sous des aspects tellement diversifiés et bizarres, que l'on ne pourrait croire qu'ils appartiennent aux mêmes espèces , si l'on ne trouvait tous les intermédiaires entre les formes les plus opposées. Si les remarques que nous soumettons sur ce genre sont fondées, les Lymnorées ne doivent point rester parmi les Polypiers Actinaires ; mais à moins de les rapprocher des Milléporées avec lesquelles elles n'ont toutefois que fort peu d'analogie , nous ne connaissons point de Polypiers avec lesquels on puisse les réunir. A la vérité, en comparant attentivement les Lymnorées avec les corps pétrifiés que Lamouroux a décrits et figurés comme des Eponges dans son *Génère Pulyparium* , on trouve entre eux les plus grands rapports de structure; mais les Eponges pétrifiées n'ont point l'enveloppe membraneuse plissée des premières , et si celles-là ont de la ressemblance avec quelques Eponges vivantes, les Lymnorées ne paraissent plus se

rapporter à celles-ci. L'espèce rapportée à ce genre a été nommée *Lym. mamillosa*.

LYMPHE, zool. chim. Liquide diaphane, incolore ou très-légèrement coloré en rose, un peu visqueux, essentiellement albumineux, d'une saveur un peu salée, contenu dans un système particulier d'organes nommés V ; vaisseaux lymphatiques. V- les mots Vaisseaux, Gikcuation et Sécrétion. Examinée au microscope, la Lymphé offre les mêmes globules que ceux qui composent le sang ; ils sont seulement un peu plus petits et non

LYtf G 7 5

revêtus d'une enveloppe colorante.

Ce fluide, abandonné à lui-même, se comporte d'une manière analogue au sang; il se partage en deux parties :

l'une est du sérum, et l'autre un caillot formé de filaments rougâtres , ressemblant à des arborisations vasculaires. Cependant la chaleur et les Acides ne coagulent pas ce fluide, et il ne verdit le sirop de violette que lorsqu'il est concentré, firandc et Chevreul ont fait l'analyse de la Lymphé du Chien1- Le premier de ces chimistes ia regardait comme de l'eau tenant en dissolution un peu d'Albumine , du chlorure de Sodium avec des traces de Soude. Chevreul l'a trouvée composée, sur 1000 parties, de : Eau, 926, 4; Fibrine, 004, 2; Albumine, 071, 0 ; caibonate de Soude, 001, 8; chlorure de Sodium, 006, 1 ; phosphates de Chaux et de Magnésie, et carbonate de Chaux, 000, 5.

A l'égard de ce qu'on a nommé improprement LYMriE dans les Végétaux , V. SÈVE. (G.-N.)

LYNCEE. Lynteué. daûsr. Genre de l'ordre des Lophyropodes , famille des Ostracodes de Latreille (Fam.

Nat. du Piègn. Anim.), établi par Millier, et ayant pour caractères: deux yeux distincts ; des antennes simples, velues ou en pinceau; huit pâtes. Ce genre, qui est intermédiaire entre les Cypris et les Daphnia, puisqu'il a la tête des uns et la queue des autres, s'éloigne des premiers par les antennes qui sont au nombre de quatre dans ceux-ci et par les pieds, et des seconds par l'œil qui est unique. Le corps des Lyncées est airoondi , comprimé, renfermé ainsi que celui des Daphnies dans un test plié en deux, imitant les deux battans d'une coquille bivalve dont le centre , qui forme une ligne saillante sur le dos , représente la charnière. La tête est plus ou moins séparée du corps par une échancrature du test en dessous. Les ■ yeux sont placés au-devant l'un de l'autre, et non dans une ligne transverse au corps de l'Animal ; il y a

M LYN

quatre antennes insérées au-dessous de la tête, toutes inégales et garnies de longs poils sur leur côté inférieur, qui servent plus directement à l'action natatoire que dans les Cypris. Les pâtes sont difficiles à compter; elles sont au nombre de huit ou dix, terminées par des soies et accompagnées à leur base d'écaillés • barbes ou branchiales. La queue est petite , pointue, ordinairement repliée sous le ventre et enfermée dans le test. Les œufs sont apparents sous celui-ci, dans la région du dos , tantôt seuls , tantôt au nombre de deux par ponte ; c'est au printemps qu'on les aperçoit comme des points noirs à travers le test. Les Lyncées

sont les plus petits de tous les Entomostracés ; ils habitent les eaux dormantes où. croissent les Plantes aquatiques. Ces Crustacés ne sont point rares aux enviions de Paris; cependant on ne les y rencontre pas aussi souvent que les Cypris et les Daphnies. Ce genre u'est pas très-nombreux en espèces ; on en compte huit ou neuf; la principale est :

Le Lyncée a queue courte, *L. brachyurus* , Lalr. (Hist. Nat. des Crust. et des Ins. T. iv , p. 204 , pl. 3-2 , fig. 1 à 12; ; Miiller (Entom. T. vin, fig. là 11); *Monoculus brachyurus*, Müll. Antennes au nombre de quatre; test globuleux, transparent comme de la corne ; queue courte , composée de deux filets réunis à leur base. V. , pour les autres espèces, Latreille, Jurine , Miiller, Desmarest , etc. (G.) 1

* LYNCURIDS. mole. ross. Syn.

de Bélemnile. K. ce mot. (b.)

LYNCURIOS. min. Théophraste et Pline ont ainsi nommé une Pierre, sur laquelle les érudits ont beaucoup disserté sans résoudre la question d'une manièresatisfaisanle. Au temps de Pline, on attribuait sa formation à l'urine pétrifiée du Lynx; et cette opinion ridicule a été répétée jusque dans les temps modernes. Cependant ;'» mesure que la minéralogie eut fait quelques piogrès, les idées sur cette

LYN

Pierre devinrent moins invraisemblables. On a successivement cru que les anciens avaient voulu désigner sous le nom de. Lyn-

curius , une Cornaline brune , une variété de Succin , le rcon Hyacinthe , et enfin une Topaze roussâtre. (g..n.)

* LYNGBYA. bot. crypt. (Arthrodiées.) Le genre formé sous ce nom par Agardh, sous le n° 67, dans son Syllèma Algarum, ne paraît) ait différer des Osciflaires que parce qu'on n'y retrouverait pas la mucosité dans laquelle se lissent les filamens vivons de ces Psychodiaires , et que les filamens des Ly //^jaseraiient inertes.

Nous ne croyons pas à la validité de ce genre, où l'auteur rapporte sous le nom de iLyngby aferrûgfnea , l'Oscillatoria æstuarii de Lyngbye, pl.

26 , e, que nous pouvons affirmer être un véritable Oscillaire. F. ce mot et Colothrix au Supplément. (b.)

* LYNGBYELLE. Lyngbyella.

bot. crypt. (Cofi/è/vées.) Nous avons proposé l'établissement de ce genre aux dépens du Sphacelaria de Lyngbye , pour répartir les espèces où les faciès de matière colorante , disposées oïdinai-reinent deux à deux, ou jusqu'à quatre dans chaque article , y sont dans le sens longitudinal de l'article , au lieu qu'il n'y a qu'une zone faciale et transverse dans les véritables Sphacel-laires. Nous citerons comme exemples de ce genre: les Sphacela-ria disticha et scuparia, Lyngb., p. 40, pl. Si, qui en sont les types. Ce sont des Plantes très-communes de nos mers où elles croissent de toutes parts , et qu'on trouve souvent jetées au ri-vage. Ln fructification, interne comme dans le reste des Confer-vées , y est située à l'extrémité des derniers rameaux qui se renflent en massue au temps de la propagation, et dans la trans-parence desquelles se distinguent une ou plusieurs gemmules.

LYNX. m.v.m. Espèce de Chat qui donne son nom à un sous-genre dont il est le type. On a aussi appelé le Caracal , Lynx de Barbaïue. (b.)

LYO

LYONIA. bot. phan. Genre de la famille des Ericinées, et de la Décandrie Monogynie, L., établi par Nuttall (Gêner, of Nort/i Amer. Plant.

T. I, p. 266), qui l'a ainsi caractérisé : calice à cinq dents; corolle presque globuleuse et pubescente; capsule à cinq loges et à cinq valves seplifères sur leur milieu, ayant leuis bords formés par cinq autres valves accessoires et externes; graines nombreuses , subulées , imbriquées longitudinaleinent. Ce genre est formé aux dépens des Andromeda de Willdenow , dont il ne doit probablement former qu'une section. Nuttall en décrit quatre espèces indigènes des Etals-Dnis , savoir : *Lyonia ferruginea*, *rigUa*, *paniculata* et *frondusa*.

Le genre *Lyonia* de llafinesque est le même que le *Po/ygonel/a* de Michaux, ce mot. (o..N.)

LYONSIE. Lyonsia. bot. phan. R.

Brown (Wern. Traits. , 1 , p. 66) appelle ainsi un genre nouveau de la famille des Apocinées, auquel il attribue pour caractères : une corolle monopétale, infundibuliforme , dépourvue d'écaillés à l'orifice de son lube, et ayant son limbe partagé en cinq divisions égales et recourbées , à prélloraison valvairc. Les étamines sont saillantes ; les filets insérés au milieu du tube sont filiformes, et les anthères sagittées, adhérentes à la partie moyenne du stigmate. L'ovaire est à deux loges. Le style est fili-

forme, dilaté dans sa partie supérieure qui se termine par un stigmate presque conique. Les lobes du disque hypogyne sont cohérens entre eux.

Le fruit est une capsule cylindrique, biloculaire, à deux valves roulées sur elles-mêmes et ressemblant chacune à un follicule ; la cloison est parallèle aux valves, libre et portant les graines sur chacun de ses bords. Ce genre , très-voisin du *Parsonia*, dont il diffère seulement par la structure de sa capsule , se compose d'une seule espèce , *Lyonsia straminea* , R. Br. , /oc. cit. C'est un Arbuste sarmenteux, originaire de la Nouvelle-Hollande ,

LYR 577

dont les feuilles sont opposées, les fleurs disposées en cymes terminales et trichotomes. (a. r.)

PÉRANT H E. *Lycranthus*.

bot. pu an. Genre de la famille des Orchidées et de la Gynandrie Monandric, L. , établi par R. Brown {Prodr. F/or. Nou.-Hol/, 1, p.

5a5) et qui offre un calice en gueule, ayant la foliole supérieure et externe creusée en forme de four, tandis que les autres sont planes et égales entre elles. Le labelle est court, concave , ayant ses bords redressés , rétréci vers son sommet. Le gynostème est grêle et linéaire , terminé par une anthère persistante dont les deux loges sont rapprochées; chaque loge contient deux masses polliniques pulvérulentes. Ce genre est composé de trois espèces originaires de la Nouvelle-Hollande. Ce sont des Plantes herbacées, non parasites, glabres, dont les bulbes sont simples; la tige porte une seule feuille vers sa base et deux écailles. Les fleurs ,

d'un brun noir, forment un épi terminal. Ce genre a des rapports avec le *Ca/adenia* et les *Corysanthes*. (a.r.)

LYQUE. ins. (Cuvier et Duméril.) V. *Lycus*.

LYRE. ois. V. *Mentjre*.

LYRE, pois. . Espèce des genres *Trigle* et *Callionyme*. V. ces mots, (b.)

LYRE DE DAVID, moll. Espèce du genre *Harpe*. (b.)

LYRÉE (feuille.) bot. piian. On nomme ainsi; , dans le langage descriptif, la feuille dont les lobes du haut sont grands et réunis , tandis que ceux du bas sont petits et divisés jusqu'à la nervure médiane. Telles sont les feuilles de plusieurs *Brassica* et d'autres Crucifères siliculeuses , des *Geum* , etc. (G..N.)

LYROPE. Lyrops. ins. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons , famille des Fouisseurs , tribu des Larrates >!cLalreille (Fam. Nat. du Règn Anim.), établi par Illiger, et nommé *Trachytes* par Panzer. Ces Insectes ressemblent aux

TOME IX

r)7s LYS

Larres avec lesquels Lalreille les avait réunis , et n'en diffèrent que par leurs mandibules qui ont au côté interne une saillie en forme de dent , par l'abdomen qui est proportionnellement plus

court et par la lâugùett'e qui a de chaque cote une peti'.c division , ce qui la rend distinctement trifide.

Ces Insectes se distinguent des Miscophcs et des Dinèles, parce qu'ils ont trois cellules cubitales fermées /'tandis que ces derniers genres n'en ont que deux. Le type de ce genre est :

Le Lyrope étrusque , L. elruscus, Illig. ; Larra et ruse us de Jurinc (Flym., pl. 9, genre 9); Trachytes irico/or, Panzer {Tauu. Ins. Genn. , fasc. 84 , t. 19); Liris au rata , Fabr. Cette espèce se trouve en Allemagne et en Italie. (g.)

LYS. bot. niAN. Pour Lis. K. ce mot. (b.)

LYSANTIIE. bot. pijan. Ce genre, proposé par Knight et Salisbury pour quelques espèces de Grevillea , n'a point été adopté. V. GRÉviULiiE.

LYSIANTHUS. bot vhan. Pour Lisianthus. V . ce mot. (g..n.)

* LYSIDICE. Lysidice. annel.

Genre de l'ordre des Néréidée^, famille des Eunices , fondé par Savigny (Sysl. des Annelides, p. 10 et 5a) qui lui assigne pour caractères disrr tinctifs : trompe armée de sept mâchoires , trois du côté droit , quatre du côté gauche ; les deux mâchoires intérieures et inférieures très simples ; antennes découvertes , les extérieures nulles; les mitoyennes très courtes ; l'impaire de même; branchies indistinctes; front arrondi.

Le genre Lysidice , institué aux dépens de celui des Néréides de Linné, offre plusieurs points de ressemblance avec les Léo-dices et les Aglaures. 11 diffère des premières par la petitesse des

antennes et par les branchies indistinctes, et il s'éloigne essentiellement des secondes par un plus grand nombre de mâchoires.

L'examen plus attentif de leur organisation extérieure montre des caractères

LYS

assez nombreux et plus ou moins faciles à saisir. Leur corps est linéaire, cylindrique, composé de segmens courts et nombreux : le premier segment n'est point rétréci ni saillant sur la tête, le second segment est égal au troisième. La tête est plus large que longue, libre, simplement arrondie par-devant, et entièrement découverte ainsi que les antennes. La bouche offre une trompe dépassant le front à son orifice, et cette trompe est munie de sept mâchoires disposées comme celles du genre *Léodice* (V. ce mot) avec une lèvre inférieure beaucoup plus large que la première paire de mâchoires.

Les yeux sont grands et situés à la base extérieure des antennes mitoyennes. Les antennes moins longues que la tête sont incomplètes, c'est à-dire que les antérieures sont nulles; les mitoyennes sont courtes, ovales ou coniques, et ne paraissent point sensiblement articulées; l'impaire est semblable aux mitoyennes, mais plus longue; les pieds ne paraissent pas convertis en cirres longs et tabulantes, seulement la dernière paire est changée en deux filets; les pieds sont tous ambulatoires, très-courts, à deux faisceaux inégaux de soies simplement pointues ou terminées par un petit appendice mobile; les cirres supérieurs sont subulés et les inférieurs très-courts. On ne distingue point de branchies.

Savigny décrit trois espèces qui sont nouvelles et dont il ne donne pas la figure. .

La Lysidice Vaentine, Lys.

Valentina , Savig. Corps long de près de deux pouces , grêle , formé de quatre-vingt-dix-neuf segmens dans un individu incomplet; le premier segment à peine plus long que ^e second; antennes subulées; tête à yeux noirs, sans autres taches ; pieds à deux faisceaux desoies jaunâtres; le faisceau supérieur, plus mince et plus long, se compose de soies trèsfines , l'inférieur de soies plus grosses, terminées par un appendice; acicules jaunes; cirres supérieurs su-

LYS

bulés et aisez saillans; cirres inférieurs fort courts. Couleurs et reflets de la nacre. Des côte» de la Méditerranée.

La Lysidice olympienne , Lys.

olympia, Savig. Corps long de quatorze lignes , composé de cinquante-cinq segmens, sans compter une douzaine de petits anneaux qui forment au bout du corps une queue conique , ciliée de deux rangs de pieds imperceptibles , et terminée par deux fdels courts; premier segment à peine plus long que le suivant ; yeux noirs j antennes subulés ; un petit mamelon conique derrière l'antenne impaire , sortant de la jonction de la tête avec le premier segment du corps ; pieds de l'espèce précédente , à deux acicules très-noirs ; couleur gris-blanc,, avec les retlets de la nacre , sans taches. Des côtes de l'Océan sur les Huîtres.

La Lysidice Galathine , Lys. Galathinq , Savig. Cette espèce pourrait bien être, suivant Savigny , une variété de la précédente.

Corps plus épais; antennes très-courtes , ovales , avec un large mamelon derrière l'antenne impaire; couleur d'un blanc laiteux ; les trois premiers stigmates d'un roux doré en dessus ; les yeux comme noyés chacun dans une tache ferrugineuse; acicules très-noirs. Des côtes de l'Océan. (aud.)

* LYSIGONIUM. bot. crypt.

(Link.)Syn. de Gaillonelle? V. ce mot. (b.)

LYSIMACHIA. bot. phan. J'.Ly-

SIMAQUE.

LYSIMACHIÉES. bot. phan. Cette famille naturelle de Plantes est plus généralement désignée aujourd'hui sous le nom de Primulacées. f.

ce mot. (a. r.)

LYSIMACHIE. bot. phan. Pour Lysimaque. ce mot. (b.)

LYSIMAQUE. Lysimachia. bot.

phan. Genre de Plantes de la famille des Primulacées et de la Pentandrie Monogynie, L. , composé d'un assez

LYS 579

grand nombre d'espèces qui croissent pour la plupart dans les lieux humides de la France et de l'Europe. Les Lysimaques sont des Plantes herbacées, généralement vivaces, à feuilles opposées ou verticillées , à Heurs très-souvent jaunes, axillaires à l'aisselle des feuilles ou réunies en grappes ou en thyrses au sommet des rameaux. Leur calice est à cinq divisions très-profondes ; la co-

rolle monopétale subcampaniformu ou rotacée , c'est-à-dire ayant cinq divisions extrêmement profondes ; le»

étamines, au nombre de cinq, sont très-souvent monadclpbes par leur base; les anthères sont subcordiformes, à deux loges inl-rorses; l'ovaire est libre, globuleux, appliqué sur un disque hypogyne, annulaire et très-peu saillant; il offre une seule loge contenant un grand nombre d'ovules attachés à un Irophosperme central. Le style est long, cylindrique, terminé par un stigmatte tronqué, très-petit, simple et à peine distinct du sommet du style. Le fruit est une capsule généralement globuleuse, apiculée à son sommet, recouverte en partie par le calice qui est persistant, à une seule loge qui renferme un nombre considérable de graines polyèdres attachées à un trophosperme central. Ces graines contiennent, dans l'intérieur d'un endosperme blanc et charnu, un embryon cylindrique placé en travers du bile. Les espèces de ce genre peuvent être divisées en deux groupes suivant que leurs Heurs sont solitaires ou réunies plusieurs ensemble.

f Fleurs solitaires.

Lysimaque Nummulaire , *Lysimachia Nummularia* , L. , Fl. Dan., tab. 485. Cette espèce est extrêmement commune dans les bois et les prés humides; ses tige» sont étalées , rampantes , portant des feuilles opposées , ovales , arrondies , obtuses , courtement pétiolées ; ses fleurs sont assez grandes , jaunes, axillaires, pédonculées et solitaires; ses étamines sont monadclpbes tout-à-fait par la

5So LYS

base de leurs (ilets. La Nummulaire fleurit pendant presque tout l'été.

Lysimaque ponctuée , *Lysimachia punctata* , L. , Jacq., Flor.

Austr. , lab. 366. Cette espèce , qui croît le long des marcs, dans le nord de l'Europe, a sa tige dressée, pubescente , ramuse, haute d'environ deux pieds ; ses feuilles , verticillées par trois, sont lancéolées et inarquées de petits points noirs à leur face inférieure. Ses Heurs grandes et jaunes , quelquefois maculées, sont solitaires et axillaires. Elle fleurit en juin et juillet. On la cultive quelquefois dans les jardins. Il lui faut une terre bumide.

Lysimaque des bois , *Lysimachia nemorum*, L. , Fl. Dan., lab. 174.

Cette espèce' est le *Lerouxia nemorini* , Merat, Fl. Par. Elle est assez commune dans les bois montueux et humides; ses tiges sont grêles, étalées; ses feuilles opposées, ovales, aiguës, entières; ses fleurs petites, jaunes , portées sur des pédoncules grêles, plus longs que les feuilles.

Elle fleurit en avril et mai.

ff Fleurs lées.

Lysimaque commune , *Lysimachia vulgaris* , L. , Bull. Herb. , tab. 347. Cette Lysimaque , très-commune sur le bord des étangs et des ruisseaux , porte un grand nombre de noms vulgaires. Ainsi on la désigne sous ceux de Corneille , Chasse-Bosse, Souci d'eau, etc. Elle est vivace. Sa tige dressée s'élève à une hauteur de deux à trois pieds et porte des feuilles opposées ou verticillées par trois ou quatre; elles sont lancéolées, aiguës , presque sessiles. Ses fleurs jaunes sont pédonculées , réunies plusieurs ensemble à l'aisselle des feuilles supérieures où leur réunion forme

une panicule terminale; elles s'épanouissent en juin et juillet. Cette espèce passe pour vulnérable, mais néanmoins on en fait peu usage.

Lysimaque verticillée, *Lysimachia verticillata* , Pall. Cette espèce est fort voisine de la précédente.

Elle est généralement plus grande;

LYS

ses feuilles sont constamment verticillées, portées sur de courts pétioles; ses fleurs , plus nombreuses que dans la Lysimaque vulgaire, offrent la même disposition. Elle est originaire du Caucase; on la cultive assez fréquemment dans les parterres.

Lysimaque Tuysiflore , *Lysimachia Tkyrsiflora* , L. , Fl. Dan. , tab. 517. Espèce vivace croissant sur le bord des eaux et offrant une tige dressée, simple , haute au plus d'un pied , garnie de feuilles opposées , sessiles, lancéolées, aiguës et velues.

Les fleurs sont petites , jaunes, disposées en épis oblongs, pédonculés , placés à l'aisselle des feuilles supérieures.

Lysimaque a feuilles de Saule, *Lysimachia Ephemerum* , L. Cette belle espèce croît dans les Pyrénées et en Espagne; ses tiges, hautes de deux à trois pieds , sont dressées , glabres , portant des feuilles opposées, sessiles , oblongues, lancéolées , glabres et glauques. Les fleurs sont blanches , formant un long épi terminal. Cette espèce, que l'on cultive fréquemment dans les jardins, demande une terre franche, légère et humide ; on la multiplie d'éclats séparés des racines ou de graines semées sur couches. (a. r.)

LYSIINEMA. rot. phan. C'est un genre établi par Lloberth Biowu dans la famille des Épacridées , et auquel il donne pour caractères : un calice coloré , entouré d'un grand nombre de bractées également colorées; une corolle monopétale, hypocratériforme, dont le tube se divise quelquefois en cinq parties, et dont le limbe est formé de cinq lobes sans plis et réfléchis; des étamines hypogynes, ayant les anthères attachées au-dessus de leur partie moyenne et peltées; cinq écailles hypogynes, et pour fruit une capsule dont les trophospermes sont attachés à l'axe central.

Les espèces qui composent ce genre ont absolument le port des Epacris. Outre *YEjmens pungens* , Cav. ,

LYS

Je. 4, p. 26 , tab. 546 , que Browu place dans ce genre , il en décrit quatre autres espèces qu'il nomme *Lysinema pentapetalum* , *L. cilialum* , *L. lasianthum* et *L. conspicuum*. (a. n.)

* LYSIPOMIE. *Lysipomia*. bot.

fian. Genre nouveau de la famille des Lobéliacées , établi par Kunth {in Humb. Nov. Gêner., 5, p. 5 18) et qui comprend quatre espèces originaires de l'Amérique méridionale , croissant dans les montagnes élevées ou elles forment de petites touffes arrondies. Elles sont quelquefois dépourvues de tiges ; leurs feuilles sont alternes, linéaires ou spatulées, très-coriacées , roides ou charnues. Leurs fleurs sont blanches, axillaires et solitaires. Le calice est adhérent , avec l'ovaire infère ; son limbe est à cinq lobes inégaux; sa corolle est tubuleuse, caduque, à cinq divisions inégales , disposées comme en deux lèvres. Les étamines , au nombre de cinq, sont réunies et soudées comme dans le genre Lobélie ; le stigmate est bilobé ; le fruit est une capsule uniloculaire , polysperme

, s'ouvrant par son sommet au moyen d'un opercule. Les graines sont nombreuses et attachées à un trophosperme pariétal et longitudinal. Ce genre , très-voisin du Lobelia , en diffère suffisamment par sa capsule uniloculaire s'ouvrant par un opercule. Les quatre espèces qui composent ce genre ont été décrites et figurées par Kunth {loc.

cit.) sous les noms de Lysipomia montioides, Kunth {loc. cit.}, lab.

266, fig. 2; Lys. reniformis , tab.

267, fig. 1 ; Lys. acatilis, tab. 267, fig. 2. (a. a.)

* LYSISPORTUM. bot. crypt.

{Champignons.) Sous-genre du Sporotrichum de Link. Quelques auteurs le croient assez distinct pour servir à l'établissement d'un genre. V. Sporotrichum. (a. f.)

* LYSMA. TE. Lysmata. ciust.

Genre de l'ordre des Décapodes , fa-

LYS 81

mille des Macroures , tribu des Carides, établi par Risso. qui lui a donné le nom de Mœlicerta déjà employé par Pérou pour désigner un groupe de Méduses. Les caractères de ce genre sont : antennes intermédiaires ou supérieures, formées de trois filets dont le plus court est joint à la base de l'un des deux plus longs ; antennes extérieures longues et sétacées; pieds des deux premières paires didactyles , ceux de la seconde étant plus longs

et ayant leur carpe divisé en plusieurs petits articles; pieds des trois dernières paires très-minces, terminés par un ongle simple; les quatre derniers étant plus courts que les autres ; carapace carénée en dessus, et terminée par un rostre fort court en avant. Ce genre se distingue de ceux de Ni/sa , llyménocère, Alpkê et Hypopolite , par les antennes intermédiaires qui n'ont que deux filets dans tous ceux-ci ; il s'éloigne des Palémons par son corps plus raccourci et ses pieds plus minces , et par la pièce qui précède la main qui est subdivisée en petits articles au lieu d'être entière.

Ces Crustacés se trouvent dans la Méditerranée - l'espèce qui sert de type à ce genre est :

La Lysmate soyeuse, *L. seticauda*, Risso (Crust. , p. 110 , pl. 2 , f. i). Elle est longue d'un pouce et demi ; son rostre est court, sexdenté en dessus et bidenté en dessous; les pièces natatoires de la queue sont ciliées sur leurs bords ; celles du milieu sont terminées par dix longues soies très-déliées; le corps est d'un rouge de corail , marqué longitudinalement de lignes blanchâtres. Ce Crustacé habite les eaux profondes des environs de Nice. (g.)

LYSSOSTYLIS. bot. ph.vn. V.

GuÉVIJ-LÉE.

LYSTRE. Lystra. ins. Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Homoptères , famille des Cicadaïdes , tribu des Fulgores , établi par Fabricius , et ne différant des Fulgores , auxquelles ces Insectes ressemblent beaucoup, que par leur tête qui est

i MAC

iransversc, et vie se prolonge pas en forme de museau. Le corps de Lystres est allongé; leurs élytres ne selargissent point en arrière comme celles des Flalles , et ne se terminent point par un rétrécissement comme celles des Isses; l'extrémité de l'abdomen des femelles des Lystres porte des paquets de filets cotonneux trèsblancs avec lesquels il est presumable qu'elles enveloppent leurs œufs. Ce genre se compose d'une assez grande quantité d'espèces propres aux Indes- Orientales , à la Chine et à l'Amérique méridionale; l'espèce qui lui sert de type est :

La Lystre laineuse , *L. lanata*, Fabr. ; *Cicacla lanata* , Lin. Les côtés du front sont rouges; l'extrémité des élytres est noire avec des points bleus. Elle se trouve à Cayenne et aux Antilles. (o.J

* *LYSURUS*. bot. crypt. (Champignons.) Genre ainsi caractérisé :

volva sessile , arrondie ; réceptacle continu au pédicule , et se divisant au sommet en plusieurs brandies redressées , égales , couvertes extérieurement d'un mucus mêlé de sporules qui , en se détachant, forme à la surface une sorte de racine. Le Phallus Mokusih de Linné fils a servi de type à ce genre fondé par Fries , Sjst. Mycol. , 2 , p. 286 ; il croît eu

MAB

Cline sur les racines de Mûriers; sa fétidité est extrême , sa vie trèscourte; son. volva est blanchâtre ; son stipe a trois ou quatre

pouces de hauteur; il est charnu à la manière des Phallus , de couleur de chair, plus foncé à l'extrémité; les découpures du cun-ceptacle sont au nombre de cinq , égales, un peu cylindriques, d'un rouge foncé. Les Chinois le supposent propre à guérir les ul-cères cancéreux; ils le mangent quelquefois, mais non sans dan-ger, (a. F.)

* LYŖAIODON. hept. orn. Klein, dans son Tentamen Erpetolo-giœ , formait sous ce nom un genre qui répond aux Couleuvres. (b.)

* LYTHRAIRES. bot. phan. On appelle plus généralement au-jourd'hui Salicariées cette famille naturelle de Plantes. V. Salicariées.

LYTHRODES.min. Karstena donné ce nom à une variété de l'Elajolithe. V. ce mot. ' (g..n.)

LYTHRUM. bot. phan. V. Sali-

CAIRE

* LYTТА. ins. (Fabricius.) V.

Cantharide.

LYZAN. pois. (Forskalh.) Espèce du sous-genre Liche. V. Gasterostée. (b.)

MaAN. bot. phan. (Rochon.) Un Walthedak Madagascar qu'on a pris à tort pour une- Tournefortie. (b.)

MAAR. ois. Syn. du Goéland Bourgmestre. V. Mouette, (dr. .z.)

MABA. bot. phan. Genre de la famille des Ébénacées et de la Diécie Triandrie , L. Ses fleurs dioïques présentent un calice découpé jusque vers son milieu en trois parties, et une corolle urcéolée trifide.

Dans les mâles les étamines hypogynes, en nombre égal, ou plus ordinairement double des divisions de la corolle , à filets tantôt simples , tantôt réunis alternativement deux à deux, s'insèrent autour d'un rudiment central de pistil; dans les femelles , l'ovaire à trois loges biovulées, se change en une baie ovoïde ou rarement globuleuse, entourée à sa base

Earle calice persistant cupuliforme.

es espèces de ce genre sont des Ar-

MAB

brisseaux à feuilles alternes, dépourvues de stipules entières et coriaces , dont les pédoncules axillaires, accompagnés de petites bractées, portent une seule (leur sur les pieds femelles,

plusieurs sur les mâles. Forster en fit le premier connaître une originaire des îles de la mer du Sud sous le nom de *Jaba elliptica*; R. Brown en a décrit sept de la Nouvelle-Hollande, et récemment Labillardière en a ajouté deux autres recueillies dans la Nouvelle-Calédonie {*V. Sertum Austro- Caledonicum* , tab. 35 et 56). On en trouve aussi une dans les Indes; c'est celle que Koenig

et Roxburgh appelaient du nom générique de Ferreula; enfin R. Brown pense que le Caja si rang de Rumph {Flerbar. Arnboin. , 5 , tab. î) appartient à ce genre.

MABEA. bot. phan. Genre de la famille des Euphorbiacées et de la Dodécandrie Monogynie, L. Ses fleurs sont monoïques : on observe dans les mâles un calice à cinq dents , pas de pétales, des étamines au nombre de neuf à douze, insérées sur un réceptacle à peu près conique , et dont les anthères adnées aux filets extrêmement courts regardent en dehors; dans les femelles le calice est partagé jusque vers son milieu en cinq divisions égales, ou en six dont trois alternativement extérieures et plus courtes, le style se termine par trois branches contournées; l'ovaire globuleux offre trois loges renfermant chacune un ovule unique, et devient plus tard une capsule à trois coques.

Aublét(-7a///. Guian. 187, tab. 554) a fait connaître deux espèces de Tilabea, originaires de la Guinée; mais les Herbiers de ce pays en contiennent plusieurs autres jusqu'ici inédites ; ce sont des Arbustes à rameaux sarmenteux , remplis d'un suc lactescent; les feuilles, accompagnées de stipules, sont alternes , entières ou légèrement crénelées, veinées, luisantes sur leur face supérieure; les pédoncules , disposés en panicules épaissies terminales, portent soit à leur base, soit plus haut , une bractée glandu-

MAB Ifci

leuse des deux côtés sur ses bords; les inférieurs plus longs et moins nombreux sont simples , et soutiennent chacun une seule fleur femelle; les supérieurs se divisent en trois branches dont chacune se termine par une fleur mâle. (a. d.J.)

MABI ou MABY. bot. phan. (Nicholson.) Nom caraïbe de la Palate, *Convolvulus Batalas*, L. V. Liseuon.

MABOLO. bot. phan. Nom de pays de Y Embryopteris de Roxburgh. et Gacrtner. V. Plaqueminitr. (b.)

MABOUIA et MABOUIER. bot.

phan. Noms de pays proposés par quelques botanistes français pour designer le genre *Morisonia*. y ' . ce mot.

MABOUYA. rept. saur. C'est-à-dire en langue caraïbe , Diable. F'.

Gecko. (b.)

* MABRE. pois. (Uelarocbc.) Syn.

de Sparus *Mormyrus*, L. , dans les îles Baléares. F' ' . Spare. (b..)

* MABUHUC. bot. phan. (Camelli.JSyn. de Cassythe. Fr. ce mot. (b.)

MABURNIE. *Mabumia*. bot.

phan. Genre de l'Hexamirie Monogynie , L. , établi par Du Petit-Thouars (Gêner. Nof. Madagasc. , n. 13) qui l'a ainsi caractérisé : calice adhérent à l'ovaire par sa base, tubuleux et muni de trois angles en forme d'ailes ; corolle remplacée par six appendices dont trois extérieurs plus grands; six élamincs réunies deux à deux et placées devant les trois plus larges appendices ; ovaire surmonté d'un style de la longueur du tube terminé par un stigmate capité à trois lobes ; capsule à trois loges poly spermes. Le nom de ce genre est un anagramme du *Burmannia*, genre dont il

est tellement rapproché qu'il serait possible que la Plante qui le constitue n'en fût qu'une espèce; elle a des tiges courtes , aphyllées , parsemées de petites écailles et terminées par deux ou trois fleurs. Cette Plante est indigène de Madagascar. (c)», (N.)

.MABY. bot. phan. V. Mahi.

584 MAC

*MACA. bot. phan. On ne peut reconnaître quel est l'Arbre mentionné sous ce nom dans le Recueil des voyages, mais il est présumable qu'il appartient à la famille des Palmiers ; c'est peut-être le même que celui que Humboldt mentionne sous le nom de Macanilla de Caripe , qui paraît appartenir au genre Martinèze , et dont les fruits comme ceux du Maca sont comparés à de petites pommes, et le tronc épineux. (b.)

MACACA. kam. (Lacépède.) Syn.

de Macaque. (b.)

MAGACCO. mam. De ce nom que les Portugais ont appliqué d'une manière générale aux Singes, est dérivé le mot Macaque dont on a fait le nom générique d'une division des Singes de l'ancien-Monde. V. Macaque, (is. o. ST. -h.)

MACACO. MAM. Syn. du Maki Vari , et non pas du Mococo , comme la ressemblance des noms pourrait le faire croire. /""Maki. (is. g. st.-h.)

MACAGO. ors. Espèce du genre Tinamou. V. ce mot. (dr..z.)

MA-CADA-CALA ou MACADA- POLA. bot. phan. Syn. indou de Morinda citriodora , ou Gala-Pilava des Malabares. (b.)

MAGACUS. mam. V. Macaque.

MACAGUA. ois. Espèce du genre Faucon. P'. ce mot. Vieillot en fait le type du genre qu'il forme sous le nom spécifique d'Hétéropières , mais qui n'a point été adopté par Temminck dont nous suivons la méthode.

(DR..Z

MAC AH AL AF. bot. phan. V. Calaf.

MAC AH ANE ou MACA.NE. Macahanea. bot. phan. Aublet (Pl. de laGuian. , 4 suppl. , p. 6) a décrit et figuré le fruit d'un Arbrisseau qu'il nomme Macakanea Guyanansis , et qu'il figure planche 371. Ce genre imparfaitement connu, et que Jussieu appelle Macanea , fait partie de la famille des Guttifères. Son fruit est une baie pyriforme. , inégale , co-

MAC

riacc , contenant dans une seule loge de quatre à six graines ovoïdes , coriaces , placées au milieu d'une pulpe charnue et attachées à des trophospermes pariétaux. Le Macakanea Guyane/isis , Aublet, loc. oit., est un Arbrisseau de quatre à cinq pieds de hauteur; il pousse des branches sarmenteuses qui entourent le tronc des Arbres voisins; ces brandies sont garnies de feuilles opposées, lisses, vertes , elliptiques , aiguës , finement dentées et portées sur un pétiole court ; les fruits sont réunis plusieurs ensemble.

Cet Arbrisseau, nommé Macacahana par les Garipons , croît sur les bords de la Crique des Galibis : il était en fruit dans le mois de juin.

* MACAIRA ou MAKAIRA. pois.

Espèce du genre Xiphias. P • ce mot.

* MACANCO. mam. V. Maki.

* MAC AND OU ou MACAN- DOUE. bot. phan. Syn. de Morinda cilrifolia à Java ; les Portugais de l'Inde l'appellent Macanda. (b.)

MAC AN IL LA DE CARIBE. bot.

phan. (Humboldt.)Ce qui pourrait bien être une faute d'orthographe espagnole, pour dire Mançanitla (petite pomme.) V. Maca. (b.)

MACAO, ois. V. Ara.

MACAQUE. Macacus. mam. Genre de Quadrumaues appartenant à la première division des Singes (ceux de l'Ancien-Monde ou les Catarrhinins de Geoffroy Saint-Hilaire) , et intermédiaire soit par ses formes , soit par ses habitudes , à celui des Guenons et à celui des Cynocéphales.

Les dents sont, comme chez tous les Singes de l'Ancien-Monde, au nombre de trente-deux, c'est-à-dire en même nombre que chez l'Homme ; elles sont d'ailleurs semblables à celles des Cynocéphales , et ne diffèrent de celles des Guenons que par un petit talon qui termine les dernières molaires à l'une et à l'autre mâchoire , et par la forme des canines

MAC

MAC

supérieures arrondies et non point aplaties à leur face interne, et présentant à leur face externe une dépression assez forte. L'angle facial est de 40° environ, terme moyen; mais il se trouve plus ouvert dans certaines espèces, moins dans quelques autres. Celles-ci se rapprochent ainsi davantage des Cynocéphales, dont l'angle facial n'est guère que de 50° environ, les premières se trouvant au contraire plutôt en rapport avec les Guenons et les Semnopithèques, où cet angle, assez variable, est toujours moins aigu. Néanmoins c'est dans la forme de la tête et du museau que nous trouverons les seuls caractères véritablement importants des Macaques, et presque les seuls aussi qui puissent servir à leur distinction. Le museau beaucoup plus gros et plus prolongé que chez les Guenons, du moins pour la plupart des espèces, est beaucoup plus court que chez les Cynocéphales; ceux-ci se distinguent d'ailleurs parfaitement par la disposition de leurs narines terminales et tout-à-fait antérieures.

Le corps est en général trapu et épais, le col court, la tête grosse, les membres robustes, et l'aspect de l'Animal véritablement désagréable et hideux. Les callosités des fesses sont très-prononcées, et la queue, quelquefois nulle, est ordinairement assez courte; elle ne devient d'ailleurs jamais, même chez les espèces où elle a le plus de force et de longueur, un organe de préhension, comme elle l'est chez beaucoup de Singes américains; caractère qui au reste appartient généralement à tous les genres de l'Ancien-Monde. Enfin leurs membres, à peu près égaux, sont dans leur essentiel conformés comme ceux des Guenons; et leurs mains sont de même pentadactyles.

Ils ont les lèvres minces, et les abajoues existent assez développées.

On peut faire à l'égard des habitudes des Macaques les mêmes remarques que nous venons de faire à l'égard de leur organisation. Généralement plus doux , plus sus-

ceptibles d'éducation que les Cynocéphales , ils sont beaucoup plus médians , plus indociles , et surtout plus lascifs que les Gue-nons , quelques espèces ayant plutôt les habitudes et le naturel de ces dernières , et d'autres se rapprochant au contraire davantage des Cynocéphales, tandis que plusieurs enfin se trouvent véritablement intermédiaires entre ces deux genres. C'est ce qu'on reconnaît assez facilement lorsqu'on étudie des individus adultes et bien portans; car les jeunes , même dans les espèces qui par les développemens de l'âge deviennent le plus complètement intraitables, ont d'abord assez de douceur; les femelles sont aussi ordinairement moins empressées à nuire et moins indociles que les mâles. Du reste les Macaques ont à tout âge beaucoup d'adresse et d'intelligence ; et quelques-uns d'entre eux sont même très-susceptibles d'éducation. Tel est particulièrement le Magot, que les bateleurs habituent sans trop de difficulté à obéir avec promptitude sur un geste ou sur un mot , à danser sur la corde, et à exécuter différens tours d'adresse qui amusent et souvent même étonnent vivement les spectateurs. D'autres Macaques ne sont guère susceptibles que d'être adoucis par la domesticité ; encore quand ils deviennent adultes , ou qu'ils commencent à vieillir, arrive-t-il souvent que leur caractère change entièrement , et qu'ils deviennent tout-à-fait indociles et intraitables.

Aussi tandis que beaucoup de personnes élèvent volontiers de jeunes Macaques , et les prennent même en affection dans cet âge où ils ne manquent véritablement ni de grâce ni de douceur , il en est bien peu qui veuillent les conserver long-temps, et qui ne

s'empressent de s'en défaire dès qu'ils sont parvenus à l'âge oii ils prennent avec leurs forces , les penchans et les habitudes qui caractérisent leur espèce. Ces Singes se sont reproduits assez souvent dans nos climats, au contraire des Guenons, et même des Cynocéphales,

686 MAC

malgré leur extrême lascivité. Cette différence tient uniquement , suivant Fr. Cuvier , à la facilité plus grande que l'on a de réunir à la fois les deux sexes, et aussi à la rapidité de leur développement. On peut remarquer cependant que la ménagerie du Muséum a plusieurs fois possédé en même temps les deux sexes de quelques espèces de Cynocéphales , et qu'elle a même encore maintenant le mâle et la femelle du Diill et du Papion , sans qu'on ait jamais réussi à les faire produire. Au contraire trois espèces de Macaques , le Maimon , le Rhésus et le Macaque proprement dit, ont plusieurs fois produit au Muséum et sa ménagerie possède même en ce moment deux jeunes individus nés en novembre 1824, presque dans la même semaine. Fr. Cuvier a donné l'histoire de l'un d'eux , lorsqu'il n'était encore âgé que de quarante-neuf jours (Hist. Nat. Mamm. par Geoff.

Saint-Hilaire et Fr. Cuv.) , et nous reproduirons ici les principales remarques faites par ce zoologiste , en ajoutant quelques autres détails d'après nos propres observations. L'accouplement se fait de la même manière que chez les autres Quadrupèdes , et la gestation dure environ sept mois.

Le jeune individu a dès sa naissance les couleurs de l'adulte, seulement avec une nuance un peu plus pâle; mais ses membres sont plus grêles , et sa tête sensiblement plus grosse.

Il a dès-lors les yeux ouverts, paraît voir les objets qui l'entourent , et suivre du regard les mouvemens qui se font près de lui. Du reste, s'attachant avec les quatre mains aux poils de la poitrine et du ventre de sa mère , tenant le mamelon dans sa bouche , et ainsi toujours disposé à teter, lorsqu'il en sentie besoin, il reste pendant long-temps à peu près immobile. La mère paraît peu gênée de ce fardeau , et marche comme à l'ordinaire , soit à quatre , soit à deux pieds; embrassant alors et maintenant son petit au moyen d'une de ses mains antérieures. Elle lui prodigue d'ailleurs les soins les plus empres-

MAC

ses, les plus lendres, pendant tout le temps qu'ils lui sont nécessaires, surveille avec beaucoup d'attention , et aide ses premiers mouvemens.

Cependant dès que le petit, devenu un peu plus âgé, commence à vouloir prendre une autre nourriture que le lait de sa mère, celle-ci, sans jamais cesser d'ailleurs de le soigner avec le même zèle , ne souffre pas qu'il satisfasse son désir; elle lui arrache le peu d'alimens qu'il vient à saisir, remplit ses abajoues, et s'empare de tout pour elle-même.

Le petit , dès-lors plein d'inelligence et d'adresse , sait cependant bien prendre de temps en temps un peu de la nourriture que sa mère lui refuse. Nous l'avons vu plusieurs fois saisir adroitement des amandes dans la main de celle-ci, au moment même où elle les portait à sa bouche, puis s'enfuir rapidement à l'autre extrémité de la cage , et les manger alors , en ayant la précaution de tourner le dos à sa mère. Il avait ainsi toujours le soin de s'écarter pour prendre de la nourriture, lors même que celle-ci venait à lui

en présenter elle-même ; ce que nous n'avons vu qu'une seule fois , et ce qui n'arrivait en effet que très-rarement (du moins lorsqu'il s'agissait de quelque friandise). Les deux jeunes Macaques du Muséum ont maintenant (décembre 1825) un peu plus de treize mois , et tout porte à croire qu'ils s'élèveront parfaitement. L'un d'eux , très-faible dans son premier âge , paraît cependant toujours assez délicat; et quoique l'un soit né huit jours environ avant l'autre, sa taille est beaucoup moins considérable. Tous deux continuent à recevoir les mêmes soins de leurs mères; et quoiqu'ils soient déjà presque'aussi gros qu'elles - mêmes , celles-ci les portent encore souvent, et paraissent même fort peu gênées de ce fardeau.

De simples différences de proportions sont, comme chacun sait, ce qui distingue la plupart des genres d'Oiseaux; de-là le vague de leurs caractères , l'incertitude de leurs h-

MAC

mites , et le peu de précision de toutes les méthodes ornithologiques. Une simples différences de proportions constituent de même presque uniquement , comme nous l'avons vu , les caractères du genre Macaque.

Aussi sommes-nous à son égard dans le même embarras ou nous nous trouvons continuellement à l'égard des Oiseaux. Plusieurs espèces , qui sont regardées comme de véritables Macaques par la plupart des auteurs modernes, pourraient presque tout aussi bien être considérées comme appartenant soit au genre Cynocéphale, soit au genre Guenon.

Tels sont le Bonnet-Chinois , la To-

que et même le Macaque proprement dit, classés même dans quelques systèmes parmi les Guenons, et l'Ouanderou, rapporté tour à tour à ce dernier genre et à celui des Cynocéphales. Quoiqu'il en soit, nous placerons, comme l'ont déjà fait Desmarest et F. Cuvier, tous ces Singes parmi les Macaques. Ce genre se trouvera ainsi composé d'un assez grand nombre d'espèces répandues dans l'Afrique ou dans l'Inde; l'une d'elles se trouve même, comme nous le verrons, jusque dans la partie la plus méridionale de l'Europe.

INous diviserons les Macaques, comme on l'a fait pour les Guenons, en plusieurs petits groupes, savoir :

les Cercocèhes, les Maimons et les Magots correspondant aux genres Cercocèhe, Macaque et Magot de divers naturalistes.

* Les Cercocèbes.

Les espèces que nous comprenons sous ce nom paraissent véritablement, à plusieurs égards, intermédiaires aux Macaques et aux Guenons; et Geoffroy Saint-Hilaire avait même cru pouvoir en former un genre particulier sous le nom de Gercocèbej 110m que nous ne conservons ici que comme celui d'une petite division parmi les Macaques. Elle se reconnaît facilement par les proportions de la queue plus longue que le corps. Les deux premières espèces se distinguent

MAC 587

en outre par leur face étroite et allongée, leur front nu, et la disposition fort remarquable des poils de leur tête qui sont divergens et dont l'ensemble forme une sorte de calotte.

La Toque, Geoff'r. St.-Ilil., Ami.

Mus. T. ix ; *Macacus radiatus* , Uesm.; *Cercocebus radiatus* , Geoff'r. , a le pelage d'un gris verdâtre en dessus avec le dessous du corps et de la queue et La partie interne des membres de couleur blanche ; le dessus de la queue est gris verdâtre comme le dessus du corps. Les poils divergens sont assez courts. Sa taille est de dix-huit pouces environ. Cette espèce-, qui habite l'Inde, et particulierement le Malabar, a été établie sous ce nom par Geoffroy Saint-Hilaire d'après un individu que possédait le Muséum. Quelques naturalistes avaient , il est vrai , supposé que la Toque pourrait bien n'être qu'une simple variété du Macaque Bonnet-Chinois, avec lequel elle a en effet beaucoup de ressemblance ; mais il est bien certain aujourd'hui qu'elle forme une espèce réellement distincte , comme la montre l'examen attentif de plusieurs individus amenés vivans en Europe. Du reste ses habitudes sont, suivant Desmarest , tout-à-fait analogues à celles des Guenons.

Le Bonnet-Chinois , *Macacus sinicus*, Desm.; *Cercocebus sinicus*, Geoll.

St.-Hil. (mais non pas , suivant Fr.

Cuvier, *Simiasinica* , L.), se distingue par son pelage d'un fauve brillant en dessus , avec la queue un peu plus brune , les favoris , la face interne des membres et le dessous du corps blanchâtres; les mains, les pieds et les oreilles noirâtres. La face est couleur de chair; seulement la lèvre inférieure est bordée «le noir. Les poils sont , dans cette espèce, gris à leur base avec leur partie terminale annelée de noir et de jaune; disposition qui se retrouve chez le plus grand nombre des Macaques, et particulièrement chez la Toque; mais chez le Bonnet-Chinois c'est le jaune qui domine: de-là la teinte généralement

fauve , et non pas verdâtre de son pelage. Cette espèce a la même patrie que la Toque, et vraisemblablement aussi les mêmes habitudes.

Le Macaque ordinaire , *Macacus irus*, Fr. Cuv. , Mêm. Mus. T. iv; *Macacus cynomolgus* , Desm. ; *Simia cynomolgus* et *S. cynocepalus*? L. , a environ un pied huit pouces jusqu'à l'origine de la queue, qui est aussi à

lieu près de cette longueur. Son péage est verdâtre en dessus , avec le dessous du corps et la face interne des membres d'un gris blanchâtre. La queue et les pieds sont noirâtres, et la face, à peu près nue , est de couleur de chair livide , avec une partie plus blanche entre les yeux. Les favoris assez courts sont de couleur verdâtre.

La femelle est un peu plus petite que le mâle, et présente quelques caractères particuliers. Cette espèce est le véritable Macaque de Buffon , et il paraît qu'on doit aussi lui rapporter l'Aigrette du même auteur. Ses mœurs sont généralement celles des autres Macaques; elle paraît cependant un peu moins indocile et moins lubrique; et c'est ainsi que nous voyons toujours à quelques différences de caractères correspondre aussi des différences dans les habitudes.

Le Macaque à face noire , *Macacus carbonarius* , que Fr. Cuvier (Mainm. Lithog. , livraison de décembre 1825) vient de décrire sous ce nom , est généralement d'un vertgrisâtre sur le dessus du corps et sur la face externe des membres , avec leur face interne, les parties inférieures du corps, les favoris, les joues et la queue, gris- blanchâtre. Une légère bande noire est placée audessus de

l'œil , et la face est aussi de cette couleur. Cette espèce, très-voisine de la précédente , se distingue d'ailleurs très-bien par la couleur de la face.

**** Les Maimons.**

On les distingue facilement par leur queue toujours beaucoup plus

MAC

courte que le corps et quelquefois même d'une extrême brièveté.

L'Ouanderou , Buff. T. xiv ; *Macacus silenus* , Desm. , *Simia silenus* , Schreb. , L., et *S. leonina*, L., se distingue facilement par son pelage généralement noir, avec l'abdomen et la poitrine blancs. Il a aussi reçu de Cuvier le nom de Macaque à crinière, parce que sa tête est entourée d'une longue barbe blanchâtre et d'une crinière cendrée , et de Pennant celui de Singe à queue de Lion , à cause d'une mèche de longs poils qui termine la queue. Son visage et ses mains sont noirs, tandis que ses callosités sont rougeâtres. Sa longueur est de dix-huit pouces, sans compter la queue qui en a dix seulement. Cette espèce habite les Indes-Orientales ou elle porte les noms de Nil-Bandar , de Lowando ou d'Elwauda , et non pasceluid'Ouanderou, que Buffon lui a composé. Elle est tout-à-fait indocile et intraitable, suivant plusieurs naturalistes. Cependant une femelle observée et décrite par Fr. Cuvier lui a paru douce et même caressante.

Le Rhésus , Audebert ; *Macacus erythrœus*; *Macacus Rhésus*, Desm.; *Simia erythrœa*, Schreb. ; le Macaque à queue courte, Buff.; le Maimon ou Rhésus de Fr. Cuvier, est en dessus d'un

beau vert-gris roussâtre, avec les membres antérieurs et les jambes plus grises et les cuisses plus jaunes à leur partie externe. Le dessous du corps et la face interne des membres sont blancs; et la queue, d'ailleurs courte, est grise en dessous et d'un vert roussâtre en dessus. La face est couleur de clair livide; et, suivant Fr. Cuvier, on voit au milieu du front, entre les yeux, un petit tubercule dont l'apparence est celle d'une loupe et qui grossit à l'approche du rut. Le Rhésus habite les Indes, et il a les mœurs que nous avons indiquées comme celles des véritables Macaques, c'est-à-dire qu'assez doux dans le jeune âge, il devient ensuite très-lubrique et presque tout-à-fait intraitable. F. Cuvier a décrit sous le

MAC

nom de Rhésus à face brune un Singe qui ne diffère guère du Rhésus ordinaire que par la couleur brune de la face et de toutes les parties nues.

Le Maimon, Buff. T. xiv, pl. 10 ; Audeb. ; *Macacus nemestrinus*, Desm.; *Simia nemestrina*, L. ; le Singe à queue de Cochon de plusieurs auteurs, est en dessus d'un fauve verdâtre, avec le milieu du sommet de la tête noir, cette tache descendant sur le col, le dos et la queue en prenant une teinte verdâtre. Les joues et toutes les parties inférieures du corps sont d'un blanc roussâtre ; la queue, que l'Animal tient souvent recourbée, est grêle et courte. L'espèce habite Sumatra, où elle porte le nom de Bariou.

Nous décrirons sous le nom de *Macacus libidinosus* un Singe déjà indiqué par Fr. Cuvier, qui le regarde comme une espèce nouvelle et bien distincte, et qui l'a fait figurer à ce titre dans l'Atlas du Dictionnaire des Sciences Naturelles ; et par Desmarest,

suivant lequel il ne serait qu'un Maimon. Notre description est faite d'après un dessin, de moitié environ de grandeur, qui se trouve dans la riche collection des Vélins du Muséum.

L'individu représenté, qui est une femelle, est fort semblable au Maimon, dont il diffère cependant par ses joues d'un fauve légèrement olivâtre, comme les épaules et les membres antérieurs, et non pas blanches ou blanchâtres connue chez le Maimon.

Il a de même une sorte de calotte noire sur la tête ; et cette tache se prolonge sur le dos et la queue, qui se trouvent, ainsi que toutes les parties postérieures du corps et la face externe des membres de derrière, d'un brun légèrement nuancé de fauve olivâtre. La face interne des membres, soit antérieurs, soit postérieurs, semble grisâtre sur le dessin ; et le dessous du corps d'un blanchâtre qui se nuance insensiblement avec le brun du corps. La face et les doigts sont à peu près couleur de chair. Enfin le corps paraît plus grêle que chez le Maimon, et la queue est à peu près

MAC 8g

de même longueur. Mais ce qui rend cette espèce extrêmement remarquable, c'est l'énorme turgescence de toutes les parties sexuelles pendant le rut. Tout ce qui environne la vulve, l'anus et les callosités (et même le dessous de la queue dans presque toute son étendue), acquiert un développement véritablement prodigieux, et dont il est tout-à-fait impossible de se faire idée, par l'illusion, quelquefois cependant assez abondante, qu'on observe périodiquement chez les autres Macaques.

Le Macaque à face bouge, *Macacus speciosus*, Fr. Cuvier, Mamm.

lith. , se distingue facilement par sa queue excessivement couite, sa face d'un beau rouge, et qui se trouve entourée de poils noirs; ses ongles noirs , et son pelage d'un gris vineux , avec les parties inférieures du corps et la région interne des membres, blanches : il habite les Indes-Orientales.

Le Macaque de l'Inde, *Macacus Maurus*, Fr. Cuv., Mamm. , lith., est encore une espèce qu'on reconnaît facilement par sa queue excessivement courte comme dans l'espèce précédente, et son pelage généralement brun-foncé; sa face, ses mains et ses oreilles sont noires. Cette es-

l>èce habile , comme la précédente , es Indes-Orientales ou elle a été découverte par Diard et Duvaucel.

*** Les Magots.

Cette division est très-remarquable par l'absence de la queue qui se trouve remplacée par un petit tubercule :

une seule espèce la compose.

Le Macot , *Macacus i/iuus*, Desm. ; *Simia inuus*, S. sylvanus et S. Pit/iecus de Linné et des auteurs systématiques, a quelquefois jusqu'à deux pieds el demi ; .son pelage est généralement d'un gris jaunâtre, avec les parties inférieures du corps et larégion interne des membres de couleur blanchâtre; sa face est couleur de chair livide. Le Magot est le fameux Pithèque des anciens, le Singe dont Galien a donné l'anatomic. Il est

f)go MAC

aujourd'hui amené très-fréquemment en Europe , où les bateleurs le dressent , comme nous l'avons dit , à divers exercices; il a

du reste à peu près les habitudes des Macaques; et c'est tout-à-fait à tort qu'on l'avait rapproché des Orangs , parce qu'il manque de queue comme les espèces de ce genre. Il est répandu dans diverses régions de l'Afrique , et se trouve même jusque sur le rocher de Gibraltar en Espagne. On a vu dans ce fait de l'existence simultanée du Magot sur la côte septentrionale de l'Afrique et dans l'Espagne un indice de la réunion primitive de l'Europe et de l'Afrique ; mais , suivant d'autres , les Magots de Gibraltar sont tout simplement les descendants de quelques individus qui, s'étant échappés de domesticité, se seront acclimatés et reproduits en ce lieu.

Nous ne rechercherons pas ici si le *Simia Platypigos* de Schreber , le *S. fusca* de Shaw , le Babouin à longues jambes de Buffon, \zBrown Baboon de Fennant, et quelques autres , sont bien réellement des Macaques comme le croient plusieurs zoologistes , et à quelles espèces ils doivent être rapportés. L'examen de ces questions nous engagerait dans de longues discussions qui ne nous apprendraient que très-peu de chose d'intéressant, et rien de certain.

(is. G. ST.-H.)

MACARATNGA. bot. phan. Du Petit-Thouars, dans les Nouveaux Genres de Madagascar, en nomme aussi un qui paraît appartenir à la famille des Euphorbiacées. Les fleurs sont dioïques ; les mâles offrent un calice quadriparti ; pas de corolle; huit ou douze étamines à filets saillans , libres, terminés par une anthère large et supérieurement aplatie, partagée comme en quatre lobes par deux sillons qui se croisent à angle droit ; dans les fleurs femelles le calice est très-petit et urcéolé , l'ovaire est surmonté par

un style en forme de languette portant sur un de ses côtés un stigmate velu ; le fruit est un follicule souvent hérissé de tuber-

MAC

cules plus ou moins allongés; il renferme une seule graine suspendue au sommet de la loge, et dans laquelle on observe un petit embryon à radicule supère, entouré d'un périsperme charnu. L'unité de stigmate et de loge semblerait écarter ce genre des Euphorbiacées, mais du reste il se place par l'ensemble de ses caractères, et d'ailleurs Du Petit-Thouars a rencontré une fois le fruit composé de deux coques accolées. Il n'a pas encore fait connaître les caractères des quatre espèces qu'il rapporte à ce genre, on sait seulement que trois d'entre elles croissent à Madagascar dont les habitants leur donnent ce nom de Macaranga, et qu'une quatrième a été trouvée à l'Ile-de-France où elle porte vulgairement celui de Bois Violon.

Ce sont des Arbres ou des Arbrisseaux rameux ; leurs feuilles alternes, cordiformes ou péllées et munies à leur base de deux glandules, sont accompagnées de stipules caduques; leurs fleurs sont axillaires ; les mâles disposées sur des épis rameux en petits pelotons dont chacun est soutenu par une courte bractée : les femelles, ordinairement solitaires, en offrent aussi une, mais plus grande et glanduleuse. (a. d. J.)

MACAREUX. Mormon, ois. (Illiger.) Genre de l'ordre des Palmipèdes. Caractères : bec assez court, plus haut que long, très-comprimé; les deux mandibules arquées, sillonnées transversalement, échancrées vers la pointe; arête tranchante, s'élevant plus que le crâne; narines marginales, linéaires, presque entièrement fermées par une membrane nue; pieds courts, retirés

dans l'abdomen ; trois doigts devant , entièrement palmés ; point de pouce ; ongles très-crochus ; ailes courtes ; les première et deuxième rémiges les plus longues; queue composée de seize rectrices.

Ces Oiseaux dont on a, faute de les bien connaître , beaucoup trop multiplié les espèces , se plaisent plus que partout ailleurs sur les mers glacées

MAC

du cercle arctique; confondus avec les Guillemois et les Pingouins en bandes très-nombreuses, ds peuplent ces tristes régions vers lesquelles la nature semble ne porter qu'avec regret quelques regards inféconds. Les Macareux parviennent rarement jusque dans nos parages tempérés; il est vrai que le peu d'étendue de leurs ailes, quoique leur permettant d'effleurer avec assez de rapidité la surface des eaux, s'oppose à ce qu'ils effectuent de longs voyages; toutelois ces ailes, toutes petites qu'elles sont, suffisent encore pour ne pas assimiler les Macareux à ces êtres équivoques qu'on ne sait trop dans quelle classe ranger. En effet si l'on voulait que les organes du vol fussent un attribut indispensable pour caractériser l'Oiseau , on ne pourrait regarder comme tel, ni le Pingouin dont l'aile n'est qu'une espèce de rame qui aide sa course sur les Ilots , ni le Mauciot chez lequel on ne trouve qu'une véritable nageoire plutôt couverte d'écaillés que garnie de plumes; et dans cette hypothèse le Macareux serait le dernier chaînon qui unirait les légers habitants des airs aux nombreuses tribus aquatiques.

Nous avons vu plusieurs fois sur nos côtes des Macareux qu'y avait jetés une longue tempête; ces Oiseaux misérables, meurtris

par la compression des vagues, se trouvaient hors d'étal de fuir notre approche, et se laissaient prendre sans opposer la moindre résistance. La nourriture des Macareux se compose de petits Poissons, de Mollusques, de Crustacés, et à leur défaut de Plantes aquatiques.

Ils nichent, à ce que l'on assure, vers les pôles, dans des crevasses de rochers ou dans des trous pratiqués dans les terres riveraines par les Quadrupèdes qui y séjournent d'ordinaire. La ponte consiste en un ou deux œufs blanchâtres, tachetés de cendré, et d'un volume disproportionné en grosseur avec la taille médiocre de l'Oiseau. Cet œuf ou ces œufs reposent sur un matelas assez épais de duvet qu'entourent

MAC 59i

des Lichens et de faibles Plantes marines.

Macareux à aigrette, *Fratercula cirrata*, Vieill. ; *Alca cirrata*, Lath.; Mormon cir/ala, Temm., Buff., pl.

enl. 761. Parties supérieures d'un noir bleuâtre; les inférieures d'un brun obscur; front, côtés de la tête, menton et tiges des rémiges d'un blanc assez pur; des paquets de plumes effilées partant de dessus les yeux et retombant le long du cou des deux côtés: ces plumes sont blanches à leur origine et jaunissent insensiblement; bec portant trois sillons, plus une proéminence plus épaisse; une cire cartilagineuse en forme de rosette aux angles des mandibules; pieds d'un jaune orangé foncé, avec les palmures rouges et les ongles noirs. Taille, dix-neuf pouces. La femelle est un peu plus petite; elle a l'aigrette moins fournie, et seulement deux sillons au bec. Dans les mers qui baignent d'un côté le Kamtschatka et de l'autre l'Amérique; ne s'éloignant pas à

plus de cinq ou six lieues des rochers et des îles où il se retire toutes les nuits dans des crevasses ou dans des trous qu'ils se sont creusés eux-mêmes à une profondeur d'un mètre environ , et dont on ne parvient à les tirer qu'après avoir essuyé des blessures assez graves , résultantes de leur bec fort acéré.

Macareux huppé. V. Starique.

Macareux Kallingak. V. Macareux A AIGRETTE.

Macareux du Kamtschatka. V.

Macareux a aigrette.

Macareux nu Larrador, Alca Labradorica , Lath. V. Macareux Moine.

Macareux MiTciiAG.vTcm. V. Macareux A AIGRETTE.

Macareux Moine, *Imo/7wort Fratercula*, Temm.; *slca arc/ica*, Gmel., Buff., pl. enl. 275. Parties supérieures et collier d'un noir lustré; joues, un large sourcil et gorge d'un gris blancâtre; rémiges d'un brun noirâtre; parties inférieures blanches; bec d'un bleu cendré à sa base, jaunâtre au centre et d'un rouge vif à la pointe;

Sga MAC

mandibule supérieure marquée de trois sillons; iris blanchâtre; bord des yeux rouge ; pieds d'un rouge orangé. Taille , douze pouces et demi.

Les jeunes ont l'espace entre l'oeil et le bec d'un cendré noirâtre , les joues et la gorge d'un cendré foncé, le large collier nuancé sur le devant du cou de cendré noirâtre , le bec plus petit ,

lisse , dénué de sillon , el entièrement d'un fauve brunâtre. Du nord des deux conlinens où l'espèce vit presque constamment sur les eaux et ne se montre à terre que fortuitement ou dans la saison de la ponte; en hiver on en voit arriver périodiquement sur les côtes de l'Europe tempérée ; mais ils regagnent leurs demeures glacées aussitôt que le froid est devenu moins insupportable.

Macareux du nord, Mormon glacialis , Leach. Parties supérieures noires, avec un collier presque aussi large que celui du Macareux Moine; joues et côtés de la tête d'un blanc grisâtre; rémiges brunes; parties inférieures blanches; mandibule supérieure très-élevée avec trois cannelures profondes, l'inférieure fortement arquée ; pieds d'un jauue orangé avec la palmure rouge et les ongles noirs.

Taille , douze à treize pouces. Des mers habitables les plus voisines du pôle.

Macareux Perroquet. V. Staiuque. (DR., z.)

MACARIBO. mam. Même chose que Caribou. V. Renne à l'article Cerf. (b.)

MACARISIE. Macarisia . rot .

phan. Nom donné par Du Petit— Thouars (Plantes des îles Austr., p.

4g, tab. i4) à un nouveau genre, dont la place , dans la série des ordres naturels, est encore incertaine , et qu'il caractérise ainsi : le calice est monosépale , turbiné , à cinq divisions réfléchies; la corolle formée de cinq pétales linéaires insérés à la base du calice; les étamines , au nombre de dix , sont monadelphes

par la base de leurs filets qui offrent entre chacun d'eux une petite dent

MAC

ui semble être une étamine avortée, l'ovaire est arrondi, à cinq loges contenant chacune deux ovules; le style est simple, de la longueur des étamines. Le fruit est recouvert par le calice et la corolle qui persistent; c'est une capsule ovoïde, allongée, marquée de dix sillons longitudinaux s'ouvrant en cinq valves, septifères sur le milieu de leur face interne, et appliquées contre un axe central et persistant. Chaque loge contient une seule graine ovoïde, comprimée, terminée supérieurement par une aile membraneuse plus longue que la graine. Cette graine se compose d'un tégument coriace recouvrant un endosperme ovoïde, charnu et blanc, contenant un embryon renversé, ayant la radicule cylindrique et les cotylédons foliacés et lancéolés.

Ce genre se compose d'une seule espèce, *Macarisia pyramidata*, Du Petit-Thouars, loc. cit. Arbuste à rameaux dressés, nombreux, effilés, cylindriques et opposés. Les feuilles sont aussi opposées, pétiolées, obtuses, dentées; les fleurs sont petites, formant des bouquets pédonculés placés à l'aisselle des feuilles.

Ce petit Aibre croît à Madagascar, où il a été observé par Du Petit-Thoirars. Ce savant botaniste pense que le genre *Macarisia* se rapproche par quelques caractères de la famille des Rhamnées. (a. r.)

MACARON DES PRÉS. bot.

crypt. (Paulet.) Syn. de Mousseron.

* MACASSO. bot. phan. Noix d'un Arbre des bords du Zaïre encore indéterminé. (b.)

* MACAVACAHOD. mam. Singe mentionné par Humboldt qui l'appelle Viduita et trop imparfaitement décrit pour être rapporté à son genre.

Ce nom de Viduita est un de ces diminutifs si employés en espagnol; il signifie petite Veuve. (b.)

* MACBRIDÉE. Macbridea. bot.

phan. Genre de la famille des Labiées et de la Didynamie Gymnospermie ,

MAC

L., établi par Elliot et Nuttall {Gen

of North Amer. Plants, 2 , p. 36) qui en ont ainsi fixé les caractères : calice presque turbiné, à trois segmens , dont deux ovales et larges , le troisième linéaire , lancéolé ; lèvre supérieure de la corolle enlière , l'inférieure plus courte et trilobée ; quatre étamines didynames; un style; quatre akènes au fond du calice. Ce genre ne se compose que d'une seule espèce qui était le *Thymra Carpliniana* de "Walther {Carol. 162); Elliot et Nuttall l'ont nommée *Macbridea pulchra*.

C'est une Plante indigène de la Caroline, dont les tiges sont droites , garnies de feuilles opposées , entières.

Les fleurs sont grandes, rougeâtres, marquées de raies blanches , et disposées en verticilles au nombre de quatre, et formant un épi terminal,

MACER et MACIR. bot. phan.

Le Macis dans Dioscoridc. P~. ce mol et Muscadier. (b.)

MACEREÏ. bot. piian. L'un des noms vulgaires des Airelles. V. ce mot. (b.)

MACERON. Srnyrnium. bot. phan.

Genre de la famille des Ombellifères, et de la Pentandrie Digynie , L. , établi par Tournefort , adopté par Linné et par tous les botanistes modernes avec les caractères suivans :

calice entier , très-peu apparent; cinq pétales acuminés , presque égaux , carénés et légèrement infléchis; cinq étamines ; ovaire surmonté de deux styles très-courts , terminés par des stigmates obtus; fruit strié, presque ovale, formé de deux akènes , marqués chacun de trois côtes dont les marginales sont conniventes. Les fleurs sont entourées ordinairement d'un involucre formé d'un petit nombre de folioles. Dans son travail sur les Ombellifères, Snrengcl a fait de ce genre le type d'une tribu à laquelle il a donné le nom de Smyrniées. V. ce mot. 11 se compose de huit espèces dont quatre croissent dans l'Europe méridionale, une dans quelques contrées de l'Amérique du

TOME IX

Nord , une dans les forêts du Caucase, une en Egypte, et une dernière au cap de Bonne-Espérance. Parmi celles qui sont indigènes d'Europe , nous mentionnerons les suivantes :

Le Macjeron commun, *Smyrniolum olusatrum* , L. , vulgairement nommé Gros Persil de Macédoine, est une Plante qui croît dans les lieux humides du midi de l'Europe. De sa racine grosse, blanchâtre et bisannuelle, s'élève une tige rameuse, haute de près d'un mètre, garnie à sa base de feuilles Internées , à folioles ovales , arrondies , dentées et lobées; celles de la partie supérieure sont simplement ternées , et à folioles lancéolées. Les ombelles des fleurs sont d'un blanc jaunâtre ; à ces fleurs succèdent des fruits en forme de croissant , cannelés et noirâtres. Toutes "les parties du Macerou exhalent une odeur très-aromatique. On en faisait autrefois usage comme Plante potagère , mais aujourd'hui on lui préfère soit les feuilles de Persil, soit les jeunes pousses du Céleri qui ont une saveur très - analogue , mais plus agréable. Quant aux propriétés anisicorbuliques de ses feuilles, el à la vertu cordiale et carminative de ses akènes , elles n'ont rien de bien spécial , el elles le cèdent même en énergie à plusieurs autres Ombellifères.

Le Maceron per folié , *Smyrniolum perfoliatum* , L. , est une fort belle espèce dont la racine est napiforme et vivace; la tige droite, haute de plus d'un demi-mètre , ordinairement simple, glabre et striée- Elle possède des ieuilles radicales , Internées , à folioles arrondies et crénelées ; celles de la tige sont coidiformes, scs-siles, embrassantes et comme pei foliées. Les fleurs sont jaunes et forment des ombelles composées de cinq à sept layons. Cette Plante croît eu Provence, en Esp igne, en Italie et en Hongrie. Elle se cultive avec facilité sous le climat de Paris. Nous eu avons

même vu un grand nombre d'individus croissant spontanément dans les terrains incultes qui avoisinent l'Ecole de J.J. Lanique du Jai>

5g4 MAC

clin du Roi, et qui provenaient sans doute de graines échappées de celui-ci. (G..N.)

MACHJERINE. Machoerina. bot.

phan. Genre de la famille des Cypéracées , établi par Valh (E/iumer.

Plant. , 1 , p. 208) pour le *Schoenus reslioides* de Swartz (Fl. Ind.-Occid. , 1 , p. 104). Ce genre a ses fleurs polygames et 'paniculées ; ses épillets sont pauciflores , composés d'écaillés imbriquées et un peu écartées; chaque fleur se compose de deux squames ovales , lancéolées , de trois étamines et d'un pistil entouré de soies hypogynes. Le *Machoerina reslioides* , Yahl , loc. cit., est une Plante vivace originaire de l'Amérique méridionale. Son chaume est dressé , très-simple, follement comprimé , triangulaire et articulé à son sommet; les feuilles sont radicales , larges , glabres, sans nervures et assez semblables à celles de *V. Iris germanica* ; leur bord est ferrugineux. Le chaume n'en porte qu'une seule. Les fleurs sortent d'une écaille en forme de spathe.

MACH/ERIDM. bot. phan. Ce genre, de la famille des Légumineuses , a été établi par Persoon (Enchirid. , 2 , p. 276} qui l'a placé dans la Diadelphie Décandrie , L. En l'adoptant, Kunth {Nov. Gen. et Spcc.

Plant. œquin. , 6, p. 091) lui a imposé les caractères suivants : calice campanulé , à cinq dents et accompagné de deux bractées ;

corolle papilionacée ; étamines réunies en un seul tube fendu (selon Aublet) ou diadelphes (selon Jacquin); ovaire stipité ; stigmate simple , aigti 5 légume stipité, indéhiscnt, finissant en une aile membraneuse , cultiiforme , et ne contenant qu'une seule graine réniforme.

Ces caractères ont été composés d'après ceux donnés par Aublet et Jacquin , pour différentes Plantes que es derniers auteurs rapportaient au cenre *Nissolia* de Linné. Le nombre ge ces espèces n'est pas considérable ; d ne s'élève qu'à sept ou huit. Ce sont es Arbres ou des Arbrisseaux qui

MAC

croissent tous dans l'Amérique méridionale et les Antilles. Celles que Persoon a indiquées comme indigènes de l'île de Madagascar ne sont pas assez bien décrites pour être rapportées avec certitude au genre *Machœrium*. Leurs branches sont sarmenteuses , volubiles , garnies de feuilles alternes , imparipinnées , à trois à six folioles alternes, accompagnées de stipules pétiolaires, caduques. Leurs fleurs sont disposées en grappes paniculées au sommet des rameaux. Elles ont une couleur violette, et chacun de leurs pédicelles offre une bractée à sa base. L'espèce ue l'on doit considérer comme type e ce genre. est le *Machœrium ferrugineum* , Persoon , ou *Nissolia quinata* d' Aublet. De Candolle (*Prodr. Sjst.*

eget., 2, p. 258) ne considère le genre *Machœrium* que comme une section du *Nissolia*, tout en inclinant néanmoins pour sa séparation. Il en a éloigné le *Nissolia arborea* de Jacquin , proposé par Kunth comme espèce de *Machœrium*. (G..N.)

* MACHALEB. bot. phan. (Rauwolf.) La Noix de Ben ou du Moringa. V, ce mot. (b.)

MACHAN. MA M.. Quelques anciens voyageurs ont désigné sous ce nom la Panthère ; il n'est probablement qu'une corruption de l'espagnol JWa/zc/iada, qui signifie tachetée. (b.)

MACHANE. bot. phan. Pour Macahane. F. ce mot. (u.)

* MACHAON, ins. Nom scientifique du grand Papillon à queue, de Geoffroy , l'une des plus belles espèces de l'Europe où elle vit sur les Ombellifères. (n.)

MACHAONIE. Machaonia. bot. phan. Humboldt et Bonpland {Pl.

yEquin., 1 , p. 101 , t. 29) ont appelé ainsi un nouveau genre de la famille des Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie , L., voisin du Knoxia , et qui offre les caractères suivans : le tube du calice est adhérent avec l'ovaire infère ; le limbe est à cinq divisions assez courtes ; la corolle est

MAC

i monopétale , infundibuliforme , à

i cinq divisions , velue à l'entrée du tube ; les étamines , au nombre de

i cinq , sont insérées au bout du tube et saillantes ; l'ovaire est à deux loges contenant chacune un seul ovule pendant. Le style se termine par un stigmate bifide. Le fruit est une capsule cunéiforme , allongée, couronnée par le limbe du calice , à deux loges et à deux coques monospermes, coriaces, indéhiscentes. Ce genre

se compose d'une seule espèce, *Machaonia acuminata* , Humh. et Bonpl. , loc. cit. , t. 29. C'est un grand Arbre très-rameui; et très-touffu , dont les feuilles opposées sont pétiolées , obovals, acuminées , très-entières , accompagnées de deux stipules interpetiolaires. Les fleurs sont petites , blanches , disposées en panicule terminale et très-rameuse. Ce bel Arbre est cultivé dans les rues de la ville de Guayaquil , dans la province de

'Quito. Il fleurit en février, (a. b.)

MACHE, bot. phan. Nom vulgaire des Valérianelles et plus spécialement de la *Valeriana olitoria* , dont on mange les feuilles en salade.

V. Valérianelle. (a.b

MACHE RIE. bot. phan. Pour *Machaeria*. ce mot. (b.)

MACHETES. ois. (Cuvier.) Syn.

de Combattant. (b.)

MACHETTE, ois. Syn. vulgaire et ancien du Hibou *Brachyote*. Ir.

Chouette. (db..z.)

MA-CHI. bot. phan. Syn. de *Sesamum orientale* , L. (b.)

MACHtLE. *Machilis*. ins. Genre de l'ordre des Thysanoures , famille des Lépidoptères , établi par Latreille , et que tous les entomologistes avaient confondu avec les Lépidoptères ; les caractères de ce genre sont : yeux très-saillants, presque contigus et occupant la

majeure partie de Ja lèle ; pulpes maxillaires très-grands et en orme de petits pieds ; corps convexe ; t arqué en dessus ; abdomen termilé par des petits filets propres pour c saut et dont celui du milieu , placé

MAC 595

au-dessus des deux autres , est beaucoup plus long. Ces Insectes ont la tête petite, enfoncée dans le corselet; leurs yeuv sont grands ; les antenne* sont en forme de soie et fort longues , elles paraissent naître , ainsi que les palpes maxillaires , d'une même ligne transversale; le premier segment du corselet est beaucoup plus court et plus étroit que le second, se replie sur les côtés , devient presque cylindrique et avance de part et d'autre antérieurement; le second segment est fort grand et élevé; le reste du corps est ensuite formé de plusieurs anneaux qui diminuent insensiblement de grandeur jusqu'à l'extrémité postérieure qui est terminée par les trois filets dont nous avons parlé plus haut. La forme générale du corps de ces Insectes approche de celle d'un cône , les côtés sont comprimés et son dos est voûté au milieu , et tout le corps est couvert fie petites écailles ; on voit tout le long de ses côtés de petits appendices cylindriques , simples en majeure partie et dont l'usage est inconnu; les pâtes sont assez courtes; les tarses sont coniques , composés de deux pièces dont la dernière est munie de deux crochels. Les Machiles sautent très-bien avec leur queue. Ces Insectes diffèrent des Lépismes par les yeux, par la forme du corps et par les trois filets de la queue qui ne sont pas propres à sauter dans ces derniers. Les Podures s'éloignent des Machiles par leurs palpes qui ne sont point apparens , et par leurs antennes qui sont composées de quatre articles.

La seule espèce connue de ce genre est :

La Machile Polypode, M. Polypoda, Latr.j Lepisma Polypoda ,
L.

On la trouve en Europe. (g.)

MACH1LDS. bot. phan. Plusieurs Arbres d'Amboine, employés comme bois de construction, ont été décrits et figurés sous ce nom par Rumph [Heib. yfmboin., 5, t. 40-4i). Ou ne peut, d'après les descriptions et les figures , déterminer à quel genre ils appartiennent. (g..n.j

5g6 MAC

MACHLIS. mam. (Pline,) V. Élan à l'article Cerf. (b.)

MACHOIRAN. Mjstus, vois. Sousgenre de Silure. V. ce mot.
(b.)

MACHOIRE DE CHEVAL

Moll. Nom vulgaire et marchand du Cassis tuberosum. f. Casque,
(b.)

MACHOIRES, zool. Dans les Animaux vertébrés et articulés , on donne ce nom aux parties solides qui forment en quelque sorte la charpente delà bouche. Les Mâchoires se distinguent en supérieure et en inférieure.

Comme cet organe varie beaucoup dans les diverses classes d'Animaux, nous renvoyons à chacune d'elles pour connaître les particularités relatives à leur organisation, etc. f.

Bouche, Insectes, Mammifères, Oiseaux, Poissons et Reptiles,
(a.r.)

MACHOMOR. bûtt. cryft. {Câampignons.) Les Kamtschadales composent avec Y Agaricus acris, qu'ils nomment ainsi, une liqueur enivrante, dont l'excès cause un assoupisse-

MAC

ment d'où résulté quelquefois la mort. (jj)

MACHOQDET. ins. Bomare dit qu'on donne ce nom dans les îles (sans dite lesquelles), à un Gryllon qui a les ailes gaufrées , se tient dans les trous d'Arbres, n'entre pas dans les maisons comme le nôtre , et qui produit un bruit métallique semblable à celui du marteau sur l'enclume. On ne peut savoir ce qu'est cet Animal sur une telle indication du compilateur Bomare. (b.)

MACHOTTE. ois. L'un des syn.

vulgaires de Chouette. V. ce mot.

* MACHDELE. fois. Espèce du genre Raie. V. ce mot. (b.)

MACIGNO. géol. V. Lagoni et

PSAMMITE.

MACIR. BOT. FHAN. V. MACER.

MACIS. bot. fhan. On appelle ainsi l'Ai ille rose et charnu , qui recouvre la graine du Muscadier. Tr.

ce mot. (a. r.\

Sources et licence

Texte : https://archive.org/details/b21301141_0008. Domaine public ; numérisation mise à disposition par Internet Archive. Mise en forme : liregratuitement.com. Tout ce que nous ajoutons reste libre.